



LIBRARY OF

D. Z. P. Metcalf

1885-1956

GENRE NYMPHALE.

CARACTÈRES DU GENRE.

ANTENNES terminées en une petite massue allongée; longueur des palpes inférieurs ne surpassant pas notablement celle de la tête; cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouverte en arrière, mais se rétrécissant vers son milieu. Chenilles n'ayant que quelques épines ou quelques tubercules, avec l'extrémité postérieure du corps plus ou moins fourchue.

1. *Massue des antennes formée presque insensiblement, grêle, cylindrico-obconique.*

A. *Ailes supérieures allongées, les inférieures larges.*

Le genre NEPTIS de Fabricius. (Pap. *Aceris*, *lucilla*, etc.)

2. *Massue des antennes formée brusquement, épaisse, en forme de cône renversé ou allongé.*

Le genre APATURA de Fabricius. (Pap. *Iris*, *ilia*, *Bolina*, etc.)

Le genre PAPHIA du même. (Pap. *Jasius*, *Stelenes*, *Chiron*, etc.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues extérieures, linéaires et aiguës.

1. NYMPHALE JASIUS.

Ailes supérieures ayant de part et d'autre une raie maculaire, et le bord postérieur, fauves; dessous des quatre ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

2. NYMPHALE PÉLIAS.

Dessus des quatre ailes avec une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, fauves; dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

3. NYMPHALE BRUTIUS.

Dessus des ailes avec une bande blanche sur le milieu; dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

4. NYMPHALE CASTOR.

Dessus des ailes fauve, avec le limbe postérieur largement noir; dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux, et une bande, blancs.

5. NYMPHALE POLLUX.

Dessus des ailes avec une bande fauve sur le milieu; dessous noir, avec des anneaux, et une bande, d'un blanc-verdâtre.

6. NYMPHALE EUDOXE.

Dessus des ailes avec une bande sur le milieu, et des taches à l'extrémité, fauves; dessous ferrugineux vers la base, avec des anneaux argentés; ailes inférieures seulement avec une bande blanche.

NYMPHALE. (Insecte.)

7. NYMPHALE Lucrétius.

Dessus des ailes avec deux Landes jaunes, maculaires: dessous ferrugineux, avec quelques anneaux bleuâtres vers la base; inférieures avec une raie grise, postérieure et transversale.

8. NYMPHALE Fabius.

Dessus des ailes avec une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, jaunes: dessous d'un cendré-luisant, avec des ondes noires à la base.

9. NYMPHALE Anticléé.

Dessus des ailes avec une bande fauve, terminale: bande des supérieures maculaire et plus courte, bande des inférieures offrant quatre petits yeux.

10. NYMPHALE Candiopé.

Dessus des ailes d'un jaune-roussâtre, avec l'extrémité tachetée de noir et de fauve: dessous avec l'origine de la côte d'un vert-pomme-luisant.

11. NYMPHALE Athamas.

Ailes avec une bande discoïdale d'un vert-blanchâtre, presque transparente, et bordée extérieurement en dessous par des lunules ferrugineuses.

12. NYMPHALE Sempronius.

Ailes avec deux queues, blanches, ayant le bord noir et ponctué de blanc.
FAB.

13. NYMPHALE Horatius.

Ailes dentées, ayant deux queues, noires: extrémité des inférieures d'un rouge-sanguin, avec des points oculaires noirs.
FAB.

14. NYMPHALE Trivdate.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec des lunules d'un jaune d'ocre sur la tranche du bord terminal: moitié postérieure des quatre ponctuée de bleuâtre.

15. NYMPHALE Thurius.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec des lunules d'un jaune d'ocre sur la tranche du bord terminal: milieu des supérieures avec des points, celui des inférieures avec une large bande, bleuâtres.

16. NYMPHALE OEclus.

Dessus des ailes d'un bleu-noir: dessous d'un bleu-cendré et ondulé de noir, avec une tache fauve à l'angle de l'anus.

17. NYMPHALE Éthéocle.

Dessus des ailes d'un vert-noir; dessous brunâtre: leurs deux surfaces avec une bande blanche, discoïdale.

18. NYMPHALE Éphyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec des points verdâtres sur le bord postérieur des premières, et des lunules blanches sur le bord correspondant des secondes.

19. NYMPHALE Étésipe.

Dessus des ailes d'un bleu-noir; dessous marbré de blanc, de noir et de ferrugineux: leurs deux surfaces avec une bande blanche discoïdale.

20. NYMPHALE Éthéta.

Dessus des ailes d'un noir-bleu, avec des taches d'un bleu-pâle sur la moitié postérieure: dessous marbré de blanc, de noir et de ferrugineux.

21. NYMPHALE Bénécie.

Dessus des ailes noir, avec une Lande rousse, commune: dessous des inférieures tacheté de blanc, de jaune et de ferrugineux.

22. NYMPHALE Pyrrhus.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec la base d'un jaune d'ocre pâle: les inférieures avec une double rangée de lunules bleuâtres.

NYMPHALE. (Insecte.)

23. NYMPHALE NISUS.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les inférieures d'un bleu-pâle avant le bord, avec des points oculaires et une bande blanche.

24. NYMPHALE SOLON.

Ailes en queue, noires, avec une bande jaunâtre, et la base obscure. FAB.

25. NYMPHALE XIPHARÈS.

Dessus des ailes noir : milieu des supérieures avec des taches blanches, milieu des inférieures avec une bande jaune, dentée en dehors.

26. NYMPHALE MILTIADÈ.

Ailes en queue, d'un brun-obscur ; les inférieures avec une tache blanche : dessous des quatre avec une bande blanche, commune, et un seul œil. FAB.

B. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec une queue extérieure, linéaire, aiguë, et la dent qui précède l'angle anal obtuse et un peu plus prononcée que les autres.

27. NYMPHALE ACHÉRONTE.

Dessus des ailes supérieures roux à la base, noir et tacheté de blanc à l'extrémité : inférieures d'un ferrugineux-obscur, avec un point noir.

C. Bord postérieur des premières ailes concave, et plus ou moins tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes avec deux queues linéaires, dont l'une anale et courbée du côté du corps ; l'autre extérieure, oblique, beaucoup plus longue, et obtuse à son extrémité.

28. NYMPHALE THÉTIS.

Dessus des ailes fauve, avec trois raies noires, transverses, communes, droites : dessous glacé de blanc-verdâtre, avec une ligne transverse et discoïdale, puis une rangée de points oculaires.

29. NYMPHALE PELLÉNIS.

Dessus des ailes fauve, avec deux lignes noires, transverses, communes ; la postérieure des supérieures anguleuse : dessous glacé de blanc-verdâtre, avec une ligne transverse et discoïdale, puis une rangée de points oculaires.

30. NYMPHALE ASTIDA.

Ailes en queue, d'un brun-obscur, avec un espace fauve, discoïdal et commun : les supérieures avec une lunule noire. FAB.

31. NYMPHALE COTÉSIE.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec la base et une double bande postérieure d'un ferrugineux-purpurin : dessous avec la moitié antérieure très-blanche et bordée en dehors par une ligne ferrugineuse, dentée.

32. NYMPHALE CHIRON.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec quatre bandes communes d'un brun-tanné : dessous avec la moitié antérieure d'un gris de perle et bordée en dehors par une bande blanche.

33. NYMPHALE THÉMISTOCLE.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec quatre bandes communes d'un brun-tanné : dessous d'un brun-violet, avec une rangée postérieure de points noirs.

34. NYMPHALE DIONÉ.

(Voyez pag. 292, n^o. 12.)

35. NYMPHALE CORINNE.

(Voyez page 291, n^o. 11.)

36. NYMPHALE FURCULA.

Dessus des ailes fauve à la base, ensuite noir et glacé de bleu : dessous d'un ferrugineux-luisant, avec deux lignes noires, transverses et ondulées.

NYMPHALE. (Insecte.)

D. Bord postérieur des premières ailes concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre extérieure, oblique, dilatée en angle vers l'origine de son côté interne, un peu courbe et rétrécie à son extrémité.

37. NYMPHALE Orsiloque.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes transverses d'un gris de perle; dessous d'un gris de perle, avec des bandes fauves.

38. NYMPHALE Crithon.

Ailes en queue, d'un brun-noirâtre en dessus, d'un gris-violâtre en dessous: une bande blanche sur chaque surface. FAB.

E. Bord postérieur des premières ailes peu concave ou presque droit. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre extérieure, oblique, linéaire et aiguë.

39. NYMPHALE Camillus.

Ailes blanches de part et d'autre, avec des bandes transverses roussâtres et bordées de brun.

40. NYMPHALE Thyoné.

Ailes fauves de part et d'autre, avec plusieurs lignes transverses d'un brun-noirâtre: les 4^e., 6^e., et 8^e. lignes des secondes ailes légèrement bordées de blanc.

41. NYMPHALE Hylas.

Ailes fauves ou blanches de part et d'autre, avec des lignes transverses et le bord d'un brun-noirâtre: deux points à l'angle interne.

42. NYMPHALE Périandre.

Ailes blanches de part et d'autre, avec six lignes transverses roussâtres, le bord postérieur brun et rayé de blanc.

43. NYMPHALE Coelès.

Ailes un peu en queue (avec deux queues), rayées de blanc et de jaunâtre, et ayant une bande blanche sur le milieu: dessous des inférieures avec une rangée de points oculaires. FAB.

F. Bord postérieur des premières ailes dilaté en angle vers son milieu. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, et ayant une queue extérieure, oblique, assez longue, arrondie à son extrémité.

44. NYMPHALE Hippoda.

Dessus des ailes noir: supérieures variées de fauve et de jaune; inférieures avec une rangée de points blancs vers l'angle de l'anus.

G. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, et ayant une queue extérieure, oblique, obtuse ou arrondie à son extrémité.

a. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

45. NYMPHALE Clytemnestre.

Ailes d'un noir-brun: les deux surfaces des supérieures avec une bande d'un jaune d'ocre sur le milieu: dessous des quatre ayant des taches argentées vers la base.

46. NYMPHALE Décus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, sur le milieu: inférieures rousses vers l'angle anal, avec des yeux et deux points violets.

47. NYMPHALE Êtota.

Ailes un peu en queue, d'un brun-noirâtre, avec des ondes plus foncées et une bande blanche commune sur le milieu: inférieures avec deux yeux en dessus et en dessous. FAB.

NYMPHALE. (Insecte.)

48. NYMPHALE Vétanès.

Dessus des ailes blanc et sans taches à la base ; ferrugineux à l'extrémité, avec des points fauves et des points noirs.

49. NYMPHALE Lycurgue.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec une rangée de lunules d'un bleu-pâle sur le limbe postérieur : dessous des inférieures avec des points blancs, marginaux.

50. NYMPHALE Portia.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec une ligne anguleuse et le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : dessous gris, avec des points noirs vers la queue des inférieures.

51. NYMPHALE troglodyte.

Ailes dentées et en queue, rousses, avec une ligne transverse et le bord postérieur d'un brun-noirâtre. FAB.

52. NYMPHALE Ryphea.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, à reflet violet en dessus, avec deux bandes souci sur les premières, et une tache presque discoïdale de cette couleur sur les secondes.

53. NYMPHALE Néséc.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : supérieures avec un reflet violet et deux bandes souci, inférieures sans taches.

β. Bord interne des premières ailes avec une échancrure plus ou moins profonde, au moins dans les mâles.

54. NYMPHALE Hélié.

Ailes dentées, d'un brun-tanné en dessus : extrémité des supérieures noirâtre, avec des taches d'un jaune d'ocre et disposées en une bande anguleuse.

55. NYMPHALE Halicc.

Ailes entières, rousses en dessus : moitié postérieure des supérieures d'un noir-bleu, avec une bande très-blanche, anguleuse, interrompue dans son milieu.

56. NYMPHALE Pléione.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures noir : dessous réticulé de ferrugineux, et offrant sur le milieu une raie brune transversale.

57. NYMPHALE Éribote.

Ailes entières, fauves ou ferrugineuses en dessus, avec un reflet violet à la base : inférieures ayant de part et d'autre des points marginaux presque ocellés.

58. NYMPHALE Polycarme.

Ailes entières, noires en dessus, brunes en dessous, sans taches. FAB.

59. NYMPHALE Laertia.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec la base glacée de violet : dessous des supérieures avec des points blancs, marginaux.

60. NYMPHALE Motvus.

Ailes entières, noires en dessus, avec la base glacée de bleu-verlâtre : dessous des supérieures sans taches au bord terminal.

61. NYMPHALE Octavius.

Ailes en queue, noires, avec une bande verte, courte : dessous gris, avec une ligne brune, transversale. FAB.

II. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Angle anal des secondes prolongé et replié en dessous.

γ. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

NYMPHALE. (Insecte.)

62. NYMPHALE Orion.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : supérieures avec une bande longitudinale, inférieures avec la base, fauves ; bord postérieur des quatre blanchâtre de part et d'autre.

63. NYMPHALE? Cocytæ.

Ailes en faux, noires en dessus, avec le bord postérieur cendré. FAB.

64. NYMPHALE Odin.

Ailes entières, unianguleuses, obscures : inférieures offrant de part et d'autre une couple de points noirs presque ocellés. FAB.

65. NYMPHALE Mycétine.

Dessus des ailes d'un noir-violet, avec une bande commune d'un bleu-ardoisé : dessous des supérieures avec deux points ocellés à la base.

66. NYMPHALE posthume.

Ailes en faux, entières, d'un brun-noirâtre, avec le disque bleu : dessous des inférieures gris et sans taches. FAB.

67. NYMPHALE Cymodoce.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec un reflet bleu à la base : angle anal des inférieures offrant de part et d'autre un seul œil.

68. NYMPHALE Égeste.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le bord postérieur des quatre et le milieu des inférieures d'un brun-obscur : dessous d'un brun-incarnat, avec une ligne ferrugineuse, commune.

69. NYMPHALE Bisaltide.

Dessus des ailes fauve, avec l'extrémité des supérieures noire et ponctuée de blanc de part et d'autre : dessous des supérieures avec deux yeux peu prononcés, dessous des inférieures avec trois.

J. Bord interne des premières ailes avec une échancrure, du moins dans les mâles.

70. NYMPHALE Ilys.

Dessus des ailes fauve : supérieures avec une bande blanchâtre, anguleuse, vers l'extrémité : dessous des inférieures d'un bleu-pâle à la base.

71. NYMPHALE Isidora.

Dessus des ailes fauve, avec une tache sur la côte, et le sommet des supérieures, noirâtres : dessous des inférieures avec des points oculaires sur le bord terminal.

72. NYMPHALE Marthésius.

Ailes entières, noires en dessus, avec une rangée postérieure de points blancs : base des supérieures largement fauve.

73. NYMPHALE Roger.

Ailes entières, noires en dessus, avec deux bandes sur les supérieures, et une tache sur le milieu des inférieures, d'un rouge-vermillon : dessous varié de grisâtre et de ferrugineux.

I. Bord postérieur des premières ailes droit, ou à peine convexe. Angle anal des secondes prolongé et obtus.

74. NYMPHALE Dirécé.

Ailes d'un brun-obscur : supérieures offrant de part et d'autre une bande jaune : dessous des quatre rayé de blanchâtre.

75. NYMPHALE Phorcis.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec quelques lignes noires, transverses, et en outre deux points gris aux inférieures.

K. Bord terminal des ailes supérieures droit, ou à peine concave. Ailes inférieures allongées dans le sens de la longueur du corps.

NYMPHALE. (Insecte.)

76. NYMPHALE Mésentéria.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures avec une bande fauve, transverse, bifide; leur dessous jaunâtre à la base, avec des points d'un bleu-luisant.

77. NYMPHALE Cocala.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande transverse sur le milieu : bande des supérieures fauve, bifide; bande des inférieures blanche.

78. NYMPHALE Phliassa.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche sur le milieu : bande des supérieures courte, se perdant dans une bande fauve échancrée en un seul endroit de son côté interne; bande des inférieures terminée en pointe à l'angle de l'anus.

79. NYMPHALE Cythérée.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, discoïdale, pointue à ses extrémités : bande des supérieures courte, s'alignant immédiatement à une bande fauve dont le côté interne est entier.

80. NYMPHALE Iphiela.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, discoïdale, arrondie à son extrémité antérieure, pointue à l'extrémité opposée : sommet des supérieures avec une tache fauve, solitaire.

81. NYMPHALE Mythra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, discoïdale, pointue à chaque extrémité : sommet des supérieures avec une tache orangée : dessous des quatre d'un jaune-fauve, avec une bande et des lignes blanches, transversales.

L. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes ayant, au moins dans les mâles, l'une des trois dents postérieures plus prononcée que les autres.

α. Dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

82. NYMPHALE Syda.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche, commune : sommet des supérieures avec une tache orangée : dessous des quatre ferrugineux, avec plusieurs raies blanches, transversales.

83. NYMPHALE Fatime.

Ailes un peu en queue, d'un noir enfumé, avec une bande jaune (fauve), commune, mais plus courte aux inférieures : milieu de ces dernières avec des taches rousses. FAB.

84. NYMPHALE Libérie.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures brunâtre : dessous des inférieures avec une rangée discoïdale de quatre points oculaires.

85. NYMPHALE Bella.

Dessus des ailes fauve, avec le sommet des supérieures noir et tacheté de blanc : dessous des inférieures réticulé de gris, et offrant quatre yeux.

86. NYMPHALE Lauphice.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verlâtre - luisant : dessous des inférieures d'un gris-argenté, avec un point obscur à la base.

87. NYMPHALE Laure.

Dessus des ailes noir, avec une bande sur le milieu : bande des supérieures fauve, interrompue; bande des inférieures blanche et environnée d'un reflet bleu.

NYMPHALE. (Insecte.)

88. NYMPHALE THOÛ.

Ailes ayant de part et d'autre une bande blanche, commune, et un œil sans prunelle : dessous des inférieures d'un gris-argenté.

89. NYMPHALE PAVON.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes plus claires : sommet des supérieures avec une tache fauve : dessous des inférieures avec trois points bleuâtres, oculaires.

90. NYMPHALE VACUÏA.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures offrant de part et d'autre une bande souci : dessous des inférieures avec un point bleu oculaire.

91. NYMPHALE AGATHIS.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre au sommet deux raies blanches, transverses, maculaires : dessous des inférieures sans yeux.

92. NYMPHALE ZUNILDA.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en dessus (avec un reflet violet dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre au sommet deux raies blanches, transverses, maculaires : dessous des inférieures avec deux points bleus, oculaires.

♀. Avant-dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

93. NYMPHALE GÉLANIE.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune : dessous offrant à la base des taches ferrugineuses entourées de blanc.

♂. Auté-pénultième dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

94. NYMPHALE ACILIA.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec des lignes grises, transverses, une bande blanche, commune, et une rangée postérieure d'yeux sans prunelle.

95. NYMPHALE STÉLÉNÈS.

Ailes offrant de part et d'autre deux bandes vertes, pâles, dont l'antérieure des inférieures entière : dessous des supérieures marqué au milieu de la côte d'un L bleuâtre.

96. NYMPHALE ÉPAPHÉA.

Ailes d'un brun-tanné de part et d'autre, avec une bande blanche, commune : moitié postérieure des supérieures fauve en dessus.

97. NYMPHALE SYMACHIA.

Ailes d'un brun-noirâtre, ayant en dessus une bande blanche, commune, et en dessous quatre bandes rousses, avec autant de bandes blanches.

98. NYMPHALE TYPHA.

Ailes dentées, d'un noir-brun, avec une bande commune en dessus, le disque de la base en dessous, blancs : disque des supérieures divisé par une raie.

99. NYMPHALE NÉCRÉA.

Ailes dentées, d'un noir-brun, avec une bande commune en dessus, le disque de la base en dessous, d'un vert-pâle : disque des supérieures non divisé.

100. NYMPHALE LAMINA.

Ailes dentées, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune, et deux rangées transverses de lunules bleues : dessous tacheté de roux.

NYMPHALE. (Insecte.)

101. NYMPHALE Ursule.

(Voyez Pap. ÉPHESTION, pag. 42, n^o. 51 de la première partie.)

102. NYMPHALE Oïsis.

Ailes dentées, noires en dessus (glacées de bleu dans le mâle), avec trois raies blanches, maculaires, transversales, dont l'antérieure et la suivante coupant l'abdomen.

103. NYMPHALE Sylvia.

Dessus des ailes varié de noir et de jaunâtre, dessous verdâtre : supérieures ayant de part et d'autre une bande blanche, transverse, maculaire.

104. NYMPHALE Opis.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec une bande commune, et des caractères, d'un jaune d'ocre : supérieurs avec une rangée transverse de points blancs.

105. NYMPHALE Cupavius.

Ailes d'un noir-brun : dessus et dessous des supérieures avec deux bandes blanches, maculaires; surfaces correspondantes des inférieures avec le milieu d'un jaune d'ocre.

106. NYMPHALE Iapis.

Ailes sinuées, d'un noir-brun en dessus, d'un brun-tanné-clair en dessous, avec une bande postérieure d'un blanc-bleuâtre sur chaque surface.

107. NYMPHALE ? Cocyta.

Ailes inégalement dentées, d'un brun-noirâtre : extrémité des inférieures bleuâtre. FAB.

108. NYMPHALE ? Mosime.

Ailes dentées, noires : inférieures brunes, avec l'angle anal bleuâtre et divisé transversalement par une ligne noire. FAB.

M. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes arrondi.

109. NYMPHALE Acouthéa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, dessous d'un gris de perle à l'extrémité : leurs deux surfaces offrant une bande blanche, commune et très-anguleuse.

110. NYMPHALE Péléa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec des taches blanches et des taches noires en fer de flèche : dessous des quatre cendré, avec des lunules noires.

111. NYMPHALE Althéa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande crénelée, et une ligne anguleuse, blanches : dessous avec une ligne ferrugineuse, commune et discoïdale.

112. NYMPHALE Alciméda.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande crénelée, et une ligne ponctuée, blanches : des taches fauves sur le bord terminal des inférieures.

113. NYMPHALE Amphicéda.

Ailes blanches, avec le bord postérieur ondulé de noir en dessus : leur dessous offrant à la base des caractères, et sur le milieu une ligne commune, d'un brun-obscur.

114. NYMPHALE Sangaris.

Dessus des ailes d'un rouge-vermillon, avec des points noirs sur le limbe postérieur : dessous d'un brun-tanné-clair, avec une ligne ferrugineuse, commune et discoïdale.

NYMPHALE (Insecte.)

115. NYMPHALE Discouthéa.

Dessus des ailes d'un bronzé-pâle, avec la base, et une ligne transverse et maculaire à l'extrémité, obscures : supérieures ayant vers la côte une ligne transverse de taches blanches.

116. NYMPHALE Alphéda.

Dessus des ailes d'un vert-bronzé, dessous d'un vert-blanchâtre : chaque surface offrant à la base des caractères, et à l'extrémité deux lignes flexueuses, obscures.

117. NYMPHALE Arcadius.

Ailes entières : supérieures noires, tachetées de bleu et de blanc; inférieures d'un brun-obscur : dessous (des quatre) brun. FAB.

118. NYMPHALE Véronique.

Dessus des ailes d'un vert-violet, avec des raies transverses, et le bord postérieur, obscurs : dessous avec une ligne commune de points blancs.

119. NYMPHALE Æthiopa.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le bord postérieur noir : sommet des supérieures offrant de part et d'autre une ligne trasverse de points blancs.

120. NYMPHALE Honorius.

Ailes entières, bleues : supérieures ayant le sommet noir, avec la côte brune; inférieures ponctuées de noir à la base, rayées à l'extrémité. FAB.

121. NYMPHALE Cytra.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre : dessous jaunâtre, avec deux lignes transverses, dont l'une maculaire, l'autre ondulée, noirâtres.

122. NYMPHALE Atlita.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec un reflet bleu : dessous fauve, avec des raies violettes, ondulées; cinq yeux sans prunelle aux inférieures. FAB.

123. NYMPHALE Cnidie.

Ailes d'un brun-tanné : les deux surfaces des supérieures avec une bande, et des points au sommet, blancs; dessous des inférieures avec une bande fauve, tachetée de noir.

124. NYMPHALE Doriclée.

Ailes d'un brun-jaunâtre, et ayant en dessus deux lignes transverses de points noirs : dessous des inférieures avec un point noir à la base.

125. NYMPHALE Lysandra.

Ailes entières, d'un brun-jaunâtre, ayant en dessus deux lignes de points noirs, et en dessous une seule ligne de points blancs.

126. NYMPHALE Augé.

Dessus des ailes d'un brun-jaunâtre : supérieures avec trois raies vertes, transversales; inférieures avec une rangée de points noirs.

127. NYMPHALE Hespérus.

Ailes sinuées, obscures, ondées de noir : supérieures avec quatre points blancs. FAB.

128. NYMPHALE Chrémès.

Ailes entières, obscures : inférieures rousses, avec des bandes noires en dessus, un point blanc central en dessous. FAB.

NYMPHALE. (Insecte.)

129. NYMPHALE MIRUS.

Ailes sinuées, obscures, avec de légères bandes d'un brun-tanné : dessous des inférieures obscur à la base, varié à l'extrémité. FAB.

130. NYMPHALE Méléagris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, dessous d'un jaune-fauve : leurs deux surfaces avec une multitude de points blancs.

131. NYMPHALE Dédale.

Ailes entières : leur dessus d'un brun-obscur, avec une multitude de points blancs : leur dessous d'un brun-pâle et sans taches.

132. NYMPHALE Mélanthia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec des points blancs : leur dessous brun. FAB.

133. NYMPHALE Marthe.

Ailes dentées, variées de brun et de fauve : supérieures avec trois rangées de lunules, inférieures avec une bande, blanches. FAB.

134. NYMPHALE Absalon.

Ailes entières, fauves, fuscées de brun : leur dessous orangé, avec des ondes obscures. FAB.

135. NYMPHALE Amulia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, sans taches : dessous d'un jaune-fauve, avec trois raies transverses, plus une rangée de points, bleues et marquées de noir.

136. NYMPHALE Harquinus.

Ailes presque entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous orangé, avec des taches d'un bleu-argenté, et marquées de noir. FAB.

137. NYMPHALE Amasia.

Dessus des ailes d'un vert-argenté, avec l'extrémité plus foncée : dessous d'un vert-pré, avec des points noirs oculaires le long du bord postérieur.

138. NYMPHALE Démétra.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec des bandes plus obscures, mais peu prononcées : dessous d'un vert-blanchâtre, avec le bord du sommet des supérieures blanc.

139. NYMPHALE Argénissa.

Ailes entières, d'un bleu-bronzé en dessus, d'un vert-obscur en dessous, et ayant de part et d'autre cinq lignes noires, transverses, ondulées.

140. NYMPHALE Médion.

Ailes dentées, d'un noir-bronzé en dessus : supérieures avec une bande oblique, inférieures avec le milieu, d'un vert-doré ou bleuâtre.

141. NYMPHALE Fraucine.

Ailes dentées, d'un noir-bronzé en dessus : supérieures avec une bande jaunâtre et oblique; inférieures avec le milieu, et des taches marginales, d'un vert-bleuâtre.

142. NYMPHALE Erithonius.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus : inférieures offrant une bande d'un bleu-violâtre, et dilatée vers l'angle de l'anus.

143. NYMPHALE Narva.

Ailes dentées, noires, avec une rangée postérieure de points blancs : supérieures avec des taches, inférieures avec le milieu, jaunes.

NYMPHALE. (Insecte.)

144. NYMPHALE Perséa.

Ailes dentées, noires de part et d'autre; avec un espace discoïdal et commun d'un fauve-briqueté; supérieures avec deux taches et une bande, inférieures avec des points marginaux, d'un jaune d'ocre.

145. NYMPHALE Eléus.

Ailes dentées, d'un fauve-briqueté de part et d'autre, avec l'extrémité d'un noir-bronzé; supérieures avec une bande, inférieures avec un simple cordon de points, blancs.

146. NYMPHALE Janás.

Ailes un peu dentées, noires: supérieures ponctuées de blanc de part et d'autre: dessus des inférieures avec le milieu rouge; leur dessous jaune à la base, avec des points noirs.

147. NYMPHALE Sémire.

Ailes un peu dentées, d'un brun-obscur, et ayant de part et d'autre une bande verte, interrompue: inférieures tachetées de ferrugineux vers l'angle de l'anus: dessous des quatre jaune à la base, avec des points noirs.

148. NYMPHALE Lucrétia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-obscur, et ayant de part et d'autre une bande blanche, interrompue: dessous jaune à la base, avec des points noirs.

149. NYMPHALE Sulpitia.

Ailes dentées, noires, avec une bande blanche, commune: dessous des inférieures jaunâtre, avec des points noirs à la base, une bande sur le milieu, et des points à l'extrémité, blancs. FAB.

150. NYMPHALE Hostilia.

Ailes dentées, presque semblables de part et d'autre, noires, avec des taches noires à la base: extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre, avec des points d'un jaune-pâle.

151. NYMPHALE assimilée.

Ailes presque entières, semblables de part et d'autre, noires, avec des lignes d'un vert-blanchâtre: inférieures offrant vers l'extrémité une suite de taches écarlates.

152. NYMPHALE Disippe.

Ailes dentelées, fauves, avec les nervures, et le bord postérieur tacheté de blanc, noirs: inférieures avec une raie noire, transverse, courbée en arrière.

153. NYMPHALE Misippe.

(Voyez pag. 188, n°. 40 de la première partie.)

154. NYMPHALE Callisto.

Ailes dentées, d'un noir-brun: inférieures ayant de part et d'autre une bande fauve, chargée de sept taches très-noires, ovales, à prunelle blanche.

155. NYMPHALE Lasinassa.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessous, et ayant à l'extrémité des points, des taches sagittées, et des lunules, blanchâtres: dessus des quatre ailes (mâle) avec une tache d'un violet-blanchâtre sur le milieu.

156. NYMPHALE Liria.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessous, et ayant à l'extrémité des points, une bande crénelée intérieurement, et des lunules, blanchâtres: dessus des quatre ailes (mâle) avec une tache d'un violet-blanchâtre sur le milieu.

NYMPHALE. (Insecte.)

157. NYMPHALE Bolina.

Ailes dentées, d'un brun-tanné en dessous, avec une bande blanche; bande des inférieures marquée à chaque bout d'une liture noire: dessus des quatre ailes (mâle) avec une tache d'un blanc-violetâtre sur le milieu.

158. NYMPHALE Aliména.

Ailes dentées, presque semblables de part et d'autre, noires, avec une bande commune sur le milieu, et une triple rangée de taches sur le bord, bleues.

159. NYMPHALE Salmasis.

Ailes dentées, noires en dessus, avec le milieu rayonné de bleu: dessous d'un brun obscur, avec une bande transverse, et une raie maculaire, blanchâtres. (Fem.)

160. NYMPHALE Antilope.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre sur le limbe postérieur trois cordons de points blancs: dessus des supérieures (mâle) glacé de violet à l'extrémité.

161. NYMPHALE Vitellia.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur: dessous avec des points discoïdaux, et des traits marginaux, d'un blanc-bleuâtre.

162. NYMPHALE Eurinoë.

Ailes un peu dentées, semblables de part et d'autre, noires, avec une multitude de taches, et le milieu des inférieures, à partir de la base, blancs.

163. NYMPHALE? Philomèle.

Ailes sinuées, noires, tachetées de blanc: inférieures avec des rayons jaunes à la base. FAB.

164. NYMPHALE? Pinthæus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-obscur: supérieures avec trois taches jaunes; inférieures avec le milieu, à partir de la base, blanc. LINN.

165. NYMPHALE? Zoile.

Ailes entières, d'un noir-brun: supérieures avec trois taches, inférieures avec le milieu, blancs. FAB.

166. NYMPHALE Siva.

Ailes entières: dessus des supérieures d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une multitude de taches d'un vert-bleuâtre; leur dessous avec l'origine de la côte, et trois taches, argentées.

167. NYMPHALE Sophus.

Ailes entières: supérieures noires, avec le milieu fauve et tacheté de noir; inférieures d'un brun-obscur, avec des points, et une ligne transverse, noirs. FAB.

168. NYMPHALE? Sisamnus.

Ailes entières, d'un noir-brun, avec une bande commune, et des points, blancs: bande des supérieures courte. FAB.

169. NYMPHALE Polyxo.

Ailes presque dentées, d'un fauve-briqueté en dessus, avec le milieu d'un jaune d'ocre: supérieures avec l'extrémité, inférieures avec six taches oculaires, noires.

170. NYMPHALE Æropus.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre une bande commune, jaune ou blanche: dessous des supérieures avec un œil d'un bleu-pâle à la base.

NYMPHALE. (Insecte.)

171. NYMPHALE Tulbagh.

Ailes presque dentées, brunnâtres : supérieures avec deux bandes fauves, inférieures avec une seule et une rangée d'yeux, de part et d'autre.

172. NYMPHALE Lubentina.

Ailes presque dentées, d'un vert-obscur : supérieures ayant de part et d'autre une bande blanche maculaire ; extrémité des inférieures avec un double cordon de points cramoisis.

173. NYMPHALE Adonia.

Ailes presque dentées, d'un vert-obscur, offrant toutes les quatre de part et d'autre une bande blanche commune : extrémité des inférieures avec un seul cordon de points cramoisis.

174. NYMPHALE Evclina.

Ailes entières, d'un vert-bronzé en dessus, avec une bande plus foncée sur le milieu : les deux surfaces des supérieures avec une tache incarnate à la base, dessous des inférieures avec deux.

175. NYMPHALE du peuplier.

Ailes légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche maculaire, un cordon de lunules fauves, et une double ligne marginale d'un bleu-ardoisé.

176. NYMPHALE Sibylla.

Ailes légèrement dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une bande blanche maculaire : dessous des inférieures d'un bleu-cendré à la base, avec des points noirs.

177. NYMPHALE Camilla.

Ailes légèrement dentées, d'un bleu-foncé, avec une bande blanche maculaire : dessous des inférieures d'un bleu-cendré sans taches à la base.

178. NYMPHALE Proctris.

Ailes dentées, rousses, avec une bande blanche commune sur le milieu : dessous d'un vert-cendré à la base, avec des lignes noires transversales.

179. NYMPHALE Épione.

Ailes entières, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche sur le milieu : dessous des inférieures avec cinq lignes rousses transversales, et deux taches blanches à la base.

180. NYMPHALE Lycorias.

Ailes sinuées, d'un brun-noirâtre en dessus : supérieures avec une bande oblique d'un rouge-vermillon ; inférieures avec une double ligne blanchâtre avant le bord terminal.

181. NYMPHALE Eumée.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une bande blanche : bande des inférieures terminée à chaque bout par une tache fauve. FAB.

182. NYMPHALE Cocalia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures tachetées de noir et de jaune : dessous des quatre gris, avec une rangée transverse de points blancs. FAB.

183. NYMPHALE ? Phégéa.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande, inférieures avec le milieu ferrugineux ou blanc : dessous plus pâle et ondulé de noir. FAB.

184. NYMPHALE Marguerite.

Ailes presque dentées, d'un blanc-argenté en dessus, avec l'extrémité noire et tachetée de blanc : dessous des inférieures aspergés de brun, avec une rangée de points oculaires.

NYMPHALE. (Insecte.)

185. NYMPHALE Flavilla.

Ailes presque dentées, d'un jaune-fauve, avec le sommet brunâtre en dessus; dessous avec trois lignes ferrugineuses transversales, et deux points oculaires très-blancs sur les ailes supérieures, cinq sur les inférieures.

186. NYMPHALE Lirissa.

Ailes sinuées, d'un cendré-obscur en dessus, avec des ondes noires: les deux surfaces des supérieures avec une bande, celles des inférieures avec des points oculaires, blancs.

187. NYMPHALE Lassus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec des lignes noires transversales: supérieures avec une tache blanche sur la côte: dessous (des quatre) pâle, avec des lignes obscures et transverses. FAB.

188. NYMPHALE ? Dyndima.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, jaunâtres en dessous, avec des ondes noires de part et d'autre: sommet des supérieures offrant deux taches blanches.

189. NYMPHALE Démophon.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous varié de gris, avec un seul point à la base, puis une ligne ondulée, noirs.

190. NYMPHALE Amphitoé.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous varié de gris, avec deux points à la base, puis une ligne très-anguleuse, noirs.

191. NYMPHALE Lycomède.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous jaunâtre, avec deux points à la base, puis deux lignes anguleuses, noirs.

192. NYMPHALE Amphimaque.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous ayant la moitié antérieure, et un point, d'un blanc-grisâtre.

193. NYMPHALE Démodice.

Dessus des ailes noir, avec une bande commune d'un bleu-verdâtre-luisant: dessous des supérieures avec des lignes transverses, et des anneaux, noirs; dessous des inférieures avec deux yeux éloignés l'un de l'autre.

194. NYMPHALE Déiphile.

Dessus des ailes noir, avec le milieu violet, et une bande commune de taches fauves à l'extrémité: dessous d'un gris de perle à la base, avec des taches ferrugineuses.

195. NYMPHALE Anœæa.

Dessus des ailes d'un noir-foncé ou d'un brun-noirâtre, avec une bande oblique d'un bleu-verdâtre aux supérieures: dessous vert, avec trois lignes ferrugineuses aux inférieures.

196. NYMPHALE Antiochus.

Ailes entières, d'un noir-velouté en dessus, avec une bande commune orangée et luisante, mais plus courte aux supérieures.

197. NYMPHALE Antinoé.

Ailes presque dentées, d'un noir-velouté en dessus, avec une bande orangée et luisante: bande des supérieures atténuée vers le bord interne.

198. NYMPHALE Numilius.

Ailes sinuées, d'un noir-velouté en dessus, avec le milieu des inférieures, et deux taches aux supérieures, orangés et luisants: sommet des inférieures bleuâtre.

NYMPHALE. (Insecte.)

199. NYMPHALE Erminia.

Ailes presque dentées : dessus des supérieures noir , avec la base d'un vert-doré , et une bande blanche maculaire à l'extrémité ; inférieures avec deux yeux , dont un moitié plus petit.

200. NYMPHALE Iris.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre (un reflet violet dans le mâle) , avec des taches aux supérieures , et une bande unidentée aux inférieures , blanches : dessus des supérieures sans tache oculaire.

201. NYMPHALE Iia.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre (un reflet violet dans le mâle) , avec des taches aux supérieures , une bande sinuée aux inférieures , blanches ou orangées : supérieures offrant de part et d'autre une tache oculaire.

202. NYMPHALE Cyanippe.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en dessus , avec deux raies maculaires plus obscures à l'extrémité : milieu des inférieures d'un bleu-argenté-brillant.

203. NYMPHALE Leucophthalme.

Ailes dentées , noirâtres en dessus : les deux surfaces des supérieures avec une bande d'un jaune d'ocre , celles des inférieures avec une tache orbiculaire très-blanche sur le milieu.

204. NYMPHALE Médée.

Ailes presque dentées , noires en dessus , avec trois bandes de taches jaunes : première et seconde bandes traversant l'abdomen.

205. NYMPHALE Micalia.

Ailes presque dentées , noires en dessus , avec des lunules à l'extrémité des quatre , et une bande sur le milieu des supérieures , jaunes : dessous des inférieures avec une tache d'un brun-marron.

206. NYMPHALE Volumna.

Ailes presque dentées , d'un noir-bleu en dessus : dessous des supérieures avec des anneaux et une bande d'un vert-pâle-luisant ; dessous des inférieures avec trois yeux , dont l'antérieur bipupillé.

207. NYMPHALE Sydonia.

Ailes presque dentées , d'un noir-brun sans taches , mais avec un reflet violet à la base : dessous plus pâle , avec quatre points verdâtres.

208. NYMPHALE Mygdonia.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun en dessus : dessous des inférieures avec des taches d'un brun-marron , plus quatre yeux presque effacés et groupés deux à deux.

209. NYMPHALE Alpaïs.

Ailes presque dentées , brunes : sommet des supérieures d'un noir-bleu et tacheté de blanc : dessous des inférieures avec trois yeux , dont l'antérieur bipupillé.

210. NYMPHALE Maia.

Ailes presque dentées , brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec un point noirâtre à la base ; dessous des inférieures avec quatre points verdâtres , rapprochés deux à deux , et dont le second plus gros.

211. NYMPHALE Orphise.

Ailes entières , brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec un point noirâtre à la base ; dessous des inférieures avec quatre points verdâtres , rapprochés deux à deux , et dont l'antérieur plus gros.

NYMPHALE. (Insecte.)

212. NYMPHALE Macris.

Ailes presque dentées, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec trois yeux peu prononcés, dessous des inférieures avec sept.

213. NYMPHALE Myrto.

Ailes entières, brunes en dessus : dessous des supérieures sans taches à la base, dessous des inférieures avec cinq yeux peu prononcés.

N. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

214. NYMPHALE Marsolia.

Ailes entières, brunes en dessus (un reflet violet dans le mâle) : dessous des supérieures avec des points noirs à la base, dessous des inférieures avec sept yeux peu prononcés.

215. NYMPHALE Amiclie.

Ailes entières, d'un brun-tanné obscur en dessus : extrémité des supérieures avec une bande, et des points, blancs : dessous des inférieures avec des taches oculaires d'un brun-marron.

216. NYMPHALE Euphémie.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus, avec le milieu noir : dessous brun, avec deux paires d'yeux sur les inférieures.

217. NYMPHALE Irénécia.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, ayant en dessus une bande blanche dis-coidale, et en dessous trois bandes blanches, dont l'antérieure entourée de roux.

218. NYMPHALE Postverta.

Ailes presque dentées : dessus du mâle d'un vert-bronzé-luisant ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec des bandes blanches : dessous des ailes inférieures (dans les deux sexes) d'un blanc-violetre, avec six raies transverses ferrugineuses et deux yeux.

219. NYMPHALE Sérina.

Ailes presque dentées : dessus du mâle d'un vert-bronzé-luisant ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches : dessous des ailes inférieures (dans les deux sexes) blanc, avec quatre raies jaunes bordées de brun et deux yeux.

220. NYMPHALE Artémisia.

Ailes dentées, noires : supérieures avec des taches, inférieures avec une bande, blanches : dessous des inférieures avec deux yeux argentés. FAB.

221. NYMPHALE Johanna.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus, avec l'extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre et chargée de six taches blanches : inférieures ocellées de part et d'autre.

222. NYMPHALE Irma.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus, avec l'extrémité des supérieures d'un brun-noirâtre et chargée de taches tirant sur le cendré : dessous des inférieures gris, avec trois lignes ferrugineuses, transversales, et dont l'antérieure bifide.

223. NYMPHALE Inès.

Ailes presque dentées, d'un vert-bronzé en dessus : sommet des supérieures d'un brun-noirâtre de part et d'autre, avec des taches blanches : dessous des inférieures blanc, avec cinq lignes brunes, transversales.

NYMPHALE. (Insecte.)

224. NYMPHALE Cadma.

Ailes dentelées, d'un jaune-fauve : supérieures ayant de part et d'autre au sommet un espace noir, avec deux taches d'un jaune-pâle : dessous des inférieures avec deux yeux bleus.

225. NYMPHALE Isis.

Ailes d'un noir-brun : supérieures entières, ayant de part et d'autre une tache cramoisie sur le milieu; inférieures dentées. offrant en dessus une ligne marginale blanchâtre.

226. NYMPHALE Claudine.

Ailes presque dentées, noires, ayant chacune en dessus un espace cramoisi semi-lunaire : dessous des inférieures marqué, avec sept yeux à l'extrémité.

227. NYMPHALE Pyrame.

Ailes presque dentées, noires (dessus du mille avec un reflet violet) : supérieures offrant de part et d'autre une bande coquelicot : dessous des inférieures sablé, et ayant des points oculaires, plus une ligne marginale, bleuâtres.

228. NYMPHALE Galanthis.

Ailes entières, noires : supérieures avec deux bandes, inférieures avec une seule, cramoisies en dessus, plus pâles en dessous.

229. NYMPHALE Soraba.

Ailes presque dentées, noires, glacées de violet : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes avec deux yeux, et une ligne très-minutieuse, bleus.

230. NYMPHALE Pithéas.

Ailes entières, noires : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes d'un rose-pâle au milieu, avec deux yeux à prunelle bleuâtre.

231. NYMPHALE Condomanus.

Ailes entières, d'un noir-violet : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes cramoisies, dont l'antérieure commune au dessus des secondes ailes : dessous de ces dernières ailes avec deux anneaux, et une liture centrale, jaunes.

232. NYMPHALE Pygas.

Ailes presque dentées, noires : supérieures ayant de part et d'autre un espace cramoisi semi-lunaire : dessous des inférieures avec trois anneaux, et une ligne transverse à la base, jaunes.

233. NYMPHALE Pyracmoh.

Ailes presque dentées, noires (glacées de bleu dans le mâle) : supérieures ayant de part et d'autre une bande cramoisie, bifide : dessous des inférieures avec trois anneaux, et une ligne transverse à la base, jaunes.

234. NYMPHALE Hydaspé.

Ailes presque dentées, noires, avec la base glacée de bleu en dessus : supérieures ayant de part et d'autre une bande cramoisie, courte : dessous des inférieures avec deux anneaux jaunes, et quatre points oculaires.

235. NYMPHALE Hydarnis.

Ailes entières, noires en dessus, avec la base glacée de bleu : supérieures avec une bande cramoisie, courte : dessous des inférieures avec cinq anneaux, et deux taches biconnées, noirs.

NYMPHALE. (Insecte.)

236. NYMPHALE Clyménus.

Ailes entières, noires en dessus (un reflet violet changeant dans le mâle), avec une bande d'un vert-doré sur le milieu des supérieures, et une semblable sur le bord terminal des inférieures: dessous de ces dernières ailes gris, avec cinq anneaux, et quatre points, noirs.

237. NYMPHALE Euclide.

Ailes entières, noires en dessus (un reflet violet changeant dans le mâle), avec une bande d'un vert-doré vers le milieu des quatre: dessous des inférieures gris, avec cinq anneaux, et trois points, noirs.

238. NYMPHALE Candréna.

Ailes entières, noires en dessus (base glacée de violet dans le mâle), avec un chevron à l'extrémité des supérieures, une bande à l'extrémité des inférieures, d'un vert-doré: dessous des inférieures gris, avec six anneaux noirs.

239. NYMPHALE Ooppel.

Ailes entières, noires en dessus, avec une bande sur le milieu des supérieures, une ligne à l'extrémité des inférieures, d'un vert-doré: dessous des inférieures d'un jaune d'ocre pâle, avec deux lignes noires transverses et parallèles.

240. NYMPHALE Tytius.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une bande blanche: bande des supérieures interrompue: dessous des quatre offrant à la base des points noirs oculaires.

241. NYMPHALE Sofonius.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec un grand nombre de taches noires oculaires: supérieures ayant de part et d'autre une bande jaunâtre sur leur milieu.

242. NYMPHALE ? Phylaxis.

Ailes entières: supérieures d'un brun-obscur, avec des taches briquetées: inférieures briquetées en dessus, blanches en dessous à la base, et ayant de part et d'autre des points noirs à l'extrémité.

243. NYMPHALE Epigia.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires: supérieures avec une bande blanche, courte; inférieures avec le milieu d'une couleur rousse qui s'étend sur les ailes de devant.

244. NYMPHALE Laphria.

Ailes entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus: dessous d'un fauve-pâle, avec des points, et une ligne commune, noirâtres.

245. NYMPHALE Aréthusus.

Ailes entières, d'un noir-chatoyant en dessus, avec une multitude de taches d'un bleu-verdâtre: dessous des inférieures avec des points rouges à la base et à l'angle de l'anus. (Une bande blanche non simée aux ailes supérieures de la femelle.)

246. NYMPHALE Amphionie.

Ailes presque dentées, noires en dessus, avec des hiéroglyphes d'un vert-bleuâtre: supérieures offrant de part et d'autre une bande blanche: dessous des inférieures rayonné de rouge.

247. NYMPHALE Féronia.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des hiéroglyphes bleuâtres et une rangée d'yeux à iris simple.

NYMPHALE. (Insecte.)

248. NYMPHALE Férentina.

Ailes presque dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des hiéroglyphes bleuâtres, peu prononcés, et une rangée d'yeux à iris double. (4^e et 5^e) ceux des ailes inférieures marqués dans le mâle d'une lunule rousse.)

249. NYMPHALE Chloé.

Ailes inégalement dentées, d'un bleu-verdâtre en dessus, avec une multitude de taches noires : base des quatre offrant de part et d'autre des marques ferrugineuses.

O. Ailes oblongues ou allongées dans le sens du diamètre du corps.

250. NYMPHALE Eulimène.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, offrant en dessus trois bandes fauves : dessous des inférieures avec six bandes, et le bord terminal, d'un blanc-incarnat.

251. NYMPHALE Nesté.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, verdâtre en dessous : leurs deux surfaces offrant de part et d'autre trois bandes, jaunes dans le mâle, blanchâtres dans la femelle.

252. NYMPHALE Héliodore.

Ailes presque entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec trois bandes d'une fauve-faive.

253. NYMPHALE Hordonia.

Ailes presque entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec trois bandes d'un jaune-faive : dessous jaunâtre et aspergé de ferrugineux.

254. NYMPHALE Frobénia.

Ailes un peu dentées, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, postérieure : bande des premières ailes formée de trois taches.

255. NYMPHALE de l'Érable.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, fauves en dessous, avec trois bandes blanches maculaires : bande de la base des supérieures longitudinale et lunulée.

256. NYMPHALE Leucothoé.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, fauves en dessous, offrant de part et d'autre trois bandes blanches maculaires : bande du milieu des inférieures chargée antérieurement de points noirs.

257. NYMPHALE Strophia.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec trois bandes blanches maculaires : dessous des inférieures ponctué de noir à la base et au milieu.

258. NYMPHALE Hélicopis.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec deux bandes blanches maculaires en dessus, et quatre en dessous : base des supérieures marquée de deux points blancs.

259. NYMPHALE Lucille.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun en dessus, ferrugineuses en dessous, ayant le milieu traversé de part et d'autre par une bande blanche maculaire : base des supérieures avec une ligne longitudinale de points blancs.

260. NYMPHALE Mélicerta.

Ailes dentelées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : base des supérieures avec plusieurs points blancs, épars.

NYMPHALE. (Insecte.)

261. NYMPHALE Mélinoc.

Ailes dentelées, d'un noir-brun de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : base des supérieures avec une tache en forme de coin, et un point, blancs.

262. NYMPHALE Ophiome.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre de part et d'autre, avec une large bande, et des lignes transverses, blanches : dessous avec des taches oculaires très-noires.

263. NYMPHALE Vénilia.

Ailes un peu dentées, noires, ayant de part et d'autre une bande discoïdale, et des points, blancs : dessous avec des rayons d'un blanc-verdâtre à la base.

264. NYMPHALE Nauplia.

Ailes entières, d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec des taches, celles des inférieures avec une bande, blanches : bande des inférieures entourée en dessous de jaune et de roux.

265. NYMPHALE Émilie.

Ailes entières, noires : les deux surfaces des supérieures avec des taches, celles des inférieures avec deux bandes, d'un blanc-luisant : bande de la base des inférieures commune aux ailes supérieures, l'autre entourée de roux en dessous.

266. NYMPHALE Cœnobite.

Ailes dentées, noires : supérieures avec une ligne longitudinale et des taches : dessus des inférieures avec une bande blanche ; leur dessous blanc, avec quatre bandes, et des taches marginales, d'un brun-obscur. FAB.

267. NYMPHALE Hercilie.

Ailes dentées, d'un blanc-cendré en dessus, avec le limbe postérieur d'un brun-obscur : dessous des inférieures d'un fauve-pâle, avec deux bandes, et des lunes marginales, blanches.



A. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues extérieures, linéaires & aiguës.

1. NYMPHALE Jafius (1).

NYMPHALIS Jafius.

Nym. alis anticis utrinquè strigâ maculari limboque postico, fuscis : subtis omnibus ad basin ferrugineis, annulis fasciâque albis.

Papilio E. A. Jafon, alis bicaudatis, fuscis, posticè lutescentibus : subtis caracteribus fasciâque albis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 749. n.º 26.

Papilio N. Jafius. FAB. *Syst. Ent.* p. 449. n.º 29. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 10. n.º 40.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n.º 44.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 61. n.º 191.*

Papilio Jafius. ESP. *Pap. part. 1. tab. 99. cont. 54. fig. 1.*

ESP. *Pap. part. 1. tab. 104. cont. 59. fig. 2-8.* (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Jafius. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem.* p. 2. n.º 2.

Papilio Jafius. PETAGNA. *Inf. Ent. tom. 2. p. 445. n.º 1.*

Papilio Jafius. CYRILL. *Ent. Neap. specim. 1. tab. 11. fig. 1.*

Papilio Jafius. DAVRY, *Inf. tom. 1. pl. 1. fig. 1.*

Papilio Jafius. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 151. n.º 1.*

Papilio Jafon. HERBST, *tab. 64. fig. 5. 4. 5.*

Papilio Jafon. GRAM. *pl. 559. fig. A. B.*

Papilio Rhea. HUBN. *Pap. tab. 115. fig. 580. 581.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. pag. 205.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 46. fig. 21.*

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure, & elle est d'un brun-chatoyant en dessus. Ses premières ailes ont le bord postérieur couvert par une bande fauve, plus ou moins finuée en dedans, finement lisérée de noir en dehors, & divisée par huit nervures brunes, dont les quatre antérieures plus fortes. En avant de cette bande, & à partir du bord d'en haut, il y a une rangée transversée, & quelquefois double, de cinq ou six gros points fauves. Les secondes ailes ont six dents,

dont la quatrième & la postérieure prolongées en queues linéaires, toutes deux externes & d'un noir-foncé. Cette couleur est aussi celle du bord terminal, parallèlement auquel règne un cordon de sept taches d'un fauve plus ou moins verdâtre, grandes, la plupart en forme de coin, & précédées du côté du corps par une ligne de cinq à sept points d'un bleu-verdâtre. Les échancrures sont en outre ciliées de blanc, ainsi que l'angle anal, lequel est arrondi sans être failloit.

Le dessous des quatre ailes a la partie antérieure ferrugineuse, chargée de taches & de bandelettes transversales d'un brun-olivâtre & encadrées de blanc. Vient ensuite une bande commune & discoïdale d'un blanc-fatiné, ayant le côté externe bordé par des points noirs aux ailes supérieures. Ces dernières ailes sont après cela fauves jusqu'au bout, & coupées transversalement par une bande d'un gris-ardoisé, bande dont le côté interne a des échancrures dans chacune desquelles il y a une tache noire à peu près triangulaire. Les nervures sont aussi d'un bleu-ardoisé depuis la bande blanche jusqu'au bord. Le dessous des ailes ont, sur le côté externe de la bande blanche susdite, une série de taches ferrugineuses, derrière lesquelles est un espace olivâtre, où l'on voit une rangée de points d'un bleu-violet, séparés les uns des autres, & adossés à des taches marginales de la couleur & presque de la forme de celles qui leur correspondent en dessus. La tête, le corselet, & l'origine de la côte des premières ailes, sont ferrugineux. L'abdomen est d'un brun-obscur, avec des poils grisâtres, pareils à ceux qui garnissent la gouttière des secondes ailes. Les antennes sont noires, & les palpes ont la tranche extérieure blanche, avec la sommité fauve. La trompe est d'un ferrugineux-luisant.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le milieu des ailes inférieures finement pointillé de bleu en dessus.

Ce lépidoptère plane comme les oiseaux de proie, c'est-à-dire, qu'il agite peu ses ailes en volant. On le voit assez souvent se reposer sur des troncs d'arbres exposés au soleil. Il habite la Barbarie, l'Espagne, le Portugal, l'Asie mineure, les rives du Bosphore ou canal de Constantinople, la Sicile, le pays de Naples, la Dalmatie, le comté de Nice, la Corse, les îles d'Hières (particulièrement celle de Porte-Cros), & les environs de Toulon. On le trouve aussi, mais moins communément, près de Montpellier. Il donne deux fois dans l'année : en juin, puis en septembre. M. Devilliers, officier d'infanterie, assure qu'il répand une odeur de mûle.

M. Lefebvre de Cérity, ingénieur des constructions maritimes à Toulon, nous a envoyé sur les métamorphoses de cet insecte un mémoire fort intéressant, auquel étoit joint un dessin qui ne laisse absolument rien à désirer.

La chenille provient d'un œuf verdâtre. Elle est

(1) Nous avons adopté la dénomination de *Jafius*, parce qu'elle est beaucoup plus usitée que celle de *Jafon*; parce que d'ailleurs Linnæus a deux papillons *Jafon* : celui dont il s'agit ici, & un autre dont nous parlons dans le *Supplément* placé à la fin de ce volume.

extrêmement lente dans tous les mouvemens, & semble ne changer de place qu'à regret. Après avoir tapissé de soie le dessus d'une feuille d'*arbutus*, elle s'y tient attachée par les pattes membraneuses, ayant les six pattes écaillées & la tête élevée en l'air. La nuit, elle quitte pour aller manger les feuilles voisines, & revient au bout d'un quart d'heure reprendre son poste ordinaire. Dans le premier âge, elle est toute verte; mais, lorsqu'elle a subi les premières mues, elle devient d'un vert-jaunâtre qui se rapproche tellement de la couleur de la feuille dont elle se nourrit, qu'on a de la peine à l'apercevoir. Sa peau est comme chagrinée, & plissée transversalement. Une ligne jaune, placée près des stigmates, longe chaque côté du corps, & il y a sur le dos quatre points orangés, peu apparens. Les pattes écaillées sont noires, les autres sont vertes. La tête est armée de quatre cornes verticales, dont les deux intermédiaires plus longues. Ces cornes ont la fommité rougeâtre, & la base jaunâtre. Au moment de la transformation, cette chenille choisit une branche à laquelle elle se suspend par les pattes de derrière au moyen d'un amas de soie. Après être restée trois jours dans cette attitude, elle se débarrasse de sa peau.

La chrysalide est lisse, grosse, un peu carénée, d'un vert-pâle. Son extrémité postérieure est munie de deux pointes entre lesquelles il y a un pédoncule adhérent à l'amas de soie dont nous venons de parler.

Les chenilles écloses à la fin de septembre passent l'hiver & ne se métamorphosent qu'au mois de mai suivant. Celles qui naissent dans le mois de juin accomplissent toutes leurs métamorphoses dans l'espace de trois mois. Le papillon n'est guère que quinze jours en chrysalide.

2. NYMPHALE PÉLIAS.

NYMPHALIS Pelias.

Nym. alis omnibus supra fasciâ mediâ punctisque marginalibus fulvis: subtus ad basin ferrugineis, annulis fasciâque albis.

Papilio Pelias. CRAM. *Pap. pl. 3. fig. C. D.*

Papilio Pelias. HERBST, *Pap. tab. 63. fig. 5. 6.*

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est ferrugineux à la base; traversé au milieu par une bande fauve, oblique; noir à l'extrémité, avec un rang de points fauves, lunulés. La bande des premières ailes est bifide antérieurement, & marquée au dessus de la fissure d'une ligne de quatre points noirs. La bande des secondes ailes descend jusqu'à la gouttière du bord interne, & elle est suivie en dehors de trois à quatre points bleus, alignés transversalement près de l'angle anal.

En dessous on retrouve les mêmes caractères que dans le *Jafius*, seulement le fauve des ailes supérieures est divisé en taches séparées, & la bande blanche de leur milieu est plus large.

Du Cap de Bonne-Espérance.

3. NYMPHALE BRUTIUS.

NYMPHALIS Brutius.

Nym. alis supra fasciâ mediâ albâ: subtus ad basin ferrugineis, annulis fasciâque albis.

Papilio Brutus. CRAM. *Pap. pl. 241. fig. E. F.*

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, discoïdale, maculaire aux supérieures, plus large & entière aux inférieures dont elle atteint le bord interne. Ces dernières ailes ont à l'angle anal un groupe de deux à trois points bleus.

Le dessous des quatre ailes est comme dans le *Jafius*, avec cette différence qu'ici la bande blanche des inférieures a le côté externe bordé par une raie fauve, continue, au lieu de l'avoir bordé par une série de taches ferrugineuses; & que l'espace qui la suit en dehors, au lieu d'être verdâtre, est noir & chargé conséquemment de points ferrugineux dont le contour est d'un bleu-pâle.

De la côte de Guinée.

4. NYMPHALE CASTOR.

NYMPHALIS Castor.

Nym. alis supra fulvis, limbo postico latè nigro: subtus ad basin ferrugineis, annulis fasciâque albis.

Papilio N. Castor, alis dentato-bicaudatis, fulvis, margine nigris: subtus fasciâ maculifque albis nigrâ fœctis. FAB. *Gen. Inf. Mant. p. 251. — Spec. Inf. tom. 2. p. 11. n. 44. — Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n. 48. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 65. n. 196.*

Papilio Pollux. CRAM. *Pap. pl. 37. fig. C. D.*

Papilio Pollux. HERBST, *Pap. tab. 63. fig. 5. 4.*

Papilio Camulus. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 30. fig. 1. 2.*

Fabricius a donné le nom de *Castor* au *Pollux* de Cramer, & *vice versa*.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-brun à la base; d'un fauve-jaunâtre au milieu; noir à l'extrémité, avec de petits croissants rouillâtres, marginaux. Le disque des premières ailes offre en outre quelques taches noires, éparées; & il y a un point bleu à l'angle anal des secondes.

Le dessous des quatre ailes ressemble à peu près

au dessous du *Jafius*, depuis la base jusqu'à la bande blanche inclusivement; ensuite le fond est fauve jusqu'au bord, avec une rangée transverse de taches noires. Ces taches ont différentes formes. Aux premières ailes, elles sont, pour la plupart, triangulaires & finement bordées de bleuâtre en dehors. Aux secondes ailes, les six antérieures sont ovales, piquées de bleuâtre, & chargées chacune d'un point ferrugineux; la postérieure est ronde, plus grande, saupoudrée de gris & marquée dans son milieu d'un petit œil violet. Le corselet est ferrugineux, l'abdomen jaunâtre. Les antennes sont noires.

De la côte de Guinée.

5. NYMPHALE POLLUX.

NYMPHALIS POLLUX.

Nym. alis suprà fasciâ mediâ fulvâ : subtus ad basin nigris, annulis fasciâque virefcenti-albis.

Papilio N. Pollux, *alis dentato-bicaudatis, fuscis, fasciâ flavâ : subtus fasciâ maculifque albis nigro fectis.* FAB. *Gen. Inf. Mant. p. 251.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 11. n. 45.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n. 49.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 63. n. 197.*

Papilio Castor. GRAM. *Pap. pl. 37. fig. E. F.*

Papilio Castor. HERBST, *Pap. tab. 63. fig. 1. 2.*

Elle est approchant de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande fauve, commune, oblique & discoidale. La bande des premières ailes est maculaire, bifide antérieurement, & marquée au dessous de la fissure d'une ligne de trois points noirs. La bande des secondes ailes ne descend pas au-delà du disque. Celles-ci ont au sommet un point rouillâtre, & le long du bord terminal un double rang de points inégaux d'un bleu-violet.

Le dessous des quatre ailes se rapproche beaucoup du dessous du *Jafius*; mais ici le fond de la partie antérieure est noir, au lieu d'être ferrugineux; les taches qu'on y voit sont pareillement noires, & leur encadrement est d'un blanc-verdâtre; le bord terminal des ailes supérieures est d'un gris-ardoisé, comme la bande dentée qui le précède intérieurement; le bord analogue des inférieures a, derrière la rangée de points violets, des taches fauves bien plus étroites. Le corps est d'un brun-obscur en dessus, d'un gris-fale en dessous. Les antennes sont noires.

De la côte de Guinée.

N. E. Cramer représente le dessous de son *Castor* ferrugineux vers la base. C'est sans doute une méprise de l'enlumineur; car les individus que nous avons vus en nature, & nous en avons vu plusieurs, ont le fond noir dans cette partie. On a omis aussi

les petites taches fauves situées à l'extrémité de la surface inférieure des secondes ailes.

6. NYMPHALE EUDOXE.

NYMPHALIS EUDOXE.

Nym. alis suprà fasciâ mediâ maculifque marginalibus fulvis : subtus ad basin ferrugineis, annulis argenteis; posticis tantum fasciâ albâ.

Papilio N. Eudoxus, *alis caudatis, nigris, fasciâ communi rubrâ : subtus maculis argenteis nigro fectis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 65. n. 205.*

Papilio Eudoxus. DRURY, *Inf. tom. 5. pl. 33. fig. 1. 4.*

Papilio Eudoxus. JOX. *Fig. piët. 5. tab. 53.*

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est brun à la base; puis noir jusqu'au bout avec une bande fauve, commune, oblique, discoidale, se rétrécissant à mesure qu'elle approche de la côte des supérieures. Celles-ci ont, le long du bord terminal, une rangée de points, & les inférieures une rangée de lunules, fauves. Il y a en outre deux points bleus près de l'angle anal des ailes inférieures.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, & présente, sur les trois quarts antérieurs des premières, & à la base des secondes, des taches noires, entourées de blanc-argenté. Les ailes supérieures ont ensuite deux rangées transverses de taches fauves, séparées par une raie noire, ponctuée de bleu. Les ailes inférieures sont traversées dans leur milieu par une bande blanche, mouchetée de brun; en avant du bord postérieur, par deux lignes ondulées bleuâtres, lissérées de noir; & près du bord même par un cordon de lunules fauves.

De Sierra-Leonc.

7. NYMPHALE LUCRÉTIVUS.

NYMPHALIS LUCRETIVUS.

Nym. alis suprà fasciâ duabus macularibus fulvis : subtus ferrugineis, ad basin annulis aliquot cœrulescentibus; posticis strigâ posticâ grisefcente.

Papilio N. Lucretius, *alis dentatis, atris, fulvo fasciatis : subtus maculis atris lineâ cœruleâ cinctis.* FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 22. n. 91.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n. 107.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 84. n. 261.*

Papilio Lucretius. GRAM. *Pap. pl. 82. fig. E. F.*

Papilio Lucretius. HERBST, *Pap. tab. 66. fig. 1. 2.*

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec deux bandes fauves, maculaires, dont une terminale & moins

moins large, l'autre disposée obliquement entre celle-ci & le milieu de la surface.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux & présente, vers la base, diverses taches noires, bordées de bleuâtre; il y a en outre à l'extrémité des inférieures, sur un fond plus intense, une raie grise, transversale, courbée en arrière, & à laquelle correspond sur les ailes supérieures une bande d'un ferrugineux plus clair que le reste de la surface.

De la côte de Guinée.

8. NYMPHALE FABIUS.

NYMPHALIS Fabius.

Nym. alis supra fasciâ mediâ punctisque marginalibus: subtus nitidè-cinereis, unâs bascos nigris.

Papilio N. Fabius, alis dentato-bicaudatis, fuscis, flavo-fasciatis: subtus basi nigro undatis, apice punctis fulvis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 12. n. 47.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n. 52.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 64. n. 201.*

Papilio E. A. Euphanes, alis bicaudatis, fuscis: superioribus maculis transversalibus punctisque marginalibus luteis; inferioribus fasciâ unâ: subtus omnibus cinereis, maculis albis, luteis nigrisque variis. ESP. *Pap. Evol. tom. 1. p. 258. tab. 59. fig. 1.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande jaune, commune, oblique, diagonale. La bande des premières ailes est maculaire & précédée intérieurement, près de la côte, de deux taches de sa couleur. Il y a en outre, le long du bord terminal des mêmes ailes, une rangée de points, &, sur le limbe correspondant des inférieures, deux rangées de lunules d'un jaune un peu verdâtre.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré luisant, coupé transversalement à la base par trois lignes noires en zig-zag, au milieu par une bande blanche, vers l'extrémité par un rang de points d'un jaune-fauve & entourés de verdâtre. Après ces points, les secondes ailes en ont de bleuâtres, que précède immédiatement en dehors un cordon de lunules jaunes.

Des îles Nicobar, mer des Indes.

9. NYMPHALE ANTICLÉE.

NYMPHALIS Anticlea.

Nym. alis supra fasciâ terminali, fulvâ: anticarum macularum abbreviatâque, posticarum ocellis quatuor.

Papilio Anticlea. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 27. fig. 5. 6.*

Elle est beaucoup plus petite que les précédentes, & ses queues sont plus courtes. Le dessus des ailes est d'un noir enfumé, avec une bande fauve, terminale. La bande des ailes supérieures est maculaire & ne monte pas jusqu'au sommet. Celle des inférieures est continue, plus large, & marquée vers l'angle anal de quatre petits yeux noirs à prunelle blanche.

Le dessous des quatre ailes est rouffâtre, avec des parties plus claires & d'autres plus foncées, bordées par des lignes noires transversales. Indépendamment de ces caractères, il y a à la base des premières ailes trois points noirs, ocellés; &, sur le bord postérieur des secondes, plusieurs petits yeux correspondant à ceux de la surface opposée.

De Sierra-Leone.

De Sierra-Leone.

10. NYMPHALE CANDIOPE.

NYMPHALIS Candiope.

Nym. alis supra lutescentibus, apice nigro fulvoque maculato: subtus costâ bascos nitidè viridi.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes a environ la moitié antérieure d'un jaune-rouffâtre & terminée par du fauve vil; l'autre moitié d'un noir-brun, avec deux rangées transversales de taches fauves, dont les intérieures orbiculaires, les extérieures lunulées & tout-à-fait marginales.

Le dessous des premières ailes est d'un jaunepâle vers la base, avec la côte d'un vert-pomme & finement entrecoupée de blanc; plus, quelques traits noirs transversaux, derrière lesquels il y a une bande obscure, commune aux ailes inférieures. Après cette bande, le fond est d'un brun-clair, avec des points noirs formant une ligne parallèle au bord postérieur.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-grisâtre, avec une tache d'un vert-pomme-luisant à l'origine de la côte, deux bandes tortueuses de taches blanchâtres sur le milieu, une rangée de points d'une teinte incarnate en avant du bord postérieur, &, sur ce même bord, une série de lunules verdâtres, marquées chacune d'un point qui est noir en dehors, violet en dedans. Le corps est rouffâtre en dessus, cendré en dessous.

Sa patrie nous est inconnue.

11. NYMPHALE ATHAMAS.

NYMPHALIS Athamas.

Nym. alis fasciâ mediâ glaucâ, subhyalinâ, subâsque lunulis ferrugineis extus marginatâ.

Papilio Athamas. CRAM. *Pap. pl. 89. fig. C. D.*

Papilio Athamas. DRURY, *Inf. tom. 1. pl. 2. fig. 5. 4.*

Papilio Pyrrhus. DONOV. *Of an Epitome of*
Y y

the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 2. pl. 4. fig. 5.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-violet, avec une bande d'un vert-blanchâtre, commune, oblique, discoidale, un peu transparente, beaucoup plus large dans la femelle que dans le mâle. Cette bande ne monte pas jusqu'à la côte des premières ailes, mais elle en est séparée par un gros point de sa couleur, & quelquefois par deux, dont l'extérieur très-petit. Les secondes ont parallèlement au bord terminal une rangée de sept points blancs, oblongs.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus, en ce que le fond est plus pâle; en ce que le côté externe de la bande verte est longé par une suite de lunules ferrugineuses, bordées de blanc en dedans & de noir en dehors; enfin, en ce qu'aux points marginaux des secondes ailes correspond ici un rang de points noirs, entourés de blanc-violet-luisant. Le corps est d'un brun-cendré, avec quatre points blanchâtres sur la tête. Les antennes sont noires, avec la sommité ferrugineuse.

De la Chine & de l'île de Java.

N. B. Donovan a confondu cette espèce avec le *Pyrrhus*.

12. NYMPHALE Sempronius.

NYMPHALIS Sempronius.

Nym. alis bicaudatis, albis, margine atro, albo punctato. FAB.

Papilio N. Sempronius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 62. n.º. 194.*

Papilio Sempronius. JON. *Fig. piç. 5. tab.*

Le corps est grand, blanc, avec les antennes noires. Le dessus des ailes est blanc, avec tous les bords noirs, & le postérieur pointué de blanc.

Le dessous est varié de blanc, de vert, de noir, & coupé transversalement par une raie bleue; il y a en outre, à l'angle anal des ailes inférieures, trois taches fauves marquées de noir; & le bord terminal des mêmes ailes est noir, avec des lunules jaunes.

Elle habite. . . .

(Traduction du texte de Fabricius.)

13. NYMPHALE Horatius.

NYMPHALIS Horatius.

Nym. alis dentato-bicaudatis, atris: posticis apice sanguineis, punctis ocellaribus atris. FAB.

Papilio N. Horatius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 64. n.º. 202.*

Papilio Horatius. JON. *Fig. piç. 5. tab. 16. fig. 2.*

Elle a tout-à-fait le port des précédentes. Le

corps est noir, avec quatre points blancs sur la tête. Les ailes supérieures sont noires, avec une bande marginale, courte, commune aux secondes ailes, & un point d'un rouge-sanguin. Leur dessous est cendré & présente à la base trois points noirs; au milieu, une bande plus obscure que le fond & bordée de noir.

Les ailes inférieures ont deux queues. Leur dessous est noir, avec une large bordure terminale d'un rouge-sanguin, bordure sur laquelle il y a cinq points noirs ocellés, dont la prunelle est blanche. Le dessous des mêmes ailes est cendré, avec une bande plus foncée sur le milieu; une raie jaune, des lunules noires & bleues vers le bout. Elle habite. . . .

(Traduction du texte de Fabricius.)

14. NYMPHALE Tiridate.

NYMPHALIS Tiridates.

Nym. alis supra atro-ceruleis, margine postico lunulis ochraceis: omnium dimidio apicalis punctis ceruleiscentibus.

Papilio N. Tiridates, alis dentato-bicaudatis, supra nigris, ceruleo maculatis margineque albo punctato. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 11. n.º. 45.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n.º. 47.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 62. n.º. 195.*

Papilio Tiridates. CRAM. *Pap. pl. 162. fig. A. B.*

Papilio Tiridates. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 23. fig. 1. 2.*

Papilio Tiridates. HERBST, *Pap. tab. 62. fig. 5. 4.*

Papilio Tiridates. DONOV. *Of an Evit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 5. pl. 2. fig. 5.*

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-noir, avec deux rangées transverses & postérieures de points d'un bleu clair, & une rangée tout-à-fait terminale de lunules d'un jaune-terreux.

En dessous, le fond des quatre ailes est d'un brun-grisâtre un peu luisant. Vers la base sont des traits noirs, ondulés, transversaux, légèrement bordés de bleuâtre; vient après cela une série transverse & tortueuse de points jaunâtres. Cette ligne est suivie aux secondes ailes d'un rang de points violâtres, adossés à des lunules jaunâtres. Les premières ailes ont à leur angle interne une double tache noire, bordée en dehors par une accolade bleuâtre. Le dessus du corps est d'un brun-noirâtre, avec quatre points blanchâtres sur la tête. Les antennes sont noires, & les palpes jaunâtres en dessous.

Des îles de Java & d'Amboine.

15. NYMPHALE Thurius.

NYMPHALIS Thurius.

Nym. alis suprà atro-cæruleis, margine postico lunulis ochraceis: disco anticarum punctis, posticarum fasciâ latâ, cærulescentibus.

Papilio Thicste. STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAM. pl. 52. fig. 2 & 2. B.

Elle a beaucoup de rapport avec la nymphe *Tridate*; mais, ce qui l'en distingue particulièrement, c'est que le dessus des secondes ailes est traversé au milieu par une bande d'un bleu encore plus pâle que les points, & le dessous des quatre, par une bande grisâtre tortueuse. La bande bleue du dessus des secondes ailes est large & dentée en dehors.

Prise dans le pays des Castres par M. Levaillant.

16. NYMPHALE ŒCLUS.

NYMPHALIS ŒCLUS.

Nym. alis suprà atro-cæruleis: subtus cinereo-cærulescentibus nigroque undatis, maculâ angulî ani, fulvâ.

Papilio N. ŒCLUS, alis dentato-bicaudatis, suprà nigris: subtus cinereis, nigro undatis, maculâ ocellari, fulvâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n.º. 30. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 63. n.º. 198.*

Papilio ŒCLUS. HERBST, *Pap. tab. 65. fig. 3. 4.*

Papilio Aeilus. CRAM. *Pap. pl. 517. fig. A. B.*

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-noir, sans taches aux inférieures, avec quatre ou cinq points blancs épars vers le sommet des supérieures.

En dessous, le fond des quatre ailes est d'un bleu-ardoisé pâle, avec une multitude de lignes noires, ondulées & transversales. Il y a en outre, à l'angle interne de chaque aile, une tache jaune orbiculaire. Celle des inférieures a le milieu marqué d'un point noir. Les deux surfaces du corps sont colorées comme celles des ailes, & la tête offre deux points blancs. Les antennes sont noires.

De l'île d'Amboïae.

17. NYMPHALE ETHÉOCLE.

NYMPHALIS ETHEOCLES.

Nym. alis suprà atro-iridibus, subtus fuscescentibus: utrinque fasciâ albâ, mediâ.

Papilio N. Etheoctes, alis bicaudatis, cæruleo-fuscis, utrinque fasciâ albâ: posticis margine iridî. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 6. n.º. 51. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 64. n.º. 200.*

Papilio Etheoctes. CRAM. *Pap. pl. 119. fig. D. E.*

Papilio Etheoctes. HERBST, *Pap. tab. 65. fig. 3. 4. 5.*

Elle est de la même taille que l'*Œclus*. Le dessus des ailes est d'un vert-noir, avec une bande blanche, commune, oblique, discoïdale. La bande des premières ailes est maculaire, rétrécie antérieurement, & précédée, vers l'origine de son côté interne, d'un groupe de trois à quatre points de sa couleur. Les secondes ailes ont, parallèlement à leur bord postérieur, une rangée de crochets blanchâtres, &, sur le bord même qui est d'un vert plus clair que le reste de la surface, quelques crochets ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-pâle, un peu luisant, avec une bande blanche, correspondant à celle du dessus. A la base des supérieures sont trois points ocellés, à celle des inférieures trois lignes transverses, noirs & bordés de bleuâtre. On voit en outre à l'angle interne des premières ailes une double tache noire, & en avant du bord postérieur des secondes, un cordon de lunules violâtres. Ce bord est vert, depuis la queue extérieure jusqu'à l'angle anal inclusivement, avec une suite de points noirs.

De la côte de Guinée.

18. NYMPHALE EPHYIA.

NYMPHALIS EPHYIA.

Nym. alis suprà fusco nigris, anticarum margine postico punctis virescentibus, posticarum lunulis albidis.

Elle diffère de l'*Ethéocle* en ce qu'elle est d'environ neuf lignes plus petite, & sans bande blanche de part & d'autre; en ce que le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, peu ou pas chatoyant; en ce que celui des supérieures a trois points verdâtres le long de la côte, & huit ou neuf semblables le long du bord terminal.

De la côte occidentale d'Afrique.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Parmi eux il s'en trouvoit un dont le dessus des secondes ailes offroit, avant les crochets blanchâtres, une rangée de lunules d'un vert-obscur.

19. NYMPHALE ETÉSIPE.

NYMPHALIS ETESIPÉ.

Nym. alis suprà atro-cæruleis, subtus albo, nigro ferrugineoque marmoratis: utrinque fasciâ albâ, mediâ.

Papilio Etheoctes. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 10.*

Fabricius l'a confondue avec l'*Ethéocle*, quoiqu'elle en diffère essentiellement.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-bleu, avec une bande blanche, commune, oblique, discoïdale. Cette bande est continue & dentelée extérieurement aux secondes ailes. Aux premières, elle se compose de taches dont les postérieures très-

grandes, les antérieures très-petites, & formant par leur disposition une fissure assez profonde. Les secondes ailes ont au milieu de leur bord terminal un croissant rouffâtre, plus ou moins distinct; & en avant de l'angle anal qui est verdâtre, un groupe de deux ou trois points blancs.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches blanches, entremêlées de taches noires dont toutes les antérieures ayant le milieu ferrugineux; plus une bande blanche, correspondant à celle de dessus. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont le bord antérieur d'un blanc-futé. Leur bord postérieur est verdâtre à l'angle de l'anus, avec deux taches violettes; jaune entre les deux queues; puis noir; enfin, chargé au sommet d'un rang de trois lunules ferrugineuses. Le dessus du corps est d'un noir-brun, avec quatre points blancs sur la tête, & deux autres sur le milieu du corselet. Les antennes sont tout-à-fait noires.

De Sierra-Leone.

20. NYMPHALE Ethéta.

NYMPHALIS Etheta.

Nym. alis suprà atro-cæruleis, dimidio apicali cærulescenti-maculatis: subtus albo, nigro ferrugineoque marmoratis.

Elle diffère de l'*Etispe* en ce qu'elle est moins grande; en ce que le dessus de les ailes offre à l'extrémité deux rangées transverses de taches d'un bleu-pâle, surtout les extérieures; en ce que la bande blanche, discontinue, manque du part & d'autre. La surface supérieure des premières ailes est seulement marquée de quelques points blancs entre le disque & le milieu du bord d'en haut.

De la côte occidentale d'Afrique.

N. B. Ne seroit-ce point le mâle de l'*Etispe*?

21. NYMPHALE Bérénice.

NYMPHALIS Berenice.

Nym. alis suprà nigris, fuscis communi rufis: postlicis subtus albo, flavo ferrugineoque maculatis.

Papilio N. Berenice, alis dentatis, nigris, fuscis communi rubris: postlicis subtus nigro, albo, ferrugineo flavoque maculatis. FAB *Mant. Inf. tom. 2. p. 48. n. 471.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 114. n. 350.*

Papilio Berenice. DEURY, *Inf. tom. 5. pl. 11. fig. 1. 2.*

Papilio Zingha. CRAM. *pl. 515. fig. B. C.*

Papilio Zinghus. HERBST, *tab. 151. fig. 5. 4.*

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec une bande rouille, traversant obliquement le milieu des supérieures, &

couvrant toute la base des inférieures. Ces dernières sont ponctuées de blanc vers l'angle de l'anus, & de roux vers le sommet.

Le dessous des premières est grisâtre le long de la côte, avec des points & des veines noirs; roux le long du bord interne, avec du noir près de l'angle de ce nom.

Le dessous des secondes ailes est blanchâtre à la base, avec des points noirs; puis noir jusqu'au bout, avec des taches grisâtres, entremêlées de points ferrugineux. Il y a en outre, vers l'angle de l'anus, quelques taches jaunes, entre lesquelles sont des hiéroglyphes blancs.

De la côte occidentale d'Afrique, & particulièrement de Sierra-Leone.

22. NYMPHALE Pyrrhus.

NYMPHALIS Pyrrhus.

Nym. alis suprà fusco-nigris, basi pallide ochraceâ: postlicis lunularum cærulescentium serie duplici.

Papilio E. A. Pyrrhus, alis bicaudatis, fuscis, fuscis communi albâ: primorum dimidiatâ. LINS. *Syst. Nat. 2. p. 749. n. 25.* — *Muf. Lud. Ultr. p. 205.*

Papilio Pyrrhus. CLERCK, *Icon. tab. 25. fig. 2.*

Papilio N. Pyrrhus. FAB. *Syst. em. p. 449. n. 50.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 10. n. 41.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n. 45.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 61. n. 192.*

Papilio Pyrrhus. CRAM. *Pap. pl. 220. fig. A. B.*

Papilio Pyrrhus. HERBST, *Pap. tab. 62. fig. 1. 2.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 47. fig. 2. 5.*

Elle a environ quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec la moitié antérieure des inférieures, & un grand espace triangulaire à l'origine du bord interne des supérieures, d'un jaune livide. Les ailes supérieures ont neuf taches orbiculaires du même jaune, savoir: deux un peu au-delà du milieu de la côte, & sept alignées parallèlement au bord de derrière. Les secondes ailes ont deux rangées de lunules bleues: l'une bordant le côté externe de la partie jaune; l'autre marginale, terminée à l'angle de l'anus par un croissant fauve, & séparée de la précédente par une ligne transversée de points blancs ou bleuâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-jau-nâtre, coupé transversalement près de la base par deux raies noires, communes, dont la postérieure décrivant un coude & remontant jusqu'à la poitrine. Immédiatement après cette dernière raie, c'est-à-dire, au milieu de la surface, il y a une bande blanche, terminée en pointe sur les secondes ailes, & suivie sur toutes les quatre d'une

ligne noire, ondulée, bordée de blanc extérieurement, & entre laquelle & le bord, mais plus près de celui-ci, on voit un cordon de taches blanches. Indépendamment de ces caractères, le dessous des secondes ailes offre trois lunules d'un rouge-fer-rugueux, disposées obliquement entre le dique & le bord interne; plus une rangée terminale de lunules jaunes. Le corps est d'un jaune-pâle; la tête & le devant du corselet font noirs, avec des points blancs.

De l'île d'Amboine.

N. B. Fabricius rapporte ici la fig. 5, pl. 2, tom. 1 de Drury; mais cette figure représente l'*Athamas*. Drury n'a point donné le *Pyrrhus*.

23. NYMPHALE NIFUS.

NYMPHALIS Nifus.

Nym. alis supra fusco-nigris : posticis antè marginem posticum cœruleiscentibus, punctis ocellariis fusciâque albâ.

Papilio N. Euryalus, alis caudatis, nigris : posticis antè marginem cœruleis, maculis nigris pupillâ albâ. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 20. n. 83.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n. 95.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 70. n. 218.* (Le mâle.)

Papilio Euryalus. GRAM. *Pap. pl. 74. fig. A. B.*

Papilio Euryales. HERBST, *Pap. tab. 61. fig. 1. 2.*

Papilio N. Nifus, alis caudatis, nigris : anticis fusciâ subvâ ; posticis albâ submarginali. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 21. n. 84.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n. 96.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 70. n. 219.* (La femelle.)

Papilio Nifus. GRAM. *Pap. pl. 150. fig. A. B.*

Papilio Nifus. HERBST, *Pap. tab. 61. fig. 3. 4.*

Les auteurs ont donné le mâle de ce lépidoptère sous le nom d'*Euryalus*, & la femelle sous celui de *Nifus*. Nous adoptons le dernier de ces deux noms, parce qu'il y a une satire qui porte celui d'*Euryale*.

Notre *Nifus* a le port & la taille du *Pyrrhus*; mais sa queue postérieure est sensiblement plus courte que celle qui la précède en dehors. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande fauve ou jaunâtre vers l'extrémité des supérieures, & une bande blanche sur le bord terminal des inférieures. La bande des premières ailes descend de la côte à l'angle interne. Elle se compose ordinairement de points fauves dans le mâle, de taches jaunâtres, grandes & en forme de coin dans la femelle; nous disons ordinairement, parce qu'il arrive qu'elle s'oblitére plus ou moins, n'importe le sexe. La bande marginale des secondes ailes est précédée antérieurement d'une bande d'un bleu-cendré, sur laquelle il y a une rangée courbe de huit

yeux noirs à prunelle bleuâtre, yeux beaucoup plus grands dans la femelle que dans le mâle.

Le dessous des quatre ailes est brun, un peu teinté de gris-luisant, avec deux bandes jaunes, communes, dont l'antérieure bordée de noir, plus courte & moins vive; la postérieure ayant des points bleuâtres à son côté externe sur les ailes de devant, & à son côté interne sur celles de derrière. On voit en outre au milieu de chaque aile une ligne noire, transversée & tortueuse, laquelle est doublée de jaunâtre en dehors, mais seulement dans la femelle. Le corps est noir en dessus, brun en dessous. Les antennes sont noires.

De l'île d'Amboine.

24. NYMPHALE SOLON.

NYMPHALIS Solon.

Nym. alis caudatis, nigris, fusciâ stavefcente, basi fusci. FAB.

Papilio N. Solon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 69. n. 216.*

Papilio Solon. JON. *Fig. pict. 5. tab. 63. fig. 2.*

Comme nous n'avons pas vu ce lépidoptère, nous ignorons quelle peut être sa véritable place.

Le corps est brun. Le dessus des ailes est obscur à la base; ensuite noir, avec une bande jaunâtre, commune, mais interrompue sur les supérieures. Indépendamment de cela, le bord terminal est ponctué de jaune.

Le dessous des ailes est cendré, avec quelques ondes noires à la base; une bande d'un jaune-pâle sur le milieu; des taches jaunes peu prononcées à l'extrémité.

Il habite.....

(Traduction de Fabricius.)

25. NYMPHALE XIPHARES.

NYMPHALIS Xiphares.

Nym. alis supra nigris : anticarum disco maculis albâ, posticarum fusciâ flavâ extusque dentatâ.

Papilio N. Xiphares, alis dentato-caudatis, nigris : anticis albo maculatis, posticis fusciâ flavâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n. 96.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 71. n. 221.*

Papilio Xiphares. GRAM. *Pap. pl. 577. fig. A. B.*

Papilio Xiphares. HERBST, *Pap. tab. 60. fig. 5. 6.*

Cette nymphale, dont l'envergure est d'environ quatre pouces, a la même forme que toutes celles de cette division; mais sa queue postérieure est arquée, & beaucoup plus longue que celle qui la précède en dehors.

Le dessus des premières ailes est d'un noir-brun, avec quatre ou cinq taches blanches, disséminées,

& huit points jaunâtres, dont cinq disposés transversalement en arc entre les taches précédentes & le sommet, les trois autres groupés à l'angle interne. Le dessus des secondes ailes est d'un noir-brun, & traversé au milieu par une bande jaune, oblique, large, dentée en dehors. On y voit en outre deux séries marginales de lunules, dont les intérieures d'un bleu pâle & luisant, les extérieures jaunâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-olivâtre vers la base, avec quelques raies noires, transversales & bordées de bleuâtre; puis grisâtre jusqu'au bout, avec un bande blanche, commune, discoïdale, tortueuse, & précédée extérieurement d'une ligne jaunâtre, ondulée. Aux lunules du dessus des secondes ailes correspondent ici des lunules à peu près semblables.

Du Cap de Bonne-Espérance.

26. NYMPHALE Miltiade.

NYMPHALIS Miltiades.

Nym. alis caudatis, fasciis: posticis maculâ albâ: subtus omnibus fasciâ communi albâ ocelloque unico. FAB.

Papilio N. Miltiades. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 66. n° 205.*

Papilio Miltiades. JON. *Fig. pict. 5. tab. 80. fig. 2.*

Cette espèce n'est mise ici que conditionnellement. Le corps est grand, brun. Les ailes supérieures sont d'un brun-obscur, avec une tache ferrugineuse fur leur milieu, & deux points blancs vis-à-vis de leur sommet. Leur dessous est plus pâle que le dessus, avec deux raies noires, transversales, à la base; une bande blanche derrière le milieu; un œil noir à iris jaune & sans prunelle vers le bord postérieur.

Les secondes ailes font en queue. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec une grande tache blanche, plus une raie jaune, transversale & marginale. Leur dessous est comme celui des premières ailes, mais la bande blanche a le milieu dilaté & marqué d'un œil noir.

Elle habite....

(Traduction du texte de Fabricius.)

B. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes avec une queue extérieure, linéaire, aiguë, & la dent qui précède l'angle anal, obtuse & un peu plus prononcée que les autres.

27. NYMPHALE Achérona.

NYMPHALIS Acheronta.

Nym. alis anticis supra basi rufis, apice nigris albo maculatis: posticis fusco ferrugineis puncto nigro.

Papilio N. Acheronta, alis dentato-caudatis: anticis basi rubris, apice nigris albo maculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 47. n° 463. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 76. n° 259.*

Papilio Cadmus. GRAM. *Pap. pl. 22. fig. A. B.*

Papilio Pherecidas. GRAM. *Pap. pl. 550. fig. A. B.*

Papilio Cadmus. HERBST, *Pap. tab. 57. fig. 1. 2.*

Papilio Pherecidas. HERBST, *Pap. tab. 57. fig. 5. 4.*

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-bruné depuis la base jusque vers le milieu, avec les nervures plus ou moins noires; ensuite noir jusqu'au bout, avec six points blancs, dont quatre formant une ligne oblique derrière la couleur fauve, les deux autres disposés transversalement vis-à-vis du sommet. Le dessus des secondes ailes est d'un ferrugineux obscur, avec un point noir, plus ou moins distinct, vers l'angle de l'anus.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun légèrement glacé de gris, avec quelques taches noires, annulaires, près de la base; une ligne flexueuse & transverse de cette couleur sur le milieu; une bande obscure & pareillement transverse entre la ligne susdite & le bord postérieur. Cette bande est terminée au bord antérieur des premières ailes par une tache d'un blanc-luisant, & au bord interne des secondes par deux points noirs ocellés. Les secondes ailes ont en outre un point blanchâtre dans une des taches annulaires de la base. Le corps est d'un brun-rouillâtre en dessus, d'un brun-pâle en dessous. Les antennes sont ferrugineuses, avec la massue noire.

Elle se trouve depuis le Brésil jusqu'à l'état de New-York inclusivement.

C. Bord postérieur des premières ailes concave, & plus ou moins tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes avec deux queues linéaires, dont l'une anale & courbée du côté du corps; l'autre extérieure, oblique, beaucoup plus longue, & obtuse à son extrémité.

28. NYMPHALE Thétis.

NYMPHALIS Thetis.

Nym. alis supra fulvis, strigis tribus nigris, communibus, rectis: subtus glauco-nitidis, strigâ mediâ sericeâ punctorum ocellatorum.

Papilio N. Thetis, alis dentato-caudatis, fulvis, strigis nigris: posticis subtus glaucis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 87. n° 385. — Mant. Inf. tom. 2. p. 47. n° 465. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 77. n° 241.*

Papilio Pctreus. GRAM. *Pap. pl. 87. fig. D. E.*

STOLL, *Pap. Suppl. à GRAM. pl. 2. fig. 2. A.* (La chenille.) *Fig. 2. B.* (La chrysalide.)

Papilio Petreus. HERBST, *Pap. tab. 67. fig. 1. 2.*

Papilio Petreus. ESP. *Pap. Exot. tab. 58. fig. 1. 4.*

Papilio Peleus. SULZ. *Inf. p. 142. tab. 13. fig. 4.*

Elle a entre trois pouces & trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve plus ou moins vil, suivant le sexe, avec trois lignes noires, communes, obliques, non finuées. Il y a en outre deux ou trois petites lignes transverses, de cette couleur, vers la base des premières ailes, lesquelles ont l'extrémité de la côte & une partie du bord terminal noirâtres. Ce dernier bord & les queues font obscurs aux secondes ailes, dont l'angle anal offre trois croissans blanchâtres, croissans que surmontent deux points noirs entourés chacun d'un cercle blanc, tantôt simple, tantôt double. La queue extérieure a l'extrémité un peu blanche.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun ferrugineux, glacé de violâtre ou de blanc-vertâtre, avec une ligne obscure, commune, discoïdale, oblique, derrière laquelle il y a une rangée transversée de points noirs, ocellés. Les ailes supérieures ont de plus quelques légères taches brunes le long de la côte.

La femelle a les queues bordées de fauve.

La chenille, d'après Stoll, est ferrugineuse, tachetée de noir, avec la tête fauve & armée de deux épines noirâtres, longues, légèrement rameuses. Sur son dos, entre la cinquième & la onzième incisions, est une bande jaune, assez large, sinuée, d'où s'élève un rang de quatre épines noires, aiguës, & dont la postérieure un peu courbée en avant. Les pattes écailleuses font noires; les pattes membraneuses jaunes, ainsi que le ventre. Elle vit sur l'*Acajou des Indes occidentales* (*anacardium occidentale*).

La chrysalide est jaune, mouchetée de noir, avec des épines brunes, dont les deux antérieures & les suivantes longues, les postérieures courtes & dorsales.

De la Guyane & du Brésil.

29. NYMPHALE Pellénis.

NYMPHALIS Pellenis.

Nym. alis suprà fulvis, strigis duabus nigris, communibus; anticarum posticâ angulatâ; subtis glaucis nitidis, strigâ mediâ serieque punctorum ocellatorum.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a environ un demi-pouce de moins; en ce que la seconde ligne noire est fortement brisée aux premières ailes, & que la troisième y manque totalement; en ce que le mâle a la queue extérieure moins longue, un peu plus large & bordée de fauve comme dans la femelle.

Nous la soupçonnons des Antilles.

30. NYMPHALE Aflina.

NYMPHALIS Aflina.

Nym. alis caudatis, fuscis, disco communi fulvo; anticis lunulâ atrâ. FAB.

Papilio N. Aflina. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 81. n. 251.*

Papilio Aflina. JON. *Fig. piç. 5. tab. 80. fig. 1.*

Voici ce qu'en dit Fabricius: le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un espace fauve, discoïdal & commun. Les supérieures ont en outre une lunule noire.

Le dessous de toutes les ailes est orné de brun, & la queue des inférieures est longue.

De l'île Saint-Thomas.

31. NYMPHALE Corésie.

NYMPHALIS Corefia.

Nym. alis suprà fusco-nigris, basi fasciâque geminâ purpurascenti-ferrugineis; subtis dimidiato basilari niveo, strigâ ferratâ ferrugineâ extus marginato.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec la base, & deux bandes postérieures, d'un ferrugineux-purpurin. Les secondes ailes ont le bout de la queue extérieure blanc, la queue anale ferrugineuse de part & d'autre & surmontée d'un groupe d'atomes blanchâtres.

Le dessous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un blanc-lavé, & bordée en dehors par une bande ferrugineuse dont le côté externe est en scie & terminé de noir. L'autre moitié est d'un brun-grisâtre-luisant, surtout au sommet, avec le bord postérieur ferrugineux. Sur la partie blanche de la base font trois lignes roussâtres, transverses, très-fines & légèrement flexueuses. Le corps a le dessus d'un noir-brun, le dessous blanc. Les antennes font noires en dessus, ferrugineuses & annelées de blanc en dessous.

Du Brésil.

32. NYMPHALE Chiron.

NYMPHALIS Chiron.

Nym. alis suprà nigro-fuscis, fasciis quatuor communibus corticinis; subtis dimidiato basilari margaritaceo, fasciâ albâ extus marginato.

Papilio E. A. Chiron, alis caudatis, nigris, fusco fasciatis; anticâ albis, strigis ferrugineis. FAB. *Syst. Ent. p. 452. n. 40. — Spec. Inf. tom. 2. p. 16. n. 60. — Mant. Inf. tom. 2. p. 3. n. 68. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 26. n. 78.*

Papilio Marius. CRAM. *pl. 200. fig. D. E.*

Papilio Marius. STOLL, *Suppl. à CRAM.*

Papilio Marius. Esp. Pap. Exot. tom. 1. tab. 52. fig. 4.

DAUBENTON, Pl. enlum. 71. fig. 2. 5.

Papilio Chiron. HERBST, tab. 52. fig. 1. 2.

Elle est de la même taille que la précédente. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec quatre raies ou bandes communes d'un brun-tanné-pâle. Il y a en outre vers l'extrémité des premières ailes une rangée transverse de trois points blancs, & à l'angle anal des secondes deux taches noires oculaires, dont la plus intérieure saupoudrée de blanchâtre. La queue interne de ces dernières ailes a le milieu d'un roux-vil, & la queue externe a le bout blanc.

Le dessous de toutes les ailes est d'un gris de perle à la base, avec quatre lignes rousses, transversales, dont l'extérieure bordée par une bande blanche étroite. De cette bande au bord terminal, le fond est brun, avec trois raies violettes, communes, plus quelques points blancs au sommet des ailes supérieures, & deux points noirs ocellés à l'angle anal des inférieures.

De l'Amérique méridionale.

35. NYMPHALE Thémistocle.

NYMPHALIS Themistocles.

Nym. alis suprà nigro-fuscis, fuscis quatuor communibus corticinis: subtus violaceo-brunneis, punctorum nigricantium serie posicis.

Papilio N. Themistocles, alis caudatis, brunneis, fusco-fuscatis: posicis punctis duobus atris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 66. n^o. 207.

Papilio Themistocles. JON. Fig. piç. 5. tab. 70. fig. 2.

Elle ressemble beaucoup au *Chiron*; mais elle n'a qu'une seule queue, celle de l'angle de l'aune manque; les bandes brunes du dessus des ailes sont plus vives; le dessous est entièrement brun & légèrement glacé de violet, avec deux lignes obscures & ondulées sur le milieu, & une série de points noirâtres ocellés en avant du bord postérieur. Outre cela le mâle n'a pas de points blancs vis-à-vis du sommet des premières ailes.

Du Brésil.

34. NYMPHALE Dioné.

NYMPHALIS Dioné.

Nous Pavons décrite comme Vanesse (p. 300, n^o. 12); mais elle doit être rapportée ici.

35. NYMPHALE Corinne.

NYMPHALIS Corinna.

Elle a été mise parmi les Vanesses (p. 300, n^o. 11); mais elle doit être rapportée ici.

36. NYMPHALE Furcula.

NYMPHALIS Furcula.

Nym. alis suprà basi fulvis, tunc nigris cœruleoque nigrantibus: subtus nitenti-ferrugineis, strigis duabus nigris, undulatis.

Papilio N. Furcula, alis caudatis, fuscis, basi fulvis: anticis fuscis cœruleis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 79. n^o. 246.

Papilio Furcula. JON. Fig. piç. 5. tab. 79. fig. 1.

Papilio Iole. DRURY, Inf. tom. 3. pl. 38. fig. 2.

Papilio Iole. STOLL, Pap. Suppl. à CRAM. pl. 29. fig. 4 & 4. D.

Elle est à peu près de la taille des deux précédentes. Le dessus des quatre ailes est fauve à la base; ensuite noir jusqu'au bout, avec un réillet d'un bleu-violet, réillet qui se fait principalement sentir contre la couleur fauve des supérieures. Les secondes ailes ont, près de l'angle anal, un point d'un noir-foncé & entouré d'un anneau roux.

Le dessous des quatre ailes est d'un ferrugineux légèrement glacé de violâtre, avec deux lignes transverses & ondulées, puis une rangée de points oculaires, noirs. Le dessus du corps est fauve.

De la Jamaïque.

D. Bord postérieur des premières ailes concave. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte & arrondie; l'autre extérieure, oblique, longue, dilatée en angle vers l'origine de son côté interne, un peu courbe & rétrécie à son extrémité.

37. NYMPHALE Orfiloque.

NYMPHALIS Orfilochus.

Nym. alis suprà fuscis, fuscis duabus margaritaceis, transversis: subtus margaritaceis, fuscis fulvis.

Papilio E. A. Orfilochus, alis caudatis: anticis fuscis duabus, posicis unicâ, albis: subtus basi albis fuscis fulvâ. FAB. Gen. Inf. Mant. p. 252. — Spec. Inf. tom. 2. p. 16. n^o. 62. — Mant. Inf. tom. 2. p. 8. n^o. 70. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 27. n^o. 80.

Papilio Cinna. CRAM. Pap. pl. 200. fig. F. G.

Papilio Orfilochus. HERBST, Pap. tab. 52. fig. 3. 4.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux bandes communes, couleur de nacre de perle, & dont l'antérieure discoïdale, droite, assez large; la postérieure linéaire, & en outre oblitérée aux secondes ailes. Celles-ci ont la

queue

queue anale fauve & marquée d'un point noir; la queue extérieure brune, bordée de blanc & précédée de quelques traits de cette couleur.

Le dessous des quatre ailes est nacré de perle, avec trois bandes fauves, communes. Il y en a une quatrième, très-courte, vis-à-vis du sommet des ailes supérieures, ailes dont le bord terminal est également fauve. Le bord correspondant des ailes inférieures est longé par une double ligne noire, ondée, & les queues sont colorées comme en dessus. Le corps est brun en dessus, blanc en dessous. Les antennes sont ferrugineuses.

De la Guyane.

58. NYMPHALE Chriton.

NYMPHALIS Chriton.

Nym. alis caudatis, supra fuscis, subtus glaucis: fuscia utrinque albâ. FAB.

Papilio E. A. Chriton. FAB. *Gen. Inf. Mant.* p. 252. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 16. n. 61.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 8. n. 69.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 27. n. 79.*

Papilio Chriton. HERBST, *Pap. tab. 52. fig. 5. 6.*

Elle a de l'affinité avec la précédente. Les ailes supérieures ont la base d'un brun-obscur, avec quelques lignes transverses encore plus obscures; le milieu traversé par une bande blanche, large; l'extrémité noire, avec six ou sept points blancs. Les ailes inférieures sont d'un brun-obscur, avec une raie blanche, s'alignant à la bande des premières ailes, mais ne descendant pas jusqu'à l'angle de l'aube. Leur bord postérieur est rayé, & l'on y voit trois taches noires entourées d'un iris blanc. L'angle anal offre une petite tache rousse, & la queue est longue, noire, bordée de blanc.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris-violet-luisant, avec une large bande blanche & des lignes fauves, transversales. Aux trois taches noires, & à la tache rousse des secondes ailes correspondent ici des taches semblables.

De Surinam.

(Traduction du texte de Fabricius.)

E. Bord postérieur des premières ailes peu concave ou presque droit. Bord correspondant des secondes avec deux queues, dont l'une anale, très-courte & arrondie; l'autre extérieure, oblique, linéaire & aiguë.

59. NYMPHALE Camillus.

NYMPHALIS Camillus.

Nym. alis utrinque albis, fuscis transversis rufescentibus fuscoque marginatis.

Papilio N. Camillus, alis bicaudatis, albis, fuscis fulvis nigro marginatis: posticis maculâ *Hist. Nat. Inf. Tom. IX.*

caudali atrâ. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 11. n. 42.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n. 46.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 62. n. 195.*

Papilio Pantheus. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 6. fig. 4.*

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont blanches de part & d'autre, avec sept bandes communes, dont les quatre antérieures rouffâtes & bordées de brun, les trois postérieures entièrement brunes & linéaires. Outre cela, les premières ailes ont l'extrémité des nervures brune, & le milieu de leur bord d'en haut offre deux petites bandes colorées comme les quatre bandes antérieures. L'angle anal & la queue interne des secondes ailes sont fauves, avec une tache noire, mais saupoudrée de bleu en dessus. Le corps est blanc, avec une ligne noire le long du dos, & une semblable le long de chaque côté. Les antennes sont noires. Les palpes ont le dessus rouffâtre, le dessous blanc.

De l'Afrique équinoxiale.

40. NYMPHALE Thyoné.

NYMPHALIS Thyone.

Nym. alis utrinque fulvis, strigis plurimis fuscis: posticarum 4^a, 6^a, 8^a, tenuiter albo marginatis.

Papilio Thyonneus. CRAM. *Pap. pl. 220. fig. E. F.*

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus de toutes les ailes est d'un fauve-foncé, avec neuf lignes transverses d'un brun-noirâtre. Les quatrième, sixième & huitième lignes des ailes inférieures ont un des côtés finement bordé de blanc.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est plus pâle, & parce que les premières ailes ont près du sommet un petit espace blanc. Le corps est fauve en dessus, avec trois lignes noires le long du corselet, & une seule le long du dos.

Nous n'avons vu que le mâle, en sorte que nous ne pouvons dire si la femelle offre des différences.

De l'île d'Amboine.

41. NYMPHALE Hylas.

NYMPHALIS Hylas.

Nym. alis utrinque fulvis aut albis, strigis margineque fuscis anguloque anti bipunctato.

Papilio Hylas. CLERCK, *Icon. tab. 40. fig. 4.* (Fem. var.)

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le mâle est fauve de part & d'autre. La femelle est blanche, avec l'angle anal de chaque aile fauve & marqué de deux points noirs. Ces

points existent pareillement dans le mâle. Celle-ci comme celle-là ont plusieurs lignes communes, & tout le contour des ailes, d'un brun-noirâtre. On voit en outre, vers l'extrémité des secondes ailes, une série transverse de points noirs, oblongs, dont quelques-uns, surtout dans la femelle, bordés de bleuâtre. Le corps est fauve ou blanc, selon le sexe, avec des lignes obscures & longitudinales. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

De l'île de Java.

N. B. La figure de Clerck représente une femelle qui forme variété, en ce que les lignes brunes des ailes sont plus larges.

42. NYMPHALE Périandre.

NYMPHALIS Periander.

Nym. albis utrinque albis, strigis sex rufescentibus marginique postico fusco, albo strigoso.

Papilio N. Periander, alis caudatis, concoloribus, albis flavo fuscatis, apice fuscis albo strigosis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n. 74. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 67. n. 208.

Papilio Periander. DONOW. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah. 5. pl. 5. fig. 1.*

Elle est à peu près de la taille de l'*Hylas*. Les quatre ailes sont blanches de part & d'autre, avec six raies roussâtres, transversales, plus ou moins longues, & une bande terminale d'un brun-obscur.

Cette bande est entièrement divisée par trois ou quatre lignes blanches, flexueuses, dont l'antérieure précédée d'un rang de points noirs, lesquels sont ronds aux premières ailes, triangulaires & plus gros aux secondes. Le corps est blanc, avec des lignes brunes, longitudinales. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue fauve.

De l'île de Java.

N. B. Décrite sur des individus mâles.

43. NYMPHALE Coclès.

NYMPHALIS Cocles.

Nym. alis subcaudatis (bicaudatis), albo flavescenteque strigosis, fuscis mediâ albâ: posticis subius strigâ punctorum ocellatorum. FAB.

Papilio N. Cocles. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n. 53. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 65. n. 204.

Papilio Cocles. DONOW. *Of an Epitome of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah. 5. pl. 2. fig. 2.*

Elle a le port & la taille de l'*Hylas*. Ses ailes sont très-minces, rayées transversalement de blanc, de jaunâtre & de brun. Sur leur milieu, il y a une bande blanche, large, commune; & vers leur bord postérieur, une raie noire transversale.

En dessous, le fond des quatre ailes est blanchâtre, avec des lignes jaunâtres, transversales, & une ligne noire, marginale. Les ailes supérieures présentent en outre, vers l'extrémité de leur bord interne, un seul point noir oculaire. Les ailes inférieures ont une rangée transverse de six points blancs à iris jaunâtre & à prunelle blanche. La prunelle des cinq yeux antérieurs est oblongue, celle de l'œil postérieur arrondie. Les mêmes ailes ont deux queues courtes, dont l'extérieure aiguë; l'intérieure encore plus courte, ronde, offrant en dessus des lunules bleues, & en dessous une tache noire. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

De Siam.

N. B. Nous avons mieux aimé traduire Fabricius que de nous servir de la figure de Donovan, attendu qu'elle rend mal les couleurs & la queue de l'angle de l'anus.

F. Bord postérieur des premières ailes dilaté en angle vers son milieu. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique, assez longue, arrondie à son extrémité.

44. NYMPHALE Hippona.

NYMPHALIS Hippona.

Nym. alis supra nigris: anticis fulvo flavo que variis, posticis strigâ anali punctorum alborum.

Papilio N. Hippona, alis dentato-gaudatis, flavo nigroque variis: posticis punctis quatuor albis. FAB. Gen. Inf. Mant. p. 256. n. 280-81. — Spec. Inf. tom. 2. p. 54. n. 258.

Papilio H. Hippona. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 180. n. 559.

Papilio Hippona. DONOW. *Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cah. 5. pl. 16. fig. 4.*

Papilio Fabius. DRURY, Inf. tom. 5. pl. 16. fig. 1. 2.

Papilio Fabius. CRAM. Pap. pl. 90. fig. C. D.

Papilio Fabius. STOLL, Pap. Suppl. à CRAM. pl. 2. fig. 1. (PAP.) fig. 1. A. B. C. (chen. & chryf.)

Papilio Fabius. HERBST, Pap. tab. 67. fig. 5. 4.

Papilio Fabius. ESP. Pap. exot. tom. 1. tab. 54. fig. 3. 4.

Fabricius avoit d'abord rangé cette espèce parmi les *Nymphales*; mais, en dernier lieu, il en a fait un *Héliconien*, sans doute à cause des couleurs.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Les premières ailes ont le dessus noir, & avec deux larges bandes, dont l'antérieure fauve, arquée, allant de la base à l'angle interne; la postérieure jaune, sinuée, oblique, atteignant la côte & le

bord terminal. L'angle externe ou fometet offre en outre deux ou trois taches jaunes. Les secondes ailes ont le dessus noir, avec une bande fauve, parallèle au bord d'en haut, & quatre points blancs, linéaires, alignés sur le bord postérieur entre la queue & l'angle de l'anus.

Le dessous des quatre ailes est d'une teinte ferrugineuse, avec des bandes pâles & transverses sur les supérieures, avec des nuances violâtres sur les inférieures. Le corps est roussâtre en dessus, brun en dessous.

La chenille, selon Stoll, est d'un vert-obscur, avec une raie noire le long du dos, & des taches de cette couleur sur les côtés. Ses pattes sont d'un vert-pâle. Sa tête est noire, marquée de deux points jaunâtres, & munie de deux épines courtes & obtuses. Elle vit sur une plante appelée *poivrier*. Elle ne mange que la nuit. Durant le jour, elle reste cachée dans une espèce d'étui ou de fourreau qu'elle pratique en roulant une feuille.

La chrysalide est courte, épaisse, sans éminences angulaires, gristâtre, avec des mouchetures brunes. Elle s'attache, par la queue, à la tige de la plante sus-mentionnée.

Des Antilles, de la Guyane & du Brésil.

G. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Bord correspondant des secondes tronqué presque carrément vers l'angle de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique, obtuse ou arrondie à son extrémité.

a. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

45. NYMPHALE Clytemnestre.

NYMPHALIS Clytemnestra.

Nym. alis fusco-nigris : anticis utrinque fasciâ mediâ ochraceâ : omnibus subtus ad basin argenteo maculatis.

Papilio N. Clytemnestra, *alis angulatis, nigris, subtus albo maculatis : anticis utrinque fasciâ flavâ.* FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 93. n^o. 406. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 50. n^o. 491. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 123. n^o. 375.*

Papilio Clytemnestra. CRAM. *pl.* 157. *fig.* A. B.

Papilio Clytemnestra. CRAM. *pl.* 366. *fig.* A. B.

Papilio Clytemnestra. HERBST, *tab.* 59. *fig.* 1. 2. 3.

Cette nymphale a environ trois pouces & demi d'envergure. La dent qui précède l'angle anal de ses ailes inférieures est plus saillante que les autres, & dans la femelle le bout de la queue ressemble pour ainsi dire à un pied.

Le dessous des ailes est d'un noir-brun à reflet verdâtre, avec une bande d'un jaune d'ocre-pâle, large, sinuée, descendant du milieu de la côte à

l'angle interne des supérieures, lesquelles ont au fometet un ou plusieurs points du même jaune. Les secondes ailes offrent des points semblables, tantôt au fometet seulement, tantôt tout le long du bord postérieur.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, nuancé de gris-violâtre & de ferrugineux, avec des taches argentées, inégales, & éparpillées depuis la base jusqu'au milieu de la surface. Outre cela, les premières ailes ont une bande comme en dessus; mais ici, la partie antérieure est argentée, & le fometet a un ou deux points également argentés. Le corps est de la couleur du fond des ailes. Les antennes sont noires, avec la fomentité de la massue ferrugineuse.

De la Guyane & du Brésil.

46. NYMPHALE Décius.

NYMPHALIS Decius.

Nym. alis suprà fuscis, fuscâ communi albâ, mediâ : posticis ad angulum ani rufis, ocellis punctisque duobus violaceis.

Papilio N. Decius, *alis caudatis, fuscâ communi albâ : posticis apice rufis, ocellis punctisque duobus albis.* FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 10. n^o. 82. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 67. n^o. 210.*

Papilio Decius. CRAM. *Pap. pl.* 114. *fig.* A. B.

Papilio Decius. HERBST, *Pap. tab.* 56. *fig.* 1. 2.

Papilio Decius. DRURY, *Inf.* tom. 3. *pl.* 6. *fig.* 1. 2. (Var. ad mas?)

Elle est approchant de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, & traversé obliquement au milieu par une bande d'un blanc-violâtre, moins large aux supérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont le bord d'en bas fauve, à partir de l'angle anal jusqu'à la queue inclusivement, avec cinq points violâtres, dont les trois extérieurs bordés de noir, & s'alignant, ainsi que les deux autres, avec des taches jaunâtres qui descendent de la côte des premières ailes.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-ferrugineux, & présente à la base quelques lignes noires, transverses, courtes, bordées de bleuâtre; au milieu une bande blanche comme en dessus; à l'extrémité une multitude d'ondes noirâtres qui oblitèrent en partie la bande blanche fuscide. Les secondes ailes ont en outre le bord interne ondulé de noirâtre jusqu'auprès de son origine. Leur bord postérieur est entièrement ferrugineux, avec une ligne bleuâtre, flexueuse, derrière laquelle il y a une série de sept points bleus, dont les cinq extérieurs entourés de noir. Les deux surfaces du corps sont de la même couleur que celles des ailes.

De la Guinée.

N. B. La figure de Drury représente un individu qui diffère en dessus des autres, en ce que les taches jaunâtres manquent aux quatre ailes; en ce que le fauve du bout des inférieures monte jusqu'à la côte, & laisse à peine apercevoir la bande blanche. Cet individu, qu'on voit dans la collection du Muséum, est le mâle ou une variété du mâle.

47. NYMPHALE EROTA.

NYMPHALIS EROTA.

Nym. alis subcaudatis, fuscis, nigro undatis fasciâque communi mediâ albâ: posticis utrinque ocellis duobus. FAB.

Papilio N. Erola. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 76. n. 257.*

Papilio Erola. JON. *Fig. pict. 4. tab. 59. fig. 1.*

Le corps est grand, bruu. Les ailes sont d'un brun-noirâtre, avec des ondes plus foncées. Sur le milieu est une bande blanche, commune, large. La bande des ailes supérieures est ondulée de noirâtre; celle des inférieures peu prononcée. Ces dernières ont deux yeux & une petite queue.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre à la base, avec des lignes ferrugineuses, transversales; blanche à l'extrémité, avec des lignes également ferrugineuses. Les secondes ailes ont en outre deux yeux comme en dessus.

De l'Afrique.

(Traduction du texte de Fabricius.)

48. NYMPHALE VÉRANÈS.

NYMPHALIS VERANES.

Nym. alis suprà basi albis, immaculatis, apice ferrugineis sulvoque & fusco punctatis.

Papilio N. Veranes, alis caudatis, suprà fuscis, sulvo nigroque maculatis, basi albis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 14. n. 55. — Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n. 61. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 66. n. 206.*

Papilio Veranes. CRAM. *pl. 160. fig. D. E. (Mas.)*

Papilio Veranes. CRAM. *pl. 388. fig. A. B. (Fem.)*

Papilio Veranes. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 51. fig. 1. 2.*

Papilio Veranes. HERBST, *Pap. tab. 56. fig. 3. 4. 5.*

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes a la moitié antérieure d'un beau blanc, mais qui passe au jaunâtre vers la côte des supérieures; l'autre moitié ferrugineuse, avec deux rangées transversales de gros points fau-

ves & une rangée intermédiaire de points noirâtres sur les premières ailes, &, au contraire, deux rangées de points noirâtres & une rangée intermédiaire de points fauves sur les secondes.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-feuille-morte & présente vers la base quelques lignes brunes, transversales, ondulées, piquées de bleuâtre; sur le milieu une raie obscure, oblique & commune; vers l'extrémité, qui est légèrement glacée de violâtre, des points noirâtres, correspondant à ceux du dessus. On voit en outre, derrière la raie discoidale des ailes inférieures, trois taches oculaires, dont une contre la côte, & deux près de l'angle de l'anus. Le dessous du corps est blanc, avec la tête & les palpes jaunâtres. Les antennes sont ferrugineuses.

Prise dans les grands bois de la Casserie par M. de Lalande.

D'après Drury, elle se trouve aussi sur la côte de Guinée.

49. NYMPHALE LYCURGUE.

NYMPHALIS LYCURGUS.

Nym. alis suprà atro-cæruleis, limbo postico lunularum cærulescentium serie: posticis subtilis punctis marginalibus albis.

Papilio N. Lycurgus, alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus cæruleis posticisque punctis albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 67. n. 209.*

Papilio Lycurgus. JON. *Fig. pict. 5. tab. 69. fig. 1.*

Papilio Laodice. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 26. fig. 1. 2.*

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-noir, avec le bord postérieur obscur & longé par un rang de lunules d'un bleu-pâle.

Le dessous est d'un brun-violâtre, avec deux bandes communes d'un brun-foncé. Outre cela, les ailes inférieures ont parallèlement au bord terminal une suite de cinq ou six points blancs, lesquels se reproduisent en dessus dans l'un des sexes.

De Sierra-Leone.

50. NYMPHALE PORTIA.

NYMPHALIS PORTIA.

Nym. alis denticulatis, suprà fulvis, strigâ angulatâ limboque postico fuscis: subtis griseis, posticis ad caudam punctis nigris.

Papilio N. Portia, alis dentato-caudatis: subtis griseis, nigro irroratis. FAB. *Syst. ent. p. 507. n. 268. — Spec. Inf. tom. 2. p. 95. n. 415. — Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n. 498. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 78. n. 242.*

Papilio Astianax. CRAM. *Pap. pl.* 337. *fig.* A. B.

Papilio Astianax. HERBST, *Pap. tab.* 57. *fig.* 5. 6.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec une ligne tranverse, anguleuse, & le bord terminal, d'un brun-noirâtre. La ligne des premières ailes est précédée intérieurement d'un gros point noir, voisin du milieu de la côte. La ligne des secondes ailes descend à peine jusqu'au niveau du disque.

En dessous, la majeure partie des ailes de devant & la totalité de celles de derrière sont d'un gris-cendré, avec des atomes bruns. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont, entre l'angle de l'anus & la queue, un rang de deux à trois points noirs, bien distincts. Le corps est fauve en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont noires.

Des Antilles.

N. B. Le dessus du mâle jette un reflet rouge.

51. NYMPHALE Troglodyte.

NYMPHALIS Troglodyta.

Nym. alis dentato-caudatis, rufis, strigâ marginæ postico-fuscis. FAB.

Papilio N. Troglodyta. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 47. n^o. 464. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 77. n^o. 240.

D'après la description de Fabricius, ce lépidoptère ne se distingue du *Portia* que parce que le point noir du dessus des premières ailes est remplacé par une tache discoïdale de sa couleur; & parce que le dessous des secondes n'offre aucun point noir entre la queue & l'angle de l'anus.

De l'Amérique.

N. B. Est-ce bien une espèce distincte?

52. NYMPHALE Ryphea.

NYMPHALIS Ryphea.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis, violaceo micantibus, anticarum fuscis duabus, posticam maculâ subdiscoïdali, calthaceis.

Papilio Ryphea. CRAM. *pl.* 48. *fig.* G. H.

Son envergure est d'environ deux pouces & demi.

Le mâle a le dessus des premières ailes d'un brun-noirâtre à reflet violet vif, avec deux bandes fouchi-ponceau, se dirigeant obliquement de la côte au bord terminal qu'elles n'atteignent pas. La bande antérieure est très-large, & bnuée à son côté externe. La bande postérieure est étroite, & comprimée vers son extrémité inférieure qui est arrondie. Le dessus des secondes ailes est brun, avec le milieu glacé de violet-pourpre, & précédé

au dehors d'une tache fouchi qu'entoure du noirâtre; il y a en outre vers l'angle anal une rangée de trois à quatre petits points d'un blanc-bleuâtre.

Le dessus de la femelle ressemble à celui du mâle quant au dessus, mais le fond des ailes ne jette qu'un léger reflet violet; les deux bandes des supérieures & la tache des inférieures sont d'un fauve-jaunâtre, au lieu d'être fouchi-ponceau.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-ferrugineux, avec une multitude de petits traits grisâtres ou cendrés, lesquels forment sur les premières ailes une ligne plus claire allant du sommet au milieu du bord interne, & sur les secondes une bande sinuée & presque discoïdale, également plus claire. Ces dernières ailes offrent, vers le milieu de la côte, un gros point blanchâtre ou jaunâtre, & entre la queue & l'angle de l'anus, une suite de trois à quatre petits points noirs presque oculaires.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. On trouve, mais plus rarement, des individus qui n'ont point de queue; d'autres qui l'ont extrêmement courte, comme celui qu'a figuré Cramer.

53. NYMPHALE Néfée.

NYMPHALIS Nefea.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis: anticis violaceo micantibus, fuscis duabus calthaceis; posticis immaculatis.

Nymphalis Nefesa, alis integerrimis; posticis subpentagonis, unicaudatis; his & superis fuscis: anticis maculis duabus elongatis, fuscis æmulantibus, plæniceis, violaceo nitentibus: alis omnibus infra brunneis, argutissimè maxinè que strigatis; posticis fuscis transversâ dilutiore punctoque nigro originem caudæ versus. Recueil d'observations de zool. & d'anat. comp. par Alex. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, *vol.* 2. p. 76. *pl.* 53. *fig.* 5. 6.

Elle diffère de la précédente en ce que le dessus des secondes ailes est entièrement brun, sans taches & sans reflet; en ce que la bande plus claire, qui les traaverse en dessous au-delà du milieu, est droite; enfin, en ce que ces ailes n'ont qu'un seul point oculaire, lequel est placé vers l'origine de la queue.

Du Pérou.

Nota. Ne seroit-ce pas plutôt une variété de climat qu'une espèce distincte?

f. Bord interne des premières ailes avec une échancrure plus ou moins profonde, au moins dans les mâles.

54. NYMPHALE Hélie.

NYMPHALIS Helie.

Nym. alis dentatis, supra corticinis: anticis apice fusco, maculis ochraceis fasciam transversam angulatamque efformantibus.

Papilio Helie. CLERCK, *Icon. tab. 54. fig. 5.* (Var.)

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-tanné, avec l'extrémité noirâtre, & offrant aux supérieures, où cette couleur occupe presque le tiers de la surface, cinq taches d'un jaune d'ocre-pâle, disposées en une bande traversée & flexueuse qui atteint les deux bords. Les ailes inférieures ont, entre l'angle de l'anus & la queue, deux points noirs, surmontés chacun d'un point blanc plus petit.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris finement entrecoupé de brun-obscur, avec une bande commune & discoïdale d'atomes argentés, plus vifs dans certains individus que dans d'autres. On voit en outre aux ailes inférieures deux points noirs correspondant à ceux de dessus. Le corps est de part & d'autre du même ton que les ailes, & celles-ci ont assez souvent les échancrures du bord postérieur blanches.

L'individu figuré par Clerck diffère de ceux que nous décrivons, en ce que la bande jaune du dessus des premières ailes est continue, & qu'elle ne descend pas au-delà du niveau du disque.

De l'Amérique.

55. NYMPHALE Halice.

NYMPHALIS Halice.

Nym. alis integerrimis, supra rufis: anticis dimidio apicalis caeruleo-nigro, fasciâ niveâ, angulatâ, in medio interruptâ.

Nous n'avons vu que des femelles de ce lépidoptère. Elles ont beaucoup de rapport avec celles de l'espèce précédente, mais leurs ailes sont entières, & le bord interne des supérieures n'a point d'échancrure. Outre cela, la bande anguleuse du dessus de ces mêmes ailes est très-blanche, & interrompue seulement vers son milieu; les secondes ailes offrent plus de points noirs entre l'angle anal & la queue.

Le dessous des quatre ailes est verdâtre, avec une bande blanchâtre vers le milieu.

Du Brésil.

56. NYMPHALE Pléione.

NYMPHALIS Pleione.

Nym. alis denticulatis, supra fulvis, antica-nim apice nigro: subtus ferrugineo reticulatis, frigâ mediâ fuscâ.

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-foncé, avec le sommet des supérieures d'un noir-brun & marqué de deux taches fauves, plus ou

moins apparentes. Le bord postérieur des secondes ailes est longé par une ligne noirâtre, flexueuse, & double vis-à-vis de l'angle externe.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre, maillé de ferrugineux, & traversé au milieu par une raie brune, le long du côté interne de laquelle il y a une teinte légèrement nacrée, teinte que l'on voit aussi à l'origine du bord antérieur des premières ailes. Le corps est fauve en dessus, jaunâtre en dessous, avec quatre points blancs sur la tête. Les antennes sont ferrugineuses.

Nous soupçonnons qu'elle habite les Antilles.

Nota. La queue des secondes ailes est très-courte, du moins dans les individus que nous avons vus.

57. NYMPHALE Eribote.

NYMPHALIS Eribotes.

Nym. alis integerrimis, supra fulvis aut ferrugineis, basi violaceo micantibus: posticis utrinque punctis marginalibus subocellatis.

Papilio N. Eribotes, alis subcaudatis, fulvis, basi caeruleo-nigris: subtus griseis. FAB. *Syfl. Ent. p. 484. n. 185.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 29. n. 308.* — *Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 75. n. 229.*

Papilio Eribotes. DONOW. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 9. pl. 1. fig. 5.*

Papilio Leonida. CRAM. *pl. 358. fig. C. D.*

STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 6. fig. 2. A.* (La chenille.) *fig. 2. B.* (La chrysalide.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est tantôt ferrugineux, tantôt d'un fauve-brun, avec un reflet violet à la base. Le milieu de la côte & le sommet des ailes supérieures sont en outre plus ou moins noirs, selon la couleur du fond, & les inférieures ont, vers l'angle anal, un rang de quatre à cinq points noirs, surmontés chacun d'un point blanc très-petit.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, avec des atomes gris ou violâtes: aux points noirs des inférieures correspondent ici des points semblables, & les supérieures ont le long du bord terminal une série de points blancs, plus ou moins distincts. Les antennes sont noires, annelées de blanchâtre, avec la sommité ferrugineuse.

La chenille, suivant Stoll, est noire, avec de petits poils & une multitude de points blancs. Elle vit sur une espèce de *prunier sauvage*.

La chrysalide est courte, ramassée, sans éminences angulaires, grise, avec des mouchettes rougeâtres. On la trouve, suspendue par la queue, sur la tige de l'arbrisseau dont les feuilles ont servi de nourriture à la chenille.

De la Guyane.

58. NYMPHALE Polycarme.

NYMPHALIS Polycarmes.

Nym. alis integris, supra nigris, subtus brunneis, immaculatis. FAB.

Papilio N. Polycarmes. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n.º 472.*

Papilio Odilla. GRAM. *pl. 529. fig. C. D.*

Papilio Odilia. STOLL, *Suppl. à GRAM. pl. 6. fig. 4 & 4. D.* (La chenille & la chrysalide.)

Nous ne connoissons cette nymphe que par l'individu qu'a figuré Cramer, & quoiqu'il soit sans queue, nous la plaçons ici à cause de la grande analogie avec l'espèce suivante.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes supérieures sont dentelées, à peine concaves, & paroissent avoir le bord interne échancré. Les inférieures sont entières. Le dessus des unes & des autres est d'un noir-violet, sans taches. Leur dessous est ferrugineux, avec des haclures bleuâtres le long du bord interne & du bord terminal des inférieures.

La chenille est d'un violet-purpurin, avec deux lignes latérales & en même temps longitudinales, dont la supérieure blanche & maculaire, l'inférieure jaunâtre & continue. Sur les second, cinquième & onzième anneaux s'élèvent deux épines noires, assez longues, légèrement ciliées, courbes en arrière. La tête est noire, avec deux lunules d'un blanc-luisant. Cette chenille vit sur le gayavier.

La chrysalide est ovoïde, courte, ramassée, avec des taches dorées.

De Cayenne.

Nota. Stoll donne la chenille de la danaïde *Eresime* pour celle de la nymphe *Odilla*, & réciproquement la chenille de l'*Odilla* pour celle de l'*Eresime*.

59. NYMPHALE Laertia.

NYMPHALIS Laertia.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis, basi violaceo-nitide-cæruleis : subtus anticis punctis marginibus albis.

Papilio N. Laertes, alis caudatis, fuscis, basi cæruleis : posticis supra punctis quinque albis, subtus quatuor ocellaribus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 29. n.º 310. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 73. n.º 226.*

Papilio Laertes. GRAM. *pl. 73. fig. C. D.* (La femelle.)

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec environ la moitié antérieure glacée de bleu-violet. On voit en outre, vers l'extrémité des supérieures, des taches du même bleu, for-

mant dans la femelle un groupe de trois, & dans le mâle un groupe semblable, puis un groupe de deux. Les ailes inférieures ont la queue faupoudrée de gris, & il y a vers leur angle anal un rang de cinq points noirs, surmontés chacun d'un point blanc plus petit.

Le dessous des ailes est ferrugineux dans le mâle, cendré dans la femelle, avec des atomes gris vers la base, une bande violâtre & luisante entre le milieu & le bord postérieur. Ce bord offre aux premières ailes une fcie transverse de six à sept petits points blancs, & aux secondes, une suite de cinq points noirs, dont les trois intermédiaires environnés de verdâtre en dehors. La bande violâtre susdite est bordée intérieurement par une raie plus intense que le fond de l'aile, & représentant en quelque sorte un V oblique. A ces caractères il faut ajouter une tache blanche ou jaunâtre, placée au milieu de la côte des ailes inférieures.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langsdorff, un individu qui, par le dessus des ailes, sembleroit appartenir à l'espèce suivante, mais qui, en raison de leur dessous & de la forme du bord terminal des supérieures, doit être rapporté ici.

60. NYMPHALE Morvus.

NYMPHALIS Morvus.

Nym. alis integerrimis, supra nigris, basi viridinitide-cæruleis : subtus anticis margine postico immaculato.

Papilio N. Morvus? alis caudatis, supra fuscis, basi cæruleis : subtus griseo-virescentibus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 61. n.º 270. — Man. Inf. tom. 2. p. 29. n.º 311. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 73. n.º 277.*

Papilio D. F. Morvus? alis integris, subcaudatis, supra fuscis, cæruleo nitentibus : subtus griseis. FAB. *Syst. Ent. p. 484. n.º 184.*

Papilio Arachne? GRAM. pl. 48. fig. A. B.

Papilio Bajlica? GRAM. pl. 529. fig. C. D.

Nymphalis l'phis, *alis integerrimis : superis subfalcatis, margine interno profunde emarginato ; inferis unicaudatis : utrisque supra nigris basi maculisque nonnullis cæruleis : infra brunneis, nitidis, maculis griseis ; superis margine postico sbrigue ab angulo apicali marginis postici mediani versus rectâ currente pariter colonitis ; inferarum margine postico maculis duabus parvis subocellaribus.* Recueil d'oberv. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, *vol. 2. p. 80. pl. 56. fig. 1. 2.*

Nous n'avons vu que des mâles de cette espèce. Ils ont à peu près la même taille que ceux de l'espèce précédente, mais le bord terminal de

leurs ailes supérieures est concave, au lieu d'être presque droit comme dans le *Lacerta*.

Le dessus de toutes les ailes est noir, avec environ la moitié antérieure glacée de bleu-verdâtre. Il y a en outre, vers l'extrémité des supérieures, quatre taches du même bleu ou d'un blanc-bleuâtre, séparées les unes des autres & formant une ligne courbe & transverse. Les ailes inférieures ont, parallèlement à leur bord de derrière, de deux à cinq points blancs, appuyés parfois sur un cordon de taches blanches.

Le dessous des ailes est d'un brun-cendré-luisant, nuancé de gris-violetâtre, avec une raie blanchâtre allant du sommet des supérieures au milieu de leur bord interne, & un croissant entier ou interrompu, également blanchâtre, au milieu de la côte des inférieures. Ces dernières ont, en correspondance des points du dessus, des points noirs, dont deux ou trois, selon le nombre, environnés de verdâtre en dehors. Les premières ailes n'ont pas de points sur le bord postérieur, & ce bord est teinté de verdâtre jusqu'à la raie blanchâtre dont nous avons parlé.

Le *Morus* de Fabricius, ou *Arachne* de Cramer, ne paroît différer du nôtre que parce que le dessus de ses premières ailes n'offre qu'une seule tache bleue à l'extrémité.

Quant au *Basilica* de Cramer, c'est, au tant que nous pouvons le soupçonner, le même que notre *Morus*, mais il n'a point de queue.

Du Brésil.

61. NYMPHALE Oclavius.

NYMPHALIS Oclavius.

Nym. alis caudatis, nigris, fuscis abbreviatis viridi: subtus griseis, strigâ fuscâ. FAB.

Papilio N. Oclavius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 75. n.º. 228.*

Papilio Oclavius. JON. *Fig. pict. 5. tab. 101. fig. 1.*

Papilio Oclavius. DONOW. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cub. 2. pl. 4. fig. 2.*

Ne seroit-ce pas la femelle ou une variété du *Morus*?

Voici ce qu'en dit Fabricius: le dessus des ailes est noir, avec une bande verte, transverse, discoidale, courbe en arrière. La bande des ailes inférieures est très-large; celle des supérieures est séparée de la côte par une tache de sa couleur.

Le dessous des quatre ailes est gris, avec une ou deux lignes brunes, transversales.

De l'Amérique équinoxiale.

II. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave. Angle anal des secondes prolongé & replié en dessous.

7. Bord interne des premières ailes sans échancrure.

62. NYMPHALE Orion.

NYMPHALIS Orion.

Nym. alis integris, supra fusco-nigris: anticis fuscis longitudinalibus; posticis basi, fulvis; omnium margine postico utrinque albicantis.

Papilio F. Orion, alis repandis: anticis falcatis, rufis, apice nigris maculâ marginali albâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 55. n.º. 170.*

Papilio E. A. Odus, alis falcatis, subdentatis, fuscis: anticis disco flavo. FAB. *Sylt. Ent. p. 457. n.º. 60. — Spec. Inf. tom. 2. p. 25. n.º. 95. — Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n.º. 11.*

Papilio Odus. SULZ. *Inf. edit. REM. tab. 13. fig. 2.*

Papilio Odus. HERBST, *Pap. tab. 55. fig. 1. 2.*

Papilio Danae. GRAM. *pl. 84. fig. A. B.*

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un noir-brun, avec une bande fauve, longitudinale, qui couvre environ tout le tiers antérieur de la surface, puis va, en se rétrécissant, aboutir à peu de distance du bord postérieur. Vers l'extrémité du bord antérieur des mêmes ailes, il y a une tache blanche, ovale, disposée longitudinalement. Le dessus des secondes ailes est d'un noir-brun, avec la base d'un fauve un peu obscur.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun nuancé de grisâtre, avec deux bandes transverses plus foncées près de la base: viennent ensuite deux lignes noires, également transverses, qui se réunissent vers le bord interne des ailes inférieures. A la tache blanche de la côte des premières ailes, correspond ici une tache semblable. Outre cela, le bord terminal des quatre ailes est blanchâtre de part & d'autre. Le corps a le dessus roussâtre, avec le bout de l'abdomen noirâtre. Les antennes sont ferrugineuses.

De la Guyane & du Brésil.™

65. NYMPHALE? Cocytus.

NYMPHALIS Cocytus.

Nym. alis falcatis, supra nigris, margine postico cinereo. FAB.

Papilio F. Cocytus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 29. n.º. 516. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 55. n.º. 171.*

Elle est de moyenne taille, noire en dessus, avec le bord postérieur cendré. Les premières ailes, qui sont concaves, ont en outre, vers le bout de la côte, un large point de cette dernière couleur.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-pâle, avec

avec une ligne obscure & tranfverte à l'extrémité des fupérieures.

Du royaume de Siam.

(Traduction de Fabricius.)

64. NYMPHALE ? Odin.

NYMPHALIS Odin.

Nym. alis integerrimis, uniangulatis, obfcuris : pofcicis utrinquè pari punctorum atrovam fubocclatorum. FAB.

Papilio F. Odin. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 56. n^o. 175.*

Le corps eft petit, brun. Les ailes fupérieures font obscures vers la bafe, avec une petite ligne tranfverte plus obscure fur le milieu; elles font pâles à l'extrémité. Leur deffous reflemble au deffus.

Les ailes inférieures font unianguleufes, ou plutôt échanrées au bas du bord interne. Leur deffus eft obfcure, avec des lignes cendrées, tranfverfales. Leur deffous eft pareillement obfcure, avec une petite ligne plus foncée à la bafe & des lignes pâles à l'extrémité. Indépendamment de cela, elles ont de part & d'autre un couple de points noirs prefqu'occellés, & l'on voit un autre point plus petit vers la côte.

De la Chine.

(Traduction de Fabricius.)

65. NYMPHALE Mycerine.

NYMPHALIS Mycerina.

Nym. alis fuprà violaceo-nigris, fufciâ communi cyaneâ : fubtus anticis punctis bafeos duobus ocellatis.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un noir-violet, avec une bande commune, une tache longitudinale à l'origine de la côte des fupérieures, & un rang de points fur le bord terminal des inférieures, d'un bleu-ardoifé-pâle. La bande fufdite eft courbe & maculaire aux premières ailes; elle eft prefque continue aux fécondes.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun plus ou moins foncé & nuancé de gris-luifant, avec deux lignes tranfverfes, flexueufes, blanches, & bordées de noirâtre fur un de leurs côtés. Outre cela, on voit à la bafe des premières ailes deux points noirs, cerclés de blanc, & fur le bord poférieur des fécondes, une fuite de points blancs peu diftincts. Le corps eft noirâtre en deffus, grisâtre en deffous, avec quatre points blancs fur la tête. Les antennes font ferrugineufes. Les palpes ont le deffus obfcure, le deffous blanc.

Elle habite....

N. B. Nous avons vu un individu dont le deffus

Hift. Nat. Inf. Tom. LX.

des premières ailes eft fans tache bleue à l'origine de la côte.

66. NYMPHALE Pofthume.

NYMPHALIS Pofthumus.

Nym. alis fulcatis, integerrimis, fufcis, difco cœruleo : pofcicis fubtus grifeis, immaculatis. FAB.

Papilio N. Pofthumus. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 149. n^o. 438.*

Papilio Saturnus. JOX. *Fig. piét. 5. tab. 77. fig. 2.*

Elle eft de moyenne taille, & elle a les ailes concaves. Le deffus des quatre eft d'un brun-noirâtre, avec le difque largement bleu. Le deffous des fupérieures eft brun à la bafe, avec des taches blanches; gris à l'extrémité. Le deffous des inférieures eft gris, fans aucune tache.

Elle habite....

(Décrite d'après Fabricius.)

67. NYMPHALE Cymodoce.

NYMPHALIS Cymodoce.

Nym. alis fuprà fufcis, bafi cœruleo micantibus : pofcicis utrinquè ocello anali unico.

Papilio N. Cymodoce, alis fubcaudatis, fufcis, bafi cœruleo nitidis : pofcicis ocello utrinquè unico. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 29. n^o. 315. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 74. n^o. 251.*

Papilio Cymodoce. CRAM. *Pap. pl. 99. fig. G. H.*

Papilio Cymodoce. HERBST, *Pap. tab. 152. fig. 1. 2.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcure, avec un reflet d'un bleu-violet à la bafe, & une ligne noire le long du bord terminal. Il y a en outre, vis-à-vis du fommet des fupérieures, une petite ligne tranfverte, puis un petit point, blanchâtre; & vers l'angle anal des inférieures, un oeil noir à prunelle blanche & à iris ferrugineux.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun un peu plus clair que le deffus, avec l'extrémité légèrement glacée de violet, & divifée tranfverfalement par deux lignes noires, dont l'intérieure oblique & bordée de bleu du côté de la bafe; l'extérieure courbe, ondulée. Entre ces lignes, les fécondes ailes ont quatre à cinq points noirs, s'alignant avec un oeil femblable à celui de la furface oppofée; & les premières ailes offrent, en face du fommet, une tache blanchâtre.

Fabricius la dit de Surinam, & Cramer des Indes orientales.

68. NYMPHALE Egefte.

NYMPHALIS Egefta.

Nym. alis integris, supra fulvis, singularum margine postico posticarumque disco fuscis: subtus carneo-fuscescentibus, strigâ communi ferrugineâ.

Papilio Egesta. CRAM. pl. 46. fig. B. C.

Papilio Egestus. HERBST, *Pap.* tab. 151. n^o. 5. 6.

Elle a environ trois ponce: & demi d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec le bord terminal des quatre & le milieu des inférieures d'un brun-obscur. Ces dernières ont parfois l'espace brun du milieu divisé par une bandelette jaune, transversale, & il y a toujours avant leur bord postérieur une ligne de points noirs. Les premières ailes ont aussi des points semblables, mais ils n'existent pas dans tous les individus.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-violâtre-luisant, avec quelques hiéroglyphes noirâtres vers la base; une ligne ferrugineuse, oblique & un peu ondulée, sur le milieu. On aperçoit en outre l'empreinte des points noirs de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes en dessus & en dessous. Les antennes sont noires.

De la Guyane.

69. NYMPHALE Bifaltide.

NYMPHALIS Bifaltide.

Nym. alis supra fulvis, anticarum apice nigro alboque punctato: subtus anticis ocellis duobus obsoletis, posticis tribus.

Papilio N. Bifaltide, alis subcaudatis, fulvis, apice nigris: subtus punctis ocellaribus, anticis duobus, posticis tribus. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 61. n^o. 275. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 29. n^o. 314. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 74. n^o. 252.

Papilio Bifaltide. CRAM. pl. 102. fig. C. D.

Papilio Polibete. CRAM. pl. 234. fig. D. E.

Papilio Polibete. CRAM. pl. 255. fig. C. D.

Papilio Bifaltides. HERBST, tab. 150. fig. 5. 6.

Papilio Polibetes. HERBST, tab. 149. fig. 5-8.

SEBA, *Mus.* 4. tab. 55. fig. 15. 16.

Elle a de deux ponce & demi à trois ponce d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un fauve plus ou moins jaunâtre, suivant le sexe, avec l'extrémité noire, & offrant vis-à-vis du sommet, où cette couleur s'étend davantage, une tache oblique, fauve ou jaune, derrière laquelle il y a un arc transversal de trois à cinq points, dont l'inférieur jaunâtre, les autres blancs. Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-brun, avec une double ligne noire, terminale, que précèdent, du côté du corps, trois points noirs, inégalement éloignés l'un de l'autre.

Le dessous des quatre ailes est d'un ferrugineux nuancé de verdâtre ou de violâtre, avec une ligne

noire, commune, difcoïdale, oblique, suivie en dehors de trois yeux aux ailes inférieures & de deux aux supérieures. Ces yeux ont la prunelle partie noire, partie bleuâtre, & l'iris noirâtre. Indépendamment de cela, les premières ailes ont en face du sommet des points correspondans à ceux de dessus. Les deux surfaces du corps sont de la couleur de celles des ailes. Les antennes sont brunes, avec la sommité fauve ou d'un jaune-paille. Les palpes ont le dessus ferrugineux, le dessous blanc.

Cette espèce varie, 1^o. en ce que la double ligne noire qui termine le dessus des secondes ailes est remplacée par une large bande de cette couleur; 2^o. en ce que le dessous de certains mâles offre à la base des quatre ailes quelques taches d'un blanc-argenté.

Elle se trouve à Surinam.

N. B. Cramer a fait deux espèces: l'une sous le nom de *Bifaltide*, & l'autre sous celui de *Polibète*. La première, selon lui, est de Surinam, la seconde d'Amboine. Il faut qu'il y ait erreur à ce sujet, car en les comparant bien, on ne trouve entr'elles aucune différence caractéristique.

♂. Bord interne des premières ailes avec une échancrure, du moins dans les mâles.

70. NYMPHALE Itys.

NYMPHALIS Itys.

Nym. alis supra fulvis: anticis apice nigro, fasciâ albidâ, angulatâ: posticis subtus basi carulefcentibus.

Papilio N. Itys, alis subcaudatis, fulvis, apice flavo nigris: subtus basi variegatis, posticis basi caruleis. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 60. n^o. 268. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 29. n^o. 309. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 75. n^o. 250.

Papilio Itys. CRAM. pl. 119. fig. F. G.

Papilio Itys. HERBST, *Pap.* tab. 151. fig. 1. 2.

Elle a près de trois ponce d'envergure. Le dessus des premières ailes a environ la moitié antérieure d'un fauve-rosé & sans taches; l'autre moitié noire, avec une bande blanchâtre ou jaunâtre, transversale, anguleuse, très-large, & coupée dans le sens de sa longueur par une ligne ferrugineuse en zig-zag. Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-tanné, avec l'extrémité rembrunie.

Le dessous des ailes supérieures diffère du dessus en ce que tout le fond & la bande blanchâtre sont finement mouchetés de noirâtre; en ce que la côte est pointillée de bleu, & le sommet marqué de deux petits points blancs. Le dessous des ailes inférieures est d'un bleu-pâle depuis la base jusqu'au milieu, avec des atomes cendrés; ensuite d'un brun-obscur jusqu'au bout, avec deux bandes

blanchâtres, dont l'intérieure oblique, sinuée, & contiguë à la partie bleue, l'extérieure chargée d'un rang de points noirs, oculaires.

De Surinam.

71. NYMPHALE Ifidora.

NYMPHALIS Ifidora.

Nym. alis supra fulvis, anticarum maculâ costali apiceque fuscis: posticis subtus punctis marginalibus ocellatis.

Papilio N. Ifidora, alis falcato-caudatis, fulvis: anticis punctis duobus medius pallidis apiceque nigris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 78. n°. 244. (La femelle.)

Papilio Ifidora. CRAM. Pap. pl. 255. fig. A. B. E. F.

Papilio Ifidora. HERBST, Pap. tab. 150. fig. 1. 2.

Papilio Ifidora. JON. Fig. pict. 5. tab. 7. fig. 1.

Papilio Ifidora. DONOV. Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Insects of India, cah. 9. pl. 1. fig. 4.

Quoique Fabricius rapporte son *Ifidora* à celui de Cramer, nous avons d'abord eu des doutes sur l'identité, à cause du mot *magnus* dont il se sert pour désigner la taille; mais la description qu'il en donne les a fait disparaître.

Son envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un fauve-brun dans le mâle, d'un fauve-clair ou jaunâtre dans la femelle, avec le sommet ainsi que le bord terminal des premières noirâtres, & une ligne brune, transverse & flexueuse, sur les secondes. Les ailes de devant ont en outre, près du milieu de la côte, une tache noire luulcée, au dessous de laquelle il y a, mais seulement dans les femelles, deux points diaphanes & luisans comme du talc.

Le dessous du mâle est d'un brun-ferrugineux, le dessous de la femelle d'un brun-jaunâtre, avec des nuances d'un gris-luisant. Indépendamment de cela, les secondes ailes des deux sexes offrent, sur le milieu, une ligne obscure allant obliquement du bord antérieur à l'angle anal, & le long de leur bord postérieur, une rangée de six à sept points noirs, bordés de blanchâtre. Ces points paroissent quelquefois en dessus.

De la Guyane & du Brésil.

72. NYMPHALE Marthesius.

NYMPHALIS Marthesius.

Nym. alis integerrimis, supra nigris, strigâ posticâ punctorum alborum: anticis basi late fulvis.

Papilio N. Marthesius, alis integris, atris: anticis disco fulvo, posticis strigâ punctorum al-

borum. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 153. n°. 469.

Papilio Marthesius. HERBST, Pap. tab. 152. fig. 1. 2.

Papilio Marthesia. CRAM. pl. 191. fig. A. B.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une rangée postérieure de points blancs, oblongs sur les secondes ailes, arrondis sur les premières. Celles-ci ont à la base un large espace fauve, & dont la couleur s'affoiblit en arrière. Leur dessous est d'un gris-jaunâtre avec le sommet d'un brun-obscur & ponctué de bleuâtre. Le dessous des secondes ailes est nuancé de brun & de verdâtre.

De la Guyane.

73. NYMPHALE Roger.

NYMPHALIS Rogerii.

Nym. alis integerrimis, supra nigris, anticarum fuscis duabus, posticarum maculâ mediâ, sanguineis: subtus griseis ferrugineoque variis.

Nous avons dédié cette nymphe à M. Théodore Roger, amateur distingué de la ville de Bordeaux.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, avec deux bandes obliques d'un rouge-vermillon vif, & dont l'antérieure plus large: le bord du sommet est en outre ferrugineux & précédé d'un double point blanc. Le dessous des secondes ailes est de la couleur de celui des premières, avec une tache rouge vers le milieu de la surface, des points & des atomes bleuâtres sur la moitié postérieure du bord terminal.

Le dessous des quatre ailes est nuancé de gris-violâtre & de ferrugineux, & il y a sur le milieu des inférieures une ligne oblique d'atomes bleuâtres. Le corps est noir, avec la tête, le dessus des palpes & les antennes, ferrugineux.

La femelle ressemble au mâle.

De l'île de Cuba.

I. Bord postérieur des premières ailes droit ou à peine convexe. Angle anal des secondes prolongé & obtus.

74. NYMPHALE Dirce.

NYMPHALIS Dirce.

Nym. alis fuscis: anticis utrinquâ fuscâ flavâ: subtus omnibus albidis striatis.

Papilio N. Dirce, alis angulatis, fuscis: primoribus fuscâ flavâ: subtus nigro undulatis. LINN. Syst. Nat. 2. edit. 12. p. 778. n°. 177. — *Muf. Lud. Ulr. p. 287. n°. 105.*

β. *Papilio Butes*, *alis subcaudatis*, *fufcis*: *primoribus fufciâ flavefcenti-albidâ*: *omnibus subtus albidis*, *nigro firiatis*. LINN. *Syfl. Nat. edit. 10. p. 483.*

Papilio Butes. CLERCK, *Icon. tab. 56. fig. 5.*

Papilio N. Dirce, *alis angulatis*, *fufcis*, *fufciâ anticarum flavefcente*: *subtus nigro undulatis*. FAB. *Syfl. Ent. p. 506. n. 264.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 93. n. 407.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n. 492.* — *Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 123. n. 576.*

Papilio Dirce. CRAM. *pl. 212. fig. C. D.*

STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 2. fig. 3. A. 3. B. fig. 4. A. 4. B.* (La chen. & la chryl.)

Papilio Dirce. HERBST, *tab. 155. fig. 1. 2.*

Papilio Dirce. SULZ. *Inf. tab. 17. fig. 11. 12.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 10. fig. 1. 2. 7. 8.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 15. fig. 9. 10.*

Elle a de deux à trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bande d'un jaune-soufre, large & oblique, sur le milieu des supérieures, & deux points bleus à l'extrémité du prolongement anal des inférieures.

Le dessous diffère du dessus en ce que l'on y voit une multitude de lignes blanchâtres ou jaunâtres qui s'entre-croisent; en ce que la bande des ailes supérieures est beaucoup plus pâle; en ce que les inférieures ont vers l'angle de l'anus un petit espace fauve, & vers l'extrémité de la côte, une ligne transverse de quelques points bleus oculaires, plus distincts dans la femelle que dans le mâle.

La chenille, suivant Stoll, est noire, souvent annelée de jaune, avec un grand nombre d'épines fauves & branchues, dont les deux antérieures plus grandes & parfois blanches. L'anus est bifide. Elle vit sur la casse.

La chrysalide est allongée, épineuse, brune, ponctué de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

75. NYMPHALE Phorcys.

NYMPHALIS Phorcys.

Nym. alis dentatis, *fufcis*, *suprà immaculatis*: *subtus ftrigis aliquot nigris*, *posticis punctis duobus griseis*.

Papilio N. Phorcys, *alis dentato-subcaudatis*, *fufcis*: *subtus obscuris ftrigosis*, *posticis punctis duobus cinereis*. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 80. n. 248.*

Papilio Phorcys. JON. *Fig. piâ. 3. tab. 78. fig. 1.*

Papilio Phorcys. DONOW. *Of an Eptome of the Nat. Hist. of Insects of India, cah. 9. pl. 1. fig. 2.*

Si la figure de Donovan est exacte, ce lépidoptère doit être mis parmi les *Nymphales*, attendu que ses secondes ailes ont la cellule du disque ouverte pollérieurement.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un brun-obscur de part & d'autre. Leur dessus est sans taches. Leur dessous a quelques lignes noires, transverses, ondulées, indépendamment desquelles les secondes ailes ont deux points gris, bien distincts, & rapprochés de l'angle anal. Cet angle est à peine prolongé. Le corps est gros & de la couleur des ailes.

Des Indes.

K. Bord terminal des ailes supérieures droit ou à peine concave. Ailes inférieures allongées dans le sens de la longueur du corps.

76. NYMPHALE Mésentéria.

NYMPHALIS Mesenteria.

Nym. alis denticulatis, *fufcis*: *anticis suprà fufciâ fulvâ*, *transversâ, bifidâ*; *subtus basi flavefcente*, *punctis nitido-cærulefcentibus*.

Papilio N. Mesenteria, *alis dentatis*, *fufcis*: *anticis suprà fufciâ fulvâ*; *subtus maculis centralibus cæruleis*. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 105. n. 462.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 57. n. 564.* — *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 141. n. 455.*

Papilio Mesentina. CRAM. *pl. 162. fig. B. C.*

Papilio Mesenteria. HERBST, *Pap. tab. 147. fig. 1. 2.*

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-uoirâtre, avec des lignes transverses plus foncées. Indépendamment de cela, les supérieures ont, en tirant vers l'extrémité, une bande fauve, transverse, large, bifide près de la côte, un peu rétrécie vers le bord opposé.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre à la base, avec cinq ou six points blenâtres, luisans & cercelés de noir, sur les supérieures; avec trois lignes noires, transverses, sur les inférieures. Ces dernières sont ensuite brunes jusqu'au bout, avec une multitude de lignes gristâtes, longitudinales, que coupent transversalement trois raies obscures. Les premières ailes offrent une bande correspondante à celle du dessus, mais elle est ici d'une teinte incarnate, & précédée en dehors d'un double rang de taches gristâtes que fait ressortir la couleur brune du bord terminal.

De Surinam.

77. NYMPHALE Cocala.

NYMPHALIS Cocala.

Nym. alis denticulatis, *suprà fufcis*, *fufciâ*

transversâ, mediâ; anticarum fulvâ, bifidâ; posticarum albâ.

Papilio Cocala. CRAM. pl. 242. fig. F. G.

Papilio Cocala. HERBST, tab. 147. fig. 5. 6.

Fabricius la rapporte à la nymphale *Cythêrea*, mais elle paroît former une espèce distincte.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec le milieu des supérieures entièrement traversé par une bande orangée, & celui des inférieures par une bande blanche. La bande des ailes supérieures est plus large, bifide à son origine, sinuée sur le côté externe, droite ou presque droite sur le côté opposé. La bande des ailes inférieures est terminée en pointe aiguë à l'angle anal, lequel est sans tache dans le mâle, & marqué d'une petite tache orangée dans la femelle.

Le dessous des deux sexes est ferrugineux, avec une bande blanche, allant du milieu de la côte des premières ailes à l'angle interne des secondes. Les unes & les autres ont à la base trois lignes obliques, & le long du bord postérieur deux rangs de lunules bleuâtres, luisantes. On aperçoit en outre l'impression de la bande fauve du dessus des ailes de devant. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont noires.

De la Guyane & du Brésil.

78. NYMPHALE Phliassa.

NYMPHALIS Phliassa.

Nym. alis dentatis, suprâ fuscis, fuscâ albâ, mediâ; anticarum abbreviatâ, fasciæ fulvæ & intus utrimarginatæ innatâ; posticarum ad angulum ani mucronatâ.

Elle est un peu plus grande que la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, discoidale, terminée en pointe aiguë à l'angle anal des inférieures par un point fauve; se perdant, vers le bord interne des supérieures, dans une bande orangée, transverse & plus large, dont le côté externe est sinueux, le côté interne profondément échancré vers son origine.

Le dessous des quatre ailes est comme dans *Iphicla* (voyez n. 80); mais la bande blanche est moins vive, & elle se prolonge jusqu'à la côte des ailes supérieures, au lieu de finir en pointe arrondie vers leur milieu.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu une femelle ayant la bande fauve du dessus des premières ailes bifide à sa naissance; ou, si l'on veut, précédée extérieurement d'une ligne transverse de trois points de sa couleur.

79. NYMPHALE Cythêrea.

NYMPHALIS Cythêrea.

Nym. alis denticulatâ, suprâ fuscis, fuscâ albâ, mediâ, apicibus mucronatâ; anticarum abbreviatâ, fasciæ fulvæ & intus integræ innatâ.

Papilio N. Cythêrea, alis crenatis, flavis, fuscâ communî argentâ; subtis fuscâ lanceolatâ argentâ. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 785. n. 210. — *Mus. Lud. Utr.* p. 505. n. 125. (Mâle.)

Papilio Cythêrea. CLERCK, *Icon. tab.* 59. fig. 5.

Papilio N. Elea, alis dentatis, fuscâ-nebulosis, concoloribus; fasciæ primoribus flavâ, posticis albâ. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 781. n. 185. (Fem. Var.)

Papilio N. Eleus. LINN. *Mus. Lud. Utr.* p. 312. n. 150.

Papilio N. Cythêrea, alis crenatis, fuscis; anticis fasciâ fulvâ, posticis communî argentâ; subtis fuscâ argentâ, lanceolatâ. FAB. *Syst. Ent.* p. 516. n. 309. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 109. n. 474. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 62. n. 588. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 144. n. 441.

Papilio N. Elea, alis dentatis, fuscis; anticis fasciâ fulvâ, posticis albâ. FAB. *Syst. Ent.* p. 515. n. 300. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 105. n. 460. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 57. n. 562. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 141. n. 434.

Papilio Elea. CRAM. pl. 242. fig. D. E.

Papilio Eleus. HERBST, *Pap. tab.* 147. fig. 5. 4.

Après avoir bien médité la description du *Cythêrea* de Linnæus, & celle de son *Elea*, nous sommes restés convaincus que ces deux lépidoptères ne sont qu'une seule & même espèce, dont le premier paroît être le mâle; le second la femelle, ou du moins une variété femelle.

Fabricius a connu l'un & l'autre; mais il a sans fondement confondu le *Cythêrea* de Cramer avec celui de Linnæus.

L'envergure des ailes est la même que dans le *Cocala*. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, discoidale, oblique, aiguë à chaque bout. Cette bande commence au milieu des premières ailes & s'y aligne immédiatement au côté interne & très-entier d'une large bande orangée, également oblique; elle finit sur les secondes ailes à une petite tache fauve, anale & marquée de deux points noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un fauve-jau-nâtre, avec une bande blanche, correspondante & conforme à celle du dessus. Indépendamment de cela, il y a près de la base trois lignes obliques, & parallèlement au bord terminal, deux rangs de lunules d'un blanc-bleuâtre-luisant. Les lunules des secondes ailes sont séparées de la bande par une ligne ferrugineuse, transverse, maculaire, plus ou moins prononcée. Le corps est comme dans le *Cocala*. Les antennes sont noires, avec le dessous de la massue ferrugineuse.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu une femelle dont le dessus a du fauve à l'origine des ailes supérieures & vers l'extrémité des inférieures, comme l'individu que Linnæus donne sous le nom d'*Elea*.

80. NYMPHALE *Iphicla*.

NYMPHALIS Iphicla.

Nym. alis denticulatis, suprâ fuscis, fuscâ albâ, mediâ, antorsum rotundatâ, retrorsum mucronatâ: anticis maculâ apicis fulvâ, solitariâ.

Papilio N. Iphicla, alis dentatis, suprâ fuscis, fuscâ communi albâ maculâque ferrugineâ angulâ ant. Linn. *Syst. Nat.* 2. p. 780. n°. 181.

Papilio N. Iphiclus. Linn. *Mus. Lud. Ultr.* p. 511. n°. 129.

Papilio Iphiclus. CLERCK, *Icon. tab.* 41. fig. 5.

Papilio N. Iphicla. FAB. *Syst. Ent.* p. 510. n°. 285. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 99. n°. 438. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 54. n°. 555. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 155. n°. 417.

Papilio Bafilea. CRAM. *pl.* 188. fig. D. (Le mâle.)

Papilio Cytherea. CRAM. *pl.* 376. fig. C. D. (La femelle.)

Papilio 'iphicla. CRAM. *pl.* 188. fig. E. F. (Var. ?)

Papilio Iphicla. DRURY, *Inf.* tom. 1. *pl.* 14. fig. 3. 4.

Papilio Cythereus. HERBST, *Pap.* tab. 148. fig. 1. 2.

Papilio Iphiclus. HERBST, *Pap.* tab. 148. fig. 3. 4.

Sa taille est approchant la même que celle du *Cocala*. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, discoidale, oblique, arrondie à son extrémité antérieure, aiguë ou presque aiguë à l'extrémité opposée. Le dessus des premières ailes a en outre, vis-à-vis du sommet, une tache orangée plus ou moins orbiculaire dans le mâle; formant dans la femelle un triangle renversé, mais toujours isolée de la bande blanche qui monte un peu au-delà du disque. Le dessus des secondes ailes est marqué, à l'angle de l'anus, d'une petite tache fauve sur laquelle il y a deux points noirs.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-ferrugineux, avec une bande blanche de la même forme & de la même longueur qu'en dessus; plus des raies transverses d'un blanc-violâtre-luisant. Les raies sont au nombre de sept, savoir: trois à la base; quatre, dont l'extérieure onduée & maculaire, en avant du bord terminal. La bande finit aux secondes ailes par une tache fauve & pon-

tuée de noir comme en dessus: elle est surmontée aux premières de quatre traits blanchâtres, longitudinaux, derrière lesquels on voit une tache également blanchâtre, partagée par trois nervures rouffes, & suivie de deux points noirâtres, oblongs.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Si l'on peut s'en fier à une figure, l'*Iphicla* de Cramer paroît devoir être rapporté ici comme variété. En effet, il a seulement le dessous plus obscur; ce qui absorbe la ligne la plus voisine de chacun des côtés de la bande discoidale, & les deux points noirs de l'angle interne des ailes inférieures.

81. NYMPHALE *Mythra*.

NYMPHALIS Mythra.

Nym. alis suprâ fuscis, fuscâ albâ, mediâ, apicibus mucronatâ: anticis maculâ apicis fulvâ: subtis omnibus luteis, fuscâ strigifque duabus albis.

Nous n'avons vu qu'un seul échantillon de cette espèce. C'est un mâle. Voici ce qui le distingue du *Cytheréa*: le dessus des premières ailes offre, à la place de la bande orangée, une tache triangulaire, également orangée, qui, quoiqu'assez grande, ne touche aucunement la bande blanche discoidale. En dessous, cette même bande monte tout-à-fait jusqu'en haut, & n'est accompagnée que de deux lignes blanches, dont l'antérieure double sur les premières ailes, la postérieure bordée de brun-cendré sur les quatre. L'angle anal des secondes ailes a d'ailleurs deux points noirs comme du côté opposé, tandis qu'ils n'existent qu'en dessus dans le *Cytheréa*.

Du Brésil.

L. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes ayant, au moins dans les mâles, l'une des trois dents postérieures plus prononcée que les autres.

« Dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

82. NYMPHALE *Syma*.

NYMPHALIS Syma.

Nym. alis dentatis, suprâ fuscis, fuscâ communi albâ: anticis maculâ apicis aurantiacâ: subtis omnibus ferrugineis, strigis plurimis albis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, discoidale, étroite, aiguë à chaque bout. Cette bande commence au milieu des premières ailes, où elle s'unit presque au

côté interne d'une tache orangée, très-grande & à peu près orbiculaire.

Le dessous de toutes les ailes est ferrugineux, avec des raies ou bandes blanches, transverses, bordées de noirâtre : il y en a six aux ailes supérieures, & cinq aux inférieures.

Du Brésil.

83. NYMPHALE Fatime.

NYMPHALIS Fatima.

Nym. alis subcaudatis, atris, fuscis communi flavâ, posticarum abbreviatâ maculisque rubris. FAB.

Papilio N. Fatima. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 81. n.º. 252.*

Papilio Fatima. JON. *Fig. piçt. 5. tab. 12. fig. 1.*

Elle a le port de l'*Iphiacla*. Le dessus de ses ailes est d'un noir-ensumé, avec une bande fauve, commune, mais plus courte sur les inférieures, dont le milieu offre quatre taches rouffes. Les ailes supérieures ont au fommel pareil nombre de points jaunes.

Le dessous de toutes les ailes est brun, avec une bande jaune, continue. Cette bande est suivie extérieurement aux premières ailes d'une ligne jaune, transversale, & précédée intérieurement aux secondes d'une bande rouffe, interrompue. Le corps est noir.

Des Indes.

(Traduction du texte de Fabricius.)

84. NYMPHALE Libéria.

NYMPHALIS Liberia.

Nym. alis dentatis, suprà fulvis, anticarum apice fuscescente : posticis subtus strigâ mediâ à punctis quatuor ocellaribus.

Papilio N. Liberia, alis dentatis, fulvis : anticis arcu apicis ; posticis suprà puncto, subtus tribus ocellaribus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 155. n.º. 418.*

Papilio Liberia. DOW. *Of an Epitome of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 2. pl. 1. fig. 4.*

Papilio Liberia. JON. *Fig. piçt. 5. tab. 15. fig. 1.*

Papilio N. Agatha, alis dentatis, suprà fulvis, subtus glaucis : posticis puncto nigro, suprà unico, subtus tribus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 154. n.º. 414.*

Papilio N. Merione, alis dentatis, fulvis, margine fusco : posticis subtus fuscis, maculis strigifque albis caralysique. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 125. n.º. 382.*

Papilio Merione. HERBST, *tab. 171. fig. 1. 2.*

Papilio Laothoe. HERBST, *tab. 170. fig. 5. 6.*

Papilio Ariadne. GRAM. *pl. 180. fig. E. F.*

Papilio Laothoe. GRAM. *pl. 152. fig. A. B.*

STOLL, *Suppl. à GRAM. pl. 4. fig. 4. A. (La chen.) fig. 4. B. (La chryf.)*

Les papillons *Liberia*, *Agatha*, *Merione* & *Fabricius* appartiennent à cette espèce.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve à reflet purpurin, le dessus de la femelle d'un fauve-jaunâtre & sans reflet. Dans l'un & dans l'autre, les premières ailes ont le fommel brunâtre, avec une tache fauve ; & les secondes ailes offrent vers l'angle de Panus un point noir très-petit, indépendamment duquel il y a le long du bord postérieur une ligne brune plus ou moins prononcée.

Le dessous des ailes de devant est d'un fauve-pâle, avec le milieu coupé transversalement par deux lignes rouffes, courtes ; le fommel obscur & marqué d'un point oculaire que précède en dehors une raie violâtre, transversale & flexueuse.

Le dessous des ailes de derrière est d'un ferrugineux nuancé de bleuâtre, avec trois taches blanches vers l'origine de la côte, une rangée oblique de quatre points oculaires sur le milieu, une ligne violâtre en zig-zag en avant du bord postérieur.

La femelle a quelquefois tous le dessus des ailes inférieures d'un noir-brun, comme l'individu que Cramer a figuré sous le nom de *Laothoe*.

La chenille, d'après Stoll, est d'un vert-obscur, avec la tête bleuâtre, les pattes & la petite fourche de l'anus jaunes. Son corps est chargé d'épines noirâtres, branchues, dont les deux antérieures beaucoup plus grandes. Elle vit sur le citronier.

La chrysalide est allongée, bifide antérieurement, verte, avec des mouchetures ferrugineuses.

De la Guyane & du Brésil.

85. NYMPHALE Bella.

NYMPHALIS Bella.

Nym. alis suprà fulvis, anticarum apice nigro, albo maculatâ : posticis subtus griseo reticulatis, ocellis quatuor.

Papilio N. Bella, alis subcaudatis, testaceis : anticis apice atris fuscis flavâ maculisque albis ; posticis margine flavo, nigro strigoso. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 79. n.º. 245.*

Papilio Bella. JON. *Fig. piçt. 5. tab. 85. fig. 1.*

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-foncé à la base ; traversé au milieu par une bande jaune qui se foud quelquefois dans le fauve ; noir à l'extrémité, avec une rangée oblique de trois taches blanches faisant face au fommel.

Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-foncé, avec le limbe postérieur plus clair, & longé par une ligne noire, un peu flexueuse, & terminée à l'angle anal par un point blanc.

Le dessous des premières ailes est noir, avec la base & le sommet variés de gris; le milieu coupé obliquement par une bande jaunâtre, large & bifide antérieurement.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-noirâtre, réticulé de gris, avec une rangée postérieure de quatre yeux très-rapprochés, dont les deux intermédiaires sans prunelle & flabés de verdâtre; l'extérieur noir, avec l'iris jaune & la prunelle blanche; l'intérieur d'un brun-jaunâtre, avec la prunelle bleuâtre, l'iris noir & entouré d'un double cercle grisâtre. Le dessus du corps est de la couleur des ailes, avec des points blanchâtres sur la tête. Les antennes sont brunes, avec le bout de la massue jaunâtre.

De l'Amérique méridionale.

86. NYMPHALE LAURENCE.

NYMPHALIS Laurentia.

Nym. alis supra nigris, fasciâ communi cyanâ, nitidâ : posticis subtus argenteo-griseis, puncto basales fusco.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande commune & discoïdale, qui est d'un bleu-verdâtre-luisant lorsqu'on la voit de face, & d'un verdoré qu'accompagne un reflet bleu d'outre-mer lorsqu'on la regarde de côté. Les premières ailes, dont la bande fuside n'atteint point la côte, ont vis-à-vis du sommet une ligne arquée de trois points blancs, diaphanes.

Le dessous des premières ailes est d'un fauve-jaunâtre vers la base, avec trois lignes noires, transverses, dont la postérieure flexueuse & bordée en arrière par une suite de taches blanchâtres; à un gris-luisant à l'extrémité, avec une rangée transverse de trois gros points noirs près de l'angle interne.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-luisant, avec deux bandes un peu plus claires, entre lesquelles il y a une suite de points bleuâtres, peu distincts : outre cela, on voit, vers la base, un point d'un brun-noirâtre. Le corps a le dessus de cette dernière couleur, & le dessous blanchâtre. Les antennes sont brunes en dessus, ferrugineuses en dessous.

Du Brésil.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

87. NYMPHALE LAURE.

NYMPHALIS Laura.

Nym. alis supra nigris, fasciâ mediâ : anticarum fulvâ, interruptâ ; posticarum albâ & à latere cœruleo nitidâ.

Papilio N. Laura, alis angulato-dentatis, fuscis, fasciâ communi dimidiato-fulvâ : posticis

subtus argenteis, fasciâ niveâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 134. n°. 415.

Papilio Laure. DRURY, Inf. tom. 2. pl. 17. fig. 5. 6.

Ne seroit-ce pas la femelle de la précédente? Elle en a le port & la taille, & elle lui ressemble en dessous.

Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec une bande transverse sur le milieu. La bande des secondes ailes est blanche & environnée d'un beau reflet bleu. Celle des premières ailes est fauve & interrompue en deux endroits. Il y a en outre une tache de cette couleur au sommet des mêmes ailes.

Des Indes occidentales.

N. B. Fabricius dit que la bande des ailes est fauve antérieurement, blanche postérieurement. Cette manière de s'exprimer pourroit faire croire qu'elle est fauve du côté de la base, & blanche du côté du bord terminal.

88. NYMPHALE THOÉ.

NYMPHALIS Thoe.

Nym. alis utrinque fasciâ communi albâ & ocello cæco : posticis subtus argenteo-griseis.

Elle a le port & la taille de la nymphale *Laurence*. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec une bande blanche, commune, oblique & maculaire sur le milieu; avec deux lignes noires, ondulées, en avant du bord postérieur. On voit en outre, vers l'angle anal des quatre ailes, une tache fauve chargée d'un point noir; & sur la dernière dent des inférieures, une ligne bleuâtre en forme de V, & surmontée d'une poussière verdâtre.

Le dessous de toutes les ailes est comme dans la nymphale *Laure*, mais il n'y a que deux points noirs près de l'angle interne des supérieures. Le corps est de part & d'autre de la même couleur que les ailes inférieures. Les antennes sont noires, avec la massue ferrugineuse.

Nous n'avons vu que deux femelles. Elles ne diffèrent point du mâle quant au dessin; mais elles font sans rellet, & leur dessus est d'un fauve un peu obscur. Cette couleur est-elle constante dans toutes les femelles; ou bien les deux sexes font-ils tantôt plus ou moins fauves, tantôt d'un brun-noirâtre en dessus, comme cela a lieu dans *Illia* ou *petit Mars*?

De l'Amérique.

89. NYMPHALE PAVON.

NYMPHALIS Pavon.

Nym. alis supra fuscis, fasciâ duabus dilatioribus : anticis maculâ apicis fulvâ : posticis subtus punctis tribus cœrulecentibus ocellatis.

Nymphalis

Nymphalis Pavaon, *alis dentatis*; *superiorum margine postico concavo, ad apicem producto, truncato: alis quatuor supra fusco-brunneis, fasciis duabus dilatoribus, maculâque rubescenti superiorum apicem versus: infra rubescenti-brunneis, fasciis rubescenti-griseis; superiorum basi fulvâ lateris duabus nigris; inferioribus puncto cærulescenti, nigro marginato, fasciis brunneæ imposito.* Recueil d'observ. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. p. 197. pl. 18. fig. 5. 4.

Elle a le port & la taille de la nymphale *Lau-rence*. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec deux bandes plus claires, transversales & parallèles, dont l'une discordale, l'autre plus étroite, maculaire & voisine du bord postérieur. Les premières ailes ont en outre, près du sommet, une tache fauve, ovale, assez grande, coupée par les nervures.

Le dessous de toutes les ailes a la moitié postérieure d'un brun-rougeâtre, avec deux bandes d'un gris de perle, correspondant à celles de la surface opposée, plus une série de taches marginales, colorées comme ces bandes. La base des premières ailes est d'un fauve-jaunâtre, mais un peu plus pâle près de la côte, avec deux caractères noirs, dont l'un en forme de S, l'autre en forme d'I. Il y a encore trois taches noirâtres, triangulaires, & alignées transversalement près de l'angle anal des mêmes ailes. Les secondes ailes ont, entre les deux bandes, un rang de trois points bleuâtres, bordés de noir; & à la base, qui est d'un gris-rougeâtre, un point & un petit trait bruns. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous.

Prise dans les bois de Loxa, & dédiée à M. Pavaon, naturaliste espagnol, célèbre par ses travaux sur les plantes du Pérou.

90. NYMPHALE *Vacuna*.*NYMPHALIS Vacuna.*

Nym. alis denticulatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus): anticis utrinque fasciâ cathacæâ: posticis subtis puncto ocellari cæruleo.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec une bande oblique & maculaire d'un jaune-foncé au-delà du milieu, un arc de trois points blancs vis-à-vis du sommet, une ligne d'un gris-obscure en avant du bord postérieur. Cette ligne se prolonge jusqu'à l'angle anal des secondes ailes.

Le dessous de la femelle ressemble à celui du mâle, mais il est sans reflet; la bande fouci des premières ailes est continue, beaucoup plus large, & suivie seulement de deux points blancs. Les dents des secondes ailes sont en outre uniformes,

Hist. nat. Inf. Tome LX.

tandis que dans le mâle la dernière est plus saillante que les autres.

Le dessous des ailes supérieures des deux sexes est fauve à la base, avec trois raies noires, courtes & transversales; ensuite noirâtre, avec une bande & des points comme en dessus, plus une teinte d'un gris-violetâtre au sommet. Le dessous des ailes inférieures, dans le mâle & dans la femelle, est d'un gris-violetâtre-luisant, avec des espaces maculaires d'un brun-marron peu prononcé, sans compter un point noir à prunelle bleue, placé vers l'angle de l'anus. La tranche du bord postérieur des quatre ailes est ferrugineuse de part & d'autre. Cette couleur est aussi celle du devant du corselet & du dessous des antennes.

Du Brésil.

91. NYMPHALE *Agathis*.*NYMPHALIS Agathis.*

Nym. alis denticulatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus): anticis utrinque ad apicem strigis duabus macularibus albis: posticis subtis cæcis.

Papilio Agathina. Cram. pl. 167. fig. E. F. (Le mâle.)

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec point solitaire, puis deux rangées obliques de points blancs, vers l'extrémité des ailes supérieures, & une ligne obscure le long du bord terminal des quatre.

La femelle est plus pâle, sans reflet, & ses ailes inférieures, dont toutes les dents sont égales, offrent à l'angle de l'anus un croissant lilas.

Le dessous des ailes supérieures, dans les deux sexes, est jaunâtre à la base, avec trois points & une petite raie transverse noirs; ensuite noirâtre, avec le même nombre de points blancs qu'en dessus, & le sommet d'un ferrugineux teinté de violetâtre. Le dessous des secondes ailes du mâle & de la femelle a environ tout le tiers antérieur d'un gris-lilas, le reste de la surface d'un ferrugineux légèrement teinté de violetâtre & sans aucune tache oculaire. La tranche du bord postérieur des quatre ailes, le devant du corselet & le dessous des antennes, sont ferrugineux.

Du Brésil.

92. NYMPHALE *Zunilda*.*NYMPHALIS Zunilda.*

Nym. alis denticulatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus): anticis utrinque ad apicem strigis duabus macularibus albis: posticis subtis punctis duobus ocellaribus cæruleis.

Nous n'avons vu que le mâle de cette espèce. Il est plus petit que celui de la précédente, & il lui ressemble en dessus.

Bbb

Le dessous des premières ailes a la moitié antérieure fauve, avec deux taches, dont l'une ferrugineuse, l'autre noire; la moitié postérieure d'un gris de lin, avec des points blancs comme eu dessus, & dont les plus intérieurs environnés de noir.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris de lin, avec deux petites taches à la base, & une ligne flexueuse sur le milieu, d'un ferrugineux-pâle, & deux points noirs à prunelle bleue vers l'angle de l'anus. La tranche du bord postérieur est entrecoupée de blanc & de ferrugineux.

Du Brésil.

g. Avant-dernière dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

95. NYMPHALE Gélanie.

NYMPHALIS Gelania.

Nym. alis dentatis, fuscis, utrinque fuscis communi albâ: subtus maculis basæ ferrugineis alboque cinctis.

Son envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, oblique, discordale, moins divisée aux inférieures qu'aux supérieures. Ces dernières ont vers l'origine de la côte trois taches d'un rouge-ferrugineux, transversales, encadrées de noir, & séparées l'une de l'autre par du cendré-bleuâtre. Les ailes inférieures ont à l'angle de l'anus une tache fauve, marquée de deux points noirs.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus en ce qu'il est moins foncé, & qu'il présente parallèlement au bord terminal deux lignes ferrugineuses, entre lesquelles règne une ligne blanche; en ce que les nervures sont bordées de ferrugineux depuis la bande du milieu jusqu'à la ligne inférieure de l'extrémité; en ce que les taches rouges de la base des ailes supérieures ont l'encadrement entouré de blanc; enfin, en ce qu'il y a deux taches semblables à la base des ailes inférieures.

Elle habite l'Amérique équinoxiale.

h. Antépénultième dent des secondes ailes plus prononcée que les autres.

94. NYMPHALE Acilia.

NYMPHALIS Acilia.

Nym. alis dentatis, fuscis, strigis griseis, fuscis communi albâ seroque posticâ ocellorum decorum.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, large, oblique, discordale, précédée & suivie de plusieurs

lignes griffâtres, transverses. Entre les lignes de l'extrémité, il y a une série d'yeux noirs, sans prunelle, & ayant pour la plupart un iris rouffâtre. Indépendamment de cela, l'angle anal des ailes inférieures offre un espace fauve, dans lequel se perd la bande blanche fuscite.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que les lignes transverses sont blanchâtres, au lieu d'être grises.

Décrite d'après un individu unique, pris à la terre des Papous par M. le capitaine Freycinet.

95. NYMPHALE Stélénès.

NYMPHALIS Stelenes.

Nym. alis utrinque fuscis duabus virescentibus, posticarum priorâ integrâ: subtus anticis Z costali cœrulescente.

Papilio D. F. Stenelus, alis subcaudatis, suprâ fuscis, fuscis virescente, obtusâ, interruptâ. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 750. n^o. 30.

Papilio E. A. Stelenes. LINN. *Mus. Lud. Ulr.* p. 219. n^o. 57.

Papilio N. Stelenes, alis dentatis, fuscis, fuscis duabus viridibus, alterâ posticarum integrâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 84. n^o. 263.*

Papilio E. A. Stelenes. FAB. *Syst. Ent.* p. 456. n^o. 57. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 25. n^o. 92. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 12. n^o. 108.

Papilio Stelenes. CLERCK, *Icon. tab. 35. fig. 2.*

MERIAN, *Surin. Inf. tab. 11.*

PETIV. GAZOPH. *tab. 154. fig. 1.*

HOTTUIN, *Nat. Hist.* 1. D. 11. *stuk. plaat. 87. fig. 4. 5.*

SLOAN. *Hist. Jam.* tom. 2. p. 219. *tab. 239. fig. 9. 10.*

Papilio Stelenes. GRAM. *pl. 79. fig. A. B.*

Papilio Stelenes. HERBST, *tab. 47. fig. 3. 4.*

Le Verd-d'eau. DAUBENTON, *pl. entom. 95. fig. 1. 2.*

Elle a entre trois pouces & demi & quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec deux bandes d'un vert-céladon, communes, obliques. La bande antérieure, qui est beaucoup plus large, est fortement interrompue aux premières ailes. La bande postérieure est maculaire aux quatre, & terminée au bord interne des secondes par une tache fauve plus ou moins allongée.

Le dessous de toutes les ailes est ferrugineux, avec des bandes vertes, semblables à celles du dessus, mais plus pâles, & séparées l'une de l'autre, du moins dans les femelles, par une raie blanche. Les premières ailes ont, vers l'origine de la côte,

une raie également blanche, coupée par une ligne bleuâtre, transversale & en forme de Z. Le corps est noir en dessus, avec les côtés de l'abdomen roussâtres. Les antennes sont noires, avec la sommité ferrugineuse.

De la Guyane.

96. NYMPHALE Epaphœa.

NYMPHALIS Epaphœa.

Nym. alis utraq. corticinis, fasciâ communi albâ: anticis suprâ dimidio apicali fulvo.

Quoique nous ayons déjà donné la description de cette espèce à la page 299, n°. 10, nous croyons devoir la reproduire ici, avec les modifications qui nous ont paru nécessaires.

Elle a le port & la taille du *Stélénès*. Le dessus des premières ailes a la moitié antérieure d'un brun-tanné, l'autre moitié tabac d'Espagne. Ces deux couleurs sont séparées par une bande blanche, transversale, près de l'origine du côté interne de laquelle il y a une ligne également transversale de quatre ou cinq points bleuâtres. Le dessus des secondes ailes est entièrement d'un brun-tanné, avec une bande blanche, postérieure, courbe, maculaire, faisant suite à celle des ailes de devant.

Le dessous des quatre ailes ressemble beaucoup au dessus, mais l'extrémité des supérieures est à peu près du même ton que la base, & les inférieures ont deux bandes blanches, dont l'une discoïdale & fortement interrompue dans son milieu, l'autre correspondant à celle de la surface opposée, & renfermée entre deux séries de taches rousses. Le corps est fauve, avec des points blancs sur la tête & sur le devant du corselet; plus, des lignes longitudinales de cette couleur sur le ventre. La poitrine est rayée de blanc & de rouge. Les antennes sont noires, annelées de blancheâtre, avec le bout de la massue ferrugineux.

Du Pérou.

97. NYMPHALE Symachia.

NYMPHALIS Symachia.

Nym. alis fuscis, suprâ fasciâ communi albâ, subtus quatuor rufis totidemque albis alternantibus.

Papilio Sulpitia. CRAM. pl. 328. fig. A. B.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune, oblique, discoïdale, continue aux inférieures, maculaire aux supérieures.

Le dessous est à peu près du même brun que le dessus, avec huit bandes alternativement rousses & blanches. Les bandes des ailes de devant sont interrompues, à l'exception de celle qui avoisine le bord terminal. Le corps & les antennes sont d'un brun-noirâtre.

De la Guyane.

N. B. Le dessus des secondes ailes offre parfois, derrière la bande blanche, une ligne roussâtre, ondulée & transversale.

98. NYMPHALE Typha.

NYMPHALIS Typha.

Nym. alis dentatis, fusco-nigris, suprâ fasciâ communi, subtus disco basæ, albis: anticarum disco bipartito.

Papilio N. Typha, alis subcaudatis, nigris: primoribus maculis duabus, posticis disco rubro emarginato, albis. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 776. n°. 164. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 508. n°. 126.

Papilio Tiphus. CLERCK, *Icon. tab.* 52. fig. 5.

Papilio N. Neærea, alis dentatis, suprâ fuscis, albo maculatis: subtus maculis albis lineâ rubrâ cinctis. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 782. n°. 190. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 297. n°. 115.

EDWARDS, *Av. tab.* 5.

§. *Papilio Tiphæ.* FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 158. n°. 424.

Papilio Tiphæ. CRAM. *Pap. pl.* 8. fig. D. E.

Papilio Tiphus. HERBST, *Pap. tab.* 257. fig. 5. 6.

Papilio Tiphus. HOTTUIN, *Nat. Hist.* 1. p. 382.

SEBA, *Mus. 4. tab.* 12. fig. 19. 20.

SEBA, *Mus. 4. tab.* 19. fig. 1. 2.

Quoiqu'il y ait beaucoup de vague dans la description du *Neærea* de Linnæus, on ne peut pas douter, quand on a comparé cette description avec la figure d'Edwards, à laquelle il renvoie, que ledit *Neærea* n'appartienne à la même espèce que le *Typha*.

L'envergure des ailes est de deux pouces & demi. Leur dessus est d'un brun-brun, avec une bande blanche, commune, large & discoïdale. La bande des ailes inférieures est terminée à l'angle de l'anus par un point d'un rouge-écarlate. Celle des supérieures est interrompue vers son milieu, & souvent séparée du bord terminal par une ligne transversale de quatre à cinq points blancs. Le dessous de ces premières ailes offre à la base un large espace blanc que divise une raie brune, longitudinale, à l'extrémité de laquelle aboutit une ligne rouge, crochue & longeant la côte jusqu'à son origine; immédiatement après cette ligne vient une tache blanche, grande & orbiculaire, derrière laquelle on voit une ligne rouge, arquée, puis une rangée transversale de six points blancs.

Le dessous des secondes ailes a le disque blanc, à partir de la base, & bordé dans tout son contour extérieur par une ligne rouge, qui est continue sur la côte; maculaire & adossée à une régie de

points noirs, piqués de bleu, en face du bord postérieur. Ce bord est brun & chargé d'un rang de points blancs qui font suite à ceux des ailes supérieures. Les antennes sont noires & annelées de blanc. Le corps est brun en dessus, blanchâtre en dessous.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous avons vu une variété ayant la bande du dessus des ailes étroite, particulièrement aux supérieures.

99. NYMPHALE Nécérea.

NYMPHALIS Nœvea.

Nym. alis dentatis, fusco-nigris, supra fasciâ communi albâ strigifque duabus lunularum cœrulefcentium : subtus rufo maculatis.

Papilio N. Nœvea. FAB. *Syst. Ent. p. 510. n.º 266. — Spec. Inf. tom. 2. p. 100. n.º 441. — Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n.º 556. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 157. n.º 424.*

Papilio Nœvea. GRAM. *Pap. pl. 75. fig. C. D.*

STOLL, *Pap. Suppl. à GRAM. pl. 4. fig. 5. A.* (La chenille.) *fig. 5. B.* (La chrysalide.)

Papilio Nœveus. HERBST, *Pap. tab. 257. fig. 5. 4.*

Fabricius a connu cette espèce, du moins par la figure de Cramer, mais il l'a confondue avec le *Typha*.

Elle en diffère cependant par les caractères que voici : en dessus la bande des quatre ailes est d'un vert-pâle & beaucoup plus large ; les inférieures n'ont pas de point rouge à l'angle de l'anus : en dessous l'espace blanc, ou plutôt verdâtre, de la base des premières ailes, n'est pas divisé par une ligne brune, longitudinale ; le disque des secondes ailes n'est pas bordé de rouge sur la côte, mais seulement dans la partie qui fait face au bord postérieur ; les points de ce bord, ainsi que ceux du bord correspondant des ailes supérieures, forment une ligne presque continue & d'un ton violâtre.

Même patrie.

La chenille, suivant Stoll, est d'une couleur ferrugineuse, avec la tête, le devant du corps, le dos & les six pattes antérieures, d'un jaune-clair ; les autres pattes & les trois derniers anneaux d'un jaune-obscur. Elle a des épines noires, branchues, dont deux plus longues sur le col. On la trouve sur le *Cassier*.

La chrysalide est perpendiculaire, verte, mouchetée de sauve, avec une éminence obtuse sur la partie antérieure du dos. L'insecte parfait en sort au bout de neuf à dix jours.

100. NYMPHALE Lamina.

NYMPHALIS Lamina.

Nym. alis dentatis, fuscis, utrinquè fasciâ communi albâ strigifque duabus lunularum cœrulefcentium : subtus rufo maculatis.

Papilio N. Lamina? alis angulatis, nigris, fasciâ utrinquè communi albâ : subtus rufo maculatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 118. n.º 561.*

Papilio Lamina? JON. *Fig. pict. 5. tab. 52. fig. 1.*

Papilio Arthemis. DRURY, *Inf. 2. pl. 10. fig. 5. 4.*

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, sur le milieu, & un double cordon de lunules d'un vert-bleuâtre le long du bord terminal. Indépendamment de cela, les ailes supérieures ont parallèlement au sommet une ligne transverse de deux à trois petites taches blanches, & les inférieures offrent entre la bande & les lunules une rangée courbe & transverse de sept points roux.

Le dessous diffère du dessus en ce que le fond est d'un brun-pâle, excepté sur le bord postérieur qui reste noir ; en ce qu'il y a à la base de chaque aile quelques taches bleuâtres, accompagnées de quelques gros points roux ; enfin, en ce que les premières ailes ont une série de points de cette dernière couleur avant les lunules bleues de l'extrémité. Les échancrures de toutes les ailes font blanches de part & d'autre. Le corps est noir, avec trois lignes blanches le long du ventre. Les antennes sont noires.

De l'Amérique septentrionale, & principalement de l'état de New-York.

Nota. Fabricius ne dit pas si le dessus des secondes ailes a une rangée de points roux. C'est la seule différence qu'il y ait entre son *Lamina* & le nôtre.

101. NYMPHALE Urfula.

NYMPHALIS Urfula.

(Voyez *Pap. Ephelion*, p. 42. n.º 51.)

Papilio N. Urfula, alis dentatis, nigris : posticis limbo cœrulefcente fasciâ nigrâ : subtus fulvo maculatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 82. n.º 257.*

Papilio E. A. Afsyanax. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 4. n.º 29.*

Papilio N. Urfula. SMITH-ABBOT, *the Nat. Hist. of the rarer Lepid. Inf. of Georgia, &c., tom. 1. p. 19. tab. 10.*

Papilio Ephelion. STOLL, *Pap. Suppl. à GRAM. p. 121. pl. 25. fig. 1.*

Nous avons, mais à tort, placé cette espèce dans le genre PAPIILLON. C'est une véritable Nym-

phale, qui habite plusieurs parties de l'Amérique septentrionale, & non la côte de Guinée, comme nous l'avons dit, sur la foi de Stoll.

Sa chenille est ferrugineuse, avec des nuances blanchâtres. Elle a, près du col, deux épines noires, un peu branchues, & presque convergentes à leur base. On la trouve sur l'airelle à écorce verte (*vaccinium flamineum*); sur le *faule* & sur le *cryster sauge*.

La chrysalide, dont les couleurs sont absolument les mêmes que celles de la chenille, a sur le dos une bosse ronde, assez prononcée. L'insecte parfait paroît en avril & en juin.

102. NYMPHALE Oïfis.

NYMPHALIS Oïfis.

Nym. alis dentatis, suprâ nigris (in mare cœruleo micantibus), strigis tribus macularibus albis, primâ & secundâ abdomen fecantibus.

Papilio N. Oïfis, alis angulatis, cœruleis, margine anticarumque maculâ atris: subtis obfuscis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 124. n°. 578. (Le mâle.)

Papilio Oïfis. JON. Fig. piç. 5. tab. 101. fig. 2.

Papilio Oïfis. DRURY, Inf. 3. pl. 16. fig. 3.

Papilio N. Blandina, alis dentatis, atris, albo maculatis: anticis striâ basæ, posticis strigâ marginali, cœruleis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 129. n°. 597. (La femelle.)

Papilio Blandina. JON. Fig. piç. 5. tab. 10. fig. 1.

Papilio Blandina. DONOW. Of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, cub. 2. pl. 1. fig. 3.

Fabricius & d'autres auteurs ont donné le mâle de cette espèce sous le nom d'*Oïfis*, & la femelle sous celui de *Blandina*.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec trois bandes blanches, maculaires, dont les deux antérieures traversant le dessus du corps. Ces bandes sont moins apparentes dans le mâle, parce qu'elles y sont absorbées par un reflet d'un bleu-violet vif. L'un & l'autre sexe ont au sommet des premières ailes une tache ferrugineuse, & la femelle offre parallèlement au bord terminal des secondes une ligne bleuâtre, fincée.

Le dessous des premières ailes est brunâtre vers la base, ferrugineux vers l'extrémité, avec des bandes maculaires comme en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un ferrugineux tirant au gris ou au violâtre, avec des bandes plus ou moins distinctes, correspondant à celles de la surface opposée. Les échancrures des ailes sont blanches dans la femelle. Le corps est

de part & d'autre du même ton que les ailes. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs.

Du Brésil.

103. NYMPHALE Sylvia.

NYMPHALIS Sylvia.

Nym. alis suprâ nigro flavidoque variis, subtis viriscentibus: anticis utrinquâ fasciâ albâ, transversâ, maculari.

Papilio Sylvia. GRAM. pl. 45. fig. F. G.

Papilio Sylvia. HERBST, Pap. tab. 247. fig. 2. 3.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, varié de jaune-obscure dans tous les sens, & coupé transversalement au-delà du milieu par une bande blanche, maculaire, partant de la côte, mais n'atteignant pas le bord interne. Le dessus des secondes est pareillement noir, avec du jaune-obscure qui y forme six bandes étroites & transversales, dont les trois antérieures se réunissant près de la côte; la quatrième rayonnée en dehors; les deux autres, la cinquième surtout, composées de lunules.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun, tantôt très-pâle, tantôt verdâtre, & présente, vers l'extrémité, trois séries transverses de taches noires, dont les antérieures bilobes & un peu grandes. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont sur le milieu une ligne noire, flexueuse; & les premières une bande blanche comme en dessus, sans compter deux anneaux & un trait noirs qui avoisinent la base. Les échancrures du bord postérieur de toutes les ailes sont lilérées de blanc. Le corps a le dessus noir & annelé de jaune depuis la tête jusqu'à l'anus. Les antennes sont noires, avec la sommité roussâtre.

Des îles de Java & d'Amboine.

104. NYMPHALE Opis.

NYMPHALIS Opis.

Nym. alis suprâ fuscis, fasciâ communi caracteribusque ochraceis: anticis strigâ punctorum alborum.

Papilio N. Opis, alis dentatis, fuscis: anticis flavo reticulatis, posticis fasciatis. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 97. n°. 428. — Mant. Inf. tom. 2. p. 57. n°. 521. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 151. n°. 403.

Papilio Opis. GRAM. pl. 158. fig. A. B.

Papilio Opis. DRURY, Inf. tom. 2. pl. 18. fig. 5. 6.

Papilio Opis. HERBST, Pap. tab. 143. fig. 3. 4.

Papilio N. Crithea, alis dentatis, fuscis, maculis ocellaribus: posticis subtis cinereis, punctis

duobus *frigâque* *posticâ* *fufcis*. *FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 98. n^o. 429. — Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n^o. 522. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 152. n^o. 406.*

Papilio Crithea. *CRAM. pl. 138. fig. C. D.*

Papilio Crithea. *DRURY, Inf. tom. 2. pl. 16. fig. 5. 6.*

Papilio Crithea. *HERBST, Pap. tab. 145. fig. 1. 2.*

L'*Opis* & le *Crithea* des auteurs diffèrent si peu l'un de l'autre que Fabricius les auroit sans doute réunis, s'il en avoit donné la description d'après nature, au lieu de la donner, ce qu'on reconnoît très-aisément, d'après les figures de Cramer. On objectera peut-être que le *Crithea* a le bord postérieur des ailes moins finué que l'*Opis*; mais cela prouveroit seulement une différence de sexe. Nous avons dit plus d'une fois que, lorsque les ailes sont dentées, elles le sont plus fortement dans les individus femelles que dans les individus mâles.

L'envergure des ailes est d'environ deux pouces & demi. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec des anneaux, une ligne basilaire & une bande discoidale, d'un jaune d'ocre. La bande traverse tout-à-fait les ailes inférieures; elle monte plus ou moins sur les supérieures, vers l'extrémité desquelles il y a une série transverse de six à sept points blancs. Le dessous de ces premières ailes ne diffère du dessus que parce qu'il est plus pâle, & un peu glacé de violâtre aux taches annulaires.

Le dessous des secondes ailes a la base d'un brun mêlé de gris & marqué de quelques caractères noirâtres; tout le reste de la surface jaunâtre, avec trois lignes obscures & transversales, dont les deux postérieures maculaires.

De Sierra-Leone en Afrique.

105. NYMPHALE Cupavius.

NYMPHALIS Cupavius.

Nym. alis fusco-nigris: anticis utrinque fuscis duabus macularibus albidis, posticis disco ochraceo.

Papilio F. Cupavius, alis integris, atris, albo maculatis: posticis subtus griseis, fuscis utrinque albis. *FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 60. n^o. 265. — Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n^o. 502. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 152. n^o. 467.*

Papilio Cupavia. *CRAM. pl. 195. fig. E. F.*

Papilio Cupavia. *HERBST, tab. 137. fig. 3. 4.*

Elle a de deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec deux rangées obliques de taches blanches ou d'un blanc-jaunâtre vers le bout des supérieures, & une tache d'un jaune d'ocre, plus ou moins grande & plus ou moins foncée, sur le disque des inférieures. Celles-ci ont en outre, pa-

rallement au bord postérieur, un double rang de taches cendrées, petites & peu apparentes.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que le fond est un peu plus pâle, & le contact d'une teinte ferrugineuse.

Le dessous des secondes ailes est lavé de brun-jaunâtre, avec un espace discoidal plus clair & surmonté immédiatement de deux points noirs, tantôt séparés, tantôt réunis.

La femelle a le milieu des secondes ailes d'un jaune plus foncé en dessus.

De la côte de Guinée.

106. NYMPHALE Iapis.

NYMPHALIS Iapis.

Nym. alis repandis, suprâ nigro-fuscis, subtus dilutè corticinis: utrinque fuscisâ posticâ cærulefcentibus.

Papilio Laocoon. Vélins du Muséum. (Le mâle.)

Papilio Ganimède. Vélins du Muséum. (La femelle.)

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un noir-brun, avec une bande blanche, largement bordée de bleu-cendré, commençant en avant aiguë au sommet des ailes supérieures, & allant toujours en s'élargissant aboutir à l'angle anal des inférieures.

Le dessus de la femelle est d'un brun-obscur, avec deux bandes blanches, transverses & rapprochées, dont l'intérieure maculaire, beaucoup moins large aux secondes ailes qu'aux premières; l'extérieure semblable à celle du mâle, mais quelquefois sans bordure bleue.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-tanné pâle, avec une bande d'un blanc-violâtre, double ou simple suivant le sexe, & correspondant à celle du dessus. Il y a en outre, à la base des ailes supérieures, quatre ou cinq traits noirâtres, transversaux. Le bord postérieur de toutes les ailes est liséré de blanc de part & d'autre. Les deux surfaces du corps sont de la couleur de celles des ailes. Les antennes sont noires.

De Java.

N. B. Nous avons vu une variété mâle, dont la bande du dessus des ailes est entièrement d'un bleu-cendré, & s'étend jusqu'au liséré du bord. Cette variété vient aussi de l'île de Java.

107. NYMPHALE? Cocytia.

NYMPHALIS Cocytia.

Nym. alis repando-dentatis, fuscis: posticis apice cærulefcentibus. *FAB.*

Papilio N. Cocytia. *FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 127. n^o. 368.*

Papilio Cocytus. JON. Fig. piç. 4. tab. 64. fig. 2.

Fabricius signale ainsi ce lépidoptère : il a beaucoup d'affinité avec le *Bella* (n^o. 85) ; cependant il s'en distingue en ce que les ailes ne sont ni concaves, ni en queue, mais simplement dentées.

Il vaudroit mieux ne rien dire que de s'exprimer ainsi. Ce n'est pas le moyen de faire reconnoître une espèce que de la comparer à une autre qui ne lui ressemble ni par la forme, ni par les couleurs. Ceux qui verront les dessins de Jones reconnoîtront peut-être quelle doit être la place de celle-ci. En attendant nous la mettrons à côté de l'espèce dont elle nous paroît le plus se rapprocher.

Des Indes orientales.

108. NYMPHALE? Monime.

NYMPHALIS Monima.

Nym. alis dentatis, fuscis : postlicis brunneis, angulo ani cærulecente strigâ nigrâ. FAB.

Papilio N. Monima. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n^o. 502.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 127. n^o. 390.*

Fabricius la décrit ainsi : elle est de moitié plus petite que l'*Ondulée*, c'est-à-dire qu'elle n'a guère plus de quinze lignes d'envergure. Ses premières ailes sont noirâtres, avec des taches ferrugineuses peu prononcées à la base, & une liture ou petite raie bleuâtre à l'angle interne. Les secondes ailes ont la base noirâtre ; l'extrémité brune, & offrant, vers l'angle de l'anus, un large espace bleuâtre sur lequel il y a une ligne noire, ondulée.

Le dessous de toutes les ailes est cendré, avec des lunules noires à la base, & une ligne traversée de cette couleur vers l'extrémité.

Des Indes orientales.

M. Bord postérieur des premières ailes plus ou moins concave, ou tronqué au sommet. Bord correspondant des secondes arrondi.

109. NYMPHALE Aconthéa.

NYMPHALIS Aconthea.

Nym. alis supra fuscis, subtus apice margaritaceis : utrinque fasciâ communi albâ, valitè angulatâ.

Papilio Aconthea. FEM. CRAM. *pl. 154. fig. F. G.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, annelé de noirâtre à la base, & traversé, au-delà du milieu, par une bande blanche, commune, très-anguleuse, coupée par les nervures. Cette bande est

toujours oblitérée ou comme bifide près de la côte des premières ailes : elle est parlois divisée sur les quatre par un rang de taches noires & presqu'en forme de cœur.

Le dessous de toutes les ailes offre le même dessin que le dessus, mais la base est tantôt d'une teinte verdâtre, tantôt d'une teinte jaunâtre, & l'extrémité constamment d'un gris de perle. Le corps est de la couleur des ailes en dessus & en dessous. Les antennes sont noires.

De Java.

110. NYMPHALE Péléa.

NYMPHALIS Pelea.

Nym. alis dentatis, fuscis : anticis maculis sagittatis albis nigrisque : subtus omnibus cinereis, lunulis nigris. FAB.

Papilio N. Pelea. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 133. n^o. 409.*

Ce lépidoptère n'est peut-être qu'une variété de l'*Aconthea*. Voici ce qu'en dit Fabricius : il est de moyenne taille. Les premières ailes ont le dessus d'un brun-obscur, avec quelques lunules noires près de la base ; avec une large bande, composée de taches blanches & de taches noires en fer de flèche, vers l'extrémité. Les secondes ailes sont d'un brun-obscur, avec des lunules noires, plus une liture blanche faisant suite à la bande des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec un grand nombre de lunules noires, surtout aux inférieures : la bande blanche des supérieures est ici moins apparente que du côté opposé. Le corps est de la couleur des ailes.

Des Indes orientales.

111. NYMPHALE Althéa.

NYMPHALIS Althea.

Nym. alis dentatis, supra fuscis, fasciâ crenatâ strigâque angulatâ albis : subtus strigâ communi ferrugineâ.

Papilio N. Althea, alis dentatis, fuscis, fasciâ strigâque angulatâ dentatis albis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 88. n^o. 389.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 47. n^o. 469.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 115. n^o. 347.*

Papilio Althea. CRAM. *pl. 89. fig. E. F.*

Papilio Althea. HERBST, *Pap. tab. 249. fig. 1. 2.*

Papilio Althea. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 20. fig. 1. 2.*

Elle est à peu près de la taille de l'*Aconthea*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec la base marquée de quelques zig-zags noirs, & parfois lavée de ferrugineux. Sur le milieu de la sur-

face, il y a une bande blanche, commune, oblique, fortement dentée en arrière, & suivie d'une ligne blanche en feston, dans chacun des creux de laquelle est une tache noire en fer de flèche.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est beaucoup plus pâle, & la bande blanche est bordée à son côté interne par une ligne d'un ferrugineux-obscur.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous avons vu une variété dont la bande du dessus des ailes inférieures est absorbée par la teinte ferrugineuse de la base.

112. NYMPHALE Alciméda.

NYMPHALIS Alciméda.

Nym. alis dentatis, supra nigro-fuscis, fusciâ crenatâ strigâque punctiformi albis : posticis maculis marginalibus fulvis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande d'un blanc-jaunâtre, commune, oblique, discoïdale, dentée en arrière, & suivie d'une rangée de points blancs. Il y a en outre, près du milieu de la côte des premières ailes, deux taches blanches, transversales; & sur le bord postérieur des secondes, un cordon de lunules blanchâtres, puis une série de taches fauves.

Le dessous offre les mêmes caractères que le dessus; mais le fond des quatre ailes est d'un gris-perlé, & l'on remarque à leur base quelques anneaux ferrugineux. Le corps est brun en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont brunes, avec la massue fauve.

De la Cafrerie.

113. NYMPHALE Amphicéda.

NYMPHALIS Amphicéda.

Nym. alis albis, supra marginis postici undis nigris, subtus caracteribus basæ strigâque communi fuscis.

Papilio N. Amphicéda, alis dentatis, fuscis, discæ communi cinereo, fusco undato : subtus apice griseis, lunulis nigris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 113. n. 348. (La femelle.)

Papilio Amphicéda. CRAM. pl. 146. fig. D. E. (La femelle.)

Papilio Cænis. DRURY, Inf. tom. 2. pl. 19. fig. 1. 2. (Le mâle.)

Nous avons, mais à tort, placé cette espèce parmi les PIÉRIDES. (Voyez la description du mâle, p. 142. n. 85.)

La femelle s'en distingue en ce que le dessus de toutes ses ailes offre, avant la ligne anguleuse de l'extrémité, une ligne semblable, mais plus large, au lieu d'offrir sur les supérieures une rangée de points, & sur les inférieures une suite de quelques chevrons, noirâtres. La base des unes & des au-

tres est en outre plus obscure que dans le mâle, lequel n'a été connu ni de Fabricius, ni de Cramer.

Elle se trouve, comme nous l'avons dit, sur la côte de Guinée.

114. NYMPHALE Sangaris.

NYMPHALIS Sangaris.

Nym. alis supra sanguineis, limbo postico punctis nigris : subtus dilute corticinis, strigâ communi ferrugineâ.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un rouge-vermillon un peu chatoyant, avec une rangée presqu terminale de points noirs, peu prononcés aux supérieures, & liés aux inférieures par une ligne anguleuse également noire.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-tanné-clair, avec des hiéroglyphes noirs à la base; une ligne ferrugineuse, commune & oblique, sur le milieu; des chevrons obscurs, surmontés de points violâtres, à l'extrémité. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes manquent.

Décrite d'après un individu mâle & unique que nous soupçonnons avoir été pris sur la côte occidentale d'Afrique.

115. NYMPHALE Disconthéa.

NYMPHALIS Disconthea.

Nym. alis supra pallido-æneis, basi strigâque maculari posticâ fuscis : anticis costam versus strigâ à maculis albis.

Papilio Aconthea. MUS. CRAM. pl. 134. fig. D. E.

Cramer donne, avec doute il est vrai, le mâle de cette espèce pour celui de l'*Aconthea*.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est obscur à la base, avec quelques taches annulaires plus foncées; ensuite d'un bronzé-pâle jusqu'au bout, avec une rangée postérieure de points obscurs, moins gros aux ailes inférieures qu'aux supérieures. Ces dernières ont, un peu au-delà du milieu, une raie blanche, transversale, courte, maculaire, appuyée sur la côte, & suivie de deux points blancs faisant face au fommel.

Le dessous de toutes les ailes offre le même dessin que le dessus, mais le fond en est généralement très-pâle, & le bord postérieur est un peu lavé de violet. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont ferrugineuses.

De Java.

116. NYMPHALE Alphéda.

NYMPHALIS Alphéda.

Nym.

Nym. alis suprà œneis, subtùs glaucis : utriusque basi caractèribus, apice strigis duabus undulatis, fuscis.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un seul individu, dont nous n'avons pu déterminer le sexe.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un vert-bronzé, leur dessous d'un vert-blanchâtre. Chaque surface offre à la base des hiéroglyphes noirs, & vers l'extrémité deux lignes obliques, transverses & flexueuses.

Du Bengale.

117. NYMPHALE Arcadius.

NYMPHALIS Arcadius.

Nym. alis integerrimis : anticis nigris, cœruleo alboque maculatis ; posticis fuscis : subtùs (lingulis) brunneis. FAB.

Papilio N. Arcadius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 151. n°. 465.

Papilio Arcadius. JON. Fig. piçt. 5. tab. 58. fig. 1.

Le corps est de moyenne grandeur, d'un brun-obscur. Les ailes supérieures sont noires, avec la base bleue & coupée de brun, l'extrémité tachetée de blanc. Les ailes inférieures sont d'un brun-obscur, avec des taches bleues, marginales.

Le dessous des quatre ailes est brun.

De l'Afrique.

(Traduction de Fabricius.)

118. NYMPHALE Véronique.

NYMPHALIS Veronica.

Nym. alis suprà violaceo-virescentibus, strigis margineque postico fuscescentibus : subtùs strigâ punctorum alborum.

Papilio N. Veronica, alis dentatis, suprà virescentibus : subtùs ferrugineis, strigâ punctorum alborum. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 136. n°. 421.

Papilio Veronica. CRAM. pl. 325. fig. C. D.

Papilio Veronica. HERBST, tab. 142. fig. 1. 2.

Papilio Veronica. JON. Fig. piçt. 5. tab. 56. fig. 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un verdâtre-luisant & prenant à certains aspects une teinte violette, avec des raies transverses, & particulièrement le bord terminal, obscurs.

Le dessous est ferrugineux, avec deux bandes légèrement grisâtres, courbes & transverses, sur la postérieure desquelles il y a une série de points blancs. Ces points se reproduisent en dessous, tantôt aux quatre ailes, tantôt aux inférieures seule-

Hist. Nat. Inf. Tom. 1A.

ment. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noires en dessus, roussâtres en dessous.

De la côte de Guinée.

119. NYMPHALE Æthiopa.

NYMPHALIS Æthiopa.

Nym. alis suprà violaceo-cœruleis, margine postico nigro : anticis utriusque strigâ apicali punctorum alborum.

Papilio N. Æthiopa, alis dentatis, cœruleis : anticis apice atris, albo punctatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 136. n°. 420.

Papilio Æthiopa. JON. Fig. piçt. 5. tab. 56. fig. 1.

Papilio Afer. DRURY, Inf. tom. 3. pl. 36. fig. 1. 2.

Papilio Afer. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 27. fig. 3 & 3. B.

Ce lépidoptère pourroit bien être la femelle ou une variété du précédent. Nous n'osons point l'y réunir, parce que nous ne l'avons vu qu'en mauvais état.

Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, qui paroît azuré ou violâtre selon les aspects, avec le bord postérieur d'un noir-brun. Vis-à-vis du sommet des supérieures, il y a une ligne transverse & tortueuse de six points blancs, dont les deux inférieurs plus gros. Ces points reparoissent en dessous, où le fond des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec des taches violâtres, annulaires.

De Sierra-Leone.

120. NYMPHALE Honorius.

NYMPHALIS Honorius.

Nym. alis integerrimis, cœruleis : anticis apice atris costâque fuscâ ; posticis basi nigro punctatis, apice stratis. FAB.

Papilio N. Honorius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 151. n°. 464.

Papilio Honorius. JON. Fig. piçt. 6. tab. 67. fig. 1.

Le dessus des quatre ailes est bleu. Les supérieures ont le sommet très-noir, avec la côte d'un brun-obscur & terminée vis-à-vis du sommet par une rangée de taches bleues. Les ailes inférieures ont le bord terminal noir.

Le dessous des quatre ailes est obscur, avec des points bleus à la base & à l'extrémité des premières; avec des points noirs à la base des secondes, & des raies de cette couleur à leur extrémité.

Elle habite....

(Traduction de Fabricius.)

121. NYMPHALE Cyina.

NYMPHALIS Cyina.

Nym. alis supra virefcenti-cæruleis : subtus flavidis, strigis duabus marginalibus, alterâ punctiformi, alterâ undulatâ, fuscis.

Elle n'est peut-être aussi qu'une variété de la nymphe *Véronique*.

Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoisé-luisant, avec tout le bord terminal des supérieures, & le sommet des inférieures, d'un brun-obscur.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-jaunâtre, avec quelques taches lie-de-vin-foncé vers la base; & une rangée transverse de points noirs, puis une ligne ondulée de cette couleur, à l'extrémité.

De la côte occidentale d'Afrique.

122. NYMPHALE Atlita.

NYMPHALIS Atlita.

Nym. alis dentatis, fuscis, cæruleo micantibus: subtus fulvis, strigis undatis glaucis, posticis ocellis quinque cæcis. FAB.

Papilio N. Atlita. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 37. n. 388.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 97. n. 300.*

Elle est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre à rellet violet, avec trois taches fauves, presque marginales, aux inférieures.

Le dessous des quatre ailes est d'un fauve-obscur, avec des raies violâtres, transverses & ondulées. Indépendamment de cela, les ailes supérieures ont vers le sommet un point violâtre, distinct; & les inférieures cinq yeux sans prunelle, yeux qui prennent une teinte violâtre du côté du bord postérieur.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

123. NYMPHALE Gnidie.

NYMPHALIS Gnidia.

Nym. alis corticinis: anticis utrinquè fuscisâ punctisque apicis albis; posticis supra fuscisâ fulvâ nigro maculatâ.

Papilio N. Gnidia? alis dentatis, testaceis: anticis apice fuscis fuscisâ albâ; posticis strigâ fulvâ lunulis nigris. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 157. n. 422.*

Papilio Gnidia? JON. *Fig. pict. 5. tab. 57. fig. 2.*

Papilio Gnidia? DONOV. *Of an Epitome of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 9. pl. 3. fig. 2.*

Nous n'avons vu qu'un seul échantillon de cette espèce, encore étoit-il en mauvais état.

Son envengure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des premières ailes est d'un brun-tanné vers la base, avec deux anneaux noirâtres; d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avec une bande blanche se dirigeant du milieu de la côte à l'angle interne, & une rangée transverse de quatre points blancs faisant face au sommet.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-tanné, avec une bande fauve, transverse, postérieure, courbe, dentée à son côté interne, & chargée dans toute sa longueur d'une double série de taches noires, dont les antérieures triangulaires, les postérieures lunulées.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que l'origine du bord d'en haut est marquée de blanc.

Le dessous des secondes ailes est un peu plus pâle que le dessus, avec un point noir à la base, puis quatre raies violâtres, transversales, dont les deux antérieures linuées, les deux autres, notamment l'avant-dernière, formées par des points.

Prise dans l'expédition du capitaine Baudin.

N. B. L'individu décrit par Fabricius & figuré par Donovan diffère du nôtre en ce que le dessous des secondes ailes n'offre qu'une seule rangée de points blancs, & en ce que ces points sont appuyés chacun sur un point noir.

124. NYMPHALE Doriclee.

NYMPHALIS Doriclea.

Nym. alis latefcenti-fuscis, supra strigis duabus punctorum nigrorum: posticis subtus puncto bascos atro.

Papilio S. Doriclea, alis repandis, fuscis: posticis fasciâ fulvâ nigro punctatâ, subtus puncto atro. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 248. n. 772.*

Papilio Doriclea. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 56. fig. 5. 6.*

Papilio Doriclea. JON. *Fig. pict. 4. tab. 71. fig. 1.*

Elle a environ deux pouces d'envengure. Le dessus des ailes est d'un brun-jaunâtre, avec deux rangs de points noirâtres, placés parallèlement au bord postérieur sur un fond plus clair. Les premières ailes ont en outre, vers l'origine de la côte, quelques petites lignes transverses, également noirâtres.

Le dessous des quatre ailes est à peu près du même brun que le dessus, avec quelques lignes noirâtres, transverses, à la base des supérieures; & une semblable, mais plus longue, à la base des inférieures. Ces dernières ont un gros point noir vers l'origine de leur bord interne.

Des Indes, selon Fabricius.

De Sierra-Leone, selon Drury.

125. NYMPHALE *Lyfandra*.

NYMPHALIS Lyfandra.

Nym. alis integris, lutescenti-fufcis, fuprà ftrigis duabus punctorum nigriorum, fubtus unicâ alborum.

Papilio Lyfandra. STOLL, *Pap. Suppl. à GRAM.* pl. 29. fig. 5 & 3. C.

Elle fe diftingue du *Doriclée* en ce qu'elle a les ailes plus arrondies & traversées en deffous par une rangée poférieure de points blancs; en ce que de ce même côté les lignes noires de la bafe des fupérieures & le point de la bafe des inférieures font encadrés de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

126. NYMPHALE *Auge*.

NYMPHALIS Auge.

Nym. alis fuprà lutescenti-fufcis: anticis ftrigibus viridibus, poflicis ferie punctorum nigrorum.

Papilio S. Auge, alis dentatis, fufcis: anticis fufcis viridibus; poflicis fulvâ nigro maculata, fubtus puncto bafeos atro. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 248. n° 775.*

Papilio Auge. JON. *Fig. piâ. 4. tab. 71. fig. 2.*

Papilio Auge. DONOV. *Of an Epitome of the Nat. Hift. Inf. of India, cah. 2. pl. 2. fig. 4.*

Elle a le port & la taille du *Doriclée*. Le deffus de fes ailes eft auffi d'un brun-jaunâtre. Les premières ont trois raies vertes, tranfverfales; les fécondes ont parallèlement au bord poférieur, qui eft un peu plus clair que le refte de la furface, une rangée de points noirs.

Le deffous de toutes les ailes eft nuancé de ferrugineux & de violâtre, & la bafe des inférieures offre un point d'un noir-foncé.

Des Indes, félon les auteurs cités da la fynonymie.

127. NYMPHALE *Hefpérus*.

NYMPHALIS Hefperus.

Nym. alis repandis, fufcis, nigro undatis: anticis punctis quatuor albis. FAB.

Papilio F. Hefperus. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 47. n° 145.*

Papilio Hefperus. JON. *Fig. piâ. 4. tab. 75. fig. 1.*

Le corps eft obfcure. Les quatre ailes font brunâtres, avec des ondes plus foncées. Les ailes fupérieures ont, vers le bord, quatre points blancs, appuyés fur des points noirs; & le long du bord même une raie noire, oncée, plus diftincte.

Le deffous eft plus pâle que le deffus.

Elle habite.....

(Traduction de Fabricius.)

128. NYMPHALE *Chremès*.

NYMPHALIS Chremes.

Nym. alis integerrimis, obfcuris: poflicis rubris, fuprà fufcis atris, fubtus puncto medio nigro. FAB.

Papilio F. Chremes. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 47. n° 144.*

Papilio Chremes. JON. *Fig. piâ. 5. tab. 72. fig. 2.*

Le corps eft de moyenne grandeur, brun, avec les antennes jaunâtres. Les premières ailes font d'un brun-foncé, avec deux bandes près de la bafe, & l'extrémité, noirâtres. Leur deffous eft prefque comme le deffus, mais plus clair.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un rouge-obfcure, avec deux bandes noires, dont l'une court derrière le milieu, l'autre arquée & fe liant par des veines noires au bord terminal qui eft auffi de cette couleur. En deffous les mêmes ailes font rouffâtres, avec un petit point blanc, difcoidal.

De l'Afrique.

(Décrite d'après Fabricius.)

129. NYMPHALE *Mirus*.

NYMPHALIS Mirus.

Nym. alis repandis, fufcis, testaceo fufcicatis: poflicis fubtus bafi fufcis, apice variegatus. FAB.

Papilio F. Mirus. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 48. n° 146.*

Fabricius la décrit ainfi: elle a le port de l'*Hefperus*. Le corps eft obfcure. Les ailes font également obfcures, avec plusieurs bandes d'une couleur tannée, & dont quelques-unes maculaires.

Le deffous des ailes fupérieures eft brunâtre, avec des bandes jaunes, & la partie interne variée de cendré, de brun & de bleu.

Le deffous des ailes inférieures eft brun à la bafe, varié à l'extrémité.

Elle fe trouve.....

130. NYMPHALE *Méléagris*.

NYMPHALIS Meleagris.

Nym. alis fuprà fufcis, fubtus lutescentibus; utrinquè albo multipunctatis.

Papilio N. Meleagris, alis fubdentatis, albo punctatis, fuprà fufcis, fubtus flavescens. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 128. n° 395.*

Papilio Meleagris. GRAM. pl. 66. fig. A. B.

Ccc 2

Papilio Meleagris. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 27. fig. 5. 4.*

Papilio Meleagris. HERBST, *tab. 145. fig. 1. 2.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une multitude de points blancs, dont les antérieurs épars, les autres formant trois rangées courbes, parallèles entr'elles & au bord postérieur. Il y a en outre quelques lignes blanches, transversales, à la base des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-fauve, avec des points blancs comme en dessus, mais ceux de la rangée intermédiaire ont le milieu, & tous les autres le pourtour, noirs.

Décrite sur un individu pris à Sierra-Leone.

151. NYMPHALE Dédale.

NYMPHALIS Dædalus.

Nym. alis integris, supra fuscis, albo multipunctatis: subtus pallidè brunneis, immaculatis.

Papilio F. Dædalus, alis integerrimis, fuscis, albo maculatis: subtus brunneis. FAB. *Syfl. Ent. p. 482. n. 174. — Spec. Inf. tom. 2. p. 57. n. 230. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n. 289. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 35. n. 162.*

Elle a le port & approchant la taille du *Méléagris*. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur. Les premières ont des taches blanches, dont les quatre antérieures lunulées & plus grandes, les autres en forme de points & disposées sur trois rangs de points bleuâtres, chargés chacun d'un point noir.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-pâle, sans taches. Le corps est entièrement obscur.

De la Guinée.

152. NYMPHALE Mélantha.

NYMPHALIS Melantha.

Nym. alis dentatis, supra fuscis, albo punctatis: subtus brunneis. FAB.

Papilio N. Melantha. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 128. n. 594.*

Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec quelques lignes blanches à la base, & trois rangs de points de cette couleur vers l'extrémité.

Le dessous est brun, avec une rangée postérieure de points plus obscurs.

De la Guinée.

(Traduction du texte de Fabricius.)

155. NYMPHALE Marthe.

NYMPHALIS Martha.

Nym. alis dentatis, fusco sulvoque variis:

anticis lunulis ternatis, posticis fuscis, albis. FAB.

Papilio N. Martha. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 139. n. 429.*

Elle est de moyenne taille. Les antennes sont noires, avec la base de la massue blanche. Les ailes supérieures sont tachetées de fauve & de brun, & elles ont, vers le bord terminal, des lunules blanches, disposées sur trois rangs, dont l'antérieur commun aux secondes ailes. Celles-ci sont fauves, variées de brun, avec une bande (parfois une raie) blanche, transverse, discoidale: vers leur bord postérieur il y a une ligne noire, ondée, placée contre le rang de lunules blanches dont nous avons parlé.

Le dessous de toutes les ailes est pâle, fascié de blanc, avec la base & des litières noires.

Du royaume de Siam.

(Décrite d'après Fabricius.)

154. NYMPHALE Absalon.

NYMPHALIS Absalon.

Nym. alis integerrimis, fulvis, fusco fasciatis: subtus aurantis, fusco undatis. FAB.

Papilio F. Absalon. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 56. n. 175.*

Voici ce qu'en dit Fabricius: le corps est petit, brun. Le dessus des quatre ailes est d'un fauve-obscur, avec des bandes plus obscures. Leur dessous est d'un jaune-orangé, avec plusieurs ondes noirâtres.

De la Guinée.

155. NYMPHALE Amulia.

NYMPHALIS Amulia.

Nym. alis supra fuscis, immaculatis: subtus luteis, posticis strigis tribus punctisque cæruleis, nigro notatis.

Papilio N. Amalia, alis dentatis, supra fuscis, subtus flavis: posticis strigis duabus punctisque cæruleis, nigro notatis. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 129. n. 593.*

Papilio Amalia. JON. *Fig. pict. 5. tab. 11. fig. 1.*

Papilio Amulia. CRAM. *pl. 180. fig. C. D.*

Papilio Amulius. HERBST, *tab. 140. fig. 3. 4.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun légèrement chatoyant, & sans taches. Leur dessous est d'un jaune-fauve, avec le bord postérieur des quatre, deux raies transverses & une rangée de points sur les inférieures, d'un bleu-violet. Les raies & les points des ailes inférieures sont marqués de noir,

& il y a deux taches de cette couleur vis-à-vis du sommet des supérieures.

Décrite d'après un seul individu pris à Sierra-Leone.

156. NYMPHALE Haquinus.

NYMPHALIS Haquinus.

Nym. alis subintegris, fuscis: subtus aurantiis, maculis cœrulescenti-argenteis nigro notatis. FAB.

Papilio F. Haquinus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 53. n^o. 169.*

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par la description de Fabricius.

Il est de moyenne taille. Les antennes sont obscures, annelées de gris, avec la massue noire & terminée de fauve. Le corps est brun. Les ailes sont à peine sinuées, d'un brun-noirâtre en dessus, sans taches & sans reflet, mais avec une légère teinte jaunâtre aux supérieures.

Le dessous des quatre ailes est fauve, avec des taches d'un argenté-bleuâtre, nombreuses, éparfes, marquées de noir. Il y a en outre, le long du bord postérieur, deux lignes blanchâtres, interrompues. Les pieds sont jaunâtres.

Trouvé à Tranquebar.

157. NYMPHALE Amasia.

NYMPHALIS Amasia.

Nym. alis suprà argenteo-virescentibus, apice saturatiore: subtus gramineis, punctis marginalibus nigris, ocellatis.

Papilio N. Amasia, alis dentatis, viridibus: posticus suprà punctis marginalibus nigris, subtus ocellaribus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 136. n^o. 419.*

Papilio Amasia. JON. *Fig. pict. 5. tab. 15. fig. 2.*

Papilio Eupale. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 6. fig. 3.*

Elle a presque deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-argenté-luisant, terminé aux supérieures par un grand espace triangulaire d'un vert-obscur, & aux inférieures par une bande nébuleuse sur laquelle il y a une rangée de points noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-pré, avec quelques taches rouilleuses sur le milieu, de légères nuances argentées au bord interne & vers l'extrémité. Il y a en outre six à sept points noirs, ocellés, le long du bord postérieur des secondes ailes, & deux vis-à-vis du sommet des premières. Le corselet est d'un vert-olivâtre, l'abdomen d'un vert-blanchâtre. Les antennes sont verdâtres; les palpes bruns en dessus, blancs en dessous.

Décrite d'après un individu mâle & unique, pris sur la côte occidentale d'Afrique.

N. B. La figure de Drury est si mauvaise que, sans le texte qui l'accompagne, on ne sauroit pas qu'elle représente cette espèce.

158. NYMPHALE Démétra.

NYMPHALIS Demetra.

Nym. alis integris, suprà fuscis obsoleteque obfcurius fuscatis, subtus glaucis: anticis margine apicis albo.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, chatoyant, avec quatre bandes transverses plus obscures, mais néanmoins peu prononcées.

Le dessous est d'un vert-argenté, avec une bande olivâtre, large, commençant au sommet des ailes supérieures, & allant se perdre vers l'extrémité du bord interne des inférieures. Celles-ci ont une tache blanchâtre sur le milieu du bord antérieur. Les premières ont l'origine de la côte blanche, & le bout de leur sommet est de cette couleur en dessus & en dessous.

De l'Afrique occidentale.

159. NYMPHALE Argénissa.

NYMPHALIS Argenissa.

Nym. alis integris, suprà æneo-cœrulescentibus, subtus obscurè virescentibus, utrinque strigis quinque undulatis nigris.

Papilio Argenissa. STOLZ, *Suppl. à CRAM. pl. 27. fig. 4 & 4. C.*

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-bronzé, avec cinq lignes noires, transverses & ondulées, plus courtes sur les inférieures que sur les supérieures.

Le dessous est d'un vert-obscur, avec des lignes comme en dessus, mais il n'y en a que quatre aux ailes de devant, & celles des ailes de derrière traversent entièrement la surface.

De la Cafrerie.

140. NYMPHALE Médon.

NYMPHALIS Medon.

Nym. alis dentatis, suprà æneo-nigris: anticis fasciâ obliquâ, posticis disco, inaurato seu cœrulescenti-viridibus.

Papilio E. A. Medon, alis suprà nigris: primis fasciâ lateâ apiceque albo; posticis disco cœrulescentibus. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 733. n^o. 43.* — *Annua. Acad. tom. 6. p. 402. n^o. 53.*

Papilio N. Janassa, alis dentatis, suprà nigris, fasciâ flavâ discoque cœrulescente: singulis sub-

tis punctis tribus atris. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 781.
— *Muf. Lud. Utr.* p. 294. n^o. 112.

Papilio N. Medon. FAB. *Syfl. Ent.* p. 456. n^o. 55. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 22. n^o. 89. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 11. n^o. 102. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 81. n^o. 254.

Papilio N. Janassa, alis repandis, viridiceneis : anticis punctis nigris : subtus flavescensibus, punctis basæos nigris. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 49. n^o. 487. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 121. n^o. 571.

Papilio Medon. CLERCK, *Icon. tab.* 28. fig. 1.

Papilio Medon. GRAM. *pl.* 205. fig. B. C.

Papilio Medon. HERBST, *Pap. tab.* 150. fig. 4. 5.

Papilio N. Ceres, alis dentatis, nigris : anticis fuscis à albâ, posticis disco cærulescente puncto atro. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 90. n^o. 596. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 11. n^o. 104. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 82. n^o. 256.

Papilio Lucille. GRAM. *pl.* 156. fig. A. C.

Papilio N. Cato, alis dentatis, nigris, disco communi iridescente : subtus nigro punctatis, posticis maculâ basæos rusâ. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 11. n^o. 105. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 85. n^o. 258.

Papilio Cyparissa. GRAM. *pl.* 59. fig. D. E.

Papilio Cyparissa. GRAM. *pl.* 156. fig. B.

Papilio Cyparissa. HERBST, *Pap. tab.* 159. fig. 1. 2. 3.

Cette nymphale varie beaucoup. Aussi Linnæus en a-t-il fait deux espèces, & Fabricius quatre.

Son envergure est de trois pouces à trois pouces & demi. Toutes ses ailes font plus ou moins dentées, selon le sexe, & finement bordées de blanc aux échancrures. Leur dessus est d'un noir-verdâtre, avec le milieu des inférieures, à prendre de leur origine, & la majeure partie du bord interne des supérieures, d'un vert-métallique, tirant tantôt sur le bleuâtre, tantôt sur le jaunâtre. Les premières ailes, dont le sommet a le bout blanc de part & d'autre, offrent, entre le milieu de la côte & le milieu du bord terminal, une bande oblique de l'une des nuances vertes que nous venons d'indiquer.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-verdâtre-luisant, avec des taches noires, dont sept à huit, tant rondes qu'allongées vers la base; les autres disposées sur deux rangs le long du bord postérieur, mais obliquées ou manquant quelquefois, comme dans le *Janassa* de Linnæus. Dans certains individus, tels que le *Medon* & le *Ceres* de Fabricius, on voit reparoître la bande oblique du dessus des premières aile, & les secondes ont les

taches noires de leur base éclairées en dehors par de petits rayons blanchâtres. Dans d'autres individus, comme le *Cato* du même auteur, ou *Cyparissa* de Cramer, la bande des ailes de devant ne se reproduit pas ou est absorbée par le fond qui en est plus vert; & les ailes de derrière ont le milieu d'un jaune-fauve, avec la naissance de la côte glacée de rouge-violet. Il est des femelles où la base des quatre ailes est rouge en dessous; & des mâles qui, de ce côté, n'ont pas de rouge aux premières ailes, tandis qu'ils en ont sur la plus grande partie du bord antérieur & du disque des secondes. Enfin, quelques-uns des points noirs de la naissance des ailes percent parfois en dessus: ou bien il y en a trois à la base des supérieures, comme dans le *Janassa* de Fabricius; ou bien un seul à la base des inférieures, comme dans le *Ceres* du même auteur. Le corps est noir, avec les palpes & l'extrémité des antennes fauves. Celles-ci sont noires.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que la forme & le dessin des ailes font toujours les mêmes, & que les différences tiennent uniquement aux couleurs. Or, ces différences n'étant pas constantes, on ne peut point, ce nous semble, les regarder comme caractéristiques.

De la côte de Guinée.

141. NYMPHALE FRANCINE.

NYMPHALIS Francina.

Nym. alis dentatis, supra œneo-nigris : anticis fuscis à obliquâ iridescente ; posticis disco maculâque marginalibus cærulescenti-viridibus.

Elle a bien du rapport avec le *Medon*. Mais ce qui l'en distingue surtout, c'est que le dessus des secondes ailes a parallèlement au bord terminal une rangée de six à sept taches rondes d'un vert-bleuâtre, & sur le milieu deux points noirs, dont le postérieur très-gros: c'est que le dessous de toutes les ailes est d'un vert beaucoup plus sombre & sans éclat; que les taches noires y sont moins nombreuses, puisqu'il n'y en a que deux ou au plus quatre vers la base, & que celles du bout ne forment qu'une seule rangée.

De la côte de Guinée.

142. NYMPHALE ERITHONIUS.

NYMPHALIS Erithonius.

Nym. alis dentatis, supra fuscis : posticis fuscis à violaceo-cærulescente, ad angulum am dilatâ.

Papilio F. Eupalus, alis integerrimis, fuscis ; posticis fuscis à cæruleâ : subtus viridibus puncto atro. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 54. n^o. 241. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 27. n^o. 279. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 48. n^o. 148.

Papilio N. Erithonius, alis dentatis, nigris; posticis fasciâ caruleâ: subtus viridibus strigâ punctorum alborum. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n.º. 105. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 82. n.º. 255.*

Papilio Harpalycæ. CRAM. *pl. 145. fig. D. E.*

Papilio Medon. DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 15. fig. 1. 2.*

Fabricius a donné cette espèce comme *Danaïde bigarrée* sous le nom d'*Eupalus*, & comme *Nymphale* sous celui d'*Erithonius*.

Elle est un peu plus grande que les deux précédentes. Ses quatre ailes sont plus ou moins finées, selon le sexe. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, jettant un léger reflet doré, avec une bande d'un bleu-violet-pâle aux inférieures. Cette bande est placée transversalement au-delà du milieu, & aboutit à l'angle anal, aux approches duquel elle s'élargit d'une manière sensible. Quelquefois même, elle anticipe un peu sur les premières ailes. Celles-ci ont la côte faiblement violâtre, & leur sommet, qui a toujours le bout blanc de part & d'autre, est précédé parfois d'une ligne ou d'une bande jaunâtre, oblique.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-pâle & luisant, avec un ou deux points noirs près de la base, & une rangée transverse de points blanchâtres sur le milieu. Le corps est brun. Les palpes sont fauves, avec la fommite obscure.

De la côte de Guinée.

N. B. C'est à cette espèce que doit être rapporté le *Medon* de Drury, & non pas au *Medon* de Linnæus, comme l'ont dit certains auteurs.

145. NYMPHALE Narva.

NYMPHALIS Narva.

Nym. alis dentatis, atris, strigâ posticâ punctorum alborum: anticis maculis, posticis disco, flavis. FAB.

Papilio S. Narva. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 249. n.º. 775.*

Papilio Narva. JON. *Fig. pict. 4. tab. 67. fig. 1.*

Fabricius place cette espèce parmi les *Satyres*, tandis qu'il fait une *Nymphale* de la suivante qui en est très-voisine.

Le corps est noir, ponctué de blanc. Les premières ailes sont d'un noir-foncé, avec quatre taches jaunes, & une rangée postérieure de points blancs. Les secondes ailes, qui ont une semblable rangée de points, sont également d'un noir-foncé, avec le milieu jaune & marqué d'un ou deux points noirs.

Le dessous ressemble au dessus, mais derrière la rangée de points blancs, il y a une raie jaune, maculaire & transverse.

De l'Afrique.

(Traduction de Fabricius.)

144. NYMPHALE Perséa.

NYMPHALIS Perséa.

Nym. alis dentatis, utrinquè nigris, disco communi testaceo: anticis maculis duabus fasciæque, posticis punctis marginalibus, ochraceis.

Papilio N. Perséa, alis dentatis, oblongis, atris, flavo maculatis, disco communi rubro. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 157. n.º. 425.*

Papilio Perséa. JON. *Fig. pict. 5. tab. 90. fig. 2.*

Papilio Perséis. DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 21. fig. 5. 4.*

Papilio Perséis. HERBST, *tab. 157. fig. 5. 6.*

Elle a environ trois pouces d'envergure. Les premières ailes sont noires, avec la majeure partie du bord interne d'un fauve-briquéte: on voit en outre sur leur milieu deux taches orbiculaires, & vis-à-vis de leur sommet une bande oblique, d'un jaune d'ocre. Les secondes ailes sont d'un fauve-briquéte, avec les bords antérieur & postérieur noirs: le bord postérieur est coupé par une série arquée de points jaunes, & les échancrures sont blanches, ainsi que celles du bord correspondant des ailes supérieures. Le dessous de ces premières ailes est tout-à-fait semblable au dessus.

Le dessous des secondes ailes ne diffère du dessus que parce qu'il a un point noir vers la base, & que la couleur briquéte passe au jaune d'ocre près de la côte. Le corps est noir en dessus & tacheté de jaune depuis la tête inclusivement jusqu'à l'anus. Les antennes sont noires; les palpes fauves, avec la fommite obscure.

De Sierra-Leone. — Fabricius la dit des Indes. *N. B.* Nous n'avons vu que des mâles.

145. NYMPHALE Eléus.

NYMPHALIS Eleus.

Nym. alis dentatis, utrinquè testaceis, apice æneo, anticarum fasciâ, posticarum punctis in simplici serie, albis.

Papilio F. Eleus, alis integerrimis, fulvis, margine atro, anticarum fasciâ, posticarum punctis, albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 51. n.º. 156.*

Papilio Eleus. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 12. fig. 1. 2.*

Papilio Eleus. JON. *Fig. pict. 5. tab. 22. fig. 2.*

Il seroit difficile de dire pourquoi Fabricius a mis cette espèce parmi les *Danaïdes bigarrées*, lorsque le *Perséa*, qui s'en rapproche si fort, est pour lui une *Nymphale*.

Elle a le port & la taille de la précédente. Les quatre ailes sont faiblement dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur dessus est d'un fauve-

foncé, avec tout le contour extérieur d'un noir-bronzé. Vis-à-vis du fommet des supérieures, où cette couleur s'étend davantage, il y a une bande blanche, oblique, coupée par les nervures. Les secondes ailes ont, sur le noir du bord postérieur, une rangée courbe de gros points blancs.

En dessous, on retrouve les caractères du dessus, mais le noir y est très-pâle, & les secondes ailes offrent, parallèlement à la côte, une bande blanche, continue & un peu arquée. Le corps est noir en dessous, avec des taches d'un blanc-bleuâtre sur la tête, sur le corselet & sur les côtés de l'abdomen. Les antennes sont noires; les palpes fauves, avec la sommité obscure.

Fabricius dit qu'elle est de l'Amérique, mais on la trouve à Sierra-Leone.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Dans le nombre, il s'en est rencontré un dont le dessous offroit trois points noirs à la base des ailes supérieures, & un seul à celle des inférieures.

146. NYMPHALE JANAIS.

NYMPHALIS Janais.

Nym. alis subdentatis, nigris: anticis utrinque albo punctatis: posticis supra disco rubro, subtus basi flavâ, nigro punctatâ.

Papilio Janais. DRURY, *Inf. 5. pl. 17. fig. 5. 6.*

Elle est de la taille du *Sémire*. Les quatre ailes sont noires de part & d'autre, & liserées de blanc aux échancrures. Les supérieures, dont les deux surfaces se ressemblent, ont une quinzaine de points blancs, épars.

Le dessus des inférieures a une tache rouge, grande, discoïdale, orbiculaire. Leur dessous en a également une rouge, mais beaucoup plus petite, précédée immédiatement d'un espace jaune sur lequel il y a des taches noires, & suivie d'un rang de points blancs. Le corps & les antennes sont noirs, & la tête est ponctuée de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

147. NYMPHALE SÉMIRE.

NYMPHALIS Semire.

Nym. alis subdentatis, fuscis, fasciâ utrinque viridi, interruptâ: posticis ad angulum anti ferrugineo maculatis: subtus omnibus basi luteis, nigro punctatis.

Papilio N. Semire, alis dentatis, subconcoloribus, fasciâ viridi flavoque maculatis, basi fulvis nigro punctatis. FAB. *Spec. inf. tom. 2. p. 88. n.º. 591.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 48. n.º. 472.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 114. n.º. 351.*

Papilio Semire. CRAM. *pl. 194. fig. B. C.*

Papilio Hyppolite. DRURY, *Inf. 5. pl. 14. fig. 5. 4.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec des points noirs à la base, & une bande maculaire & transverse d'un vert-cladon sur le milieu. La bande des premières ailes est précédée & suivie de points de sa couleur; celle des secondes ailes s'appuie sur un rang de taches ferrugineuses.

Le dessous offre les mêmes caractères que le dessus, mais les points noirs de la base des quatre ailes se détachent sur un fond d'un jaune-fauve, & il y a tout le long de leur bord postérieur des points blanchâtres, oblongs, longitudinaux, rapprochés deux à deux contre chaque nervure.

De la côte de Guinée.

148. NYMPHALE LUCRÉTIA.

NYMPHALIS Lucretia.

Nym. alis subdentatis, fuscis, fasciâ utrinque albâ, interruptâ: subtus basi luteis, nigro punctatis.

Papilio Lucretia. CRAM. *pl. 45. fig. C. D.*

Papilio Lucretia. HERBST, *tab. 241. fig. 3. 4.*

Elle a le port & la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bande blanche, commune, discoïdale, & interrompue. Cette bande est précédée intérieurement aux premières ailes de deux ou trois points de sa couleur.

Le dessous diffère du dessus en ce que la bande fasciée est plus large & plus claire; en ce que le bord terminal offre une série de petites taches blanches; en ce que la base de toutes les ailes est d'un jaune-fauve, avec des points noirs, surtout aux inférieures. Le corps est noirâtre, & entièrement ponctué de blanc en dessous.

De la côte de Guinée.

149. NYMPHALE SULPITIA.

NYMPHALIS Sulpitia.

Nym. alis dentatis, nigris, fasciâ communi albâ: posticis subtus flavescensibus, punctis basibus nigris, fasciâ media punctifera apicis albis. FAB.

Papilio S. Sulpitia. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 245. n.º. 765.*

Papilio Sulpitia. JON. *Fig. pict. 5. tab. 50. fig. 1.*

Ce lépidoptère est peut-être le même que le *Lucretia*, du moins il paroît s'en rapprocher infiniment.

Voici ce qu'en dit Fabricius: le dessus des quatre ailes est d'un noir-luisant, avec une bande blanche, commune, mais interrompue sur les supérieures. Le dessous de ces dernières ailes ressemble au dessus. Le dessous des inférieures est jaune

à la base, avec des points noirs; puis blanc; enfin fauve, avec des veines noires, & une rangée transversale de points blancs.

Fabricius le dit des Indes, mais il doit être de l'Afrique.

150. NYMPHALE Hostilia.

NYMPHALIS Hostilia.

Nym. alis dentatis, subconcoloribus, fulvis, basi nigro maculatis: anticarum apice fusco punctis flavescens.

Papilio N. Hostilia, alis dentatis, fuscis, basi fulvis nigro punctatis: anticarum apice flavo maculatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 150. n.º 599.*

Papilio Hostilia. DRURY, *Inf. tom. 5. pl. 28. fig. 5. 6.*

Papilio Hostilia. JON. *Fig. pict. 5. tab. 81. fig. 1.*

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un fauve-brun, avec des taches à la base des supérieures, & des lignes transversales à celle des inférieures, noires. Les premières ont à peu près la moitié postérieure d'un brun-noirâtre & parsemée de points jaunâtres. Les secondes ont une bordure noire, dentée, avec un rang de lunules fauves.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais il est beaucoup plus pâle vers la base. Le corps est noirâtre, avec deux croissans roux sur le corselet.

De Sierra-Leone en Afrique.

151. NYMPHALE Assimilée (1).

NYMPHALIS Assimilis.

Nym. alis subintegris, concoloribus, nigris, lineis albo-virescentibus: posticis ad apicem strigâ macularum coccinearum.

Papilio N. Assimilis, alis subrepandis, nigris, concoloribus, punctis cærulescenti-albidis: posticis punctis coccineis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 782. n.º 194. — Mus. Lud. Ulr. p. 500. n.º 118.*

Papilio N. Assimilis. FAB. *Syst. ent. p. 511. n.º 280. — Spec. Inf. tom. 2. p. 101. n.º 444. — Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n.º 540.*

Papilio E. A. Assimilis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 59. n.º 114.*

Papilio Assimilis. CLERCK, *Icon. tab. 16. fig. 1. 2.*

Papilio Assimilis. CRAM. *pl. 154. fig. A.*

(1) N'ayant pas d'adjectif pour rendre le mot *assimilis*, nous avons employé le participe.

Papilio Assimilis. DRURY, *Inf. tom. 1. pl. 17. fig. 5. 4.*

Papilio Assimilis. HERBST, *Pap. tab. 126. fig. 4. 5.*

Papilio Assimilis. ESP. *Pap. exot. tab. 57. fig. 1.*

Fabricius avoit d'abord placé cette espèce parmi les *Nymphales*, auxquelles elle appartient réellement; mais il l'a mise ensuite parmi les *Chevaliers*, dont se compose notre genre *PAPILLON* proprement dit.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont noires de part & d'autre, avec des lignes d'un vert-blanchâtre, convergentes à la base, & des points du même vert alignés sur le bord postérieur. Les lignes des premières ailes sont interrompues; celles des secondes sont entières, & séparées des points marginaux par une série transversale de cinq taches écarlates, elliptiques, dont l'anale double, les deux suivantes ayant le milieu noir, la cinquième ou l'extérieure plus petite que toutes les autres. Le corps est noir, avec des lignes verdâtres le long du ventre, des points blancs sur la tête & sur la poitrine.

De la Chine.

152. NYMPHALE Disippe.

NYMPHALIS Disippe.

Nym. alis denticulatis, fulvis, venis limboque posteriori albo maculato nigris: posticis strigâ nigra, recurvâ.

Papilio F. Misippus, alis repandis, fulvis, margine nigro, albo punctato: posticis arcu nigro. FAB. *Syst. ent. p. 481. n.º 171. — Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n.º 244. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n.º 285. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 50. n.º 155.*

Papilio Archippus. CRAM. *pl. 16. fig. A. B.*

Fabricius l'a rapportée mal-à-propos à notre *Misippe* ou *Misippus* de Linnæus.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec les nervures & les bords noirs. Le bord terminal est chargé de deux rangs de points blancs, dont les extérieurs plus petits & placés sur les échancrures. Vis-à-vis du sommet des premières ailes, où la couleur noire se dilate, il y a encore trois points blancs, suivis d'une bande maculaire & transversale de quatre taches fauves. Les secondes ailes sont traversées au-delà du milieu, & de la côte à l'angle anal, par une ligne noire, courbée en arrière.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus en ce que tout le fond des inférieures & les taches fauves du sommet des supérieures sont plus pâles; en ce que les points intérieurs du bord terminal sont remplacés par une double série de lunules

blanches; enfin, en ce qu'il y a deux taches de cette dernière couleur à l'origine de la côte des ailes de devant. Les antennes sont noires, ainsi que le corps; celui-ci est ponctué de blanc sur la tête, sur la poitrine & sur le ventre.

On la trouve à la Guyane & dans plusieurs parties de l'Amérique septentrionale.

Nous n'avons pas vu la femelle.

153. NYMPHALE Missippe.

NYMPHALIS Missippe.

(Voyez p. 188. n^o. 40.)

Nym. alis dentatis, fulvis, margine posteriori nigro macularum albarum serie duplici: posticis suprâ maculâ nigrâ, subtis tribus.

Papilio D. F. Missipus. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 767. n^o. 118. — *Muf. Lud. Utr.* p. 264. n^o. 83.

Papilio Diocippus. CRAM. *pl.* 28. *fig.* B. C.

Papilio Inaria. CRAM. *pl.* 214. *fig.* A. B. (Fem.?)

Papilio Diocippus. HERBST, *Pap. tab.* 155. *fig.* 5. 4.

Papilio Inaria. HERBST, *Pap. tab.* 157. *fig.* 5. 6.

Nous avons placé conditionnellement cette espèce parmi les *Danaïdes*. Nous l'en retirons aujourd'hui, parce que les palpes, & l'ouverture de la cellule discordale des secondes ailes, nous font voir que c'est une *Nymphale*.

Elle a pour identique le *Diocippus* de Cramer. L'*Inaria* du même iconographe en est peut-être la femelle; car il n'en diffère que par la grosseur du corps, par moins de noir & par le manque de bande blanche au sommet des ailes supérieures: encore aperçoit-on la trace de cette bande.

On la trouve, avec l'*Inaria*, dans les îles de Java & d'Amboïne.

154. NYMPHALE Callisto.

NYMPHALIS Callisto.

Nym. alis dentatis, fusco-nigris: posticis utrinque fuscâ fulvâ maculis septem ovatis, atris, cœruleo pupillatis.

Papilio N. Callisto, alis dentatis, atris: posticis fuscâ sanguineâ ocellis suprâ quinque, subtis septem. FAB. *Gen. Inf. Mant.* 265. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 86. n^o. 581. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 46. n^o. 459. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. *pars* 1. p. 109. n^o. 558. (Le mâle.)

Papilio Callisto. CRAM. *pl.* 24. *fig.* A. B.

Papilio Callisto. HERBST, *Pap. tab.* 219. *fig.* 5. 4.

SEBA, *Muf. tom.* 4. *tab.* 44. *fig.* 12. 15.

La Palatine. DAUBENTON, *pl. entom.* 20. *fig.* 2. 5.

Papilio N. Pipleis, alis crenatis, nigris, concoloribus: posticis disco fulvo ocellis septem. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 775. n^o. 159. — *Muf. Lud. Utr.* p. 285. n^o. 103. (La femelle.)

Papilio N. Pipleis. FAB. *Syfl. ent.* p. 499. n^o. 242. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 84. n^o. 568. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 45. n^o. 444. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. *pars* 1. p. 103. n^o. 524.

Papilio Pipleis. CLERCK, *Icon. tab.* 26. *fig.* 2. 5.

Papilio Pipleis. CRAM. *pl.* 60. *fig.* A. B.

Papilio Pipleis. HERBST, *Pap. tab.* 219. *fig.* 1. 2.

SEBA, *Muf. tom.* 4. *tab.* 46. *fig.* 15.

Papilio Pandarus. ESP. *Pap. exot. tab.* 40. *fig.* 1.

Le *Callisto* & le *Pipleis* des auteurs ne font bien certainement qu'une espèce, dont le premier est le mâle, le second la femelle.

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un noir-ensumé, & traversé, entre le milieu & le bord postérieur des secondes ailes, par une bande fauve que divise dans toute sa longueur une rangée courbe de sept taches très-noires, grandes, ovales, ayant toutes, même l'anale qui est double & plus petite, un point bleu sur leur milieu. Dans le mâle, la bande fauve dont il vient d'être question est moins large, & surmonté immédiatement d'une grande tache lilas, un peu luisante. Celui-ci a aux premières ailes, en alignement des taches oculaires des secondes, une rangée de sept à huit points violâtres. Ces points se retrouvent aux premières ailes de la femelle; mais, outre qu'ils y sont plus gros, ils y sont encore accompagnés d'une bande & de taches d'un blanc-jaunâtre. La bande est maculaire, courte, placée transversalement au milieu de la surface; les taches longent le bord postérieur sur deux rangs: celles du rang inférieur sont réniformes, celles du rang extérieur lunulées.

Le dessous des deux sexes ne diffère du dessus de la femelle que parce qu'il est généralement plus pâle; parce que les premières ailes ont, vers l'origine de la côte, quelques points & des atomes blancs, & les secondes un cordon de lunules blanchâtres, terminales. Les échancrures du bord postérieur ont le milieu blanc. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes font noires.

Des îles de Java & d'Amboïne.

N. B. Fabricius dit que les secondes ailes de son papillon *Callisto* ont une bande d'un rouge-sanguin (*fuscâ sanguineâ*). C'est sans doute une faute typographique dont il ne s'est pas aperçu,

car toutes les figures auxquelles il renvoie rendent cette bande comme elle est dans la nature.

Esper appelle le mâle *Pandarus*, & il donne le nom de *Pseudo-Pandarus* au véritable *Pandarus* de Linnæus.

155. NYMPHALE *Lafinaffa*.

NYMPHALIS Lafinaffa.

Nym. alis dentatis, subtus fuscis, apice punctis, maculis sagittatis lunulisque albidis: alis omnibus suprâ (mas) maculâ mediâ albo-violaceâ.

Papilio N. Lafinaffa, alis dentatis, atris, maculâ cyanâ, n' tidâ: subtus fuscis, lunulis albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 127. n° 386.* (Le mâle.)

Papilio Lifsianaffe. CRAM. *pl. 205. fig. A. B.*

Papilio Auge. CRAM. *pl. 190. fig. A. B.*

Papilio Lifsianaffe. HERBST, *tab. 245. fig. 1. 2.*

Papilio Auge. HERBST, *tab. 244. fig. 1. 2.*

Papilio Auge. CLERCK, *Icon. tab. 21. fig. 1. 2.*

Papilio N. Nerina, alis dentatis, atris, fuscis albâ: anticarum terminatâ maculâ rufâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 133. n° 410.* (La femelle.)

Papilio Nerina. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf of Asia, pl. 27. fig. 1.*

Papilio Iphigenia. CRAM. *pl. 67. fig. D. E.* (Var. fem.)

Papilio Proserpina. CRAM. *pl. 218. fig. C. D.* (Var. fem.)

Papilio Alcmena. CRAM. *pl. 67. fig. A.* (Var. fem.)

Papilio Antigone. CRAM. *pl. 67. fig. C.* (Var. fem.)

Papilio Manilia. CRAM. *pl. 255. fig. A. B.* (Var. fem.)

Papilio Porphyria. CRAM. *pl. 255. fig. C. D.* (Var. fem.)

Papilio Eriphile. CRAM. *pl. 376. fig. A. B.* (Var. fem.)

Papilio Melita. CRAM. *pl. 28. fig. D. E.* (Var. fem.)

Papilio Iphigenia. HERBST, *tab. 246. fig. 3. 4.*

Papilio Alcmena. HERBST, *tab. 246. fig. 5.*

Papilio Antigone. HERBST, *tab. 247. fig. 1.*

Papilio Melita. HERBST, *tab. 242. fig. 3. 4.*

Papilio Porphyria. HERBST, *tab. 159. fig. 1. 2.*

Papilio Eriphile. HERBST, *tab. 159. fig. 3. 4.*

Papilio Manilia. HERBST, *tab. 158. fig. 5. 6.*

Papilio Proserpina. HERBST, *tab. 158. fig. 7. 8.*

Ce lépidoptère a depuis deux pouces & demi jusqu'à quatre pouces d'envergure; mais la taille la plus ordinaire est de trois pouces & un quart.

Le dessus du mâle est d'un brun-noir, & présente vers le milieu de chaque aile une tache blanche, entourée d'un resset violet, & coupée par les nervures. La tache des ailes inférieures est arrondie, celle des supérieures oblongue & oblique. Il y a en outre, au sommet de celles-ci, une tache semblable, mais beaucoup plus petite; &, à l'angle anal de celles-là, quelques atomes bleuâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une bande blanchâtre, discoidale, oblique, derrière laquelle font trois rangées courbes & parallèles de taches dont les intérieures bleuâtres & en forme de points, les intermédiaires blanchâtres & comme sagittées, les extérieures en croiffans & de la couleur des précédentes. La base des premières ailes est plus ou moins ferrugineuse, avec la côte noire, ponctuée & saupoudrée de blanc. Les secondes ailes ont encore trois taches blanchâtres, savoir: une orbiculaire à l'extrémité supérieure de la bande discoidale, & deux lunulées à son extrémité inférieure. Indépendamment de cela, les échancrures de toutes les ailes sont bordées de blanc.

La femelle, que Fabricius a donnée sous le nom de *Nerina*, & dont Cramer a fait huit espèces, comme on le voit dans la synonymie, la femelle, disons-nous, ressemble au mâle en dessous. Elle en diffère en ce qu'elle est d'un brun moins noir, & toujours traversée à l'extrémité par trois séries de taches correspondantes à celles du dessous; en ce que la grande tache du milieu des ailes supérieures est remplacée par une bande maculaire, tantôt blanche, tantôt violâtre, tantôt rouillâtre, & au bas de laquelle il y a le plus souvent un espace fauve; en ce que les ailes inférieures ont sur le milieu une bande transverse qui est fauve dans certains individus, blanche & bordée de bleuâtre ou de rouillâtre dans d'autres, toute bleue, mais à peine dissimulée dans quelques-uns. Cette bande, lorsqu'elle est fauve, communique parfois sa couleur aux taches de l'extrémité, sans néanmoins en altérer la forme. Le corps est d'un brun-noirâtre dans les deux sexes, avec des points blancs sur la tête, sur la poitrine & sur le ventre. Les antennes sont noires, avec la sommité d'un roux-vif.

De Java & de quelques-unes des Molouques.

156. NYMPHALE *Liria*.

NYMPHALIS Liria.

Nym. alis dentatis, subtus fuscis, apice punctis, fuscis intus crenatâ lunulifque albidis: alis

omnibus supra (mas) maculâ mediâ albo-violaceâ.

Papilio N. Liria, alis dentatis, atris, maculâ albo-cyaneâ omnibusque strigâ punctorum: subtus fuscis, fasciâ albidâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 126. n^o. 385. (Le mâle.)

Papilio Alcithoe. CRAM. pl. 80. fig. A. B.

Papilio Alcithoe. HERBST, tab. 243. fig. 3. 4.

Papilio F. Jacintha, alis repando-dentatis, fuscis: anticis strigâ punctorum alborum; posticis apice albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 60. n^o. 187. (Fem.?)

Papilio N. Avia, alis dentatis, subconcoloribus, nigris, strigâ punctorum, fasciâque maculari marginali pallidis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 111. n^o. 342. (Fem.?)

Papilio Jacintha. DRURY, tom. 2. pl. 21. fig. 1. 2.

Papilio Perimale. CRAM. pl. 65. fig. C. D.

Papilio Perimale. CRAM. pl. 67. fig. B.

Papilio Velleda. CRAM. pl. 349. fig. C. D. (Var. fem.)

Papilio Perimale. HERBST, tab. 241. fig. 5. 6. 7.

Papilio Velleda. HERBST, tab. 242. fig. 3. 4.

SEEA, Musf. 4. tab. 41. fig. 21. 22.

Le mâle de cette espèce ressemble en dessus au mâle de la précédente, mais le milieu de ses ailes est marqué d'une tache plus grande, plus vivement glacée de violet, & leur extrémité offre trois séries de taches, dont les intermédiaires moins apparentes. Il y a en outre des atomes bleus vers l'origine de la côte des ailes supérieures.

Le *Jacintha* de Fabricius ou *Perimale* de Cramer, que nous soupçonnons être la femelle, a le dessous des ailes d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité un peu plus claire, & divisée par trois rangs de taches d'un blanc-sale. Les taches du rang intérieur sont en forme de points, celles du rang extérieur en forme de lunules. Les taches intermédiaires composent par leur rapprochement une bande crénelée à son côté interne, & sensiblement plus large aux secondes ailes qu'aux premières. Celles-ci ont des atomes bleus vers la naissance de la côte, & une petite bande violette, plus ou moins distincte, au-delà du milieu.

Le dessous des deux sexes est comme dans le *Lafinassa*, avec cette différence que les taches qui précèdent immédiatement les lunules marginales sont plus longues & crénelées à leur côté interne; caractère constant qui empêchera de prendre une espèce pour l'autre.

Du Bengale & de l'île d'Amboine.

N. B. Le *Velleda* de Cramer ne paroît différer du *Jacintha* que parce que le dessous de ses premières ailes a des atomes bleus vers l'angle interne.

Quant au papillon *Avia*, c'est le même que le *Jacintha*. Il se trouve à Amboine, & non cu Afrique, comme le dit Fabricius.

157. NYMPHALE Bolina.

NYMPHALIS Bolina.

Nym. alis dentatis, subtus corticinis, fasciâ alba; posticarum liturâ nigrâ apicibus notata: alis omnibus supra (mas) maculâ mediâ violaceo-albâ.

Papilio N. Bolina, alis dentatis, nigris: primoribus maculis duabus, posticis solitariâ albo-cæruleis. LINN. Syst. Nat. 2. p. 781. n^o. 188. — Musf. Lud. Ultr. p. 295. n^o. 115.

Papilio N. Bolina. FAB. Syst. Entom. p. 507. n^o. 269. — Spec. Inf. tom. 2. p. 95. n^o. 414. — Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n^o. 499. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 126. n^o. 384.

Papilio Bolina. CLERCK, Icon. tab. 21. fig. 3. 4.

Papilio Bolina. CRAM. pl. 65. fig. E. F.

Papilio Bolina. DRURY, tom. 1. pl. 14. fig. 1. 2.

Papilio Bolina. HERBST, tab. 244. fig. 3. 4.

SEEA, Musf. 4. tab. 25. fig. 15. 16.

Nous ne connoissons que le mâle de cette espèce. Il ressemble beaucoup au mâle du *Lafinassa*. Mais ce qui l'en distingue principalement, c'est que la tache du dessus de ses quatre ailes est plus grande & moins glacée de violet; que la bande qui traverse en dessous leur milieu est plus large & plus continue; c'est qu'en outre celle des inférieures est marquée à chaque extrémité d'une liture noire.

De Cayenne.

158. NYMPHALE Aliména.

NYMPHALIS Aliména.

Nym. alis dentatis, subconcoloribus, nigris, fasciâ communi mediâ maculisque marginalibus in triplici serie cæruleis.

Papilio N. Aliména, alis dentatis, atris, fasciâ cæruleâ interruptâ: singulis punctis septem albidis, marginalibus. LINN. Syst. Nat. 2. p. 780. n^o. 178. — Musf. Lud. Ultr. p. 291. n^o. 109.

Papilio N. Aliména. FAB. Syst. Ent. p. 509. n^o. 279. — Spec. Inf. tom. 2. p. 98. n^o. 452. — Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n^o. 526. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 154. n^o. 412.

Papilio Alimena. CLERCK, *Icon. tab. 31. fig. 1. 2.*

Papilio Alimena. CRAM. *pl. 221. fig. A. B. C.*

Papilio Alimena. HERBST, *tab. 245. fig. 1. 2.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 11. fig. 13. 14.*

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-chaoyant, avec une bande bleue, commune, discoïdale, arquée, derrière laquelle sont trois cordons de taches également bleues, & dont les intérieures en forme de coins, les extérieures lunulées & placées vis-à-vis des échancrures, lesquelles sont bordées de blanc de part & d'autre.

Le dessous offre le même dessin que le dessus; mais le fond est brun, la bande & les taches font d'un blanc-bleuâtre, & la côte des ailes supérieures est ponctuée & saupoudrée de blanc vers son origine. Le corps est de la couleur des ailes, avec des points blancs sur la tête & sur la poitrine. Les antennes sont noires avec la sommité rouffâtre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que la bande du dessus de ses ailes est d'un bleu-verdâtre, & que les taches de l'extrémité sont presque blanches.

De Java & d'Amboine.

159. NYMPHALE Salmafis.

NYMPHALIS Salmafis.

Nym. alis dentatis, supra nigris, disco caeruleo radiatis: subtus fuscis, fuscis strigata maculari albidis. (Fem.)

Papilio N. Salmafis, alis dentatis, atris, caeruleo radiatis: subtus fuscis fuscis albi. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 132. n. 408.*

Papilio Salmafis. DRURY, *tom. 2. pl. 8. fig. 1. 2.*

Papilio Salmafis. JON. *Fig. pict. 5. tab. 65. fig. 1.*

Papilio Salmacis. HERBST, *tab. 166. fig. 5. 6.*

Papilio Omphale. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 26. fig. 1 & 1. A.*

Nous n'avons vu que la femelle de cette espèce. Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec une bande commune & discoïdale, ayant la majeure partie du côté interne blanc, & tout le côté externe d'un bleu-ardoisé qui s'étend en rayons jusqu'au bord postérieur. Ce bord offre des points blancs, dont les intérieurs oblongs & disposés en une ligne arquée, les extérieurs placés sur les échancrures.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec deux rangs de points marginaux comme en dessus, & une bande d'un blanc-violetâtre. La bande des premières ailes descend du milieu de la côte

à l'angle postérieur; celle des secondes ailes atteint le milieu du bord interne & le bout du bord antérieur. Le corps est de la couleur des ailes, avec des points blancs sur la tête & sur la poitrine.

De la Guinée, suivant Drury.

D'Amboine, suivant Stoll.

160. NYMPHALE Antilope.

NYMPHALIS Antilope.

Nym. alis denticulatis, fuscis, limbo postico utrinque strigis tribus punctorum alborum: anticis supra (mas) apice violaceo micantibus.

Papilio Antilope. CRAM. *pl. 183. fig. E. F.*

Papilio Antilope. HERBST, *tab. 242. fig. 5. 6.*

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois rangées terminales de points blancs ou bleuâtres, dont les intérieurs ronds, les autres un peu en forme de lunules & plus rapprochés entr'eux.

Le dessous est comme le dessus, excepté que la côte des premières ailes est ponctuée & saupoudrée de blanc vers son origine, & que le milieu de la côte des secondes offre une tache blanchâtre, plus grosse que les points arrondis avec lesquels elle s'aligne. Le corps est brun, avec des points blancs sur la tête & sur la poitrine. Les antennes sont noirâtres, avec la sommité ferrugineuse.

Le dessus du mâle jette un reflet violet vers l'extrémité des premières ailes. Le dessous de la femelle est plus pâle dans cette partie que vers la base.

Il est des individus des deux sexes qui ont de part & d'autre une éclaircie blanchâtre entre le milieu & la première rangée de points des ailes inférieures.

De Java & des Moluques.

161. NYMPHALE Vitellia.

NYMPHALIS Vitellia.

Nym. alis denticulatis, fuscis: subtus punctis discoïdalibus lineolisque marginalibus caeruleo-centi-albis.

Papilio N. Vitellia, alis dentatis, nigris: subtus albo maculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 48. n. 474. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 115. n. 353.*

Papilio Vitellia. CRAM. *pl. 349. fig. E. F.*

Elle a entre trois pouces & demi & quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, tantôt aboloué sans taches, tantôt avec deux points arrondis & deux taches ovales d'un ton violetâtre vers le sommet des supérieures.

Le dessous est également d'un brun-obscur, avec une dizaine de gros points d'un blanc-bleuâtre

épars sur le milieu, & un assez grand nombre de petits traits de cette couleur à la base & sur le bord terminal de chaque aile. Ce bord a les sinus blancs. Le corps est brun, avec des points blancs sur la tête. Les antennes sont noires.

D'Amboine.

162. NYMPHALE EURINOME.

NYMPHALIS Eurinome.

Nym. alis subdentatis, concoloribus, nigris, maculis permixtis posticarumque disco bascos albis.

Papilio N. Eurinome, alis dentatis, nigris, albo maculatis: posticis basi albis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 101. n. 445.* — *Mant. Inf. tom. p. 54. n. 558.*

Papilio F. Eurinome. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 57. n. 173.*

Papilio Eurinome. GRAM. *pl. 70. fig. A.*

Papilio Eurinome. HERBST, *tab. 125. fig. 1.*

Son envergure est d'environ quatre pouces. Elle a le dessus noir, avec des taches blanches de différentes formes, éparées sur toute la surface des ailes supérieures, disposées sur trois rangs à l'extrémité des inférieures. Celles-ci ont en outre tout le milieu blanc, à partir de la base.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que l'origine des quatre ailes est d'un brun-rougâtre. Le corps est jaunâtre, avec le corselet noir.

Des Indes orientales.

165. NYMPHALE? PHILOMÈLE.

NYMPHALIS Philomela.

Nym. alis repandis, nigris, albo maculatis: posticis basi flavo radiatis. FAB.

Papilio F. Philomela. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 57. n. 179.*

Papilio Philomela. JON. *Fig. piç. 3. tab. 46. fig. 1.*

Fabricius la décrit de la manière suivante : elle a les plus grands rapports avec l'*Eurinome*, mais elle forme une espèce séparée & distincte. Les premières ailes, dont le dessous ressemble au dessus, sont noires, avec des points & des lignes blancs. Les secondes ailes sont sinuées, noires, avec des rayons jaunes à la base, & des points blancs à l'extrémité.

Des Indes.

164. NYMPHALE? PINTHÆUS.

NYMPHALIS Pinthæus.

Nym. alis integerrimis, fuscis, concoloribus :

primoribus maculis tribus flavis; posticis dimidiato albis. LINN.

Papilio D. F. Pinthæus. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 766. n. 114.* — *Mus. Lud. Utr. p. 258. n. 77.*

Papilio F. Pinthæus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n. 242.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n. 280.* — *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 48. n. 149.*

Linnaeus place ce lépidoptère parmi les *Danaïdes bigarrées*, & le décrit de la manière suivante : il est de quatrième taille. Le corps est obscur, les antennes sont noirâtres. Les premières ailes font d'un brun-obscur, avec trois taches jaunes, dont l'antérieure oblongue & contiguë à la base; la suivante, grande, transverse, oblique, discoïdale; la troisième, petite & avoisinant le sommet. Les secondes ailes sont entières, & elles ont la moitié antérieure blanche, la moitié postérieure noirâtre. La couleur blanche prend une teinte jaunâtre en approchant de la couleur noire.

Linnaeus le dit des Indes. C'est ainsi qu'il s'exprime ordinairement lorsqu'il ne connoit pas la véritable patrie d'une espèce exotique.

165. NYMPHALE? ZOÏLE.

NYMPHALIS Zoilus.

Nym. alis integerrimis, atris: anticis maculis tribus, posticis disco, albis. FAB.

Papilio F. Zoilus. FAB. *Syst. Ent. p. 480. n. 163.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n. 250.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 25. n. 265.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 42. n. 128.*

Les antennes sont noires, le corselet & l'abdomen bruns & tachetés de blanc. Les ailes supérieures sont d'un noir-brun, avec trois taches, & un point vers le bord postérieur, blancs. Leur dessous ressemble au dessus, mais la base offre une petite ligne, & l'extrémité cinq points, blancs.

Les ailes inférieures sont noires, avec le dessus blanc. Leur dessous est comme le dessus, excepté que le noir du limbe terminal est ponctué de blanc.

De la Nouvelle-Hollande.

(Traduction de Fabricius.)

166. NYMPHALE SIVA.

NYMPHALIS Siva.

Nym. alis integris: anticis suprâ nitidâ fuscis, virescenti multumaculatis; subtis costâ bascos maculisque tribus argenteis.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu unique & mutilé.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses premières ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec la base ferrugineuse, une vingtaine de taches d'un vert-bleuâtre, & le bout

du sommet blanchâtre. Le dessous des secondes ailes est d'un ferrugineux à reflet purpurin, avec une rangée de taches orbiculaires, & le bord postérieur, plus foncés.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-tanné, pâle & luisant, avec des taches obscures, dont les unes éparées vers la base, les autres formant un cordon en avant du bord terminal & suivies d'une ligne ondulée également obscure. Les ailes supérieures ont en outre des taches argentées, savoir : une linéaire & longitudinale à l'origine de la côte, & trois disposées en une petite bande transverse au-delà de son milieu.

Il habite. . . .

167. NYMPHALE ? Sophus.

NYMPHALIS Sophus.

Nym. alis integerrimis : anticis nigris, disco fulvo, nigro maculato ; posticis fuscis, punctis strigatae nigris. FAB.

Papilio F. Sophus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 46. n° 141.*

Papilio Sophus. JON. *Fig. pict. 4. tab. 72. fig. 1.*

Elle est de moyenne taille. Ses premières ailes font noires, avec le milieu fauve, & marqué de plusieurs taches, dont une jaune, les autres noires. Leur dessous est varié de cendré & de jaune à la base, vert à l'extrémité.

Les secondes ailes font d'un brun-obscur, avec plusieurs points, & une ligne postérieure, noirs. Leur dessous est gris, avec une tache jaune à la base ; une bande verte courte, plus trois points jaunes sur le milieu, & le bord terminal verdâtre.

Elle habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

168. NYMPHALE ? Sifannus.

NYMPHALIS Sifannus.

Nym. alis integerrimis, atris, albo punctatis, fasciâ communi albâ : anticarum abbreviata. FAB.

Papilio F. Sifannus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 44. n° 152.*

Papilio Sifannus. JON. *Fig. pict. 2. tab. 44. fig. 1.*

Le corps est noir. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-brun, avec une bande blanche, transverse, discoïdale, veinée de noir, n'atteignant pas la côte. Derrière cette bande, il y a une ou deux lignes transverses de points blancs.

Le dessous est comme le dessus, excepté que les ailes inférieures sont ponctuées de roux à la base, & que la bande de leur milieu est jaune.

Elle habite. . . .

(Décrite d'après Fabricius.)

169. NYMPHALE Polyno.

NYMPHALIS Polyno.

Nym. alis subdentatis, supra tefluaceis disco ochraceo : anticis apice, posticis maculis fasciâ ocellaribus, nigris.

Papilio Polixena. GRAM. *pl. 54. fig. A. B.*

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-briqueté à la base, avec quelques petites taches noires ; traversé au milieu par une bande d'un jaune d'ocre pâle ; noir à l'extrémité, avec quelques points rouillâtres faisant face au sommet. Le dessous des secondes ailes est d'un fauve-briqueté, avec un espace jaunâtre sur le milieu, & une rangée de six taches noires, orbiculaires & marquées chacune d'une lunule blanche, en avant du bord postérieur.

Le dessous des quatre ailes est nuancé de brun & de jaunâtre, & l'on voit sur les inférieures un cordon de six lunules blanches correspondant à celles du dessus.

De la Chine.

N. B. Décrite d'après un individu unique.

170. NYMPHALE Æropus.

NYMPHALIS Æropus.

Nym. alis subdentatis, fuscis, utrinquâ fasciâ communi luteâ aut albâ : anticis subtis ocellis basibus carulescente.

Papilio D. F. Æropus, alis integerrimis, fuscis, fasciâ luteâ : primoribus subtis basi oculo unico. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 758. n° 128. — Mus. Lud. Ulr. p. 256. n° 75. (Le mâle.)*

Papilio Æropa. CLERCK, *Icon. tab. 59. fig. 1. 2.*

Papilio D. F. Æropus. FAB. *Syst. Ent. p. 486. n° 190. — Spec. Inf. tom. 2. p. 64. n° 287. — Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n° 552.*

Papilio N. Æropus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 154. n° 475. (Le mâle.)*

Papilio Æropus. HERBST, *tab. 152. fig. 5. 4. (Le mâle.)*

Papilio Æropus. HERBST, *tab. 153. fig. 1. 2. (La femelle.)*

Papilio Æropa. GRAM. *pl. 111. fig. F. G. (Le mâle.)*

Papilio Æropa. GRAM. *pl. 254. fig. A. B. (La femelle.)*

SEBA, *Mus. 4. tab. 9. fig. 3. 4.*

Linnaeus & Fabricius n'ont connu que le mâle de cette espèce.

Elle a entre trois & quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec

une bande d'un jaune-orangé dans le mâle, blanche ou d'un blanc un peu jaunâtre dans la femelle. La bande des premières ailes est bifide antérieurement dans les deux sexes; elle est en outre maculaire dans la femelle.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-pâle ou jaunâtre, avec une bande comme en dessus, & quelques taches bleuâtres, dont la plus antérieure oculaire.

Le dessous des secondes ailes est conflagrant d'un brun-jaunâtre, & traversé par une bande semblable à celle du dessus. La base offre en outre des taches noirâtres, entrecoupées de bleuâtre, & il y a parallèlement au bord postérieur une rangée de sept points noirs, plus ou moins gros.

D'Amboine.

171. NYMPHALE Tulbagh.

NYMPHALIS Tulbaghia.

Nym. alis subdentatis, fuscescentibus : anticis utrinquè fasciis duabus luteis, posticis unicâ serieque ocellorum.

Papilio N. Tulbaghia, alis dentatis, subconcoloribus, fuscescentibus, fasciâ lutea : posticis ocellis quinque. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 775. n°. 158. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 284. n°. 102. (Le mâle.)

Papilio N. Tulbaghia. FAB. *Syst. Ent.* p. 499. n°. 241. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 83. n°. 567. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 45. n°. 445. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 105. n°. 525.

Papilio Tulbaghia. CRAM. *pl.* 3. *fig.* E. F. (Le mâle.)

Papilio Tulbachius. HERBST, *tab.* 214. *fig.* 5. 6.

Cette nymphale a été dédiée par Linnæus à son ami Tulbagh, gouverneur du Cap de Bonne-Espérance.

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-ferrugineux vers la base; d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avec deux bandes fauves & transversales sur les supérieures, avec une seule sur les inférieures. La bande postérieure des ailes de devant est composée de taches pour la plupart orbiculaires, & l'antérieure est fortement interrompue vers le bord d'en haut. La bande des secondes ailes s'aligne à la bande antérieure des premières, & elle à le côté externe précédé d'une suite de quatre yeux noirs, dont les deux intermédiaires rapprochés l'un de l'autre, l'anal plus petit & bipupillé. Ces yeux ont l'iris jaunâtre, la prunelle d'un bleu-violet avec le milieu blanc. Parallèlement au bord terminal, qui est blanchâtre & légèrement denté, il y a une double raie d'un brun-obscur.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus en ce que le fond & les bandes sont beaucoup plus

pâles; en ce que les supérieures ont, en approchant de la base, une tache jaunâtre, transversale, tache qu'on voit de part & d'autre dans la femelle; enfin, en ce que les ailes inférieures ont vers leur origine quelques lignes noires, ondulées, & à leur extrémité cinq yeux colorés comme ceux du dessus, mais à double iris. Le corps & les antennes sont bruns.

De la Caferie.

172. NYMPHALE Lubentina.

NYMPHALIS Lubentina.

Nym. alis subdentatis, fusco-virescentibus : anticis utrinquè fasciâ albâ, maculari; posticis apice punctis chermesinis, serie duplici digefitis.

Papilio N. Lubentina, alis dentatis, obscurè virescentibus, albo, nigro rufoque maculatis. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 91. n°. 405. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 49. n°. 486. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 121. n°. 570.

Papilio Lubentina. CRAM. *pl.* 155. *fig.* C. D.

Papilio Lubentina. HERBST, *tab.* 146. *fig.* 1. 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes sont faiblement dentées, d'un vert-obscur, particulièrement vers la base. Les premières, dont le dessous ressemble à peu près au dessus, ont entre le milieu & le bord postérieur une bande blanche, maculaire, transversée & très-étroite dans le mâle; oblique, large & bifide dans la femelle. Il y a en outre vis-à-vis de leur sommet une ligne transversée de trois à quatre points blancs; vers le milieu de leur bord antérieur deux taches rouges, bordées de noir; & à leur base deux points de cette dernière couleur.

Le dessus des secondes ailes offre à son origine un point & un anneau noirs; à son extrémité deux rangs parallèles de sept taches noires, lesquelles ont le milieu d'un rouge-carmin, à l'exception toutefois des quatrième, cinquième & sixième du second rang, à partir d'en haut. Le dessous des mêmes ailes diffère du dessus en ce que la naissance du bord antérieur & presque tout le bord interne sont d'un rouge-carmin, en ce qu'il y a près de la base quatre taches pareillement rouges & encadrées de noir.

De la Chioe.

N. B. Cramer n'a figuré que la femelle; & Fabricius, à ce qu'il paroît, a décrit un individu altéré, puisqu'il dit, en parlant des ailes : *rufo maculatis.*

173. NYMPHALE Adonia.

NYMPHALIS Adonia.

Nym. alis subdentatis, fusco-virescentibus, utrinquè

utrinquè fasciâ communi albâ : posticis apice punctis chermesinis, serie unicâ digestis.

Papilio Adonia. CRAM. *pl.* 255. *fig.* C. D.

Papilio Adonius. HERBST, *tab.* 257. *fig.* 1. 2.

A en juger par l'individu que Cramer a figuré, & que nous croyons être une femelle, ce Lépidoptère ne se distingue du précédent qu'en ce que la bande blanche des premières ailes se prolonge de part & d'autre jusqu'au bord interne des secondes, & remplace sur ces mêmes ailes la rangée intérieure de taches noires à centre rouge.

De Java, selon Cramer.

174. NYMPHALE EVELINA.

NYMPHALIS Evelina.

Nym. alis integris, suprâ œneis, fuscâ mediâ futuratiore : anticis utrinquè maculâ basæos carneâ, posticis subtus duabus.

Papilio Evelina. STOLL, *Suppl.* à CRAM. *pl.* 28. *fig.* 2. et 2. B.

Elle est de la taille du *Lubentina*. Le dessus de ses ailes est d'un vert-bronzé, avec une bande plus foncée sur le milieu. Les supérieures ont en outre, vers l'origine de la côte, une tache d'un incarnat vif & encadrée de noir.

Le dessous des quatre ailes est d'un vert-blanchâtre, avec deux bandes olivâtres, dont une discoïdale; l'autre terminale, plus large, & chargée d'un rang de gros points blanchâtres. La tache incarnate des premières ailes reparoît ici, & les secondes en ont deux semblables à la base, sans compter quelques anneaux noirs dont l'empreinte est visible en dessus. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noires.

Du Bengale.

N. B. Nous n'avons vu qu'un seul individu de cette espèce.

175. NYMPHALE du Peuplier.

NYMPHALIS Populi.

Nym. alis subdentatis, suprâ fuscis, fuscâ maculari albâ, serie lunularum sulvarum strigatæ geminâ cærulefcente.

Papilio N. Populi, alis dentatis, fuscis, albo fasciatis maculatisque : subtus luteis, albo sufficiatis, maculis cærulefcentibus. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 776. n° 162. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 277. n° 1055.

Papilio medicæ magnitudinis, elegantissima, alis : supinis nigris cum areâ transversâ albâ : pronis variis coloribus depictis. RAI. *Inf.* 127. n° 5.

UDDMAN, *Diff.* 54. *fig.* 15.

Hist. Nat. Inf. tom. LX.

CLERCK, *Act. Holm.* 1752. p. 278. *tab.* 7.

Papilio N. Populi. FAB. *Syst. Ent. p.* 502. n° 251. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 87. n° 586. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 47. n° 466. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars.* 1. p. 111. n° 345.

ROES. *Inf. part.* 1. *tab.* 51. *fig.* 1. 5. (La chenille & la chrysalide.)

ROES. *Inf. part.* 3. *tab.* 55. *fig.* 1. 2. (Le papillon.)

Papilio Populi. ESP. *part.* 1. *tab.* 12. *fig.* 1.

Papilio Populi. ESP. *part.* 1. *tab.* 51. *Suppl.* 7. *fig.* 1.

ESP. *Pap.* *tab.* 106. *cont.* 61. *fig.* 1-4. (La chenille & la chrysalide.)

ESP. *Pap.* *tab.* 114. *cont.* 69. *fig.* 1. 2. (*Papilio Populi.*) *fig.* 3. 4. (*Papilio Tremulæ.*)

Papilio Populi. BERGESTR. *Nomencl. tab.* 15. *fig.* 1-4. — *tab.* 19. *fig.* 1-4. — *tab.* 51. *fig.* 1-5.

Papilio Populi. HERBST, *tab.* 254. *fig.* 1. 2.

PANZ. *Faun. Germ.* 28. 22.

Papilio Populi. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 5. et 195. n° 1. — *part.* 2. p. 185.

BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 254. n° 42.

SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 141. n° 74.

Papilio Semirani. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom.* 2. *part.* 1. p. 188. n° 1525.

Papilio Populi. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom.* 2. p. 189. n° 1526.

Papilio Populi. FUESSL. *Suiff. Inf.* p. 29. n° 571.

Papilio Populi. ROSSI, *Faun. Etruf. tom.* 2. p. 150. n° 1015.

Papilio Populi. BRAHM, *Inf. Calend.* p. 429. n° 500.

Papilio Populi. LANG. *Verz.* 2. p. 50. n° 215-218.

Papilio Populi. SCHWARZ, *Raup. Calend.* p. 42.

Papilio Populi. WIEN. *Verz.* p. 172. *sum.* H. n° 1.

Papilio Populi. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 207. n° 1.

ILLIG. *Magaz.* tom. 5. p. 202. — tom. 4. p. 58.

Papilio Populi. HUBN. *tab.* 23. *fig.* 108. (Le mâle.) *fig.* 109. 110. (La femelle.)

Papilio Populi. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 145. n° 5.

Le Sylvain. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 26. *pl.* 9. *fig.* 10. a-d. (Le mâle.)

Le grand Sylvain. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 27. pl. 10. fig. 11. a-d. (La femelle.)

ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 255. pl. 57. *Suppl. 3. fig. 11. e. f.* (Var.)

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont légèrement dentées. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, transverse, difcoïdale, puis une rangée de lunules fauves, & ensuite deux lignes marginales d'un bleu-ardoisé. La bande des premières ailes est maculaire, tortueuse, accompagnée de quatre à cinq taches pareillement blanches, dont une intérieure, quadrangulaire, appuyée obliquement sur la côte entre deux taches rouffes plus ou moins apparentes; les autres extérieures, plus petites, formant un arc transversal vis-à-vis du sommet. La bande des secondes ailes est oblique, coupée par les nervures, toujours plus large & plus claire dans les femelles que dans les mâles. Ceux-ci n'ont même assez souvent que la bande des ailes supérieures; encore manque-t-elle dans quelques individus, ainsi que la tache blanche qui la précède du côté de la base.

Le dessous diffère du dessus en ce qu'il est d'un fauve-gai, excepté vers le bord interne des ailes supérieures, où la couleur brune se reproduit; en ce que le bord correspondant des inférieures est d'un bleu-cendré; en ce qu'il y a près de la base des quatre une tache de cette nuance, & en avant de leur bord terminal une rangée de points noirs qui remplacent les lunules fauves de la surface opposée. Les échancrures des ailes sont blanches de part & d'autre. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue fauve.

Cette espèce est propre aux contrées septentrionales de l'Europe, & habite les grands bois, où il y a du tremble & du peuplier-blanc. Elle n'aime que les chemins battus, parce que, recherchant la sienne des bestiaux, & surtout celle des vaches, elle en trouve plus facilement la qu'ailleurs. Fabricius dit qu'elle est fort commune en Russie. Il paroît qu'elle ne l'est guère moins dans la forêt de Mormale (département du Nord); car elle y a été prise abondamment par MM. de Brecourt & de Villiers, officiers qui consacrent avec fruit leurs momens de loisir à l'étude de l'entomologie. Elle fréquente aussi les forêts de Compiègne, de Senlis, de Fontainebleau, d'Arnainvilliers, de Senart; mais elle est rare aux environs de Paris. Elle n'a encore été trouvée qu'une seule fois à Saint-Germain, & c'est à M. Ménétrics, élève naturel au Jardin des Plantes, que l'on en doit la découverte. Pour l'avoir fraîche, il faut le la procurer entre le dix & le vingt juin, du moins dans nos climats. Elle plane plutôt qu'elle ne vole. On ne doit jamais la poursuivre, attendu qu'elle a

l'habitude de revenir à l'endroit d'où elle est partie, & que, quand elle est posée, on peut l'attraper à la main, sans l'endommager.

La chenille est verte, nuancée de brun, avec la tête & l'anus fauves ou rougeâtres. L'anus est un peu fourchu. Le dos offre des éminences charnues & épineuses, dont les deux antérieures plus grandes, les deux postérieures un peu recourbées en arrière. Elle vit sur le tremble & sur les peupliers noir & blanc.

La chrysalide est ovoïde, obtuse antérieurement, jaunâtre, mouchetée de noir, avec une bosse arrondie vers le milieu du dos.

N. B. Quelquefois la femelle a l'extrémité des secondes ailes glacée de verdâtre en dessus.

176. NYMPHALE Sibylla.

NYMPHALIS Sibylla.

Nym. alis subdentatis, supra fuscis, fuscis maculari albâ: posticis subtus basi cinereo-carnescente, nigro punctatâ.

Papilio N. Sibylla, alis dentatis, fuscis, concoloribus, fuscis albâ: subtus lutescentibus. LINN. *Syst. Nat. 2. edit. 12. p. 781. n. 186.* (Le mâle.)

Papilio N. Prorsa. LINN. *Mus. Lud. Ultr. p. 305. n. 128.* (Le mâle.)

ROES. *Inf. part. 3. tab. 70. fig. 3.*

Papilio N. Camilla, alis dentatis, fuscis, subconcoloribus, albo fuscis maculatisque, angulo ani rubro. LINN. *Syst. Nat. 2. edit. 12. p. 781. n. 187.* — *Mus. Lud. Ultr. p. 504. n. 122.* (La femelle.)

♀. *Papilio Amphion, alis dentatis, fuscis: primoribus maculis albis, tergeminis; posticis sex transversis.* LINN. *Syst. Nat. 2. edit. 10. p. 486. n. 177.*

ROES. *Inf. part. 3. tab. 55. fig. 5. 4.*

Papilio S. Sibylla, alis dentatis, supra fuscis, subtus ferrugineis nigro maculatis: fuscis utrumque maculari albâ. FAB. *Syst. Ent. p. 512. n. 294.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 102. n. 451.* — *Ment. Inf. tom. 2. p. 55. n. 547.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 246. n. 766.*

Papilio Sibylla. ESP. *part. 1. tab. 14. fig. 2. 5.*

ESP. *part. 1. tab. 106. cont. 61. fig. 6.* (La chenille.)

Papilio Sibylla. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 30. n. 577.*

Papilio Camilla. FUESSL. *Ent. Magaz. tom. 1. p. 254.*

Papilio Sibylla. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 190. n. 1527.*

- Papilio Sibylla*. HERBST, *tab.* 254. *fig.* 3-6.
Papilio Sibylla. PANZ. *Faun. Germ.* 87. 23.
Papilio Sibylla. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 24. n^o. 20. & p. 210.
 BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 255. n^o. 47.
Papilio Sibylla. SCHNEID. *Syfl. Befchr.* p. 145. n^o. 75.
Papilio Sibylla. SCHWARZ, *Raup. Calend.* p. 171. n^o. 343.
 SCHNEFF. *Icon. tab.* 155. *fig.* 1. 2.
 LANG. *Verz.* 2. p. 50. n^o. 219-221.
Papilio Sibylla. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 67. *fig.* 1-4.
Papilio Camilla. BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec.* 2. *tab.* 8. *fig.* 1-4.
Papilio Sibylla. ROSSI, *Faun. Etruf. tom.* 2. p. 155. n^o. 1025.
Papilio Rivularis. Var. 3. SCOP. *Ent. Carn.* p. 165. n^o. 443.
Papilio Sibylla. WIEN. *Verz.* p. 172. *fam.* H. n^o. 2.
Papilio Sibylla. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. p. 208. n^o. 2.
 ILLIG. *Magaz. tom.* 3. p. 204. — *tom.* 4. p. 39.
Papilio Sibylla. HUBN. *Pap. tab.* 22. *fig.* 103. (Mas.) *fig.* 104. 105. (Fem.)
 HUBN. *Larv. Lepid.* 1. *Pap.* 1. *Nymph.* D. b. *fig.* 1. a. b.
Papilio Sibylla. Var. HUBN. *Beitr. tom.* 2. *part.* 3. *tab.* 1. *fig.* B. 1. 2.
Papilio Sibylla. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 159. n^o. 3.
 Le Deuil. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 75. n^o. 45.

Le petit Silvain. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, *tom.* 1. p. 29. *pl.* 11. *fig.* 13. a-f.

ENGRAM. *Pap. d'Europe*, *tom.* 1. p. 256. *pl.* 57. *Suppl.* 3. *fig.* 13. g. h. (Var.)

Linnaeus, d'après les figures susmentionnées de Roëfel, a donné le mâle de cette espèce sous le nom de *Sibylla*, & la femelle sous celui de *Camilla*.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes sont légèrement dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche, commune & discoïdale. Cette bande est divisée sur les ailes inférieures en sept taches; & sur les supérieures en huit, dont la cin-

quième, à partir d'en haut, beaucoup plus petite & précédée en dehors d'un point de la couleur. Les premières ailes ont encore trois taches blanches, savoir: une plus ou moins distincte vers le milieu de la côte, les deux autres vers son extrémité, où elles s'alignent avec deux taches ferrugineuses. L'angle anal des secondes ailes a une tache également ferrugineuse, sur laquelle font deux points noirs.

Le dessous de toutes les ailes, excepté cependant vers l'angle interne des supérieures, est ferrugineux, avec une bande & des taches blanches comme en dessus, plus une double rangée postérieure & transverse de points noirs dont l'empreinte paraît sur la surface opposée. Ces points sont suivis extérieurement de quelques taches blanches, & les secondes ailes ont tout le bord interne d'un bleu cendré-luisant, avec la base tachetée de noir. Le corps a le dessus d'un brun-noirâtre, & le dessous d'un gris-cendré. Les antennes sont noires en dessus, avec la sommité ferrugineuse; & au contraire ferrugineuse en dessous, avec la base noirâtre.

Le dessus des femelles est un peu fouetté de roux vers l'origine des ailes supérieures.

Engramelle a représenté, *pl.* 11, *fig.* 13, e. f., une variété sans bande blanche.

Ce lépidoptère habite les bois d'une grande partie de l'Europe; mais on ne le trouve point dans le midi de la France. Il paraît depuis la mi-juillet jusqu'au commencement d'août, suivant les localités. Les amateurs parisiens se le procureront aisément à Vincennes & à Meudon. On le voit aussi quelquefois dans le parc de Boulogne, près de la porte d'Auteuil. Il se tient sur les bords des avenues, & se pose sur les fleurs de ronces, & sur la siente des bestiaux.

La chenille, d'après Esper, est verte, avec la tête, des épines dorsales & le bas du corps, rougeâtres ou ferrugineux. Les épines sont ciliées de noir. Elle vit, au dire des auteurs, sur plusieurs espèces de *chèvrefeuilles*. Nous soupçonnons qu'elle vit aussi sur le *chêne*, car nous avons vu souvent des femelles déposer leurs œufs sur les feuilles de cet arbre.

La chrysalide est anguleuse, verdâtre, avec des taches dorées.

Nota. D'après quels caractères Fabricius met-il cette espèce dans les *Satyres*, lorsque la précédente est pour lui une *Nymphale*?

177. NYMPHALE Camilla.

NYMPHALIS Camilla.

Nym. alis subdentatis, supra atro-ceruleis, fasciâ albâ maculari: posticis subtus basi cinereo-ceruleiscente, immaculatâ.

Papilio S. Camilla, alis dentatis, atris, caeruleo micantibus, fasciâ atrinquâ maculari albâ:

poplicis subtus basi argenteâ, immaculatâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n. 534. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 246. n. 767.*

Papilio Camilla. WIEN. *Verz. p. 172. fam. H. n. 2.*

Papilio Camilla. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 210. n. 5.*

ILLIG. *Mag. tom. 5. p. 188.*

Papilio Camilla. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. part. 1. p. 191. n. 1528.*

Papilio Camilla. LANG. *Verz. 2. p. 51. p. 222. 225.*

Papilio Camilla. HERBST, *tab. 255. fig. 1. 2.*

Papilio Camilla. HUBN., *Pap. tab. 22. fig. 106. 107. (Fem.)*

HUBN. *Larv. Lepid. 1. Pap. 1. Nymph. D. h. fig. 2. a. b.*

DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 16. fig. 1. 2.*

Papilio Camilla. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 142. n. 4.*

Papilio Lucilla. ESP. *part. 1. tab. 58. Suppl. 14. fig. 2.*

ESP. *tab. 106. cont. 61. fig. 5-7. (La chen. & la chryf.)*

Papilio Lucilla. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 145. n. 76.*

Papilio Lucilla. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 25. n. 21 & p. 211.*

Papilio Lucilla. SCHWARZ, *Raup. Calend. p. 190.*

Papilio Sibylla. FUESSL. *Ent. Magaz. tom. 1. tab. 2. fig. 4. 5. (La chen. & la chryf.) fig. 6. 7. (Le pap.)*

Papilio Sibylla. GRAM. *pl. 114. fig. C. D.*

Papilio Drußilla. BERGSTR. *Nomencl. tab. 67. fig. 5. 6.*

BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec. 2. tab. 8. fig. 5. 6.*

Papilio Rivularis. SCOP. *Ent. Carn. p. 165. n. 445.*

Le Silvain azuré. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 52. pl. 11. fig. 14. a. b.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 300. pl. 80. 2. Suppl. pl. 1. fig. 14. c. d. (La chen. & la chryf.)*

Elle se distingue principalement du *Sibylla* en ce que le dessus des quatre ailes, au lieu d'être d'un brun-noirâtre, est d'un bleu-foncé chatoyant & un peu verdâtre, avec une ligne transverse &

presque terminale de points d'un bleu plus clair; en ce que leur dessous n'a qu'une rangée postérieure de points noirs, lesquels sont entourés de brun-cendré aux secondes ailes; en ce que ces dernières ailes ont la base sans taches.

Il est des femelles dont le dessus a quelques petites taches rouges.

Cette espèce se trouve en juillet & en août dans l'Asie mineure, l'Italie, l'Autriche, &c., & dans plusieurs départemens du midi & du centre de la France. Elle habite les bois & se repose souvent sur les aulnes. Scopoli lui a donné le nom de *Rivularis*. Nous avons remarqué en effet qu'elle se plaisoit le long des ruisseaux & des petites rivières. On la prend assez facilement; mais il faut bien prendre garde de l'effaroucher.

La chenille ressemble beaucoup à celle du *Sibylla*; mais elle a de plus sur chaque côté du corps une série longitudinale de points ferrugineux. Elle vit aussi, disent les auteurs, sur plusieurs espèces de *chèvre-feuille*. Il pourroit bien le faire qu'elle mangeât les feuilles de l'aulne; car, comme nous l'avons dit plus haut, elle fréquente de préférence les endroits peuplés de cet arbre.

La chrysalide est anguleuse, brunâtre, avec une bosse arrondie sur le milieu du dos.

Le papillon ne donne qu'une fois par an.

178. NYMPHALE PROCRIS.

NYMPHALIS Procris.

Nym. alis dentatis, rufis, fasciâ communiâ albâ, mediâ: subtus basi cinereo-virescente, nigro-frigosâ.

Papilio N. Procris, alis dentatis, fulvis, nigro maculatis, fasciâ albâ: subtus variegatis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 105. n. 452. — Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n. 550. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n. 425.*

EDWARDS, *Av. tab. 299.*

Papilio Procris. GRAM. *pl. 106. fig. E. F.*

Les mâles ont un peu plus de deux pouces d'envergure, & les femelles environ trois. Les quatre ailes sont dentées. Leur dessus est d'un roux-foncé, avec une bande blanche, commune, discoïdale, légèrement teintée d'incarnat, & se détachant sur un fond noirâtre. A la base, il y a de petites lignes transverses, & vers l'extrémité deux rangées de points, noirs. Outre cela, le bord postérieur est longé par une double ligne blanchâtre & en feston.

Le dessous se distingue du dessus en ce que la bande est environnée de vert-grisâtre-luisant, qui en arrière forme une simple ligne ondulée, tandis qu'en avant il se prolonge jusqu'à la base des ailes, mais avec-solution de continuité sur les supérieures, & sans interruption sur les inférieures; en ce que de plus les points noirs de la rangée extérieure

des unes & des autres font cerclés de blanc. Le corps est rouillâtre en dessus, blanc en dessous. Les antennes font noires, avec la sommité fauve.

De la Chine & de l'île de Java.
N. B. La bande blanche est fortement bifide près de la côte des premières ailes.

179. NYMPHALE Epione.

NYMPHALIS Epione.

Nym. alis integris, fuscis: anticis utrinquē fasciā mediā albā: posticis subtis strigis quinque nris, maculisque bascos duabus albis.

Nous ne connoissons cette espèce que par des individus mâles.

Leur envergure est d'environ deux pouces. Le dessus des premières ailes est d'un brun-obscur, avec quelques anneaux noirs à la base, & une bande blanche transverse sur le milieu.

Le dessus des secondes ailes est du même brun que celui des premières, avec trois lignes noires transverses vers l'extrémité.

Le dessous des ailes supérieures est d'un brun-pâle, avec une bande semblable à celle de la surface opposée, plus des taches blanches à la base & au sommet. Les taches du sommet sont au nombre de six, dont deux extérieures; celles de la base au nombre de huit, dont une encadrée de roux. Il y a en outre du roux à l'origine de la côte, & contre les nervures à partir de la bande jusqu'au bord terminal.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-pâle, avec cinq lignes rouffes transverses, dont deux à la base, deux au milieu, & une le long du bord postérieur. Les lignes de la base sont accompagnées de deux taches blanches, inégales; celles du milieu sont séparées par un espace noirâtre, & elles se réunissent à leur extrémité inférieure; celle du bord est surmontée d'un rang de points blanchâtres, dont les deux antérieurs plus prononcés.

Du Brésil.

180. NYMPHALE Lycorias.

NYMPHALIS Lycorias.

Nym. alis repandis, suprā nigro-fuscis: anticis fasciā sanguineā, obliquā; posticis antè marginem strigā geminā albidā.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu mâle & unique.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande oblique d'un rouge-vermillon sur le milieu, quatre taches inégales du même rouge vers l'origine de la côte, une petite raie blanchâtre & transverse vis-à-vis du sommet. Ces ailes ont le bord postérieur entier.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux lignes blanchâtres, maculaires,

situées parallèlement au bord postérieur qui est finoux & liseré de blanc.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais il est généralement plus pâle, & l'origine de la côte est du même ton que la bande du milieu & les taches qui la précèdent intérieurement.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-grisâtre, avec une tache rose à la base, puis trois lignes obliques & quelques veines longitudinales d'un brun-foncé: aux lignes blanchâtres de la surface opposée correspondent ici deux lignes semblables, mais moins prononcées. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

Du Brésil.

181. NYMPHALE Eumec.

NYMPHALIS Eumecus.

Nym. alis integerrimis, fuscis, fasciā albā: posticarum utrinquē terminatā maculā fulvā. FAB.

Papilio N. Eumecus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 53. n.º 280. — Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n.º 323. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 156. n.º 481.*

Les quatre ailes, dont les deux surfaces se ressemblent, sont d'un brun-obscur, avec une bande blanche, qui est terminée au bord antérieur & au bord interne des inférieures par une tache fauve. Le sommet de l'aile est un peu blanchâtre.

De Cayenne.

(Traduction de Fabricius.)

182. NYMPHALE Cocalia.

NYMPHALIS Cocalia.

Nym. alis dentatis, fuscis: anticis nigro flavoque maculatis: subtis omnibus griseis, strigā punctorum alborum. FAB.

Papilio S. Cocalia. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 250. n.º 777.*

Papilio Cocalia. JOX. *Fig. pict. 4. tab. 70. fig. 2.*

Papilio Cocalia. DONOW. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 2. pl. 2. fig. 1.*

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes sont un peu dentées, d'un brun-obscur en dessus. Les premières ont à la base des taches noires; vers le milieu de la côte une bande jaunâtre, transverse, courte & sinuée; avant le bord terminal une rangée de taches oculaires, obscures & longées en dehors par une ligne noire. Les secondes ailes ont vis-à-vis du sommet une tache oculaire, & parallèlement au bord postérieur une ligne noire.

Le dessous de toutes les ailes est gris, avec une rangée de points blancs, contigus intérieurement

à des points noirâtres, & suivis extérieurement d'une ligne obscure.

Des Indes.

Décrite d'après Fabricius & la figure de Donovan.

185. NYMPHALE ? Phégéa.

NYMPHALIS Phegea.

Nym. alis dentatis, fuscis: anticis fasciâ, posticis: disjco ferrugineo aut albo: subtus pallidioribus, nigro undatis. FAB.

Papilio N. Phegea. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 152. n.º. 407.*

Papilio Phegea. JON. *Fig. pict. 5. tab. 21.*

Voici ce qu'en dit Fabricius : elle est grande, & elle a le corps noir, avec des points blancs & l'abdomen ferrugineux. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur, ondulé de noir, avec une bande maculaire, blanche ou ferrugineuse, sur les supérieures.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est plus pâle, ce qui fait ressortir davantage les ondes noires. D'après la phrase spécifique, les secondes ailes doivent avoir le milieu blanc ou ferrugineux.

De l'Inde.

Nota. Ne seroit-ce pas une Morpho à cellule discoidale fermée ?

184. NYMPHALE Marguerite.

NYMPHALIS Margaria.

Nym. alis subdentatis, supra argenteis, apice nigro, albo maculato: posticis subtus fusco irroratis, strigâ punctorum ocellatorum.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un blanc-argenté-luisant à la base; traversé au milieu par une large bande d'un blanc un peu incarnat; noir à l'extrémité, avec trois ou quatre points blancs vis-à-vis du sommet.

Le dessus des secondes ailes est d'un blanc-argenté, avec le limbe postérieur noir & divisé dans toute sa longueur par une ligne blanche ondulée.

Le dessous des ailes supérieures est grisâtre à la base & au sommet; noir au milieu, avec une bande blanche correspondant à celle de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est gris, aspergé de brun, avec une tache violette peu prononcée vers la base, & une rangée transverse de quatre points ocellés derrière le milieu. Les deux surfaces du corps sont de la couleur des ailes.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

185. NYMPHALE Flavilla.

NYMPHALIS Flavilla.

Nym. alis subdentatis, luteis, apice supra fuscescente: subtus strigis tribus ferrugineis, punctisque ocellaribus niveis, anticarum duobus, posticarum quinque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un jaune-jauve, avec le sommet des supérieures brunâtre, & précédé d'une tache de cette nuance.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec trois lignes ferrugineuses, transversales & communes, dont l'antérieure droite, discoidale, les deux autres flexueuses. Entre la ligne discoidale & la suivante, les premières ailes ont deux points oculaires très-blancs, & les secondes cinq, dont deux gros près du bord antérieur, & trois petits près de l'angle de l'aube. Le corps est jaunâtre. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue rouffâtre.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le dessus de ses ailes offre sur le bord terminal une rangée de croissans noirâtres, concaves en dehors. Du Brésil.

186. NYMPHALE Liriffa (1).

NYMPHALIS Liriffa.

Nym. alis repandis, supra fusco-cinereis, undis nigris: anticis utrinque fasciâ, posticis punctis ocellaribus, albis.

Papilio S. Liria, alis subdentatis, cinereis, fusco undatis: anticis fasciâ albâ, posticis punctis quatuor albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n.º. 747.*

Papilio Liria. JON. *Fig. pict. 2. tab. 25. fig. 2.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un cendré plus ou moins obscur, avec plusieurs lignes noires, maculaires, transverses & ondulées. Indépendamment de cela, les ailes de devant ont entre le milieu & l'extrémité une bande blanche, oblique, large, sinuée, marquée de deux petits anneaux noirâtres; & vis-à-vis du sommet un point blanc. Les secondes ailes offrent, parallèlement au bord postérieur, une rangée de quatre à cinq points blancs, oculaires.

Le dessous diffère du dessus en ce que la moitié antérieure des premières ailes & toute la surface des secondes sont d'un gris-verdâtre-sale. Le corps est de la couleur des ailes, avec les antennes noires & annelées de blanc.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

187. NYMPHALE Lassus.

NYMPHALIS Lassus.

(1) Fabricius a deux papillons *Liria*; c'est pourquoi nous avons changé le nom de celui-ci.

Nym. alis integerrimis, fuscis, strigis nigris : anticis maculâ marginali albâ : subtus (omnibus) pallidis, strigis fuscis. FAB.

Papilio F. Laffus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 26. n°. 269. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 44. n°. 133.*

Fabricius met cette espèce parmi les *Danaïdes bigarrées*, tandis qu'il luit un *Satyre* de la précédente dont elle paroît être si voisine.

Elle est à peu près de la taille du *Lirissa*. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-obscur, avec plusieurs lignes transverses plus obscures. Outre cela, il y a une tache blanche vers la côte des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est pâle, avec des lignes transverses, & une bande postérieure, obscures. A la tache blanche des premières ailes correspond ici une tache semblable, mais accompagnée de quelques points de sa couleur.

Elle se trouve à Cayenne.

(*Décrite d'après Fabricius.*)

188. NYMPHALE? *Dyndima*.

NYMPHALIS Dyndima.

Nym. alis integerrimis, suprâ chalybæneis, subtus flavescens, utrinque nigro undatis : anticarum apice maculis duabus albis.

Papilio Dyndima. CRAM. *pl. 271. fig. G. H.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est couleur d'acier, leur dessous jaunâtre, avec sept à huit lignes noires, ondulées & transversales. Il y a en outre au sommet des ailes supérieures deux taches blanches, dont l'extérieure beaucoup plus petite & en forme de point. De Surinam.

189. NYMPHALE *Démophon*.

NYMPHALIS Demophon.

Nym. alis suprâ nigris, fuscâ communi virefcenti-cæruleâ, nitidâ : subtus griseo varis, puncto bascos unico, tunc strigâ undulatâ, nigris.

Papilio E. A. Demophon, alis dentatis, suprâ nigris, fuscâ viridi : subtus griseo marmoratis. LINN. *Syfl. Nat. 2. p. 753. n°. 47.*

Papilio Demophon. MAS. LINN. *Mus. Lud. Ulr. p. 215. n°. 54.*

Papilio Demophon. CLERCK, *Icon. tab. 29. fig. 3. 4.*

Papilio N. Demophon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 83. n°. 265.*

Papilio E. A. Demophon. FAB. *Syfl. Ent. p. 457. n°. 61. — Spec. Inf. tom. 2. p. 24. n°. 97. — Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n°. 114.*

Papilio Demophon. ESP. *Pap. exot. tab. 55. fig. 1.*

Papilio Sisyphus. CRAM. *pl. 158. fig. C.*

Papilio Pheridamas. CRAM. *pl. 158. fig. A. B. (Var.)*

Papilio Sisyphus. HERBST, *tab. 28. fig. 3.*

Papilio Pheridamas. HERBST, *tab. 28. fig. 2.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 26. fig. 11. 12.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 18. fig. 2. 3.*

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande d'un bleu-verdâtre-luisant, commune, oblique, difcoïdale, cambrée & interrompue près de la côte des supérieures, terminée en pointe sur les inférieures.

Le dessous est brunâtre, avec trois bandes transverses d'un gris de perle; un point noir à la base de chaque aile, puis une ligne ondulée de cette couleur. La ligne ondulée des secondes ailes descend du quart antérieur de la côte à l'angle interne, en se courbant en arrière vers le milieu de sa longueur. On voit en outre, parallèlement au bord postérieur des mêmes ailes, une rangée de six points, dont l'anal double, points qui sont blancs & entourés de rouffâtre. Sur le bord correspondant des premières ailes, il y a une ligne griffâtre, peu prononcée & fourchue vers son origine. Le corps & les antennes sont noirs.

De la Guyane.

N. B. Fabricius rapporte ici la *figure 1, tab. 6 du tom. 4* de Roësel. Cette figure représente le *Sarpedon*, espèce tout-à-fait différente & appartenant au genre *PAPILLON* proprement dit.

190. NYMPHALE *Amphitoë*.

NYMPHALIS Amphitoë.

Nym. alis suprâ nigris, fuscâ communi virefcenti-cæruleâ, nitidâ : subtus griseo varis, punctis bascos duobus, tunc strigâ valdè angulatâ, nigris.

Papilio Amphimacrus. SULZ. *Inf. edit. ROEM. tab. 14. fig. 2. 3.*

Papilio Amphimacrus. HERBST, *Pap. tab. 27. fig. 3.*

Fabricius l'a confondue avec son papillon *Amphimacrus*.

Elle est de la taille du *Démophon*, & elle lui ressemble en dessus.

Le dessous de ses ailes est diversement nuancé de gris, avec deux points à la base de chacune, puis une ligne très-anguleuse, noirs. La ligne des secondes ailes descend du milieu de la côte à l'angle anal, où aboutit une rangée courbe de sept points

bleuâtres, entourés de ferrugineux. Les premières ailes sont noires à l'angle interne, avec un gros point d'un gris-rouffâtre.

De l'Amérique méridionale.

N. B. La ligne noire qui traverse en dessous le milieu des secondes ailes forme par les sinuosités une sorte de profil humain, ce qui n'a jamais lieu dans le *Démophon*.

191. NYMPHALE Lycomède.

NYMPHALIS Lycomedes.

Nym. alis suprà nigris, fasciâ communi virefcenti-ceruleâ, nitidâ : subtus flavidis, punctis basifcos duobus, tunc strigis totidem angulatis, nigris.

Papilio Licomedes. CRAM. pl. 158. fig. D.

Papilio Licomedes. HERBST, *Pap.* tab. 28. fig. 4.

Fabricius la réunit au *Démophon*. Elle lui ressemble beaucoup, il est vrai. Néanmoins elle en diffère en ce qu'elle a le dessous des ailes plutôt jaunâtre que gris; en ce que l'on y voit deux lignes noires anguleuses, dont l'antérieure discoïdale, la postérieure rapprochée des points marginaux des secondes ailes; en ce que l'angle interne des premières ailes est jaunâtre avec deux points noirs, au lieu d'être noir avec un point rouffâtre.

De la Guyane.

192. NYMPHALE Amphimaque.

NYMPHALIS Amphimachus.

Nym. alis suprà nigris, fasciâ communi virefcenti-ceruleâ, nitidâ : subtus dimidio basilarî punctoque griseo-albidis.

Papilio E. A. Amphimachus, alis dentatis, atris, fasciâ ceruleâ, nitidâ : subtus anticè albis, posticè cinereis. FAB. *Syfl. Ent.* p. 457. n. 59. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 25. n. 94. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 12. n. 110. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 57. n. 110.

Papilio Meander. CRAM. pl. 12. fig. A. B.

Papilio Meander. HERBST, *Pap.* tab. 28. fig. 5. 6.

Fabricius dit que ce lépidoptère a le port du *Machaon* (*statura Machaonis*). Une telle assertion est propre à dérouter, lorsqu'on a souvent bien de la peine à reconnoître des espèces dont la forme est bien déterminée.

Sa taille est la même que celle du *Démophon*, auquel il ressemble en dessus.

Le dessous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un blanc-grisâtre; l'autre moitié brune, mais avec le bord postérieur plus clair. La partie blanche est faiblement tachetée de noir, & forme

un triangle renversé dont le côté externe est droit. La partie brune offre un gros point blanc vers l'angle interne des premières ailes, & un semblable près de la côte des secondes. Ces dernières ont en outre, parallèlement à leur bord de derrière, une rangée courbe de huit points bleuâtres, entourés de brun.

De la Guyane & du Brésil.

193. NYMPHALE Démodice.

NYMPHALIS Demodice.

Nym. alis suprà nigris, fasciâ communi virefcenti-ceruleâ, nitidâ : subtus anticis strigis annulifque nigris, posticis oculis duobus remotis.

Papilio Demophon. FEMINA. LINN. *Muf. Lud.* *Utr.* p. 215. n. 54.

Papilio Demophon. CRAM. pl. 158. fig. E.

Papilio Demophon. HERBST, *tab.* 27. fig. 4.

Papilio Demophon. HERBST, *tab.* 28. fig. 1.

SEBA, *Muf.* 4. *tab.* 26. fig. 15. 16.

Linnaeus a pris cette espèce pour la femelle du *Démophon*.

Les deux sexes du *Démophon* ressemblent effectivement à la femelle de notre *Démodice* par le dessus des ailes; mais le mâle de ce dernier a la bande bleue environnée d'un large reflet violet, & elle finit en pointe un peu au-delà du disque des premières ailes, au lieu d'être interrompue & cambrée près de leur bord d'en haut.

Le dessous des quatre ailes a un peu plus de la moitié antérieure d'un blanc-grisâtre, & fincée en dehors, avec quelques points à la base, puis une ligne anguleuse, noirs; le reste de la surface d'un gris-obscur, avec des lignes tortueuses & des anneaux noirâtres sur les ailes de devant, & deux yeux assez grands sur celles de derrière. Les yeux, dont l'un est situé près du sommet de l'aile, l'autre près de l'angle anal, sont partie noirs, partie violets, avec la prunelle blanche, l'iris roux & entouré d'un cercle blanc que borde antérieurement un arc noirâtre.

Dans la femelle, ces yeux s'alignent avec cinq points bleuâtres, dont trois intermédiaires; & l'œil postérieur se reproduit en dessus.

De la Guyane & du Brésil.

194. NYMPHALE Déiphile.

NYMPHALIS Deiphile.

Nym. alis suprà nigris, disco violaceo, apice fasciâ communi è maculis fulvis : subtus basi margaritacè, ferrugineo-maculatâ.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu unique, appartenant à M. le chevalier de Langsdorff.

Il a le port & la taille du *Démophon*. Le dessus de ses ailes est noir, avec une large bande violette sur le milieu, & une bande de taches fauves parallèlement au bord postérieur. L'avant-dernière tache de la bande fauve des secondes ailes est marquée d'un gros point noir.

Le dessous des quatre ailes a environ le tiers antérieur d'un blanc-violâtre-luisant, avec des points & des traits ferrugineux; le reste de la surface nuancé de brun-tanué & de brun plus foncé, avec une ligne noire, postérieure, commune, légèrement flexueuse, & immédiatement suivie aux secondes ailes de deux yeux très-écartés, noirs, ayant la prunelle bleuâtre & l'iris pâle. Le blanc-violâtre de la base forme un triangle renversé dont le côté externe est très-fineux.

De l'intérieur du Brésil.

195. NYMPHALE *Ancæa*.

NYMPHALIS Ancæa.

Nym. alis supra atris aut fuscis, anticarum fasciâ cyanæâ, obliquâ : subtus viridibus, postlicarum strigis tribus ferrugineis.

Papilio N. Ancæa, alis dentatis, atris : primoribus fasciâ cæruleâ, postlicis lateâ. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 781. n^o. 184. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 307. (Le mâle.)

Papilio D. F. Obrinus, alis integerrimis, supra nigris, fasciâ cyanæâ : subtus viridibus, fasciâ albâ. LUX. *Syfl. Nat.* 2. p. 766. n^o. 115. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 255. (La femelle.)

Papilio N. Ancæus, alis integerrimis, atris, fasciâ anticarum cæruleâ, postlicarum ferrugineâ : subtus viridibus. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars. 1. p. 154. n^o. 474.* (Le mâle.)

Papilio D. F. Obrinus. FAB. *Syfl. Ent.* p. 485. n^o. 186. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 62. n^o. 275.* — (*Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n^o. 517.*?)

Papilio N. Obrinus, alis integerrimis, supra fuscis, fasciâ cæruleâ maculâque ferrugineâ : subtus viridibus, fasciâ albicante. FAB. *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars. 1. p. 154. n^o. 475.* (La femelle.)

Papilio D. F. Ancæus. FAB. *Syfl. Ent.* p. 485. n^o. 187. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 62. n^o. 276.* — (*Mant. Inf. tom. 2. p. 50. n^o. 518.*)

Papilio Ancæa. CRAM. *pl. 358. fig. C. D.*

Papilio Obrinus. CRAM. *pl. 49. fig. E. F.*

Papilio Obrinus. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 6. fig. 5.* (La chenille.)

Papilio Ancæus. HERBST, *tab. 158. fig. 3. 4.*

Papilio Obrinus. HERBST, *tab. 159. fig. 4. 5.*

Papilio Obrinus. VAR. SULZ. *p. 145. tab. 16. fig. 1. 2.*

Papilio Obrinus. CLERCK, *Icon. tab. 31. fig. 2.* (Mas.) *fig. 3.* (Femina.)

Hist. nat. Inf. Tome I. X.

NATURE. G. p. 128. *tab. 6. fig. 1. 2.*

L'*Ancæa* & l'*Obrinus* des auteurs appartiennent bien certainement à la même espèce. Stoll l'avoit déjà dit, mais il s'est mépris sur les sexes.

Le mâle, ou l'*Ancæa* de Linnæus, a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-foncé, avec une bande d'un bleu-pâle & verdâtre sur les supérieures, & une bande orangée sur les inférieures. La bande de celles-ci est plus large, un peu courbe, & placée transversalement sur le milieu de la surface. La bande de celles-là est fincée & disposée obliquement entre le milieu de la côte & l'extrémité du bord postérieure.

La femelle, ou l'*Obrinus*, est un peu plus grande. & elle a le dessus d'un brun-noirâtre. Ses premières ailes ont une bande bleue comme celles du mâle, plus une tache de cette couleur au fommet, & une lunule ferrugineuse vers la base. Les secondes ailes ont le bord du fommet d'un bleu-pâle. & elles sont entièrement traversées par trois lignes & un rang de points plus obscurs que le fond.

Le dessous des deux sexes présente les caractères que voici : les premières ailes ont toute la partie postérieure brunâtre ; la partie antérieure d'un vert-pomme, avec une bande bleue correspondante à celle du dessus, mais plus pâle, & quelques traits ferrugineux transversaux vers l'origine de la côte. Les secondes ailes sont partout d'un vert-pomme, avec trois lignes ferrugineuses, parallèles & transverses, dont l'antérieure faiblement éclairée de blanchâtre en dehors ; la suivante presque adossée à une suite de quatre points, parmi lesquels les deux extrêmes sont noirs, & les deux intermédiaires blancs avec le contour rouffâtre ; il y a en outre à la base deux petites taches de cette dernière couleur. Chaque surface du corps est du même ton que chaque surface des ailes. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

La chenille, selon Stoll, est verte, avec une ligne briquetée le long de chaque côté du corps. Sa tête est ferrugineuse & armée de deux épines branchues également ferrugineuses. Son dos est orné d'autres qui sont vertes & beaucoup plus courtes. Elle vit sur le citronier, & se transforme en une chrysalide grisâtre, suspendue par la queue.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. La phrase spécifique de l'*Obrinus* du Mantissa de Fabricius n'est pas conforme à celle de ses autres ouvrages ; c'est pourquoi nous avons mis un point de doute.

196. NYMPHALE *Antiochus*.

NYMPHALIS Antiochus.

Nym. alis integris, supra holosericeo-nigris, fuscâ communi nitidâ aurantiâ : anticarum abbreviatâ.

Papilio F. Antiochus, alis integerrimis, rotu-

FFF

datis, nigris, supra fuscâ communi fulvâ. FAB. *Syfl. Ent.* p. 480. n^o. 164. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 53. n^o. 253. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 26. n^o. 270. — *Entom. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 44. n^o. 174.

Papilio Antiochus. DAURY, *Inf. tom.* 3. pl. 7. fig. 3. 4.

Papilio Antiochus. HERBST, *tab.* 133. fig. 3. 4.

Papilio Eupalemon. CRAM. *pl.* 147. fig. B. C.

STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. fig.* (La chenille.)

Le Velouté. DAUBENTON, *pl. entom.* 68. fig. 3. 4.

Son envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un noir-velouté, avec une bande orangée, luisante, discordale, un peu courbe, ne montant guère au-delà du centre des supérieures.

Le dessous de ces dernières ailes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la moitié postérieure de la côte d'un gris-violâtre, le disque jaunâtre & garni de poils noirs couchés parallèlement.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun légèrement nuancé de gris, avec une ligne transverse & arquée de quelques points noirâtres, non ocellés.

La chenille, suivant Stoll, est d'un vert-pré, avec le ventre & toutes les pattes fauves. Sa tête est noire, marquée de deux taches blanches, & armée de deux épines noires, branchues, très-longues. Il y a en outre sur tout son corps d'autres épines semblables, mais très-courtes. Elle vit sur le *tamarin* (*tamarindus*).

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

197. NYMPHALE Antinoé.

NYMPHALIS Antinoe.

Nym. alis subdentatis, supra holosericeo-nigris, fuscâ nitide aurantiâ : anticarum marginem internum versus attenuatâ.

Nous n'avons vu que le mâle de ce lépidoptère. De prime abord, on seroit tenté de le prendre pour une variété de l'*Antiochus*; mais il s'en distingue par les caractères que voici : ses premières ailes ont le bord interne & le bord terminal à peu près droits; leur bande orangée est fortement rétrécie à sa partie inférieure, & surmontée à sa partie supérieure d'une tache orbiculaire également orangée; le dessous des mêmes ailes a un point de puis sur le jaune du disque : le dessous des secondes ailes offre une bande blanchâtre, correspondant à la bande orangée du dessus, & les points qui la précèdent en dehors sont ocellés.

Du Brésil.

198. NYMPHALE Numilius.

NYMPHALIS Numilius.

Nym. alis repandis, supra holosericeo-nigris, posticarum disco, anticarum maculis duabus, nitide aurantis : posticis apice caerulefcente.

Papilio F. Numilius, alis integerrimis, atris : anticis maculis duabus, posticis unicâ, fulvâ. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 28. n^o. 291. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 53. n^o. 164.

Papilio Numilia. CRAM. *pl.* 81. fig. E. F.

Elle est de la taille de l'*Antiochus*, d'un noir-velouté en dessus, avec trois taches orangées, luisantes, grandes & orbiculaires, dont deux sur les premières ailes, l'autre vers le milieu des secondes. Celles-ci sont un peu allongées dans le sens de la largeur du corps, & elles ont le sommet violâtre, & le limbe postérieur faiblement tacheté de bleu.

Le dessous des ailes supérieures est d'un jaune-fauve depuis la base jusqu'au-delà du milieu; en suite noir, avec l'extrémité d'un brun-pâle & violâtre.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris-violâtre vers la base, avec deux lignes brunes, transverses & ondulées; d'un brun légèrement verdâtre vers l'extrémité, avec trois lignes transverses un peu plus claires, entre les deux antérieures desquelles on remarque une rangée de quatre à cinq points presque ocellés. Le corps est noir, avec les incisions du dos jaunâtres. Les antennes sont noirâtres en dessus, brunes en dessous.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Nous n'avons pas vu la femelle.

199. NYMPHALE Erminia.

NYMPHALIS Erminia.

Nym. alis subdentatis : anticis supra nigris, basi inaurato-viridi, ad apicem fuscâ albâ maculari; posticis ocello sesquialtero.

Papilio Erminia. CRAM. *pl.* 196. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Erminia. CRAM. *pl.* 241. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Erminius. HERBST, *tab.* 220. fig. 5. 4.

Papilio Erminius. HERBST, *tab.* 221. fig. 1. 2.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, avec la base d'un vert-doré, & une bande blanche, maculaire, qui descend du milieu de la côte à l'angle interne. Il y a en outre deux points blancs vis-à-vis du sommet.

Le dessous des secondes ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant dans le mâle, d'un ferrugineux-rouge dans la femelle, avec une double ligne noire, anguleuse, le long du bord terminal, & deux yeux, dont l'antérieur plus petit, vers l'angle de l'auss-

Ces yeux font noirs, ainsi que leur iris, & leur prunelle est bleuâtre. La couleur du fond des secondes ailes s'étend sur le bord interne des premières, ou, ce qui revient au même, ce bord est ferrugineux ou d'un bleu-verdâtre.

Le dessous des deux sexes est parfaitement femblable, & présente les caractères ci-après : les ailes supérieures font d'un brun-cendré, avec une bande maculaire & deux points blancs comme en dessus; vers le bas du côté interne de la bande, il y a un œil noir à prunelle bleue & à iris roux, œil qui se reproduit quelquefois en dessus; le milieu offre un espace noir faiblement vert-doré, & surmonté de deux *signas* noirs, transversaux. Les ailes inférieures sont nuancées de brun & de cendré, marquées vers la base de deux points noirs, au-delà du milieu de quelques points blancs, près de l'angle anal d'un seul œil noir à prunelle bleue & à iris jaune.

Du Bengale & de l'île d'Amboine.

200. NYMPHALE Iris.

NYMPHALIS Iris.

Nym. alis dentatis, fuscis (in mare violaceo nicanibus), anticarum maculis, posticarum fasciâ unidentatâ, albis : anticis suprà cæcis.

Papilio N. Iris, alis subdentatis, subtus griseis, fasciâ utrinque albâ interruptâ : posticis suprà uniocellatis. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 775. n^o. 151.

Papilio N. Iris, alis dentatis, fuscis, cæruleo nicanibus, utrinque fasciâ albâ interruptâ ocelloque unico : anticis suprà cæcis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 46. n^o. 460. — *Ent. Syfl. em.* tom. 3. pars 1. p. 110. n^o. 359. (Le mâle.)

Papilio N. Beroe, alis dentatis, fuscis, cæruleo nicanibus : posticis ocello unico, subtus brunneis margine rubente. FAB. *Ent. Syfl. em.* tom. 3. pars 1. p. 111. n^o. 341. (Var. mâle.)

Papilio Iris vulgaris major. ESP. *part. 1. tab. 11. fig. 1.* (Le mâle.)

ESP. *part. 1. tab. 71. cont. 21. fig. 4.* (La femelle.)

Papilio Iole. ESP. *part. 1. tab. 46. Suppl. 22. fig. 1.*

Papilio Iris. Var. ESP. *part. 1. tab. 71. cont. 21. fig. 1. — tab. 72. cont. 22. fig. 1.*

ROES. *Inf. part. 5. tab. 42. fig. 2.*

Papilio Iris. PANZ. *Faun. Germ.* 79. 25.

SULZ. *Inf. tab. 14. fig. 86.*

LEWIN. *Inf. tab. 16. fig. 1-5.*

Papilio Iris. HUFENAG. *tab. imp. Berl. Mag. tom. 2. pag. 62 & 87.*

SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 155. n^o. 69.*

SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 140. n^o. 73. (Var.)*

Papilio Iris. VAR. 1. SCOP. *Ent. Carn. p. 15. n^o. 470.*

Papilio Iris. ROSSI, *Mant. tom. 2. p. 9. n^o. 344.*

Papilio Iris. BERGSTR. *Nomencl. tab. 70. fig. 1. 2.*

BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec. 5. tab. 2. fig. 1. 2.*

Papilio Iris. HERBST, *tab. 226. fig. 6. — tab. 227. fig. 1. 2.*

Papilio Beroe. HERBST, *tab. 229. fig. 5-6. — tab. 230. fig. 1. 2.*

Papilio Iris Junonia. BORRH. *Pap. Eur. part. 1. p. 194. — part. 2. p. 185.*

Papilio Iole. BORRH. *part. 1. p. 195. — part. 2. p. 186.*

BORRH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 255. n^o. 41.*

Papilio Iris. LANG. *Verz. 2. p. 27. n^o. 194-196. p. 28. n^o. 197. 198.*

LANG. *Verz. 2. p. 28. n^o. 199. (Var.)*

Maniola Iris. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 187. n^o. 1525.*

Papilio Iris. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 201. n^o. 1.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. 4. p. 57.*

Papilio Iole. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 205. n^o. 3.*

ILLIG. *Magaz. tom. 4. p. 57.*

Papilio Iris. WIEN. *Verz. p. 171. faun. G. n^o. 1.*

Papilio Iole. WIEN. *Verz. p. 172. faun. G. n^o. 3.*

Papilio Iris. HURN. *Pap. tab. 25. fig. 117-118. (Mas.) — tab. 114. fig. 584. (Fem.)*

Papilio Iole. HURN. *Pap. tab. 122. fig. 622-623. (Var.)*

Papilio Iris. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 154. n^o. 2.*

HARRIS, *Aurelian or Nat. Hist. of English Insects. pl. 5.*

Suspirans. PODA, *Mus. Græc. p. 70. n^o. 25.*

Le grand Mars changeant. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 137. pl. 31. fig. 62. a. b. (Le mâle.)*

Le grand Mars non changeant. ENGRAM. *tom. 1. p. 145. pl. 33. fig. 63. a. b. (La femelle.)*

ENGRAM. tom. 1. p. 263. pl. 68. Suppl. 14. fig. 62. l. g. (Var. mâle.) fig. c. (La chrysl.)

ENGRAM. tom. 1. p. 271. pl. 69. Suppl. 15. fig. 62. h. i. (Var.) fig. 62. l. (Var.)

ENGRAM. tom. 1. pl. 55. fig. 65. c. d. (Var.)

Le Mars bleu-foncé-changeant. ENGRAM. tom. 1. p. 145. pl. 55. fig. 67. a. b. (Var. mâle.)

Engramelle fait de ce Lépidoptère trois espèces distinctes. Favori : le *grand Mars changeant*, le *Mars bleu-foncé changeant*, & le *grand Mars non changeant*. Les deux premières le rapportent au mâle dont le dessus a un reflet d'un bleu-violet, tantôt aux quatre ailes à la fois, tantôt aux deux antérieures seulement, tantôt enfin à celles de droite ou de gauche, selon le point d'où vient le jour. La troisième est la femelle dont le dessus est sans reflet.

L'envergure du mâle est de deux pouces & demi; celle de la femelle d'environ trois pouces. Le dessus des quatre ailes, qu'il y ait un reflet ou qu'il n'y en ait pas, est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche transverse sur le milieu, & une bande cendrée moins large & maculaire en avant du bord postérieur, lequel est lité de blanc aux échancrures. La bande du milieu des ailes supérieures est formée de six taches inégales qui se groupent séparément trois à trois; elle est en outre précédée en dehors d'une ligne tortueuse & transverse de quatre à six points de la couleur. La bande du milieu des ailes inférieures est oblique, finement coupée par les nervures, terminée en pointe près de la gouttière abdominale, & dilatée en angle aigu vers le milieu de son côté externe. Entre l'extrémité inférieure de cette dernière bande & celle du bord, il y a un œil noir à iris fauve & à prunelle bleuâtre, sans compter deux petites taches rouilles, dont l'une placée sur l'angle anal, l'autre sur la dent la plus voisine de ce même angle. Les premières ailes n'ont point d'œil en dessus.

Le dessous de ces ailes est noirâtre, avec toute la côte ferrugineuse, le bord terminal d'un gris de perle, une bande & des points blancs comme en dessus. Indépendamment de cela, la base présente un espace blanchâtre sur lequel sont quatre points noirs, rapprochés deux à deux; & il y a vers l'angle postérieur un grand œil à prunelle bleue & à iris fauve.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré un peu verdâtre, avec le milieu ferrugineux & divisé par une bande blanche, semblable à celle de la surface opposée, mais plus large, du moins antérieurement; ou y voit aussi un œil pareil à celui du dessus, mais qui paroît plus petit parce que son iris se perd dans la couleur ferrugineuse. A ces caractères du dessous des ailes inférieures, il faut encore ajouter une ligne obscure & ondulée, longeant tout le bord postérieur, lequel, ainsi

que celui des ailes de devant, est d'une teinte violâtre ou gris de perle. Le corps a le dessus d'un brun-noirâtre, & le dessous d'un gris-bleuâtre. Les antennes sont noires, avec la sommité fauve. Les yeux sont d'un ferrugineux-foncé.

Parlons actuellement des variétés. La plus remarquable & la plus rare est celle qui a été nommée *Berœe* par Fabricius, *Iole* par Hubner, *Mars bleu-foncé changeant* par Engramelle. C'est un mâle totalement dépourvu de bande blanche, & n'ayant que deux taches de cette couleur vers le sommet des premières ailes. On ne l'auroit jamais rapportée à *Illia*, si on avoit eu l'attention de remarquer que le ferrugineux du dessous des secondes ailes subsiste toujours malgré l'absence de la bande blanche.

Les autres variétés ramènent plus ou moins de celle-ci aux individus ordinaires.

L'iris habite toujours les parties basses des bois, & se tient sur la cime des *chênes*. Mais il en descend entre onze & deux heures, & vient, en planant, se reposer sur de la *fiente*, sur des *arbres qui suintent*, ou sur des *corps en putréfaction*. C'est alors le véritable moment de le prendre. Si on le manque, on doit bien se garder de le poursuivre, parce qu'on le perdrait bientôt de vue, tandis qu'en le laissant aller, on est presque sûr de le revoir l'instant d'après. Il reste caché pour peu que le temps soit incertain. Il ne donne qu'une seule fois par an, & c'est du vingt juin à la mi-juillet. On le trouve dans beaucoup de parties de l'Europe & dans toute la France, excepté dans les départemens les plus méridionaux. Aux environs de Paris, on le voit à Meudon, à Bondi, à Saint-Germain.

La chenille, d'après les figures qu'on en a données, paroît différer très-peu de celle de l'espèce suivante. Elle vit au haut des *chênes*. On a prétendu qu'elle vivoit aussi sur le *peuplier*, le *faule* & le *marceau*. Pourquoi donc alors son papillon ne fréquente-t-il jamais les prairies, dans lesquelles *Illia* est quelquefois si commun? Objectez-t-on que ces deux espèces ont de l'antipathie l'une pour l'autre? Mais elles sympathisent à merveille dans les bois, où *Illia* se fixe volontiers quand il y trouve du *peuplier*, du *faule* & du *marceau*.

201. NYMPHALE Illia.

NYMPHALIS Illia.

Nym. alis dentatis, fuscis (in mare violaceo micantibus), anticarum maculis, posticarum fuscis sinuata, albidis aut luteis : anticis ocello utrinque conspicuo.

Papilio N. Iris, alis dentatis, utrinque fuscis albidâ interruptâ ocelloque unico. FAB. Syst. Ent. p. 501. n^o. 243.—Spec. Inf. tom. 2. p. 86. n^o. 382.

Papilio N. Ilia, alis dentatis, cæruleo micantibus, utrinquè fasciâ allâ interruptâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n^o. 461. — Ent. Syst. em tom. 5 pars 1. p. 110. n^o. 540.*

Papilio Iris minor. ESP. *Pap. part. 1. tab. 37. Suppl. 15. fig. 1.* (Le mâle.)

ESP. *Pap. part. 1. tab. 11. fig. 2.* (La femelle.)

ESP. *Pap. part. 1. tab. 25. Suppl. 1. fig. 4.* (Var. mâle.)

ESP. *Pap. part. 1. tab. 45. Suppl. 19. fig. 1.*

Papilio Iris rubescens, alis denticulatis, rubescentibus, suprâ maculis magnis contiguâ nigris, in mare cæruleo variantibus : posticus serie macularum nigrarum transversâ, subtus testacearum pupillis partim albis. ESP. *Pap. tab. 71. cont. 21. fig. 2. 5.*

Papilio Ilia. PANZ. *Faun. Germ. 79. 24.*

ROES. *Inf. part. 3. tab. 42. fig. 3. 4. — part. 4. tab. 51. fig. 6.* (La chenille.)

Papilio Ilia. HERBST, *Pap. tab. 226. fig. 5.* (Le mâle.)

HERBST, *Pap. tab. 228. fig. 5. 6.* (Le mâle.)

HERBST, *Pap. tab. 229. fig. 1. 2.* (La femelle.)

Papilio Iris lutea. HERBST, *Pap. tab. 227. fig. 5-6.*

Papilio Iris rubescens. HERBST, *Pap. tab. 228. fig. 1-4.*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 55. fig. 5. 4.* (Le mâle.)

BERGSTR. *Nomencl. tab. 69. fig. 1. 2.*

BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec. 5. tab. 1. fig. 1. 2.*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 54. fig. 1. 2.* (Le mâle, var.)

BERGSTR. *Nomencl. tab. 64. fig. 1.* (Le mâle, var.)

BERGSTR. *Nomencl. tab. 69. fig. 5. 4.* (La femelle, var.)

BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec. 5. tab. 1. fig. 5. 4.* (Var.)

DONOW. *Nat. Hist. vol. 2. pl. 57.*

P. Ilia. LANG. *Verz. 2. p. 29. n^o. 209-211.*

P. Clythia. LANG. *Verz. 2. p. 28. n^o. 200-204.*

P. Eos. LANG. *Verz. 2. p. 29. n^o. 205-208.*

P. Ilia. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 156. n^o. 70.*

P. Clythia. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 157. n^o. 71.*

P. Eos. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 158. n^o. 72.*

P. Iris ilia. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 8 et 195. b. — part. 2. p. 186.*

P. Iris lutea. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 9. 195. c. — part. 2. p. 186. c.*

P. Iris rubescens. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 10 et 195. d. — part. 2. p. 186.*

Man. Ilia. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 186. n^o. 1522.*

Man. Julia. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 186. n^o. 1521.*

Man. Clytie. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 187. n^o. 1524.*

SCHIEFF. *Icon. tab. 152. fig. 1. 2.* (Le mâle.) *fig. 3.* (La femelle, var.)

P. Iris. Var. 2. SCOP. *Ent. Carn. p. 155. n^o. 450.*

P. Iris. Var. 3. SCOP. *Ent. Carn. p. 154.*

P. Clythia. ROSSI, *Faun. Etr. Mant. tom. 2. p. 9. n^o. 554. B.*

P. Ilia. ILLIG. *N. Aufg. Delf. tom. 2. p. 205. n^o. 2.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 195. — tom. 4. p. 57.*

P. Clitie. ILLIG. *N. Aufg. Delf. tom. 2. p. 204. n^o. 2. 5.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 190. — tom. 4. p. 57.*

P. Ilia. WIEN. *Verz. p. 172. fam. G. n^o. 2.*

P. Clitie. WIEN. *Verz. p. 521. fam. G.*

P. Ilia. HUBN. *Pap. tab. 25. fig. 115. 116.* (Le mâle.)

P. Clitie. HUBN. *Pap. tab. 24. fig. 113. 114.* (Le mâle.)

P. Ilia. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 160. n^o. 5. — p. 161. var. A. — p. 162. var. B.*

Le Mars. GEOFFR. *Hijl. Inf. tom. 2. p. 61. n^o. 29.*

Le petit Mars changeant. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 141. pl. 51. fig. 62. c. d.* (La femelle.) — *pl. 52. fig. 64. e. f.* (Le mâle.)

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 526. pl. 69. Suppl. 15. fig. 62. k. — pl. 5. 3^e. Suppl. fig. 64. k.*

Le petit Mars orangé. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 145. pl. 52. fig. 64. c. d. g. — p. 144. pl. 55. fig. 66. a. b. — p. 272. pl. 70. Suppl. 16. fig. 65. e. — p. 275. fig. 64. h. i. — pl. 5. 3^e. Suppl. fig. 64. l.*

Le grand Mars orangé. ENGRAM. *Pap. d'Eu-*

rope, tom. 1. p. 140. pl. 51. fig. 65. a. b. — p. 271. pl. 69. *Suppl.* 15. fig. 65. c. d.

L'Ilia & le *Clytie* de plusieurs auteurs, ou, si l'on veut, le *petit Mars changeant* & le *petit Mars orange* d'Engramelle font variétés l'un de l'autre, & contiennent principalement l'espèce que nous donnons ici sous le nom d'*Ilia*.

Cette espèce est un peu plus petite que l'*Iris*, & elle s'en distingue, quelle que soit la couleur des deux bandes du dessus de ses ailes, par les caractères ci-après : 1°. Poil des premières ailes se reproduit en dessus, à la prunelle près ; 2°. la bande discoïdale des secondes ailes est rétrécie intérieurement vers son milieu, au lieu d'être dilatée extérieurement en angle aigu ; 3°. elle est toujours plus pâle en dessous, & placée, non sur du ferrugineux, mais sur le fond même de l'aile, entre deux lignes brunâtres, dont la postérieure plus large & plus longue ; 4°. cette dernière ligne offre un gros point violâtre qui surmonte la tache oculaire, & la ligne antérieure est précédée du côté de la base par un point noir dans le mâle, par deux ou trois dans la femelle.

Nous avons donné à entendre que les bandes du dessus des ailes n'étoient pas d'une couleur constante. En effet, celles de la première variété font comme dans l'*Iris* ; c'est-à-dire que l'une est blanche & l'autre cendrée. Celles de la seconde variété au contraire font toutes deux d'un jaune-fauve, ainsi que les alentours de la base.

Il existe une troisième variété, sous le nom de *Iris lutea* ou de *grand Mars orange* ; mais elle se réduit à quelques femelles dont le dessus est entièrement fauve, avec la bande du milieu plus claire.

La chenille, qui produit ces différentes variétés, vit, dans les prairies & dans les bois, sur plusieurs espèces de *peupliers* & de *saules*. Elle est chagrinée, d'un vert-tendre. Sur chacun de ses côtés, à partir du milieu du corps jusqu'au bout, font quatre lignes obliques, dont les trois postérieures blanchâtres ; l'antérieure jaunâtre, & terminée sur le dos par une petite verrue noirâtre. Son ans finit en une pointe aiguë, bordée de jaunâtre. Les deux angles supérieurs de sa tête le prolongent verticalement en manière de cornes longues, tronquées, légèrement bifides & rugueuses à la truncature, marquées, dans le sens de leur longueur, d'une ligne jaune qui se continue jusqu'au troisième anneau du corps.

La chrysalide est carénée, d'un vert pâle & jaunâtre.

L'Ilia a les mêmes mœurs que l'*Iris*, & paroît aux mêmes époques que celui-ci. La variété à bandes blanches & celle à bandes jaunes font aussi communes l'une que l'autre dans beaucoup de contrées de l'Europe ; mais, dans quelques départemens du midi de la France, on ne trouve

que celle à bandes jaunes, encore y est-elle souvent plus petite.

Devillers reproche à Engramelle d'avoir trop multiplié les espèces de *Mars*. Nous ne le reprochons pas pour cela, puisqu'il nous est bien démontré qu'il n'y en a que deux ; mais nous soutenons hardiment qu'il s'est trompé en disant que des œufs d'une même ponte lui ont donné des chenilles dont il a obtenu l'*Iris* & la variété jaune de *Ilia*. Ce qui prouve encore qu'il s'est trompé, c'est que ces chenilles, ajoute-t-il, ne mangeoient que du *peuplier*, du *tremble* & du *saule*. La chenille de l'*Iris* n'en mange pas ; on l'a trouvée jusqu'à présent que sur le *chêne* & dans les bois d'une certaine étendue.

N. B. Le *Papilio Iris* du *Sytema Entomologicæ* & du *Species* de Fabricius doit être rapporté ici, attendu que c'est une variété de l'*Ilia*.

202. NYMPHALE Cyanippe.

NYMPHALIS Cyanippe.

Nym. alis dentatis, supra fuscis, apice strigis duabus obscurioribus, interruptis : posticis disco argenteo-carulescente.

Nymphalis Cyane, *alis dentatis, supra fuscis, lineis duabus obscurioribus macularibus marginem posticum pone, alarumque posticarum disco caruleo : infra pallidè uchatino-griseis, ut supra lineatis, primorum dimidio antico flavescenti, fusco maculato.* Recueil d'observ. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, vol. 2. p. 82. pl. 56. fig. 5. 4.

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Ilia*. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec deux raies presque noires, parallèles, maculaires, & situées le long du bord postérieur. Les ailes de devant ont sur leur milieu quelques taches également noirâtres, & à leur sommet deux ou trois points blancs. Le disque des ailes de derrière est d'un bleu-argenté-brillant, ce qui y forme une très-grande tache ovale.

Le dessous de ces dernières ailes & l'extrémité des supérieures sont d'un gris de perle, clair & luisant, avec deux raies marginales correspondant à celles du dessus, mais plus pâles & moins prononcées. Le milieu des ailes inférieures est encore coupé transversalement par une petite bande noirâtre, anguleuse. Le milieu des supérieures, à partir de la base, est jaunâtre, avec de petites taches noirâtres, dont les unes en forme d'S, les autres orbiculaires, & s'apercevant toutes en dessus.

Du Pérou.

205. NYMPHALE Leucophthalmæ.

NYMPHALIS Leucophthalmæ.

Nym. alis dentatis, supra nigricantibus: anticis utrinque fasciâ ochraceâ, posticis disco maculâ orbiculari niveâ.

Nymphalis Leucophthalma, *antennis sensim elongato-capitatis; alis superioribus integris, inferioribus crenatis: his & illis supra nigricantibus; primoribus utrinque fasciâ diluto-ochraceâ, latâ, transversâ; posteriorum disco maculâ candidâ, orbiculatâ, in medio ex utroque parte notato: alis omnibus infra diluto-castaneis, lineis pallidioribus maculisque ex rufescenti-griseis.* Recueil d'observat. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. p. 247. pl. 23. fig. 3. 4.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noirâtre, avec des lignes & des espaces maculaires plus pâles & tirant sur le jaunâtre. Les premières ailes sont entières, & traversées de part & d'autre par une bande d'un jaune d'ocre pâle, assez large, finnée, allant du milieu de la côte à l'angle interne, vers lequel elle se termine en pointe. Les secondes ailes sont crénelées, & offrent sur leur milieu, tant en dessus qu'en dessous, une tache orbiculaire d'un beau blanc. Cette couleur est aussi celle des échancrures.

Le dessous des ailes est d'un brun-marron-clair. Celui des supérieures a, indépendamment de la bande jaune dont nous avons parlé, cinq taches d'un gris-bleuâtre, & bordées de brun-foncé: il y en a trois, triangulaires & inégales, près de la base; les deux autres, petites & arrondies, sont face au sommet. Le dessous des ailes inférieures a également des taches d'un gris-bleuâtre, mais elles sont plus nombreuses; la base en présente cinq ou six de forme & de grandeur différentes, & le bord postérieur une rangée de cinq qui sont ovales; on voit en outre un point blanc sur le milieu de la côte, & derrière la tache blanche discoidale, des lignes transverses, alternativement fauves & jaunâtres. Le corps est noir, avec des lignes blanches sur le ventre. Les antennes sont noirâtres.

Da Pérou.

204. NYMPHALE Médée.

NYMPHALIS Medea.

Nym. alis subdentatis, supra nigris, fasciis tribus macularibus flavis, primâ & secundâ abdomen secantibus.

Papilio N. Medea, *alis dentatis, fulcatis, fasciis tribus macularibus flavis, angulo anti-rubro.* FAB. *Syst. Ent.* p. 308. n°. 275. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 96. n°. 422. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 32. n°. 512. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 129. n°. 796.

Papilio Chione. CRAM. pl. 96. fig. E. F.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le des-

sus des ailes est noir, avec trois bandes jaunes, maculaires, dont les deux antérieures traversent le dessus du corps, la postérieure très-étroite & presque terminale. Il y a en outre une tache ferrugineuse au sommet des premières ailes, & une semblable à l'angle anal des secondes.

Le dessous des premières ailes est noirâtre, avec toute la côte & le sommet d'un gris de perle, & des bandes maculaires correspondant à celles du dessus, mais plus pâles.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris de perle, avec un croissant noirâtre à la base, puis deux bandes transverses d'un jaune très-pâle, & dont la supérieure bordée de noirâtre antérieurement, l'inférieure marquée de deux à quatre points noirs. Les deux surfaces du corps sont colorées comme celles des ailes, & le corselet a un collier ferrugineux. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

205. NYMPHALE Micalia.

NYMPHALIS Micalia.

Nym. alis subdentatis, supra nigris, omnium lunulis apicalibus anticarumque fasciâ mediâ flavis: posticis subitis maculâ castaneâ.

Papilio N. Micalia, *alis dentatis, atris, flavo maculatis: posticis medio fulvo nigroque maculato.* FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 105. n°. 455. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 56. n°. 551.

Papilio Micalia. CRAM. pl. 108. fig. C. D.

Papilio Micalia. HERBST, tab. 166. fig. 1. 2.

Nous avons, mais à tort, placé ce lépidoptère parmi les Vanelles (pag. 515. n°. 44.). Comme la description que nous en avons donnée n'est point suffisante, nous en offrons ici une nouvelle.

Son envergure est la même que ce le de la nymphale Médée. Le dessus des ailes est noir, avec deux rangs de petites lunules jaunâtres à l'extrémité des inférieures, & un & demi à l'extrémité des supérieures. Ces dernières ailes ont au sommet deux taches ferrugineuses; sur le milieu une bande jaune, oblique, sinuée, & terminée inférieurement en pointe; à la base un trait jaunâtre, longitudinal.

Leur dessous est noirâtre, avec tout le pourtour d'un gris de perle, & une bande & un trait longitudinal jaunes communs en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris de perle avec un croissant brun à la base, & une rangée courbe de cinq points noirs inégaux au-delà du milieu. Entre le croissant & les points susdits, est un espace brun, très-grand, profondément bifide à son côté externe, & marqué près de la côte d'une tache marron, sémilunaire. On voit en outre sur le limbe postérieur une ligne arquée d'un gris plus clair que le fond de l'aile. Le corps est noir en

dessus. & présente derrière la tête quatre points, dont les deux intermédiaires blanchâtres, les deux autres ferrugineux. Les antennes sont comme dans l'espèce précédente.

Du Brésil.

Nota. L'individu figuré par Cramer & décrit par Fabricius est le mâle. Il diffère des femelles, en ce que la bande jaune des premières ailes est moins allongée de part & d'autre; en ce que le dessus des inférieures a tout le milieu ferrugineux & coupé transversalement en arrière par une ligne noire, tantôt maculaire, tantôt continue.

206. NYMPHALE Volumna.

NYMPHALIS Volumna.

Nym. alis subdentatis, suprâ cærulescenti-nigris; subtus anticis annulis, fasciâque nitide rufescentibus, posticis ocellis tribus, anteriori bipupillato.

Nous n'avons vu de cette espèce qu'un seul échantillon, dont nous n'avons pu déterminer le sexe.

Son envergure est d'environ trois pouces. Le dessus des ailes est noir, avec une teinte bleuâtre qui forme sur le limbe terminal des inférieures une ligne peu prononcée.

Le dessous des premières ailes est noirâtre, avec deux taches annulaires d'un vert-bleuâtre-luisant, & séparées par une bande tortueuse de leur couleur. Le bord postérieur est en outre d'un gris-violâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-violâtre, avec des chevrons noirâtres à la base & à l'extrémité; une bande verdâtre, transverse & située au-delà du milieu. La bande susdite est chargée de trois yeux, dont l'antérieur plus grand, solitaire & bipupillé. La prunelle de ces yeux est colorée comme la bande, & leur iris est d'un brun-rouillâtre. Le corps est de part & d'autre du même ton que les ailes. Les antennes sont noires, avec le dessous de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

207. NYMPHALE Sydonia.

NYMPHALIS Sydonia.

Nym. alis subdentatis, suprâ fusco-nigris, immaculatis, basi violaceo macantibus; subtus palhdioribus, punctis quatuor rufescentibus.

Nous n'avons vu que des mâles de cette espèce. Leur envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec un reflet violet à la base. Le reflet des secondes ailes a peu d'étendue; celui des premières au contraire longe au moins les deux tiers de la côte, & s'étend jusqu'au milieu de la surface.

Le dessous des ailes supérieures est d'un gris-obscur, avec un point, & deux bandes obliques,

noirâtres. Il y a en outre vis-à-vis du sommet, qui est d'une teinte violâtre, une rangée courbe & transverse de quatre points verdâtres.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-violâtre, avec quelques lignes obscures, flexueuses & peu prononcées, puis quatre points verdâtres, rapprochés deux à deux. Le bord postérieur des quatre ailes est faiblement entrecoupé de blanchâtre. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes, annelées de gris, avec la sommité de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

208. NYMPHALE Mygdonia.

NYMPHALIS Mygdonia.

Nym. alis subdentatis, suprâ nigro-fuscis; posticis subtus maculis cauleis ocellisque quatuor obsoletis, geminatis.

Nous n'avons vu que des femelles. Leur envergure est d'environ deux pouces & demi. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, faiblement teinté de violet, avec cinq taches blanchâtres peu distinctes à l'extrémité des supérieures, & une ligne ondulée obscure sur le limbe terminal des inférieures.

Le dessous des ailes de devant est d'un brun-cendré à la base & sans aucune tache; noirâtre au milieu, avec six taches blanchâtres dont l'antérieure solitaire, les cinq autres répondant à celles du dessus; violâtre au sommet, avec une poulrière ceudrée.

Le dessous des ailes de derrière est d'un brun-violâtre, avec deux taches marron vers l'origine de la côte, & deux lignes flexueuses noirâtres au-delà du milieu. Ces deux lignes renferment quatre yeux rouillâtres, rapprochés deux à deux, & ayant chacun un iris noirâtre & une prunelle violâtre. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes, annelées de blanchâtre en dessous, avec le bout de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

Nota. Ne seroit-ce pas la femelle du *Sydonia* ?

209. NYMPHALE Alpais.

NYMPHALIS Alpais.

Nym. alis subdentatis, fuscis; anticis apice cærulescenti-nigro alboque maculato; posticis subtus ocellis tribus, anteriori bipupillato.

Nous n'avons vu qu'un seul individu, dont il nous a été impossible de reconnoître le sexe, vu le mauvais état de l'abdomen.

Son envergure est presque de trois pouces. Le dessus des ailes est brun, avec le sommet des supérieures glacé de bleu-violet & marqué de cinq taches blanches, le bord terminal des inférieures précédé d'une ligne noirâtre ondulée.

Le dessous des premières ailes ressemble beaucoup

comp au dessus, mais il offre vers la base un croissant blanchâtre solitaire, & le sommet est d'un gris-violet, avec six points noirâtres, dont les quatre postérieurs disposés en une ligne courbe & transversale.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-violet, avec deux taches, puis deux lignes tortueuses, d'un brun-puce. Entre les deux lignes susdites, sont trois yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre. L'œil antérieur est séparé des autres & bipupillé; le second est moitié moins gros que l'anal, auquel il est presque contigu.

Du Brésil.

210. NYMPHALE Maia.

NYMPHALIS Maia.

Nym. alis subdentatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtus anticis puncto basibus nigricante, posticis quatuor virefcentibus geminatis, secundo majore.

Papilio N. Maia, alis dentatis, fuscis : anticis albo maculatis, posticis immaculatis. FAB. *Syfl. Ent. p. 512. n.º. 293. — Spec. Inf. tom. 2. p. 103. n.º. 454. — Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n.º. 552. — Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 138. n.º. 426.*

Papilio Anna. CRAM. *pl. 281. fig. A. B. (Le mâle.)*

Papilio Anna. HERBST, *tab. 223. fig. 6.*

Fabricius s'est trompé, non-seulement en prenant la femelle pour le mâle, mais encore en rapportant à cette espèce notre *Agathis mâle* ou *Agathina* de Cramer.

Elle a entre deux pouces & un quart & deux pouces & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, glacé de violet à la base des quatre ailes, & chargé vers l'extrémité des supérieures de six taches blanches peu prononcées.

Le dessus de la femelle est d'un brun plus clair & sans rellet, avec l'extrémité des premières ailes noirâtre & chargée de six taches blanches très-distinctes. Ces taches sont disposées ainsi : 1, 3, 2.

Le dessous des ailes supérieures, du mâle comme de la femelle, est d'un gris-cendré à la base, avec un seul point noirâtre; traversé au-delà du milieu par une bande fluée, également noirâtre, & sur laquelle sont des taches blanches ou blanchâtres correspondant à celles du dessus; d'un gris-violet au sommet, avec une ligne transversale de quatre chevrons bruns dont la convexité est tournée en dedans.

Le dessous des secondes ailes, dans les deux sexes, est d'un gris légèrement glacé de violet, avec deux points noirâtres vers la base; deux lignes brunes, transverses & flexueuses, au-delà du milieu; quatre points noirs, fablés de vert, rapprochés deux à deux, & dont le second plus gros & plus brillant, entre les lignes susdites. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont

Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

brunes, annelées de gris, avec le bout de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

Nota. Quelquefois les points verts des ailes inférieures ont un iris jaunâtre, mais moins prononcé que dans la figure de Cramer.

211. NYMPHALE Orphise.

NYMPHALIS Orphise.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtus anticis puncto basibus nigricante, posticis quatuor virefcentibus geminatis, anteriori majore.

Papilio Orphise. CRAM. *pl. 42. fig. E. F. (Le mâle.)*

Elle ressemble extrêmement à la nymphale *Maia*, mais elle est toujours plus petite; ses quatre ailes sont arrondies & entières; l'extrémité des supérieures n'offre que cinq taches blanches de part & d'autre, & elles sont ordinairement aussi distinctes dans le mâle que dans la femelle; les quatre petites taches brunes du sommet des ailes supérieures en dessous sont en croissants, & non en chevrons; la ligne brune antérieure du dessous des secondes ailes est bien moins flexueuse, ou plutôt en forme de V très-ouvert; le premier œil de ces mêmes ailes, à partir d'en haut, est plus gros & plus brillant que le second, tandis que c'est le contraire dans la nymphale *Maia*. Ces différences sont très-minutieuses, sans doute; mais puisqu'elles sont constantes, elles peuvent, ce nous semble, être regardées comme caractéristiques.

Nous avons vu un mâle dont le dessus des premières ailes est absolument sans taches, & dont le dessous en a cinq blanchâtres peu prononcées.

De l'Amérique équinoxiale. — Suivant Cramer, elle se trouveroit à Surinam & au Cap de Bonne-Espérance.

212. NYMPHALE Macris.

NYMPHALIS Macris.

Nym. alis subdentatis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtus anticis ocellis tribus obsoletis, posticis septem.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-foncé, avec un rellet violet; le dessus de la femelle d'un brun-cendré & sans rellet. Dans l'un & dans l'autre, l'extrémité des premières ailes est noirâtre, avec cinq points blancs; & le limbe terminal des secondes ailes offre deux lignes noirâtres, dont l'antérieure formée par des points, la postérieure ondulée.

Le dessous des premières ailes est gris à la base, avec trois petites taches noirâtres, rangées obliquement; noirâtre au-delà du milieu, avec cinq points blancs conformes à ceux du dessus; gris au sommet, avec trois points noirs à prunelle bleue.

Ggg

tre, puis une ligne de quatre chevrons bruns dont la convexité est tournée en dehors.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris légèrement nuancé de violet, avec trois lignes brunes, transverses & très-flexueuses, dont la première avoisinant la base, les deux autres séparées par une série de sept yeux peu prononcés, & ayant, à l'exception du quatrième qui est plus petit, une prunelle bleuâtre ou verdâtre.

Cette espèce nous a fourni une variété mâle dont le dessous des secondes ailes est d'un brun très-obscur, excepté à l'angle externe où il y a un grand espace jaunâtre, femi-circulaire.

Du Brésil.

215. NYMPHALE Myrto.

NYMPHALIS Myrto.

Nym. alis integris, supra fuscis : subtus anticis basi immaculata, posticis ocellis quinque obsoletis.

Papilio Monima. CRAM. pl. 587. fig. F. G.

Nous ne connoissons de cette espèce que l'individu figuré par Cramer sous le nom de *Monima*.

Il ressemble en dessus à la femelle du *Maia*, mais il n'a que cinq taches blanches à l'extrémité des ailes supérieures. En dessous, le fond de ces mêmes ailes est d'un gris-rouffâtre, sans aucune tache à la base, & l'on ne compte que quatre taches blanches au sommet. Le dessous des ailes inférieures est d'un gris-bleuâtre, avec deux traits, & une tache annulaire, bruns à la base, puis deux lignes brunes, flexueuses, entre lesquelles il y a une rangée transversée de cinq points noirs, cerclés de jaunâtre.

Cramer dit qu'elle habite la côte de Guinée. — Est-ce bien la patrie ?

N. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

214. NYMPHALE Marfolia.

NYMPHALIS Marfolia.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis (in mare violaceo micantibus) : subtus anticis punctis basibus nigricantibus, posticis ocellis septem obsoletis.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Les dessus du mâle est d'un brun-foncé à reflet violet, sans taches aux ailes supérieures (du moins dans l'individu que nous avons vu), avec une rangée de points & une ligne ondulée noirâtres sur le bord terminal des inférieures.

Le dessus de la femelle est d'un brun-cendré, avec cinq taches blanches à l'extrémité des premières ailes, un rang de points & une ligne noirâtre à l'extrémité des secondes.

Le dessous des ailes supérieures est grisâtre à la base, avec deux points noirâtres dans le mâle, & trois dans la femelle; noirâtre au-delà du milieu, avec cinq taches blanches ou blanchâtres, suivies d'une ligne transversée de quatre croissants bruns, placés sur un fond grisâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris plus ou moins clair & légèrement nuancé de violet, avec trois lignes ferrugineuses très-fines, & dont les deux postérieures séparées par une série de sept yeux de leur couleur, & ayant tous, à l'exception de l'anal, une prunelle violâtre.

Du Brésil.

215. NYMPHALE Amélie.

NYMPHALIS Amelia.

Nym. alis integerrimis, supra fusco-corticinis : anticis apice nigro, fasciâ punctisque albis : posticis subtus maculis ocellaribus castaneis.

Papilio Amelia. CRAM. pl. 156. fig. B. C.

Nous n'avons vu qu'un seul échantillon de cette espèce, & nous soupçonnons que c'est une femelle.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-tanné-obscur, avec environ la moitié postérieure des premières noire & offrant une bande transversée, puis deux points, très-blancs. Le dessous des ailes supérieures est grisâtre à la base, avec un point noirâtre; ensuite noir jusqu'au bout, avec une bande & deux points comme en dessus.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-violâtre-chatoyant, avec des taches marron, dont les postérieures presqu'oculaires. Outre cela, le bord terminal est jaunâtre & divisé par une ligne obscure, flexueuse.

De Surinam.

216. NYMPHALE Euphémie.

NYMPHALIS Euphemia.

Nym. alis integris, supra nitidè cyaneis disco nigro : subtus fuscis, posticis ocellis quatuor geminatis.

Papilio Eurota. CRAM. pl. 24. fig. C. D.

Nous ne connoissons cette espèce que par un seul individu, qui paroit être un mâle. Il a près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un bleu-luisant, tirant un peu sur le violet, avec tous les bords, & un grand espace sur le milieu, noirs.

Le dessus des secondes ailes est noir depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite d'un bleu-luisant, avec le bord postérieur légèrement noir.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-pâle, avec le milieu tacheté de noirâtre.

Le dessous des ailes inférieures est du même brun que celui des précédentes, avec trois lignes

obscures, tranſverſes & ondulées, dont l'antérieure plus courte, les deux autres renfermant quatre yeux noirâtres à prunelle bleuâtre, & rapprochés deux à deux. Le corps & les antennes ſont d'un brun-noirâtre.

Du Bréſil.

217. NYPHALE Irénée.

NYMPHALIS Irenea.

Nym. alis integerrimis, nigro-fuscis, ſuprà fuſciâ mediâ albâ : ſubtus tribus albis, anteriori niſo cinâ.

Papilio Irenea. CRAM. pl. 528. fig. C. D.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Les quatre ailes ſont entières, d'un brun-noirâtre en deſſus, avec une bande blanche diſcoïdale, & deux lignes poſtérieures plus claires que le fond. La bande des ſecondes ailes eſt terminée à l'angle de l'aube par un groupe d'atomes bleuâtres. La bande des premières ailes ne monte pas juſqu'au bord antérieur, mais elle eſt précédée en dehors d'une tache blanche oblongue & faiſant face au ſommet.

Le deſſous offre trois bandes blanches, dont l'antérieure correſpondant à celle du deſſus, mais plus large & renfermée entre deux lignes rouſſes; la poſtérieure maculaire & étroite. Il y a eu outre à la baſe des premières ailes une ligne blanche longitudinale, ſurmontée d'une ligne rouſſe également longitudinale.

Nous ignorons ſi les deux ſexes ſe reſſemblent. Celui que nous avons vu paroît être le mâle.

De Surinam.

218. NYPHALE Poſtverta.

NYMPHALIS Poſtverta.

Nym. alis ſubdentatis, maris ſuprà æneo-ſubdentatis, ſemineæ fuſcis alboque fuſciatis : poſticipis ſubtus violaceo-albis, ſtrigis ſe.x ferrugineis ocellifque duobus.

Papilio N. Poſtverta, alis dentatis, viridibus, maculis margineque fuſcis : poſticipis ſubtus fuſcis albis, ocellis duobus. FAB. Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 100. n. 311. (Le mâle.)

Papilio Poſtverta. CRAM. pl. 254. fig. C. D. (Le mâle.)

Papilio Poſtverta. HERBST, tab. 225. fig. 4. 5.

Papilio N. Mylitta, alis dentatis, nigris, fuſcis tribus macularibus albis : poſticipis ocellis duobus. FAB. Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 101. n. 312. (La femelle.)

Papilio Mylitta. CRAM. pl. 253. fig. C. D. (La femelle.)

Papilio Mylitta. JOS. Fig. piçt. 6. tab. 31. fig. 3.

Les auteurs ont donné le mâle de cette eſpèce

ſous le nom de *Poſtverta*, & la femelle ſous celui de *Mylitta*.

Le mâle, dont l'envergure eſt d'environ un pouce & demi, a le deſſus de toutes les ailes d'un vert-bronzé-luiſant, avec le bord poſtérieur noir. Il y a en outre quatre taches de cette dernière couleur entre le milieu & le ſommet des ailes de devant.

La femelle eſt de la taille du mâle, & elle a le deſſus des ailes d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanches, communes, maculaires aux ſupérieures, continues aux inférieures. Ces dernières ailes offrent contre le côté interne de leur bande poſtérieure, & aſſez loin l'un de l'autre, deux yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-métallique.

Le deſſous des premières ailes, dans les deux ſexes, eſt d'un brun-noirâtre, avec huit taches blanches, dont deux obliques & alongées près de la baſe, les autres plus ou moins arrondies, & accompagnées vers la côte de petites lites d'un bleu-brillant.

Le deſſous des ailes inférieures, dans le mâle comme dans la femelle, eſt d'un blanc-violâtre, avec ſix raies ferrugineuſes, tranſverſales, dont la troiſième tourbue, la quatrième plus courte & appuyée ſur deux yeux, la cinquième & la ſixième arquées & parallèles au bord poſtérieur. Les deux yeux dont il vient d'être queſtion ſont noirs, avec l'iris d'un jaune-paille, la prunelle d'un bleu-métallique & de forme ſemi-lunaire. Le corps a le deſſus verdâtre ou noirâtre, ſelon le ſexe, & le deſſous griſâtre. Les antennes ſont noires, annelées de blanc, avec la ſommité de la maſſue jaunâtre.

De la Guyane & du Bréſil.

219. NYPHALE Sérina.

NYMPHALIS Serina.

Nym. alis ſubdentatis, maris ſuprà æneo-ſubdentatis, ſemineæ fuſcis alboque maculatis : poſticipis ſubtus albis, fuſcis quatuor luteis fuſco marginatis ocellifque duobus.

Papilio N. Serina, alis ſubdentatis, ſuprà viridibus : poſticipis ſubtus diſco albo ocellis duobus. FAB. Syſt. Ent. p. 497. n. 232. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 80. n. 352.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 43. n. 426.* — *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 100. n. 310.* (Le mâle.)

Papilio N. Egæa, alis dentatis, ſuprà nigris, fuſciâ communi albâ : poſticipis ſubtus ocellis duobus. FAB. Syſt. Ent. p. 496. n. 231. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 79. n. 351.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 43. n. 424.* — *Ent. Syſt. em. tom. 3. pars 1. p. 100. n. 309.* (La femelle.)

Les papillons *Serina* & *Egæa* de Fabricius ne ſont qu'une ſeule eſpèce, dont le premier eſt le mâle, & le ſecond la femelle.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le

dessus du mâle est comme dans le *Postverta*, avec cette différence que les ailes supérieures n'ont que trois taches noires vers le sommet, & que le bord terminal des inférieures est entièrement divisé par une ligne courbe du même vert que le reste de la surface.

Le dessus de la femelle est d'un vert-bronzé à la base, puis d'un brun-noirâtre jusqu'au bout, avec cinq taches sur les supérieures, & deux bandes transverses sur les inférieures, blanches. Les taches des ailes de devant sont disposées ainsi : 1, 2, 2. La bande antérieure des ailes de derrière est droite & discoïdale, leur bande postérieure moins prononcée & un peu flexueuse.

Le dessous est le même dans le mâle & dans la femelle. Celui des premières ailes est d'un brun-noirâtre-pâle, avec cinq taches blanches, plus quatre lites & une ligne marginale d'un blanc-luisant. Il y a en outre à l'origine de la côte une tache jaune, longitudinale, & se courbant derrière la tache blanche antérieure. Le dessous des secondes ailes est blanc, avec quatre bandes jaunes, dont la deuxième marquée de plusieurs lites, & la postérieure d'une ligne, bleues; la troisième bilobée en arrière, plus courte que les autres, & offrant deux yeux noirs à prunelle orbiculaire d'un bleu-luisant. Toutes ces bandes sont bordées de brun-obscur. Le corps & les antennes sont comme dans l'espèce précédente.

Du Brésil.

Nota. M. le chevalier de Langsdorff possède un mâle & deux femelles plus petits, & qui se distinguent des individus ordinaires en ce que le jaune de la bande bilobée du dessous des secondes ailes ne forme pas iris autour des deux yeux. Les femelles ne paroissent pas avoir eu le dessus des ailes vert à la base. Ces légères différences suffisoient pour constituer une espèce séparée ?

220. NYMPHALE *Artemisia*.

NYMPHALIS Artemisia.

Nym. alis dentatis, nigris : anticis maculis, posticis fasciâ, albis : posticis subtus ocellis duobus argenteis. FAB.

Papilio N. Artemisia. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 101. n.º 313.*

Papilio Artemisia. JON. *Fig. pict. 6. tab. 52. fig. 1.*

Si ce lépidoptère n'est point une variété femelle de l'espèce précédente, il doit être au moins la femelle d'une espèce extrêmement voisine.

Voici ce qu'en dit Fabricius : son port est le même que celui du *Serica*. Ses quatre ailes sont noires, avec une tache (des taches selon la phrase spécifique) blanche sur les premières, & une bande de cette couleur sur les secondes.

Le dessous des ailes de devant ressemble au des-

sus, mais il y a à la base une tache jaune, oblongue.

Le dessous des ailes de derrière est blanc, & présente à la base une raie jaune, transversale; au milieu une bande bleue, bordée de noir & ayant des lites argentées; plus bas une bande brune, courte, sur laquelle sont deux taches argentées qu'entoure un cercle noir. Le bord postérieur est jaune, & divisé par une ligne argentée.

De l'Amérique.

221. NYMPHALE *Johanna*.

NYMPHALIS Johanna.

Nym. alis subdentatis, supra æneo-iridibus, anticarum apice fusco maculis sex albis : posticis utrinquè ocellatis.

Nous n'avons vu de cette espèce que deux individus qui nous paroissent être des femelles.

Ils ont le port & presque la taille du *Postverta*. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un vert-bronzé; le milieu & l'extrémité chargés de six taches blanches, disposées ainsi : 1, 2, 3.

Le dessous des secondes ailes est d'un vert-bronzé, avec le bord postérieur entièrement noirâtre. Le milieu de la surface offre en outre une bande blanchâtre, derrière laquelle il y a une rangée transverse de quatre yeux noirs à prunelle verdâtre.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais la base est jaune, avec des lites d'un blanc-luisant, & le bord postérieur est violâtre, avec une ligne obscure qui descend de la côte à l'angle interne.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec six lignes transverses, dont les trois antérieures d'un brun-rouillâtre, les trois autres d'un gris-violâtre. La quatrième & la cinquième lignes embrassent six yeux noirs à prunelle d'un bleu-argenté & à iris jaune-paille. Les deux yeux extrêmes, & le troisième, à partir d'en haut, sont plus petits que les autres.

Du Brésil.

222. NYMPHALE *Irma*.

NYMPHALIS Irma.

Nym. alis subdentatis, supra æneo-iridibus, anticarum apice fusco maculis cinerascensibus : posticis subtus griseis, snglis tribus ferrugineis, anteriori bifidâ.

Elle est un peu plus petite que le *Postverta*. Le dessus des premières ailes est d'un vert-bronzé depuis la base jusque vers le milieu; ensuite d'un brun-noirâtre jusqu'au bout, avec cinq taches dont les trois antérieures cendrées & formant une ligne oblique, les deux postérieures blanchâtres & plus petites.

Le dessus des secondes ailes est d'un vert-bronzé, avec trois lignes noires, courbes, à l'extrémité.

Le dessous des ailes de devant est jaune à la base, avec des litures bleues, dont une longitudinale; d'un brun-noirâtre au milieu, avec quatre taches blanches; d'un gris-violetâtre au sommet, avec une ligne transversée & le bord postérieur ferrugineux.

Le dessous des ailes de derrière est d'un gris-fatiné & légèrement teinté de violet, avec trois lignes ferrugineuses, transversées, dont l'antérieure fortement bifide; les deux autres courbes, parallèles entr'elles & au bord postérieur, lequel est lui-même entrecoupé de ferrugineux.

Du Brésil.

Nota. La femelle ressemble au mâle, du moins au tant que nous avons pu en juger par des individus desséchés.

225. NYMPHALE Inès.

NYMPHALIS Ines.

Nym. alis subdentatis, supra œneo-viridibus: anticis utrinque apice fusco, albo maculato: posticis subtus albis, strigis quinque fuscis.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu unique, sans corps & sans antennes.

Il a approchant la taille du *Postverta*. Le dessus des premières ailes est d'un vert-bronzé à la base; ensuite d'un brun-noirâtre, avec cinq taches blanches, disposées ainsi: 2, 2, 1.

Le dessus des secondes ailes est d'un vert-bronzé, avec deux taches blanches à l'angle externe, & trois lignes courbes d'un brun-noirâtre à l'extrémité.

Le dessous des ailes supérieures est d'un brun-obscur, avec six taches blanches, dont la plus antérieure longitudinale & bordée près de la côte par une ligne jaune que terminent deux litures d'un bleu-argenté.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec cinq lignes brunes, transversées, dont la seconde & la troisième, à partir d'en haut, se réunissant près du bord antérieur de l'aile.

Du Brésil.

224. NYMPHALE Cadma.

NYMPHALIS Cadma.

Nym. alis denticulatis, luteis: anticis utrinque areâ apicis nigrâ maculis duabus flavescens: posticis subtus ocellis duobus cœruleis.

Papilio N. Cadma, alis dentatis, fulvis: posticis subtus disco albo ocellis duobus pupillâ didymâ cœruleâ. FAB. *Syst. Ent. p. 497. n.º 254. — Spec. Inf. tom. 2. p. 80. n.º 356. — Mant. Inf. tom. 2. p. 44. n.º 451.*

Papilio S. Cadma. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 241. n.º 751.*

Papilio Cadmus. DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 18. fig. 1. 2.*

Fabricius avoit d'abord mis cette espèce parmi les *Nymphales*, mais il l'a reportée en dernier lieu dans la famille des *Satyres*.

Elle a environ un ponce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un jaune-jauve. Les supérieures, dont les deux surcotes font à peu près semblables, ont vers le bout de la côte un grand espace noir, sur lequel il y a deux taches d'un jaune-pâle; & à l'angle interne un point noir très-gros.

Les ailes inférieures sont sans taches en dessus, seulement leur sommet est un peu obscur. En dessous, ces mêmes ailes sont d'un brun-jaunâtre, avec une bande cendrée, transversale & offrant deux yeux bleus, dont l'antérieur à iris brun, le postérieur à iris jaune. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont noires.

De la Jamaïque, selon Drury.

De l'Amérique méridionale, selon Fabricius.

225. NYMPHALE Isis.

NYMPHALIS Isis.

Nym. alis fusco-nigris: anticis integris, utrinque maculâ disci chermesinâ; posticis dentatis, supra strigâ marginali albidâ.

Papilio N. Isis, alis dentatis: anticis atris, maculâ disci fungineâ: omnibus subtus viridi lineatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 124. n.º 377.*

Papilio Isis. JOX. *Fig. pict. 5. tab. 34. fig. 2.*

Papilio Isis. DONOV. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 9. pl. 1. fig. 1.*

Papilio Isis. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 7. fig. 1. 2.*

Nous n'avons vu qu'un seul individu de cette espèce. Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses premières ailes sont entières, noires en dessus, avec une tache cramoisie, discoidale, sinuée, se prolongeant en pointe jusqu'à la base. Les secondes ailes sont dentées, d'un brun-obscur, avec une ligne blanchâtre sur le bord postérieur.

Le dessous des quatre ailes est obscur, avec des lignes verdâtres, longitudinales & peu prononcées. A la tache rouge des premières ailes correspond une tache semblable, mais moins vive.

Du Brésil.

226. NYMPHALE Claudine.

NYMPHALIS Claudina.

Nym. alis subdentatis, nigris, singularum supra areâ lunari chermesinâ: posticis subtus basi mammoratis, apice septem ocellatis.

Papilio N. Claudia, alis crenatis, nigris, areâ

fanguinea : *posticis subtus marmoratis*, *ocellis septem*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 105. n.º. 325.*

Papilio Claudia. NATURF. 9. *tab. 2.*

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une tache transversale & semi-lunaire d'un rouge-carmin-chaoyant. La tache des premières ailes est très-grande & elle s'étend de la base à l'angle interne. Celle des secondes ailes est placée entre le disque & le milieu du bord postérieur qu'elle n'atteint pas.

Le dessous des ailes supérieures diffère du dessus, en ce que la tache rouge est moins vive, qu'elle est marquée près de la côte de deux gros points noirs & d'une petite tache jaunâtre; en ce que l'extrémité a deux bandes courbes & obliques, dont l'antérieure cendrée & plus courte, la postérieure blanchâtre.

Le dessous des ailes inférieures est noir, & présente les caractères que voici : à la base est un espace cendré, ponctué de noir, & qu'entoure un anneau jaune, ouvert à la partie supérieure & ayant le côté interne teinté de rouge; vient ensuite une ligne cendrée, transverse & flexueuse, laquelle est suivie d'une rangée marginale de sept yeux très-noirs à prunelle bleue & à iris jaune. L'œil anal est bipinné. Le corps est noir, avec des points blanchâtres sur la tête, ainsi que sur le devant du corselet, & une ligne jaune longitudinale sur le milieu du ventre.

Du Brésil.

Nota. L'individu d'après lequel nous avons fait cette description, a vers le milieu de la gouttière des secondes ailes une touffe de poils jaunes.

227. NYMPHALE PYRAME.

NYMPHALIS Pyramus.

Nym. alis subdentatis, nigris (in mare supra violaceo micantibus) : anticis utrinque fasciâ miniatâ : posticis subtus irroratis, punctis ocellaribus strigâque marginali cæruleiscentibus.

Papilio Pyramus. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 25. fig. 3. 4.* (Le mâle.)

Papilio Pyramus. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 32. fig. 3 & 5. c.*

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Le dessus du mâle est d'un noir-glacé de violet, avec une bande d'un rouge-coquelicot, descendant du milieu de la côte des premières ailes jusqu'au niveau du disque des secondes.

Le dessus de la femelle est sans reflet, & sa bande rouge, qui est d'ailleurs plus étroite, ne se prolonge pas sur les secondes ailes.

Le dessous des ailes supérieures, dans les deux sexes, est noir au milieu, avec une bande rouge

correspondant à celle de la surface opposée; griffâtre à l'extrémité, avec deux points noirs & une ligne ondulée bleuâtre. La base est aussi griffâtre.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-noirâtre, aspergé de gris, avec deux taches blanchâtres vers la base, une rangée de points oculaires & une ligne ondulée bleuâtre à l'extrémité. Vers le sommet ou angle externe, le fond prend une teinte rouillâtre qui s'étend plus dans certains individus que dans d'autres. Le bord postérieur des quatre ailes est entrecoupé de blanc.

Du Brésil.

228. NYMPHALE GALANTHIS.

NYMPHALIS Galanthis.

Nym. alis integerrimis, nigris : fasciis anticarum duabus, posticarum unicâ, supra chermesinis, subtus pallidioribus.

Papilio F. Galanthis, alis integerrimis, supra atris, sanguineo-fasciatis : anticis punctis duobus apicis albis. FAB. *Gen. Inf. Mant. 257. — Spec. Inf. tom. 2. p. 54. n.º. 238. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n.º. 276. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 46. n.º. 142.*

Papilio Galanthis. CRAM. *pl. 25. fig. D. E.*

Papilio Galanthis. HERBST, *pl. 138. fig. 1. 2.*

Cette nymphe ressemble beaucoup en dessus à celle que nous avons donnée sous le nom de *Rogerii* (n.º 75), mais elle en diffère par la forme & par le dessous des ailes.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-foncé, avec deux bandes cramoisies sur les supérieures, & une sur les inférieures. La bande antérieure des premières ailes occupe tout l'espace compris entre la base & le milieu de la surface; la postérieure est courbe, & elle se dirige obliquement de la côte vers l'extrémité du bord terminal, lequel est marqué de deux points blancs vis à vis du sommet. La bande des secondes ailes les traverse presque entièrement par le milieu.

Le dessous des quatre ailes offre les mêmes caractères que le dessus, mais le fond est d'un brun ferrugineux, & les bandes rouges, qui sont beaucoup plus pâles, ont le côté externe largement bordé par une teinte verdâtre.

De Surinam. — Rare dans les collections.

229. NYMPHALE SORANA.

NYMPHALIS Sorana.

Nym. alis subdentatis, nigris, violaceo micantibus : anticis utrinque fasciis duabus chermesinis, anteriore supra communi : posticis subtus ocellis duobus strigâque valde angulatâ cæruleiscentibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le dessus des premières ailes est d'un noir glacé de violet, avec deux bandes cramoisées, transversales, dont l'antérieure s'incurve en dehors, la postérieure courbe & plus étroite. Il y a en outre au sommet une raie jaune, oblique.

Le dessus des secondes ailes est aussi d'un noir glacé de violet, avec une bande cramoisie, plus ou moins longue, & faisant suite à celle de la base des ailes supérieures.

Le dessous de ces dernières ailes ressemble au dessus, mais l'origène de la côte est jaune, & le bord postérieur est presque entièrement longé par une ligne bleue.

Le dessous des ailes inférieures est noir, avec un 8 jaune, discoïdal, ouvert à sa partie supérieure, & renfermant deux yeux noirs à prunelle & à iris bleus, mais dont le postérieur bipupillé. Après ces yeux vient une ligne bleue, très-anguleuse, & s'appuyant sur un arc jaune parallèle au bord postérieur. La base offre en outre un arc semblable qui se réunit inférieurement au 8 dont nous venons de parler. Les échancrures des quatre ailes sont blanches, & l'on voit des points de cette couleur sur la tête & sur la poitrine. Les antennes sont tout-à-fait noires.

La femelle est comme le mâle, excepté que le dessus des ailes supérieures a la bande rouge moins prononcée, & le reflet violet plus circonscrit.

Du Brésil.

250. NYMPHALE Pithéas.

NYMPHALIS Pithæas.

Nym. alis integerrimis, nigris : anticis utrinque areâ lunari chermesinâ, anteriore supra communi : posticis subtus disco pallidè roseo ocellis duobus pupillâ cœrulescente.

Erycina Pithæas, alis integerrimis, rotundatis : anticis penitus posticisque supra nigris ; anticis fasciis duabus miniatis, illarum una communi : alarum posticarum medio infero pallidè roseo, lineis tribus circularibus circumscripto, alterâ flavâ & intermediâ. Recueil d'observ. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, vol. 2. p. 90. pl. 57. fig. 5. 6.

Elle est de la taille de la précédente, à laquelle elle ressemble à peu près par le dessus des quatre ailes & par le dessous des supérieures.

Le dessous de ses ailes inférieures a le milieu d'un rose-pâle, avec deux taches noires, rondes, assez grandes, écartées l'une de l'autre, offrant chacune à leur centre un point bleuâtre. La couleur rose est entourée par du noir que divisent deux arcs jaunes, dont l'un longeant le bord interne de l'aile, l'autre le bord postérieur. Il y a en outre à l'angle de l'anus deux petits traits bleuâtres.

Du Pérou.

251. NYMPHALE Coudomanus.

NYMPHALIS Condomanus.

Nym. alis integris, violaceo-nigris : anticis utrinque fasciis duabus chermesinâ, anteriore supra communi : posticis subtus annulis duobus liturâque mediâ flavis.

Papilio F. Condomanus, alis integerrimis, atris, sanguineo fasciatis : posticis subtus lineis annularibus flavis punctisque cœruleis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 53. n. 165.

Papilio Astarte. CRAM. pl. 256. fig. C. D.

Quoique Fabricius ne rapporte son *Condomanus* à aucune figure, il n'y a point de doute que ce ne soit le même que l'*Astarte* de Cramer.

Il est à peu près de la taille des deux précédens, auxquels il ressemble beaucoup par le dessus des quatre ailes & par le dessous des supérieures.

Le dessous de ses ailes inférieures est noir, avec un anneau jaune, discoïdal, ovalaire, renfermant trois points bleus, dont le postérieur séparé des deux autres par un trait jaune. Après l'anneau susdit vient une ligne bleue maculaire, puis une ligne jaune longeant tout le bord postérieur. Il y a une autre ligne jaune vers la base, mais elle ne se réunit pas à l'anneau du milieu comme dans la nymphe *Sorana*.

L'individu figuré par Cramer a deux points blancs près de l'angle anal des ailes inférieures en dessus. Ce caractère est peut-être propre à la femelle, que nous ne connoissons pas, car il n'existe dans aucun des mâles qui nous ont passé sous les yeux.

De Surinam & du Brésil.

252. NYMPHALE Pygas.

NYMPHALIS Pygas.

Nym. alis subdentatis, nigris : anticis utrinque areâ lunari chermesinâ : posticis subtus annulis tribus strigâque basilari flavis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir un peu chatoyant, avec un espace cramoisé, grand & semi-lunaire, sur le milieu des supérieures, lesquelles ont, outre cela, deux points blancs vis-à-vis du sommet. Les ailes inférieures ont près de l'angle de l'anus une rangée de trois à quatre points d'un bleu-pâle.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que l'origène de la côte est jaune, & qu'il y a à l'extrémité une ligne transverse de cette couleur, puis une ligne bleue qui longe tout le bord.

Le dessous des secondes ailes est noir, avec trois cercles jaunes, dont les deux intermédiaires fermés & adhérent l'un à l'autre; l'extérieur très-ouvert près du bord interne de l'aile, & doublé près de la base. Le cercle intermédiaire supérieur

renferme trois points bleus, & l'inférieur deux. Il y a en outre une ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord terminal. Ce bord est liseré de blanc aux échancrures, ainsi que le bord analogue des premières ailes. Les antennes sont noires, annelées de blanc en dessous, avec la sommité de la maille jaunâtre.

Du Brésil.

Nota. Tous les sujets que nous avons vus paroissent être des mâles.

255. NYMPHALE Pyracmon.

NYMPHALIS Pyracmon.

Nym. alis subdentatis, nigris (in mare cyaneo nitidis) : anticis utrinque fasciâ chermesinâ, bifidâ : posticis subtus annulis tribus strigâque basilaris flavis.

Elle est un peu plus petite que la précédente. Ses ailes sont noires en dessus, avec le milieu des supérieures traversé par une bande cramoisie & bise d'antérieurement; le milieu des inférieures glacé de bleu changeant. Les premières ont un point blanc vis-à-vis du sommet, & les secondes deux points d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

Dans la femelle, la bande rouge des ailes supérieures est plus étroite, & le milieu des inférieures est tout-à-fait noir; mais en revanche ces dernières offrent vers l'angle anal une série de huit à neuf points d'un bleu-argenté.

Le dessous des ailes supérieures, dans les deux sexes, ressemble au dessus, excepté que l'origine de la côte est jaune, & qu'il y a à l'extrémité une ligne traversée de cette couleur, puis une ligne bleue plus longue.

Le dessous des secondes ailes est noir, avec trois cercles jaunes, dont les deux intermédiaires adhérent l'un à l'autre; l'extérieur ouvert près du bord interne de l'aile & doublé du côté de la base. Le cercle intermédiaire supérieur est aussi ouvert près du bord interne, & il ne renferme qu'un point bleu; l'inférieur en contient deux comme dans les espèces précédentes: il y a en outre une ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord postérieur. Ce bord est liseré de blanc aux échancrures, ainsi que le bord analogue des ailes supérieures. Les antennes ne diffèrent point de celles du *Pygas*.

Du Brésil.

254. NYMPHALE Hydaspes.

NYMPHALIS Hydaspes.

Nym. alis subdentatis, nigris, basi suprâ nitidâ cyaneâ : anticis utrinque fasciâ chermesinâ, abbreviatâ : posticis subtus annulis duobus flavis punctisque quatuor ocellaribus.

Papilio F. Hydaspes, alis integerrimis, fuscis, cæruleo micantibus: posticis subtus flavis, lineis

annularibus nigris punctisque cæruleis FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 54. n°. 167.*

Papilio Hydaspes. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 15. fig. 2 3.*

Elle est aussi plus petite que le *Pygas*. Ses ailes sont noires, avec la base des quatre glacée de bleu en dessus, & le milieu des supérieures traversé par une bande cramoisie qui n'atteint ni la côte, ni le bord interne.

Le dessous de ces dernières ailes offre un point, & une bande correspondant à celle du dessus, rouges; plus deux lignes jaunes, dont l'une couvrait environ la moitié antérieure de la côte, l'autre placée transversalement vis-à-vis du sommet, & suivie parfois d'un point bleuâtre.

Le dessous des secondes ailes a deux cercles jaunes, ouverts, dont l'intérieur offrant trois points blancs & un point jaune entourés de bleu extérieurement. Il y a en outre à l'angle de l'anus trois ou quatre petites taches d'un bleu-métallique. Les échancrures de toutes les ailes sont blanches, & les antennes entièrement noires.

Nous ignorons en quoi la femelle diffère du mâle.

Du Brésil.

255. NYMPHALE Hydarnis.

NYMPHALIS Hydarnis.

Nym. alis integris, suprâ nigris, basi cyaneo nitidis : anticis fasciâ chermesinâ, abbreviatâ : posticis subtus annulis quinque maculisque duabus bipunctatis nigris.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le dessous des ailes est noir, avec la base des supérieures, & le milieu des inférieures à partir de leur origine, d'un bleu-luisant, qui devient violet ou verdâtre selon les aspects. Les ailes supérieures ont une bande cramoisie, un peu finie, & se dirigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle interne. Il y a en outre un point blanc à leur angle externe. Les secondes ailes ont sur le limbe postérieur une ligne maculaire d'un bleu-métallique.

Le dessous des premières ailes est d'un rouge-carmiu depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite noir jusqu'au bout, avec deux lignes courbes & transverses, dont l'antérieure plus courte & d'un blanc-jaunâtre, la postérieure moins large & d'un blanc-bleuâtre. La base offre outre cela deux traits jaunâtres, longitudinaux, dont l'antérieur placé sur la côte.

Le dessous des secondes ailes est gris, avec cinq anneaux noirs, dont deux excentriques, plus petits, & renfermant chacun une tache noire sur laquelle sont deux points tantôt gris, tantôt d'un blanc-bleuâtre. Le bord antérieur des mêmes ailes a du rouge vers son origine, & la tranche

du bord postérieur des quatre offre une frange blanche, finement entrecoupée de noir. Les antennes sont de cette dernière couleur, avec le bout de la massue jaunâtre.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du Brésil.

256. NYMPHALE Clyménus.

NYMPHALIS Clymenus.

Nym. alis integris, suprâ nigris (in mare violaceo mutabili micantibus) : fasciâ, anticarum mediâ, posticarum marginali, inaurato-iridi : posticis subtus griseis, annulis quinque punctisque quatuor nigris.

Papilio F. Clymenus, alis integris, fasciâ cyanâ : subtis anticis sanguineis ; posticis albis, annulis punctisque atris. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n°. 252. — Mant. Inf. tom. 2. p. 26. n°. 268. — Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 43. n°. 151.

Papilio Clymena. GRAM. pl. 24. fig. E. F.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec un rellet d'un bleu-violet changeant dans le mâle, sans rellet dans la femelle. Les premières ailes des deux sexes ont à la base une ligne longitudinale, au milieu une bande transversale, au sommet une liture oblique, d'un vert qui paroît plus ou moins doré selon le point d'où vient la lumière. Les secondes ailes ont le long du bord terminal une bande d'un vert-doré ou bleuâtre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un rouge-carmin depuis son origine jusqu'au-delà du milieu; puis noir jusqu'à l'extrémité, avec quatre lignes grises, dont deux longitudinales à la base, & deux transverses, dont l'antérieure plus courte, au bord postérieur.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris-foncé, avec cinq anneaux noirs, dont trois concentriques & ouverts près de la côte qui est en majeure partie du même rouge que le fond des ailes de devant. Ces cercles renferment deux ovales noirs, séparés ou tangens, & dans chacun desquels il y a deux points également noirs. La tranche du bord terminal de toutes les ailes est blanche & entrecoupée de noir. Le corps est noir en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rouffâtre.

De la Guyane & du Brésil.

257. NYMPHALE Euclides.

NYMPHALIS Euclides.

Nym. alis integris, suprâ nigris (in mare violaceo mutabili micantibus) : fasciâ singularum submediâ inaurato-iridi : posticis subtus griseis, annulis quinque punctisque tribus nigris.

Erycina Euclides, alis integerrimis, suprâ Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

atris, fasciâ cœruleâ, radios aurato-irides reflexente; alis anticis infrâ basin versus rufescentibus, in medio nigris, ad apicem superum lucido-griseis lineâque nigrâ notatis; posticis infrâ lucido-griseis, ad costam superam miniatis; alâ singulari lineis fuscis, circum duos magnos, subconcentricos figurisque totidem subovatis in medio, delinearibus: figurâ superâ punctum unicum, inferâ duo, includentibus. Recueil d'observation de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. p. 240. pl. 24. fig. 5. 4.

Erycina Euclides. Recueil d'observ. de zool., &c. vol. 2. p. 151. pl. 42. fig. 5. 6.

Elle diffère du *Clyménus*, en ce que la bande verte du dessus des secondes ailes est beaucoup plus rapprochée du milieu, en ce que l'ovale supérieur de leur dessous ne renferme qu'un seul point noir au lieu de deux.

Du Pérou.

258. NYMPHALE Candréna.

NYMPHALIS Candrena.

Nym. alis integris, suprâ nigris (in mare basi violaceo micantibus) : apice anticarum atrâ, posticarum fasciâ, inaurato-iridibus : posticis subtus griseis, annulis sex nigris.

Elle est approchant de la taille des trois précédentes. Le dessus des ailes est noir, avec la base glacée de bleu-violet dans le mâle. Les ailes supérieures ont à leur origine un trait longitudinal, à leur extrémité un chevron transversal & maculaire, d'un vert-doré. Les secondes ailes ont sur le bord postérieur une bande du même vert, mais elle ne monte pas jusqu'à l'angle externe.

Le dessous des ailes de devant est comme dans le *Clyménus*, avec cette différence que les deux lignes grises du bout sont séparées par une liture bleuâtre.

Le dessous des ailes de derrière est d'un gris-foncé, avec six anneaux noirs, dont trois concentriques, & ouverts près de la côte qui est presque entièrement rouge; le quatrième ovale; les deux autres ronds, très-petits, adhérens, & placés au-dessous du précédent qu'ils touchent parfois. La tranche du bord postérieur de toutes les ailes, le corps & les antennes ressemblent à peu près aux parties analogues du *Clyménus*.

Du Brésil.

259. NYMPHALE Ooppel.

NYMPHALIS Ooppelii.

Nym. alis integris, suprâ nigris : anticarum fasciâ mediâ, posticarum lineâ marginali, inaurato-iridibus : posticis subtus pallide ochraceis, strigis duabus nigris, parallelis.

Erycina Ooppelii, alis suprâ atris; anticarum

medio fasciâ aurato-rubri, transversâ; posticis, margini postico proximè, lineâ cærulescenti: prioribus infra nigris; illarum basi & apice, posteriorum paginâ inferâ totâ, pallido-ochraceis; harum singulâ strigis duabus nigris, parallelis. Recueil d'observat. de zool. & d'anat. comp. par Alex. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, vol. 1. p. 237. pl. 24. fig. 1. 2.

Le dessus des ailes est comme dans le *Clyménus*, mais la bande marginale des inférieures est plus étroite.

Le dessous est d'un jaune d'ocre pâle, avec une bande noire, transverse & très-large, sur le milieu des ailes de devant; avec deux lignes transverses & parallèles de cette couleur sur le milieu des ailes de derrière. Les premières ailes ont en outre tout le bord postérieur noir.

Dédiée à M. Oepel, peintre-naturaliste de S. M. le roi de Bavière.

Bords de la rivière des Amazones.

240. NYMPHALE Tytius.

NYMPHALIS Tytius.

Nym. alis integerrimis, fuscis, fasciâ communi albâ: anticarum interruptâ: singulis subtus punctis basibus ocellaribus nigris.

Papilio F. Tytius, alis integerrimis, fuscis, albo maculatis: anticis punctis quatuor ocellaribus atris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 43. n^o. 147.

Papilio Tytea. CRAM. pl. 121. fig. C. D.

Elle a deux pouces de largeur, & elle est d'un brun-obscur en dessus. Ses premières ailes ont à la base quatre taches noires, cerclées de blanc, & au-delà du milieu une bande blanche, transverse, courbe, interrompue. Ses secondes ailes ont près de leur origine une tache noirâtre, & à l'extrémité une bande transverse, puis une série de points blancs.

Le dessous ressemble beaucoup au dessus, mais il est plus pâle, & les ailes inférieures ont vers la base plusieurs points noirs, épars, & un peu oculaires.

De Surinam.

241. NYMPHALE Soronus.

NYMPHALIS Soronus.

Nym. alis integerrimis, fuscis, maculis plurimis ocellaribus nigris: anticis utrinquè fasciâ lutescente, mediâ.

Papilio Soronus. CRAM. pl. 355. fig. A. B. (Le mâle?)

Papilio Orestes. CRAM. pl. 282. fig. A. B. (La femelle?)

Les papillons *Soronus* & *Orestes* de Cramer

forment, ce nous semble, une seule espèce, dont le premier pourroit bien être le mâle, & le second la femelle.

Son envergure est d'environ deux pouces. Le mâle est d'un brun-obscur, avec un grand nombre de points noirs oculaires sur les deux surfaces des ailes inférieures, & vers la base des supérieures. Ces dernières offrent en outre de part & d'autre une bande jaunâtre, transverse, discoïdale, courbe en arrière.

La femelle, ou l'individu que nous prenons pour la femelle, ressemble au mâle, mais elle a le fond des ailes d'un brun-jaunâtre.

De Surinam.

242. NYMPHALE? Phylaxis.

NYMPHALIS Phylaxis.

Nym. alis integerrimis: anticis fuscis, testaceo maculatis: posticis supra testaceis, subtus basi albis, utrinquè apice nigro punctatis.

Papilio Phylleus. CRAM. pl. 65. fig. D. E.

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-obscur, avec plusieurs lignes transverses, briquetées, dont six à la base, & une plus longue & plus large à l'extrémité. Il y a en outre deux grandes taches de cette couleur sur le milieu. Le dessous des secondes ailes est briqueté, avec la base obscure, & une rangée marginale de points noirs.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est blanc vers la base, avec trois points noirs; d'un brun-tanné-clair vers l'extrémité, avec une double rangée de gros points noirâtres.

De Surinam.

243. NYMPHALE Epigia.

NYMPHALIS Epigia.

Nym. alis integerrimis, concoloribus, nigris: anticis fasciâ abbreviatâ albâ, posticis disco communi rufo.

Papilio Epitus. CRAM. pl. 270. fig. C.

Nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure.

Il a deux pouces de largeur. Ses quatre ailes sont d'un noir-brun, avec une bande blanche, courte & transverse, sur le milieu des supérieures, & un grand espace roux sur le milieu des inférieures. La couleur rouille dont il vient d'être question s'étend en forme de demi-lune sur le bord interne des premières ailes.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus pâle.

De Surinam.

244. NYMPHALE Laphria.

NYMPHALIS Laphria.

Nym. alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis : subtus pallide fulvis, punctis strigisque communi nigricantibus.

Papilio Lamis. CRAM. pl. 258. fig. E. (La femelle.)

Elle a de un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache.

Le dessous est d'un fauve-pâle, avec une ligne noirâtre, droite & transverse, sur le milieu, & une ligne ondulée, légèrement ferrugineuse, en avant du bord postérieur. Ces deux lignes sont séparées dans le sens de leur longueur par une série de points noirâtres, & il y a trois points semblables à la base de chaque aile.

Le mâle a les ailes supérieures un peu moins arrondies que la femelle. C'est la seule différence qu'il y ait entre l'un & l'autre.

De la Guyane & du Brésil.

245. NYMPHALE Aréthufus.

NYMPHALIS Aréthufus.

Nym. alis integris, supra nitide atris, virescenti-ceruleo multumaculatis : posticis subtus punctis basale angulique ani rubris. (Feminae alis prioribus fuscis albâ haud repandâ.)

Papilio F. Aréthufus, alis integerrimis, atris, ceruleo maculatis : posticis subtus punctis sanguineis. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n°. 251. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 25. n°. 266.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 42. n°. 150.* (Le mâle.)

Papilio Aréthufa. CRAM. pl. 77. fig. E. F. (Le mâle.)

Papilio Laodamia. CRAM. pl. 150. fig. A. (La femelle.)

Papilio Aréthufa. DRURY, *Inf. tom. 5. pl. 8. fig. 1. 2.*

Papilio Aréthufus. HERBST, *Pap. tab. 140. fig. 5. 6.* (Le mâle.)

Papilio Laodamia. HERBST, *Pap. tab. 141. fig. 5.* (La femelle.)

Fabricius n'a décrit que le mâle de ce lépidoptère. Cramer & Herbst ont connu les deux sexes, mais ils ont fait de la femelle une espèce séparée sous le nom de *Laodamia*.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-foncé, chatoyant, avec une multitude de taches d'un bleu-verdâtre. La femelle, ou le *Laodamia* des auteurs mentionnés ci-dessus, a en outre sur les deux surfaces des ailes de devant une bande blanche, non fincée, &

se dirigeant du milieu de la côte à l'angle interne, près duquel elle finit en pointe.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-verdâtre-luisant. Celui des inférieures offre dix taches rouges, dont trois à la base, deux sur le bord interne, & cinq sur le bord postérieur vers l'angle de l'anus. Dans le mâle, les ailes supérieures sont sans bande blanche, mais, en place de cette bande, on voit une ligne bleue, oblique & interrompue, qu'environne un relet d'un bleu beaucoup plus intense. Le corps a le dessus noir & entièrement tacheté comme les ailes; le dessous brun, avec des marques rouges sur la poitrine.

Nota. Il est des mâles dont le dessous des secondes ailes est sans taches rouges au bord interne.

De l'Amérique méridionale.

246. NYMPHALE Amphinome.

NYMPHALIS Amphinome.

Nym. alis subdentatis, supra nigris, caracteribus ceruleo-virescentibus : anticis utraque fuscâ albâ repandâ : posticis subtus rubro radiatis.

Papilio N. Amphinome, alis dentatis, nigris, ceruleo nebulosis : primoribus fuscâ utraque albâ ; posticis rubro radiatis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 779. n°. 176.*

Papilio N. Amphinome. FAB. *Syst. ent. p. 508. n°. 276.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 97. n°. 427.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n°. 520.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 151. n°. 404.*

ROES. *Inf. tom. 1. tab. 10. fig. 1. 2.*

MERIAN, *Surin. Inf. tab. 8.*

KLEM. *Inf. tom. 1. tab. 10. fig. 1. 2.*

Papilio Amphinome. CRAM. pl. 54. fig. E. F.

Papilio Amphinome. HERBST, *Pap. tab. 141. fig. 1. 2.*

Le Papier marbré de la Chine. DAUBENTON, *pl. enlum. 92. fig. 7. 8.*

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-chatoyant, avec une multitude de taches d'un vert-bleuâtre ou légèrement doré, en forme d'hieroglyphes, mais dont les pénultièmes des secondes ailes représentent une suite d'yeux ovalaires. Les premières ailes des deux sexes ont une bande blanche, fincée, large, coupée par les nervures, atteignant le milieu de la côte & l'angle interne. Il y a en outre un point blanc entre cette bande & le sommet.

Le dessous des six ailes est brun à la base, avec une tache rouge, triangulaire & longitudinale; ensuite d'un noir-verdâtre jusqu'au bout, avec

une bande blanche, semblable à celle du dessus, & suivie de deux rangées de points blanchâtres, dont les extérieurs marginaux.

Le dessous des secondes ailes est d'un noir-verdâtre, avec des rayons rouges sur la majeure partie de la surface, & des points d'un vert-blanchâtre à l'extrémité. Les échantures de quatre ailes sont liférées de blanc de part & d'autre. Le corps est noir en dessus & entièrement tacheté de vert-blanchâtre; il est gris en dessous, avec la poitrine rougeâtre. Les antennes sont noires.

La chenille, d'après Merian, ressemble par la forme à celle de plusieurs *MORPHOS*. Son corps est d'un vert-tendre, avec des raies longitudinales, alternativement jaunes & bleues, & les six pattes antérieures noirâtres. Sa tête est d'un jaune-obscur, armée de huit épines inégales qui semblent former une couronne. Son anus se termine par une longue fourche. Elle vit sur le *jasminum indicum*.

La chrysalide est jaunâtre, allongée, bilobée antérieurement, avec le dos épineux.

De l'Amérique méridionale.

Nota. Il est des individus mâles qui, au lieu d'avoir des rayons rouges sur le dessous des secondes ailes, n'ont que des taches de cette couleur à la base & vers l'angle anal desdites ailes. Les rayons se font oblitérés en passant au brun-pâle.

247. NYMPHALE Féronia.

NYMPHALIS Féronia.

Nym. alis subdentatis, suprâ fuscis, caracteribus caeruleiscentibus strigâque ocellorum iride simplici.

Papilio N. Féronia, alis dentatis, suprâ caeruleo fuscoque undulatis: omnibus ocellis sex. FAB. *Syst. Nat.* 2. p. 770. n°. 140. — *Mus. Lud.* *Utr.* p. 253. n°. 101.

Papilio N. Féronia, alis dentatis, suprâ caeruleo, fusco alboque marmoratis: omnibus ocellis sex. FAB. *Syst. Ent.* p. 491. n°. 210. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 71. n°. 518. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 36. n°. 572.

Papilio S. Féronia. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 226. n°. 710.

Papilio Féronia. CLERCK, *Icon. tab.* 51. fig. 1. 2.

Papilio Féronia. CRAM. *pl.* 192. fig. E. F.

Papilio Féronia. DRURY, *Inf. tom.* 1. *pl.* 10. fig. 1. 2.

Papilio Féronia. HERBST, *Pap. tab.* 225. fig. 1. 2.

SEBA, *Mus.* 4. *tab.* 53. fig. 10. 11.

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Amphinome*. Le dessus de ses quatre ailes est d'un brun-

noirâtre, avec une multitude d'hieroglyphes bleuâtres, parmi lesquels il y a parallèlement au bord postérieur une rangée d'yeux ronds, entièrement bruns, avec la prunelle blanche, l'iris simple & d'un bleu pâle. Les ailes supérieures ont vers le milieu de la côte un *signa* rougeâtre, & entre ce *signa* & la rangée d'yeux, une douzaine de taches gristâtes, épaisses & assez grandes.

Le dessous de ces ailes est d'un gris-luisant à fon origine, avec un *signa* pareil à celui du dessus; ensuite noir jusqu'au bout & parsemé de taches blanches, inégales.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-verdâtre-luisant, avec quelques traits noirs sur le milieu, & une rangée de gros points blancs cerclés de noir, en avant du bord terminal. Ce bord est noir, & marqué à chaque échanture d'une lunule blanche. Le corps a le dessus coloré & tacheté comme les ailes, & le dessous gris. Les antennes sont noires.

La femelle ressemble au mâle.

Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langsdorff, deux individus mâles chez lesquels toute la couleur grise du dessous des secondes ailes est remplacée par du jaune d'ocre foncé. Cette variété n'est pas commune.

De l'Amérique méridionale, & non des Indes orientales, comme le dit Fabricius.

Nota. Dans l'Entomologie systématique de Fabricius, l'*Arctus* est placé parmi les *DANAÏDES* BIGARRÉES, l'*Amphinome* parmi les *NYMPHALES*, & le *Féronia* parmi les *SATYRES*; en sorte qu'il faut aller du n°. 150 au n°. 710 de cet ouvrage pour trouver trois espèces qui appartiennent certainement au même genre, & qui doivent le suivre en raison de l'analogie des couleurs.

248. NYMPHALE Férentina.

NYMPHALIS Férentina.

Nym. alis subdentatis, suprâ fuscis, caracteribus obsolete caeruleiscentibus strigâque ocellorum iride duplici. (Poslicarum ocellis 4°. & 5°. in mare lunulâ rufâ notatis.)

Papilio Féronia, var. CRAM. *pl.* 362. fig. A. B.

Ce qui distingue surtout ce lépidoptère du précédent, c'est qu'il a le dessus d'un brun plus obscur, avec les hieroglyphes moins prononcés & d'un bleu plus pâle; c'est que les yeux des secondes ailes ont tous un iris d'able, & que le quatrième & le cinquième d'entre eux sont marqués des part & des mâles d'une lunule rouille qui est visible de part & d'autre.

Dans la femelle, le dessous des mêmes ailes offre sur le limbe postérieur un cordon de taches ferrugineuses.

Cramer le dit des Indes orientales, mais sa patrie est la même que celle du *Féronia*.

249. NYMPHALE Chloë.

NYMPHALIS Chloë.

Nym. alis repando-dentatis, supra viriscenti-caruleis nigroque multimaculatis: omnibus utrinque maculis basæos ferrugineis.

Papilio Chloë. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 5. fig. 1. ♂ 1. A.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoisé, avec une multitude de taches noires, parmi lesquelles il y en a trois à la base des supérieures, & deux à celle des inférieures, dont le milieu est ferrugineux. On voit en outre, vers le bout de chaque aile, une rangée de quatre à cinq yeux ayant pour la plupart une petite prunelle blanche. Les yeux des ailes de devant sont accompagnés de taches griffées plus ou moins prononcées.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-cendré-luisant, avec des taches ferrugineuses à la base, des yeux & des taches blanches à l'extrémité. Le corps a le dessus noirâtre & tacheté de bleu, le dessous tout gris. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs.

De l'Amérique méridionale.

O. Ailes oblongues ou allongées dans le sens du diamètre du corps.

250. NYMPHALE Eulimène.

NYMPHALIS Eulimene.

Nym. alis dentatis, nigro-fuscis, supra fuscis tribus, fulvis: posticis subtus fuscis sex margine-que carneo-albidis.

L'individu que nous décrivons est une femelle qui a près de quatre pouces d'envergure.

Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois bandes fauves, communes, dont la postérieure moins large & moins vive. La base des premières ailes offre en outre une bande fauve, longitudinale, & marquée vers son milieu d'un O noir derrière lequel il y a une échancrure presque en forme d'Y.

Le dessous de ces mêmes ailes ressemble au dessus, mais les bandes y sont d'une teinte incarnate.

Le dessous des secondes ailes a sept bandes d'un blanc-incarnat, & dont la troisième plus la quatrième très-étroites, la postérieure marginale. Le corps est brun, avec des anneaux blanchâtres. Les antennes sont noires en dessus, ferrugineuses en dessous.

Sa patrie nous est inconnue, mais nous soupçonons qu'elle vient d'une des îles Moluques.

251. NYMPHALE Nesté.

NYMPHALIS Nesté.

Nym. alis dentatis, supra nigro-fuscis, subtus viriscentibus: utrinque fuscis tribus maris luteis, semina albidis.

Papilio Nesté. CRAM. pl. 256. fig. E. F. (Le mâle.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois bandes d'un jaune-faive dans le mâle, d'un blanc-obscur dans la femelle. Deux de ces bandes sont communes aux quatre ailes, mais l'antérieure des premières ailes est longitudinale, lancéolée, & elle atteint d'une part la base de l'aile, de l'autre la bande suivante qui a le milieu interrompu.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-vertâtre, avec des bandes comme en dessus, mais moins foncées. Les ailes inférieures ont de plus deux lignes transversales, dont l'antérieure blanche & voisine de la base; l'autre d'un ferrugineux-obscur & placée entre les deux bandes du milieu. Le corps est tout-à-fait gris en dessous; noirâtre en dessus, avec un duvet verdâtre sur le corselet, & un anneau jaune ou blanc à la base de l'abdomen. Les antennes sont noirâtres, avec tout le dessous ferrugineux.

De l'île de Java.

252. NYMPHALE Héliodore.

NYMPHALIS Heliodore.

Nym. alis subintegræ, concoloribus, nigro-fuscis, fuscis tribus luteis.

Papilio N. Heliodore, alis dentatis, fulvis, fuscis tribus nigris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 150. n. 401.

Elle est un peu plus petite que le *Nesté*, au mâle duquel elle ressemble en dessus.

Le dessous de ses ailes offre le même dessin que le dessus, mais les inférieures ont l'origine de la côte jaunâtre.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

253. NYMPHALE Hordonia.

NYMPHALIS Hordonia.

Nym. alis subintegræ, supra nigro-fuscis, fuscis tribus luteis: subtus flaviscentibus, ferrugineo-que irroratis.

Papilio Hordonia. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 55. fig. 4. ♂ 4. D.

Elle est de la taille de la précédente, à laquelle elle ressemble en dessus, ainsi qu'au mâle du *Nesté*. Le dessous de ses ailes est jaunâtre, & plus ou moins parsemé d'atomes d'un ferrugineux-obscur.

Stoll dit, mais d'après des renseignements inexacts, qu'elle se trouve en Guinée. Sa véritable patrie est le Bengale, où elle a été prise par Macé.

254. NYMPHALE Frobenia.

NYMPHALIS Frobenia.

Nym. alis subdentatis, concoloribus, nigro-fuscis, fuscisâ fulvâ posticâ : anticarum è maculis tribus.

Papilio N. Frobenia, alis repandis, fuscis, fuscisâ communi fulvâ : anticarum interruptâ. FAB. *Suppl. Ent. Syst. em. tom. 5. p. 425. n.º. 400-1.*

Elle a près de deux poüces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, postérieure, transverse, & suivie d'une ligne cendrée pareillement transverse. La bande des ailes de devant le compose de trois taches. Celle des ailes de derrière est continue.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est généralement plus pâle, & parce que la ligne cendrée qui avoisine le bord postérieur est renfermée entre deux lignes flexueuses de sa couleur. Le corps est obscur & sans tache. Les antennes sont noires en dessus, ferrugineuses en dessous.

Dans le mâle, le dessous des premières ailes est vers l'origine du bord interne un espace d'un blanc d'étain-luisant.

De l'île-de-France.

255. NYMPHALE de l'Erable.

NYMPHALIS Aceris.

Nym. alis dentatis, suprà fusco-nigris, subtus fulvis, fuscis tribus macularibus albis : anticarum fuscisâ basifusâ longitudinali, lanceolatâ.

Papilio N. Aceris, alis dentatis, albo-fuscis, suprà nigris, subtus fulvis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n.º. 52. n.º. 514.*

Papilio S. Aceris. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 245. n.º. 765.*

Papilio Aceris. ESP. *Pap. part. 1. tab. 81. cont. 51. fig. 5. 4.*

Papilio Aceris. HERBST, *Pap. tab. 255. fig. 5. 6.*

Papilio Leucothoe. HERBST, *Pap. tab. 259. fig. 5. 6.*

Papilio Columella. HERBST, *Pap. tab. 240. fig. 1. 2.*

Papilio Aceris. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 27. n.º. 25. — p. 211. n.º. 22.*

Papilio Aceris. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 148. n.º. 73.*

Papilio Aceris. LANG. *Vers. 2. p. 51. n.º. 224. 225.*

Papilio Aceris. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 156. n.º. 1.*

Papilio Aceris tartarici. LEPCIN, *Tageb. 1. p. 205. tab. 17. fig. 5. 6.*

Papilio Leucothoe. CRAM. *pl. 296. fig. E. F.*

Papilio Columella. CRAM. *pl. 296. fig. A. B.*

Papilio H. Sapho. PALLAS, *V. part. 1. n.º. 62.*

Papilio Leucothoe. PILL. & MITTERB. *Iter, &c. p. 41. tab. 5. fig. 5. 4.*

Papilio Plautilla. HUBN. *Pap. tab. 21. fig. 99. 100. (Mas.)*

ILLIG. *Mogaz. tom. 5. p. 201.*

Le Sylvain à deux bandes blanches. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 515. pl. 2. 5.º. Suppl. fig. 12. a-d. tert.*

Son envergure est de deux poüces à deux poüces & demi. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, maculaires, dont la postérieure très-étroite. La bande de l'origine des premières ailes est longitudinale, & elle consiste en deux taches triangulaires, opposées par leur base.

En dessous, où le fond est d'un fauve-ferrugineux, on retrouve à chaque aile les caractères que nous venons d'indiquer. Indépendamment de cela, les inférieures ont trois lignes blanches, transverses, savoir : deux très-courtes à la base même; la troisième derrière la bande antérieure. Les échancrures du bord terminal de toutes les ailes sont blanches de part & d'autre. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue jaunâtre.

La femelle ressemble au mâle, seulement elle est plus grande.

Elle se trouve depuis les îles de la Sonde jusqu'en Autriche inclusivement.

Les individus des Indes orientales sont, comme le dit fort bien Fabricius, plus grands que ceux d'Europe.

256. NYMPHALE Leucothoe.

NYMPHALIS Leucothoe.

Nym. alis dentatis, suprà fusco-nigris, subtus fulvis, utraq; fuscis tribus macularibus albis : posticarum fuscisâ intermediâ punctis nigris utrorsum fectâ.

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis, suprà fuscis, subtus luteis, fuscis tribus macularibus albis nigro notatis. LINN. *Syfl. Nat. 2. edit. 12. p. 780. n.º. 179. — Mus. Lud. Ulr. p. 292.*

p. Papilio N. Hylas, alis dentatis, suprà fuscis, subtus lutescentibus : fuscis utraq; tribus albis, interruptis. LINN. *Syfl. Nat. 2. edit. 10. p. 486. n.º. 175.*

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis, suprà fuscis, fuscis tribus albis : subtus luteis, fuscis

tribus albo notatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 129. n° 595.*

Papilio Leucothoe. SULZ. *Inf. edit. ROEM. tab. 18. fig. 2. 3.*

Papilio Erosine. CRAM. *pl. 205. fig. E. F.*

Papilio Erosine. HERBST, *Pap. tab. 240. fig. 5. 6.*

DAUBENTON, *pl. enlum. 91. fig. 5. 4.*

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, maculaires, dont l'antérieure plus large; l'intermédiaire chargée sur le côté interne d'une série de points très-noirs; la postérieure marginale & composée de petits crochets. Il y a en outre, à la base des premières ailes, une bande longitudinale, consistant en une tache triangulaire & en trois gros points blancs.

Le dessous de toutes les ailes est fauve, ou d'un jaune-roussâtre, avec des bandes semblables à celles du dessus; mais la bande antérieure & celle de l'extrémité sont bordées de noir, la première sur chaque côté, l'autre en dehors seulement: les taches qui composent la bande longitudinale de la base des premières ailes sont aussi bordées de noir. Le corps est d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches sur le corselet, & une à la base de l'abdomen. Les antennes sont noires en dessus, ferrugineuses en dessous.

De la Chine, du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnæus, dans la dixième édition de son *Système nature*, rapporte cette espèce à notre *Hylé* ou *Hylas* de Clerck. Une telle erreur est vraiment inconcevable.

257. NYMPHALE Strophia.

NYMPHALIS Strophia.

Nym. alis dentatis, utrinque fusco-nigris, fasciis tribus macularibus albis: posticis subtus basi discoque punctis atris.

Papilio Sulpitia. CRAM. *pl. 214. fig. E. F.*

Papilio Sulpitia. HERBST, *Pap. tab. 240. fig. 3. 4.*

Elle est un peu plus grande que la précédente. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec trois bandes blanches, communes & maculaires, dont la postérieure très-étroite & moins distincte. Il y a en outre à l'origine des premières ailes une bande blanche, longitudinale, formée de deux taches dont l'antérieure plus grande & lancéolée.

Le dessous de ces ailes est à peu près comme le dessus.

Le dessous des secondes ailes est blanc à la base, avec des points d'un noir-foncé; ensuite d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanches, com-

munes & transversales. Les deux bandes antérieures sont séparées par un rang de points très-noirs dont l'empainte s'aperçoit sur la surface opposée. De la Chine.

258. NYMPHALE Hélicopis.

NYMPHALIS Helicopis.

Nym. alis dentatis, utrinque fusco-nigris, supra fasciis duabus macularibus albis, subtus quatuor: anticarum basi punctis duobus albis.

Papilio Heliodore. CRAM. *pl. 212. fig. E. F.*

Papilio Heliodorus. HERBST, *Pap. tab. 241. fig. 1. 2.*

SEBA, *Mus. tom. 4. tab. 16. fig. 3. 4. 8. 9.*

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec deux bandes blanches, maculaires, dont l'antérieure large & discoïdale, la postérieure très-étroite & parfois moins-prononcée. Il y a en outre deux points blancs, alignés longitudinalement, entre la bande antérieure & la base des premières ailes.

Le dessous diffère du dessus, en ce que le bord terminal offre trois raies ou bandes blanches maculaires, au lieu d'une seule.

De l'île d'Amboine.

259. NYMPHALE Lucille.

NYMPHALIS Lucilla.

Nym. alis subdentatis, supra fusco-nigris, subtus ferrugineis, utrinque fasciâ alba, mediâ, maculari: anticarum basi lineâ longitudinali punctorum alborum.

Papilio N. Lucilla, alis dentatis, supra fasciis, subtus brunneis: utrinque fasciâ maculari albâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n° 549.*

Papilio S. Lucilla. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 246. n° 768.*

Papilio Lucilla. WIEN. *Verz. p. 175. sum. H. n° 4.*

Papilio Lucilla. HUBN. *Pap. tab. 21. fig. 101. 102. (Mas.)*

HUBN. *Beitr. tom. 2. part. 1. tab. 2. fig. F. 1. 2.*

Papilio Lucilla. ILLIG. *N. Aufz. Desf. tom. 2. p. 215. n° 4.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 107.*

Papilio Lucilla. HERBST, *Pap. tab. 255. fig. 3. 4.*

Papilio Canobitus. HERBST, *Pap. tab. 270. fig. 3. 4.*

Papilio Lucilla. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 5. p. 191. n° 1329.*

Papilio Lucilla. PALL. & MITTIB. *Iter. Sic. p. 40. tab. 5. fig. 5. 6.*

Papilio Lucilla. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Camilla. ESP. *Pap. part. 1. tab. 59. cont. 9. fig. 1.*

Papilio Camilla. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 26. n°. 22. — p. 211. n°. 21.*

Papilio Camilla. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 147. n°. 77.*

Papilio Cœnobita. CRAM. *pl. 296. fig. C. D.*

Le Silvain cœnobite. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 29. pl. 10. fig. 12. a. b.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont faiblement dentées. Leur dessus est d'un brun-noirâtre; leur dessous est d'un ferrugineux foncé, avec une bande blanche, commune & maculaire sur le milieu de chaque surface. La base des premières ailes offre en outre une ligne longitudinale de points blancs. Cette couleur est aussi celle des petites échancrures du bord terminal. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue roux.

Sud de la Russie, Autriche, Hongrie, Styrie, Dalmatie.

N. B. Le dessous des ailes varie quelquefois, en ce que la ligne ponctuée de la base des supérieures est double; en ce que les inférieures ont un peu de blanc vers leur origine; enfin, en ce qu'il y a parallèlement au bord postérieur des quatre deux lignes blanchâtres, maculaires, plus ou moins prononcées.

260. NYMPHALE *Melicerta*.

NYMPHALIS *Melicerta*.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fusco-nigris, fuscâ latâ strigisque albis: anticarum basi punctis albis, sparsis.

Papilio N. Melicerta, alis dentatis, concoloribus, atris, albo punctatis fuscâque communi albâ anticarum interruptâ. FAB. *Syst. Ent. p. 508. n°. 274. — Spec. Inf. tom. 2. p. 96. n°. 425. — Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n°. 515.*

Papilio S. Melicerta. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 244. n°. 762.*

Papilio Agatha. CRAM. *pl. 527. fig. A. B.*

Papilio Agatha. HERBST, *Pap. tab. 258. fig. 7. 8.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une large bande blanche sur le milieu, & quatre lignes blanchâtres sur le limbe postérieur. La bande est crénelée en dehors, & interrompue seulement vers le bord interne des premières ailes. Celles-ci ont à la base plusieurs points blancs, épars.

Le dessous ressemble au dessus, mais la naissance des ailes inférieures est rayonnée de blanc. Les petites échancrures des quatre ailes sont très-blanches de part & d'autre.

De Sierra-Leone en Afrique.

261. NYMPHALE *Melinoë*.

NYMPHALIS *Melinoë*.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fusco-nigris, fuscâ latâ strigisque albis: anticarum basi maculâ cuneiformi punctio albâ.

Papilio Melicerta. DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 19. fig. 3. 4.*

Papilio Melicertus. HERBST, *Pap. tab. 258. fig. 5. 6.*

Papilio Blandina. CRAM. *pl. 257. fig. E. F.*

Elle diffère du *Melicerta* en ce que les premières ailes ont la bande beaucoup plus divisée, & les points blancs de la base remplacés par une tache cunéiforme & par un point de leur couleur.

De Sierra-Leone.

Nota. Ne seroit-ce pas plutôt une variété du *Melicerta* qu'une espèce distincte? On ne peut rien décider quand l'on n'a vu qu'un seul individu, à plus forte raison lorsqu'il est en mauvais état.

262. NYMPHALE *Ophione*.

NYMPHALIS *Ophione*.

Nym. alis denticulatis, utrinquè fuscis, fuscâ latâ strigisque albis: subtus maculis ocellaribus atris.

Papilio N. Ophione, alis dentatis, fuscis, albo maculatis: subtus maculis ocellaribus atris, numerosis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 97. n°. 425. — Mant. Inf. tom. 2. p. 53. n°. 518. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 151. n°. 402.*

Papilio Ophione. CRAM. *pl. 114. fig. E. F.*

Papilio Valentina? CRAM. *pl. 257. fig. C. D.*

Papilio Ophione. HERBST, *Pap. tab. 258. fig. 1. 2.*

Papilio Valentinus? HERBST, *Pap. tab. 258. fig. 3-4.*

Elle a aussi de grands rapports avec le *Melicerta*. Néanmoins elle s'en distingue en ce que la bande des premières ailes est plus divisée; en ce que leur base n'a pas de points blancs, ou n'en a qu'un seul en dessus; en ce que le dessus des quatre ailes offre avant les lignes du limbe postérieur une rangée & dense de taches très-noires, cerclées de blanc.

Les auteurs s'accordent à dire qu'elle habite la Guinée. S'il n'y a point d'erreur à cet égard, le papillon *Valentina* de Cramer ne doit pas être d'Auboinc,

d'Amboine, car il paroît trop voisin de l'Ophione pour en être séparé.

263. NYMPHALE Vénilia.

NYMPHALIS Venilia.

Nym. alis subdentatis, nigris, utrinquè fasciâ mediâ punctisque caralescenti-albis: juctis basi glauco radiatis.

Papilio N. Venilia, alis dentatis, fasciis, fasciâ communi arcuatâ albâ, marginibus caralescenti. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 780. n^o. 177. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 290. n^o. 103.

Papilio N. Venilia. FAB. *Syst. Ent.* p. 509. n^o. 278. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 98. n^o. 451. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 53. n^o. 523. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 154. n^o. 411.

Papilio Venilia. CLERCK, *Icon. tab.* 32. fig. 4.

Papilio Venilia. CRAM. *pl.* 219. fig. B. C.

SEBA, *Mus.* 4. tab. 16. fig. 3. 4.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont à peine dentées. Leur dessus est noir, avec une bande blanche, commune, discoidale, bordée de bleu; plus une rangée postérieure de points d'un blanc-bleuâtre. Les premières ailes, dont la bande est maculaire & rétrécie antérieurement, ont entre cette bande & la base quatre ou cinq petits points blancs.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus pâle, & parce que la base des quatre ailes est rayonnée de blanc-verdâtre.

De Java, selon Cramer; des Indes, selon Fabricius.

264. NYMPHALE Nauplia.

NYMPHALIS Nauplia.

Nym. alis integris, fusco-nigris: anticis utrinquè maculis, posticis fasciâ, albis: posticarum fasciâ subtus flavo rufoque circumdatâ.

Papilio N. Nauplia, alis subdentatis, fasciis, subconcoloribus: primoribus supra maculis quatuor, posticis fasciâ, albidis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 785. n^o. 197. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 303.

Papilio N. Nauplia. FAB. *Syst. Ent.* p. 512. n^o. 293. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 52. n^o. 515. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 150. n^o. 400.

Papilio Nauplius. CLERCK, *Icon. tab.* 46. fig. 1. 2.

Papilio Nauplia. CRAM. *pl.* 316. fig. D. E. (La femelle.) fig. F. G. (Le mâle.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. Les ailes sont d'un noir-brun en dessus, avec quatre ou cinq taches éparées sur le milieu des premières,

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

& une bande transverse sur le milieu des secondes. Les taches & la bande sont très-blanches dans la femelle, d'un blanc-jaunâtre dans le mâle.

Ces caractères se retrouvent en dessous, où le fond est aussi d'un brun-noiâtre. Indépendamment de cela, les premières ailes ont à la base deux raies longitudinales, dont l'antérieure rouille, l'autre d'un jaune d'ocre-pâle. La bande des secondes ailes est enveloppée du côté de la base par une ligne jaune, & du côté du bord postérieur par une ligne rouille, derrière laquelle il y a une ligne jaunâtre, moins large.

De la Guyane.

Nota. Linnæus n'a connu que le mâle de cette espèce; à en juger du moins par la description qu'il en donne.

265. NYMPHALE Emilie.

NYMPHALIS Emilia.

Nym. alis integris, nigris: anticis utrinquè maculis, posticis fasciis duabus, nitidè albis: posticarum fasciâ basales communi, alterâ subtus rufo circumdatâ.

Papilio Emilia. CRAM. *pl.* 225. fig. E. F.

Elle est un peu plus grande que la précédente. Le dessus des ailes est noir, avec des taches orbitulaires d'un blanc-luisant sur les supérieures, & deux bandelettes obliques du même blanc sur les inférieures. Les taches des ailes supérieures sont au nombre de trois, savoir: deux vis-à-vis du sommet; l'autre discoidale, plus grande & coupée par une nervure fourchue. La bande postérieure des secondes ailes est maculaire; leur bande antérieure avoisine la base & monte jusqu'à la tache discoidale des premières. Il y a en outre parallèlement au bord terminal des quatre ailes une ligne bleuâtre, très-fine.

Le dessous ressemble au dessus; mais la côte des premières ailes est longue, depuis son origine jusqu'aux taches du sommet, par une ligne rouille; les secondes ailes ont la bande postérieure plus large, continue, & renfermée dans un cercle roux & oblong. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Le dessous des ailes supérieures offre près de son origine une convexité assez semblable à une petite velle.

266. NYMPHALE Cœnobite.

NYMPHALIS Cœnobita.

Nym. alis dentatis, nigris: anticis striâ maculifque: posticis supra fasciâ albâ; subtus albis, fasciis quatuor maculifque marginalibus fasciis. FAB.

Papilio S. Cœnobita. VÆ. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 247. n^o. 769.

Papilio Cœnobita. JON. Fig. piç. 5. tab. 27. fig. 2.

Papilio Cœnobita. DOROW. Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 5. pl. 4. fig. 5.

Elle est de la taille de la nymphe *Sybille*. Le corps est noir, avec la base de l'abdomen blanche. Le dessus des ailes supérieures est d'un noir-foncé, avec une raie longitudinale, courte, des taches & plusieurs petites lignes, blanches. Leur dessous ressemble à leur dessus, mais le fond est brun. Les secondes ailes ont une raie transverse, droite, une bande discoidale, & deux lignes courbes vers le bord, blanches. Leur dessous est blanc, avec quatre bandes, & des taches marginales, d'un brun-obscur.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

267. NYMPHALE Herfiliæ.

NYMPHALIS Herfiliæ.

Nym. alis dentatis, supra cinerascenti-albis, limbo fusco: posticis subtus pallide fulvis, fasciis duabus lunulifque marginalibus albis.

Papilio S. Herfiliæ, alis dentatis, albis, limbo fusco: posticis subtus fulvis, fasciis duabus punctoque medio albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 247. n^o. 770.

Papilio Mardania. CRAM. pl. 215. fig. F. G. (Variété.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un blanc plus ou moins cendré, avec le limbe postérieur d'un brun-obscur & divisé par un cordon de lunules blanches. La base des ailes supérieures est en outre obscure, avec un trait noirâtre, transversal.

Le dessous de ces ailes est blanc, avec la base & l'extrémité souillées de fauve-pâle.

Le dessous des secondes ailes est d'un fauve-pâle, avec une tache à la base, deux bandes transverses sur le milieu, une rangée de lunules sur le bord terminal, blanches. La bande postérieure est maculaire & surmontée d'une ligne blanchâtre peu prononcée. Les lunules sont bordées de noirâtre, particulièrement en arrière. Le corps est blanchâtre, avec le costelet cendré. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue ferrugineux ou jaunâtre.

La femelle ressemble au mâle.

Quelquefois le dessus des ailes prend une teinte roussâtre vers le bout, mais moins prononcée que dans l'individu figuré par Cramer sous le nom de *Mardania*.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. La base des premières ailes offre en dessous une petite veslie semblable à celle que l'on voit dans la nymphe *Emile*.



GENRE MORPHO (1).

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES inférieurs très-comprimés, ayant la tranche antérieure étroite ou aiguë; antennes presque filiformes, légèrement et insensiblement plus grosses vers leur extrémité.

I. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouverte en arrière.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière. (Chenilles, du moins pour la plupart, terminées postérieurement par une pointe fourchue.)

A. *Angle anal des secondes ailes prolongé en une petite queue.*

Le genre *AMATHUSIA* de Fabricius. (Pap. *Aurelius*, *Phidippus*, etc.)

B. *Angle anal des secondes ailes sans prolongement remarquable.*

Le genre *MORPHO* de Fabricius. (Pap. *Hecuba*, *Menelaus*, *Achilles*, etc.)

ESPÈCES.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte en arrière, ou fermée quelquefois en dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus prolongé en une petite queue obtuse ou tronquée.

1. MORPHO Aurélius.

Dessus des ailes couleur de terre d'ombre, avec environ la moitié postérieure noire et tachetée de blanc : dessous des inférieures avec deux yeux écartés, et pareil nombre de lunules à l'angle de l'anus.

2. MORPHO Phidippe.

Dessus des ailes couleur de terre d'ombre, avec une ligne jaunâtre, transversale et presque terminale : inférieures ayant de part et d'autre deux moitiés d'yeux sur l'angle de l'anus.

3. MORPHO Adonis.

Dessus des ailes du bleu-azuré le plus brillant, avec le limbe postérieur noir (et tacheté de blanc dans la femelle) : dessous d'un gris lavé de brun, avec des bandes plus claires, et des yeux séparés.

B. Ailes supérieures plus ou moins concaves. Inférieures sans prolongement remarquable à l'angle de l'anus.

4. MORPHO Andromachus.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec un large espace commun, et des taches terminales, jaunes : dessous avec des yeux sans prunelle.

5. MORPHO Hécube.

Ailes dentées, noires en dessus, avec le milieu des supérieures, et des taches

(1) Le genre *MORPHO* de M. Latreille renferme deux divisions. Dans la première, la cellule discoïdale des ailes inférieures est ouverte; dans la seconde, elle est fermée postérieurement.

MORPHO. (Insecte.)

sur leur bord terminal, fauves : dessous des inférieures ayant à la base des bandes argentées et des bandes rousses.

6. MORPHO Métellus.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec le milieu des supérieures, et des taches sur leur bord terminal, fauves : dessous des inférieures avec des bandes pâles à la base.

7. MORPHO Persée.

Ailes dentées, d'un noir-brun en dessus, avec la base verdâtre, et l'extrémité tachetée de fauve : dessous des inférieures avec des bandes d'un blanc-luisant, et dont une dentée sur le bord d'en haut.

8. MORPHO Anaxibia.

Ailes dentées, d'un bleu-azuré-brillant en dessus, avec le limbe terminal noir (et tacheté de fauve dans la femelle) : dessous d'un brun-clair, avec une rangée transverse d'yeux roux à pruneau blanche et linéaire.

9. MORPHO Ménelas.

Ailes dentées, d'un bleu-azuré-brillant en dessus, avec le limbe noir (et tacheté de blanc dans la femelle) : dessous couleur de terre d'ombre, avec des yeux noirs à iris rouge et à pruneau formée par des atomes bleus.

10. MORPHO Hélénor.

Ailes dentées, noires en dessus, avec un espace à la base, ou une bande sur le milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous offrant à la base une ligne verdâtre, transverse et ondulée.

11. MORPHO Achille.

Ailes entières, noires en dessus, avec un espace à la base, ou une bande sur le milieu, d'un bleu-azuré-luisant : dessous offrant à la base beaucoup de lignes verdâtres, transverses et ondulées.

12. MORPHO Rhétéor.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré très-brillant : dessous varié de brun et de gris, avec des yeux sans pruneau. (Le mâle.)

13. MORPHO Cythérés.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-luisant : inférieures dentées, ayant en dessous beaucoup de bandes nacrées, et trois yeux séparés. (Le mâle.)

14. MORPHO Laerte.

Ailes un peu dentées, d'un blanc-nacré de part et d'autre, avec une bande noire sur la côte des supérieures : dessous des inférieures avec une rangée transverse d'yeux.

15. MORPHO Jaïrus.

Ailes entières, d'un brun-obscur : inférieures avec le milieu blanc à partir de la base, un œil très-grand en dessus, deux yeux séparés en dessous.

16. MORPHO Odana.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre : supérieures avec une bande d'un bleu-violet-luisant : dessous des inférieures avec un œil sans pruneau à l'angle de l'anus.

17. MORPHO Ogina.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec une bande postérieure d'un bleu-pâle : dessous des inférieures avec deux à quatre yeux.

MORPHO. (Insecte.)

18. MORPHO Célide.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec une bande d'un bleu-pâle sur le milieu: supérieures ponctuées de fauve à l'extrémité: dessous des inférieures avec deux yeux écartés.

19. MORPHO Tullia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-violet en dessus, avec des taches jaunes à l'extrémité: dessous ponctué de brun à la base.

20. MORPHO Ménéthon.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, avec le bord tacheté de jaune: dessous des inférieures avec deux yeux. FAB.

II. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu et d'où part un rameau longitudinal qui s'étend jusqu'au bord postérieur.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

21. MORPHO Actorion.

Ailes entières, couleur de terre d'ombre en dessus: supérieures avec une bande rousse à l'extrémité, et un espace d'un violet-luisant vers l'angle interne.

B. Ailes supérieures concaves. Inférieures plus ou moins prolongées en dehors.

22. MORPHO Aorsa.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une ligne fauve, transverse et presque terminale: dessous des inférieures avec des réseaux et deux yeux.

23. MORPHO Automédon.

Dessus des ailes d'un brun-noir, avec un espace violet, commun et discoïdal: sommet des supérieures (femelle) avec une ligne fauve, transversale: dessous des inférieures avec deux yeux, dont le postérieur réuni à un autre de moitié plus petit.

C. Ailes supérieures peu ou point concaves. Inférieures sans prolongement.

24. MORPHO Euryloque.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-obscur en dessus: dessous des supérieures avec deux yeux, dessous des inférieures avec trois, et une ligne noire, anguleuse et discoïdale, sur celles-ci et sur celles-là.

25. MORPHO Hionécé.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-violet en dessus, avec le limbe terminal noir: limbe des supérieures avec deux lignes transverses, limbe des inférieures avec les sinus, jaunâtres.

26. MORPHO Teucer.

Ailes un peu dentées: dessus des supérieures d'une teinte livide; dessous des inférieures d'un bleu-ardoisé à la base, leur dessous avec trois yeux séparés, dont le postérieur très-grand.

27. MORPHO Idoméinée.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noir en dessus, avec la base des quatre, et le limbe terminal des inférieures, d'un bleu-ardoisé: dessous des inférieures avec deux yeux, et une tache blanche, centrale.

28. MORPHO Inachis.

Ailes un peu dentées, d'un bleu-violet en dessus, avec le limbe terminal des quatre noir, et le sommet des supérieures d'un jaune-fauve: dessous des inférieures avec deux yeux oblongs.

29. MORPHO Martia.

Ailes un peu dentées: les deux surfaces des supérieures avec un espace blanc, central; dessous des inférieures violet, leur dessous avec deux yeux.

30. MORPHO Taramia.

Ailes presque entières: dessus des supérieures d'un fauve-jaunâtre-obscur, avec le limbe terminal noir: dessous des

MORPHO. (Insecte.)

inférieures avec deux yeux, et une ligne bleuâtre, transverse, ondulée.

31. MORPHO Saronia.

Ailes presque entières, d'un jaune-roussâtre en dessus, avec le limbe terminal noir : dessous des supérieures ayant sur le milieu une bande jaunâtre, bifide ; dessous des inférieures avec deux yeux écartés.

32. MORPHO Acadina.

Ailes un peu dentées, d'un brun-tan-né-pâle en dessus, avec une ligne fauve, transverse, presque terminale, laquelle est double aux supérieures : dessous des inférieures avec deux bandes blanches, dont une plus courte, et deux yeux écartés.

33. MORPHO Rusina.

Ailes un peu dentées, noires en dessus, avec un espace d'un bleu-brillant, puis une bande commune, qui est d'un jaune d'ocre aux supérieures, blanche aux inférieures : dessous de ces dernières avec deux yeux écartés.

34. MORPHO Anaxandra.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande d'un jaune d'ocre-pâle sur les quatre : dessous des inférieures avec une rangée courbe de trois yeux.

35. MORPHO Anaxarète.

Ailes entières, d'un noir-brun : extrémité des supérieures tachetée de blanc de part et d'autre : dessous des inférieures d'un roux-obscur, avec des points noirs à la base.

36. MORPHO Anosia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche, maculaire : dessous des inférieures avec des lignes transversales et flexueuses, plus six yeux, dont le postérieur à double prunelle.

37. MORPHO Darius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures tachetées de blanc : dessous des inférieures avec un arc noir. FAB.

38. MORPHO Oethon.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec une ligne fauve, transverse et marginale : dessous des inférieures avec de légères ondes et sept yeux. FAB.

39. MORPHO Bérécynthus (1).

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande fauve, terminale : bande des supérieures anguleuse : dessous des inférieures avec une rangée transverse de six yeux.

40. MORPHO Xanthus.

Ailes presque entières, d'un noir-brun en dessus : supérieures avec une bande fauve, anguleuse : dessous des inférieures avec deux yeux écartés, dont l'antérieur reniforme.

41. MORPHO Caryatis.

Ailes dentées, d'un noir-brun : dessous des supérieures avec une bande fauve, postérieure ; leur dessous avec une bande blanche, centrale : dessous des inférieures avec deux yeux semi-lunaires.

42. MORPHO de la Casse.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus : les deux surfaces des supérieures avec une bande fauve : dessous des inférieures avec deux yeux séparés, dont l'antérieur plus grand et presque rond.

(1) Cette espèce et les suivantes font le passage des MORPHOS aux BRASSOLIDES, en raison de leurs antennes un peu plus renflées vers l'extrémité, et d'une fente longitudinale, couverte de poils, fente que l'on remarque, ainsi que dans les BRASSOLIENS, près du bord interne des ailes inférieures du mâle. Ce dernier caractère peut servir à distinguer ces espèces des NYMPHALES, avec lesquelles on seroit d'abord tenté de les confondre, si l'on n'avoit égard qu'aux palpes et aux antennes.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement, ou fermée quelquefois en dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'aube prolongé en une petite queue obtuse ou tronquée.

I. MORPHO Aurélius.

MORPHO Aurelius.

Mor. alis supra umbrinis, dimidio circiter apicali nigro, albo maculatis: posticis subtus ocellis duobus distinctis lunulisque totidem anguli ani.

Papilio N. Aurelius. alis subcaudatis, fuscis, apice utrisque albo maculatis: posticis subtus ocellis duobus. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 11. n°. 99. — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 71. n°. 222.*

Papilio Aurelius. CRAM. pl. 168. fig. A. B.

Papilio Aurelius. HERBST, *Pap. tab. 58. fig. 1. 2.*

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer.

Elle a près de six pouces d'envergure. Ses premières ailes sont entières, couleur de terre d'ombre en dessous, avec environ la moitié postérieure noire & chargée d'une douzaine de taches blanches, longitudinales, dont les quatre antérieures beaucoup plus grandes & réunies en une bande oblique qui a les côtés anguleux. Les secondes ailes ont l'angle anal un peu prolongé en pointe obtuse. Leur dessus, qui est aussi couleur de terre d'ombre, offre, à l'angle externe ou sommet, un grand espace noir sur lequel il y a une dizaine de taches blanches, dont trois longitudinales & en forme de coin, les autres orbiculaires & plus petites.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-foncé, avec des bandes brunes, transverses & inégales, dont deux, savoir, celle du milieu & celle de la base, plus foncées. La bande du milieu des premières ailes est précédée en dehors, près du bord interne, par une tache noirâtre, transversale & presque en forme de clochette. La bande correspondante des secondes ailes l'est par deux yeux violâtres ayant une prunelle blanche, & un iris jaune qui entoure un cercle noir. L'un de ces yeux avoisine la côte, l'autre est situé vers la pointe anal ou petite queue. Celle-ci est brune comme en dessus, mais elle a ici les bords blancs, & son milieu offre deux arcs noirâtres se regardant par leur concavité.

De l'île de Sumatra.

2. MORPHO Phidippe.

MORPHO Phidippus.

Mor. alis supra umbrinis, strigâ subterminali flavidâ: posticis utrinque ocellis duobus dimidiatis anguli ani.

Papilio E. A. Phidippus, alis subcaudatis, fuscis: subtus fuscis albidis biocellatis caudæque ocellis geminis. LANN. *Syst. Nat.* 2. p. 752. n°. 57. — *Amæn. Acad.* 6. p. 402. n°. 52.

Papilio N. Phidippus. FAB. *Syst. Ent.* p. 455. n°. 52. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 21. n°. 85. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 11. n°. 97. — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 71. n°. 220.*

Papilio Phidippus. CRAM. pl. 69. fig. A. B.

Papilio Phidippus. HERBST, *Pap. tab. 55. fig. 3. 4.*

SEDA, *Mus. 4. tab. 5. fig. 5.*

Papilio Phidippus. ESP. *Pap. exot. tab. 56. fig. 1.*

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses ailes supérieures sont entières. Les inférieures sont dentées, & terminées à l'angle anal par une queue courte, large & arrondie, sur laquelle il y a de part & d'autre deux demi-yeux sans prunelle, ou, si l'on veut, deux croissans blancs se regardant par leur concavité & embrassant chacun une tache noire, semi-lunaire & légèrement saupoudrée de bleuâtre.

Le dessus des quatre ailes est couleur de terre d'ombre, avec une ligne jaunâtre, transversale & presque terminale. Leur dessous est un peu plus clair que le dessus, avec six à sept bandes ou flammes blanchâtres, luisantes, transversales, de longueur inégale. Indépendamment de ces bandes, les secondes ailes ont deux yeux ronds, dont l'antérieur moins grand & voisin du bout de la côte, l'autre placé beaucoup plus bas vers l'origine de la queue. Ces yeux, qui entourent un cercle noir étroit, sont d'un jaune-fale & piqués de brun-obscur, avec la prunelle d'un blanc-rosé & ombrée de noirâtre en dehors. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

De l'île de Java.

Nota. Le dessus des ailes supérieures offre près du milieu de la côte, particulièrement dans la femelle, une éclaircie jaunâtre qui s'étend presque jusqu'à la raie marginale de cette couleur.

Le mâle a sous le milieu du ventre un faisceau de poils divergens.

3. MORPHO Adonis.

MORPHO Adonis.

Mor. alis supra nitidissimè cyaneis, limbo nigro (femine albo maculato): subtus infuscato-griseis, fuscis dilatationibus ocellisque distinctis.

Papilio Adonis. CRAM. pl. 61. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Adonis. HERBST, *Pap. tab. 26. fig. 3. 4.*

Papilio Adonis. Esp. *Pap. exot. tab. 55. fig. 2.*

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure.

Le mâle, surtout lorsqu'on le voit de face, a le dessus des ailes du bleu-azuré le plus brillant, avec tout le contour extérieur des premières, & le prolongement anal des secondes, noirs. Ses premières ailes offrent, vers le bout de la côte, deux petites taches blanches, dont l'antérieure longitudinale, la postérieure orbiculaire & placée un peu plus bas.

La femelle a le dessus d'un bleu moins vif que le mâle, avec le limbe postérieur largement noir & chargé de deux rangs de taches blanches aux ailes supérieures, d'un seul aux inférieures.

Le dessous des deux sexes est d'un gris lavé de brun, avec six bandes transverses plus claires, dont les deux extérieures fauves, & séparées des précédentes par des yeux jaunâtres à prunelle blanche & à iris noir. Ces yeux sont un peu oblongs, écartés l'un de l'autre, au nombre de deux aux ailes de devant, & de trois ou de quatre à celles de derrière. Ces dernières ont à l'angle de l'aune deux petites lignes noires, tortueuses & transversales.

Nous avons vu, dans la collection de M. le chevalier de Langsdouff, un individu tout-à-fait semblable à la femelle quant aux caractères, mais dans lequel le bleu du dessus des ailes est remplacé par du fauve, & le blanc des taches de l'extrémité par du jaune d'ocre.

De l'Amérique méridionale, & particulièrement du Brésil & de la Guyane.

B. Ailes supérieures plus ou moins concaves. Inférieures sans prolongement remarquable à l'angle de l'aune.

4. MORPHO *Andromachus*.

MORPHO Andromachus.

Mor. alis subdentatis, supra nigro-fuscis, areâ communi latâ maculifque terminalibus fulvis: subtus ocellis cæcis.

Papilio Andromachus. CRAM. *pl. 56. fig. A. B.*

Papilio Andromachus. HERBST, *Pap. tab. 54. fig. 2. 3.*

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer, & par un individu passé dont nous n'avons pu vérifier le sexe.

Elle a environ six pouces d'envergure. Ses premières ailes ont le sommet prolongé & arrondi. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, avec deux bandes fauves, dont l'antérieure plus claire, finée & s'éclaircissant à mesure qu'elle approche du bord interne; la postérieure étroite, maculaire & tout-à-fait terminale. Les secondes ailes ont le bord posté-

rieur faiblement denté. Leur dessus est fauve depuis la naissance jusqu'au-delà du milieu; puis d'un brun-noirâtre, avec une rangée marginale de petites taches, & les échancrures, fauves.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus, en ce que la bande fauve du milieu est divisée dans le sens de sa longueur par une ligne de points obscurs, & en ce qu'il y a vers la partie antérieure de la côte cinq taches d'un gris-luisant, savoir: deux linéaires & convergentes à la base, les trois autres obliques, surtout l'extérieure qui est plus grande & concave en dehors.

Le dessous des secondes ailes est couleur de terre d'ombre à la base, avec la côte d'un gris-luisant; jaunâtre au milieu, avec trois points obscurs, dont l'antérieur isolé & plus petit; d'une teinte violâtre-chatoiyante à l'extrémité. Le corps est brun, avec le dessus de l'abdomen fauve.

De Surinam. — Très-rare jusqu'à présent.

N. B. L'*Andromachu* de Fabricius n'est point une *MORPHO*: c'est une *ACRÆE* que nous avons donnée sous le nom d'*Entoria*, p. 251, n^o. 3 de la première partie.

5. MORPHO *Hecuba*.

MORPHO Hecuba.

Mor. alis dentatis, supra nigris, anticarum disco maculifque terminalibus fulvis: posticis subtus basi argenteo rufoque fuscatis.

Papilio E. A. Hecuba, alis dentatis: anticis rubris, posticis nigris: subtus omnibus ocellatis. LINS. *Mant. Alt. p. 554.*

Papilio N. Hecuba. FAB *Syst. Ent. p. 459. n^o. 67. — Spec. Inf. tom. 2. p. 26. n^o. 104. — Mant. Inf. tom. 2. p. 15. n^o. 121. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 87. n^o. 275.*

Papilio Hecuba. CRAM. *pl. 217. fig. A. B.*

Papilio Hecuba. HERBST, *Pap. tab. 21. fig. 1. 2.*

DAUBENTON, *pl. endum. 19.*

Les deux individus d'après lesquels nous décrivons cette *Morpho* avoient le corps si défectueux que nous n'avons pu en déterminer le sexe. Cependant l'analogie seroit croire que ce sont des femelles.

Elle a de sept à huit pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, avec la base verdâtre, & le milieu traversé par une bande fauve très-large. Le bord postérieur, qui a les échancrures blanchâtres, est en outre divisé dans toute sa longueur par trois rangs de lunules fauves, dont les postérieures adhérent l'une à l'autre. Le dessus des secondes ailes est noir, avec la base d'un gris-verdâtre terminé de jaune, & le bord postérieur longé par un double cordon de lunules fauves.

Le dessous des premières ailes est brun, avec des lignes divergentes à la base, des taches triangulaires au milieu & avant le bord postérieur, d'un blanc-argenté. Derrière les taches du milieu, sont trois grands yeux noirs, ayant l'iris roux, la prunelle blanche & en croissant. Le bord postérieur offre en outre une double ligne ferrugineuse qui s'étend du sommet à l'angle interne.

Le dessous des secondes ailes est brun vers la base, grisâtre vers l'extrémité, avec quatre yeux discordaux, semblables à ceux des premières ailes, mais dont l'antérieur isolé & plus grand que les trois autres. Ces yeux sont précédés par trois bandes argentées, dont l'inférieure plus large, la supérieure linéaire & couvrant le bord d'en haut. Le bord terminal de ces ailes est entièrement divisé par trois lignes, dont l'antérieure argentée, les deux extérieures ferrugineuses, mais devenant argentées vers l'angle de l'anus.

De Cayenne. — Très-rare.

6. MORPHO Métellus.

MORPHO Metellus.

Mor. alis dentatis, supra nigro-fuscis, antica-rum disco maculosis terminalibus fulvis: postica subtus basi pallide fuscifatis.

Papilio N. Metellus, alis dentatis fulvis, posticæ atris: subtus anticis oculis tribus, posticis quinque. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 15. n. 122.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 88. n. 274.*

Papilio Metellus. CRAM. *pl. 218. fig. A. B.*

Papilio Metellus. HERBST, *Pap. tab. 22. fig. 1. 2.*

Nous n'avons vu que la femelle de ce lépidoptère.

Elle a un peu plus de six pouces d'envergure. Son dessus ressemble à celui de l'*Hécube*, mais les taches intérieures de l'extrémité des premières ailes sont moins grosses & descendent moins bas, & les extérieures ne sont pas adhérentes entr'elles.

Le dessous des premières ailes est brun. A sa base sont des lignes jaunâtres, divergentes, & suivies de deux taches blanchâtres, obliques. Vient ensuite, entre deux rangées de taches jaunâtres & triangulaires, une série de quatre yeux dont les deux supérieurs plus petits & moins prononcés. Ces yeux sont noirs, avec l'iris fauve & la prunelle formée par des atomes blancs. Le bord postérieur est en outre longé par une double ligne de petits croissants ferrugineux.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-violâtre, avec des bandes pâles & peu prononcées à la base, une rangée courbe de cinq yeux noirs à iris fauve & à prunelle blanche sur le milieu, une double ligne ferrugineuse sur le bord terminal. Le second œil, à partir d'en haut, est plus petit que les autres, & les trois suivans font presque semi-lunaires.

De Surinam. — Rare.

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

7. MORPHO Perfée.

MORPHO Perfœus.

Mor. alis dentatis, supra nigro-fuscis, basi viridescente, apice fulvo maculato: postica subtus fuscis nitidè-albidis, costali dentata.

Papilio N. Perfœus, alis dentatis, pallidè caruleis, apicè atris ferrugineo maculatis: subtus undatis, oculis tribus quatuorve. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 24. n. 93.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 15. n. 116.* — *Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 86. n. 267.*

Papilio Perfœus. CRAM. *pl. 71. fig. A. B.* (La femelle.)

Papilio Perfœus. HERBST, *tab. 22. fig. 5.*

Papilio Perfœus. HERBST, *tab. 25. fig. 1.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 18. fig. 15. 16.*

Elle a environ six pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un vert-grisâtre, plus deux rangées terminales de petites taches & les échancrures fauves. Les premières ailes ont encore, au-delà du milieu de la côte, une bande jaunâtre, courte, oblique & sinuée.

Le dessous des premières ailes est comme dans le *Métellus*, mais les deux yeux supérieurs manquent quelquefois, & les deux autres sont plus grands.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun plus ou moins violâtre, avec trois bandes blanchâtres, luisantes, dont l'antérieure dentée & couvrant la côte vers son origine; la suivante plus courte; la troisième flexueuse & précédant presque immédiatement quatre yeux dont le supérieur isolé & plus gros. Ces yeux sont noirs, avec l'iris roux & cerclé de noirâtre, la prunelle blanche & formée par des atomes. En avant du bord postérieur, il y a une bande grisâtre, & ce bord est longé par une double ligne ferrugineuse.

La femelle a sur le dessus des premières ailes trois rangs de taches fauves. Elle se distingue en outre du mâle, en ce que les yeux du dessous de ses quatre ailes sont moins grands & moins ronds, & ce qui la rapproche à cet égard de la femelle du *Métellus*.

De Surinam & du Brésil.

8. MORPHO Anaxibia.

MORPHO Anaxibia.

Mor. alis dentatis, supra nitidè cyaneis, limbo nigro (femina fulvo maculato): subtus dilutè umbrinis, strigâ ocellarum ruforum pupillâ albâ lineari.

Papilio Anaxibia. ESP. *Pap. exot. tab. 55. fig. 1.* (Le mâle.)

Papilio E. A. Tëlemachus, alis dentatis, supra
Kkk

fufcis, immaculatis, areâ communi cæruleâ, radiatâ. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 752. n^o. 41. (La femelle.)

MERIAN, *Surin. Inf.* p. 68. tab. 68. (La femelle.)

Papilio N. Telemachus, alis dentatis, fufcis, areâ communi cæruleâ, radiatâ: fingulis fubtus ocellis. FAB. *Syfl. Ent.* p. 458. n^o. 64. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 25. n^o. 100. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 15. n^o. 117. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 86. n^o. 269. (La femelle.)

Papilio Telemachus. CRAM. *pl.* 573. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Telemachus. HERBST, *Pap.* tab. 25. fig. 2. 3. (La femelle.)

Le papillon *Telemachus* des auteurs est la femelle de celui qu'Esper a décrit & figuré sous le nom d'*Anaribia*.

Le mâle a de cinq pouces & demi à six pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-azuré-brillant, avec tout le contour extérieur des premières, & seulement les dents du bord postérieur des secondes, noirs. Les premières ailes ont au-delà du milieu de la côte une petite tache blanche, plus ou moins prononcée.

Le dessus de la femelle est approchant du même bleu que celui du mâle, avec le limbe postérieur largement noir & chargé de deux rangs de taches fauves, dont les antérieures orbiculaires, les postérieures doubles & lunulées. On voit en outre aux premières ailes un cordon transversal de cinq gros points blancs contigus à la couleur bleue, plus une tache blanchâtre placée sur le noir de la côte derrière la cellule sous-marginale.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-pâle & luisant, avec cinq bandes grisâtres, flexueuses & peu apparentes, dont trois vers la base, & deux vers l'extrémité. Les bandes de l'extrémité sont précédées d'une série d'yeux roux ayant la prunelle blanche & linéaire, l'iris noirâtre & cerclé de gris. Ces yeux font au nombre de quatre aux ailes supérieures, de cinq à sept aux inférieures. Indépendamment de cela, les ailes de devant ont l'origine de la côte rouge, & leur base est verte de gris à sa partie supérieure. Le corps est bleu en dessus, d'un brun-jaunâtre en dessous.

La chenille, d'après Merian, est grande, épineuse, d'un rouge-cramoisi, avec des taches irrégulières d'un jaune-doré aux incisions. Sa nourriture est inconnue.

La chrysalide est courte, épaisse, carénée, d'un vert-pâle. L'insecte y séjourne environ un mois, & éclore dans le courant d'octobre.

D. la Guyane & du Brésil.

Nota. Dans la figure du *Telemachus* de mademoiselle Merian, le bleu du dessus des ailes se termine presque en rayons. C'est ce qui a fait dire à Linnæus que cet insecte ressembloit beaucoup à son père (*Ulyssé*), mais qu'il étoit plus petit &

sans queue. La même figure indique avec raison, des taches fauves sur le limbe terminal des ailes; cependant Linnæus, qui y renvoie, dit dans sa phrase spécifique que les ailes sont sans taches en dessus, *suprà immaculatis*.

9. MORPHO Ménélas.

MORPHO Menelaus.

Mor. alis dentatis, suprâ nitidè cyaneis, limbo nigro (femine albo maculato): fubtus umbrinis, ocellis nigris inde rubrâ atomisque cærulescentibus in pupillam congestis.

Papilio E. A. Menelaus, alis dentatis, suprâ cæruleis, nitidissimis: fubtus nebulosis, punctis fufcis. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 748. n^o. 20. — *Muf. Lud. Ulr.* p. 200. (Le mâle.)

Papilio N. Menelaus. FAB. *Syfl. Ent.* p. 458. n^o. 65. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 25. n^o. 101. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 15. n^o. 118. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 86. n^o. 270. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. CLERCK, *Icon.* tab. 21. fig. 1. GRONOW. *Zooph.* 722.

KNORR, *Del. tab.* c. 4. fig. 2.

MERIAN, *Surin. Inf.* p. 55. tab. 53.

SEBA, *Muf.* 4. tab. 51. fig. 1. 2.

Papilio Menelaus. CRAM. *pl.* 21. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. HERBST, *Pap.* tab. 24. fig. 3.

Papilio Menelaus. HERBST, *Pap.* tab. 25. fig. 1.

Papilio Menelaus. ESP. *Pap. exot.* tab. 41. fig. 1.

Papilio E. A. Nestor, alis dentatis, suprâ fufcis, maculis discoque cæruleis: fubtus ocellis tribus binisque. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 752. n^o. 40. (La femelle.)

GRONOW. *Zooph.* 718.

MERIAN, *Surin. Inf.* p. 9. tab. 9.

SEBA, *Muf.* 4. tab. 45. fig. 25. 24.

Papilio N. Nestor, alis dentatis, suprâ fufcis, albo maculatis discoque cæruleo: fubtus ocellis tribus quatuorve. FAB. *Syfl. Ent.* p. 458. n^o. 65. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 24. n^o. 98. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 15. n^o. 115. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 85. n^o. 266. (La femelle.)

Papilio Nestor. CRAM. *pl.* 19. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Nestor. HERBST, *Pap.* tab. 24. fig. 1. 2.

Papilio Nestor. ESP. *Pap. exot.* tab. 41. fig. 2.

Les auteurs ont donné le mâle de cette espèce sous le nom de *Menelaus*, & la femelle sous celui de *Nestor*.

Le mâle, dont l'envergure est d'environ six pouces, a le dessus des ailes d'un bleu-azuré-brillant, avec tout le contour extérieur noir, & les échancures du bord terminal d'un blanc-jaunâtre. Il y a en outre sur la côte des premières ailes trois petites taches blanches, savoir : une au-delà de son milieu, les deux autres près de son extrémité.

La femelle est d'un bleu un peu moins vif que le mâle, avec le limbe postérieur largement noir & chargé d'un rang de taches blanches aux ailes inférieures, de deux aux supérieures. Ces dernières ailes ont à l'extrémité de la cellule sous-marginale une tache blanche, assez grande & placée transversalement sur la côte.

Le dessous des deux sexes est couleur de terre d'ombre, & présente sur chaque aile quatre yeux noirs ayant l'iris d'un rouge-brique & la prunelle composée d'atomes bleuâtres. L'œil antérieur des secondes ailes est toujours isolé, & quelquefois appuyé sur un autre plus petit. Ces yeux, qu'entoure un cercle gris, sont précédés intérieurement & presque immédiatement d'une série de lunules d'un vert-argenté, devant lesquelles l'on voit sur les ailes supérieures un chevron transversal, & sur les inférieures une ligne interrompue, du même vert. Indépendamment de cela, toutes les ailes ont l'extrémité saupoudrée de gris, & leur bord postérieur est longé par une double ligne rougeâtre en fesson. Le corps est noir.

La chenille, selon Merian, est jaunâtre, avec des lignes longitudinales, & les pattes, roses. Sa tête est d'un brun-obscur, & chaque anneau de son corps offre quatre épines noires, aiguës. Elle vit sur un arbre très-élevé, auquel cet auteur donne le nom de *Mespilus*.

La chrysalide est cylindrique, pâle, avec des pointes sur le dos. Le papillon en sort au bout de quinze jours & paroît en janvier.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. La phrase spécifique de Linnæus seroit soupçonner que son papillon *Menelaus* n'est pas le même que celui de Cramer. Mais la description détaillée qu'il en donne dans le *Museum Ludovicæ Ultricæ Regiæ*, & la figure de Clerck, à laquelle il renvoie, ne laissent aucun doute sur l'identité.

10. MORPHO HÉLÉNOR.

MORPHO *Helenor*.

Mor. alis dentatis, suprâ nigris, areâ bascos seu fasciâ mediâ nitidâ cyaneâ : subtus basi strigâ undatâ virecente.

Papilio Helenor. CLERCK, *Icon. tab. 24. fig. 3. 4.*

Papilio Helenor. CRAM. *pl. 86. fig. A. B.*

Papilio Helenor. CRAM. *pl. 373. fig. C. (Variété.)*

Papilio Helenor. HERBST, *Pap. tab. 26. fig. 1. 2.*

Papilio Helenor. ESP. *Pap. exot. tab. 42. fig. 2.*

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande commune & discoïdale d'un bleu-argenté, ou d'un bleu-violet-luisant, n'importe le sexe. Cette bande n'a pas une largeur constante ; car, dans les individus comme celui que Cramer a représenté, elle n'est guère que d'un demi-pouce, tandis que dans beaucoup d'autres elle s'étend presque jusqu'à la naissance des ailes, en perdant toutefois de son éclat. Les premières ailes ont vers le milieu de la côte une tache blanche oblique, & vers l'extrémité des points de cette couleur, disposés sur un rang dans le mâle, sur deux dans la femelle ; sans compter les petites lunules blanches qui bordent les échancures. Les secondes ailes, dont les échancures sont également blanches, ont le long du bord postérieur une série de points rouges, plus ou moins distincts.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec des yeux très-noirs, ayant la prunelle blanchâtre & environnée d'atomes ferrugineux & d'atomes violets, l'iris jaune & renfermé dans un cercle verdâtre que borde intérieurement une lunule de la couleur. Il y a en outre vers la base de chaque aile une ligne verdâtre, transversale, flexueuse & interrompue ; & le long du bord terminal trois lignes plus ou moins grêles, dont l'intermédiaire est interrompue de rouge aux ailes inférieures. Les yeux sont au nombre de trois aux premières ailes, de quatre aux secondes, & l'antérieur d'entr'eux est toujours isolé. Le corps est noir en dessus, brun en dessous.

Cramer donne une variété qui a les trois yeux postérieurs du dessous des secondes ailes allongés & terminés inférieurement en pointe.

De plusieurs contrées de l'Amérique méridionale.

Nota. Dans les individus du Pérou, la bande du dessus des ailes est le plus ordinairement d'un bleu-violet ; dans ceux du Brésil & de Surinam, elle est d'un ton argenté.

11. MORPHO Achille.

MORPHO *Achilles*.

Mor. alis dentatis, suprâ nigris, areâ bascos seu fasciâ mediâ nitidâ cyaneâ : subtus basi strigis plurimis virecentibus.

Papilio E. A. Achilles, alis dentatis, suprâ nigris, fasciâ cœruleâ : subtus fuscis, ocellis tribus quinisque. LANS. *Syst. Nat. 2. p. 752. n. 42. — Mus. Lud. Ulr. p. 211.*

Kkk 2

Papilio Achilles. CLERCK, *Icon. tab. 24. fig. 2.*

GRONOW, *Zooph. 719.*

MERIAN, *Surin. Inf. p. 7. tab. 7.*

KNORR, *Del. tab. c. 2. fig. 1. 2.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 24. fig. 1. 2.*

Papilio N. Achilles. FAB. *Syst. Ent. p. 456. n. 54. — Spec. Inf. tom. 2. p. 21. n. 88. — Mant. Inf. tom. 2. p. 11. n. 101. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 81. n. 253.*

Papilio Achilles. GRAM. *pl. 27. fig. A. B.*

Papilio Achilles. GRAM. *pl. 28. fig. A.*

Papilio Achilles. HERBST, *Pap. tab. 25. fig. 2. 5.*

Nous n'avons pas vu ce lépidoptère ; mais , d'après les figures des auteurs, il ne nous a paru différer de l'*Hélios* que par les caractères suivans : 1°. le dessus des secondes ailes est sans points rouges sur le limbe , & l'extrémité des premières n'a qu'un ou deux points blancs ; 2°. le dessous des quatre ailes offre à la base plusieurs lignes verdâtres , & la prunelle des yeux n'est point environnée d'atomes ferrugineux. Ces différences, en admettant qu'elles soient bien exactes, fussent-elles pour constituer une espèce à part ?

La chenille, selon Merian, est jaunâtre, avec des épines brunes, aiguës, médiocrement longues. Elle a en outre, sur le devant du corps, des bouquets de poils bruns en forme de broches. On la trouve sur le cerisier d'Amérique.

La chrysalide est courte, épaisse, verte, & munie de pointes aiguës à sa partie antérieure. Le papillon éclôt au bout de cinq semaines, & donne dans le courant de mai.

12. MORPHO Rhéténor.

MORPHO Rhetenor.

Mor. alis supra nitidissimè cyaneis : subtus umbrino griseoque variis, ocellis cæcis. (Mas.)

Papilio Rhetenor. GRAM. *pl. 15. fig. A. B.*

Papilio Rhetenor. HERBST, *Pap. tab. 27. fig. 1. 2.*

Papilio Rhetenor. ESP. *Pap. exot. tab. 42. fig. 1.*

Papilio Rhetenor. SULZ. *Inf. tab. 15. fig. 1.*

Nous ne connoissons que le mâle de ce lépidoptère.

Il a environ cinq pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-azuré très-brillant, avec la côte des supérieures noire & leur sommet violet.

Le dessous est couleur de terre d'ombre vers la base ; d'un brun-grisâtre vers l'extrémité ; & tra-

versé au milieu par une bande blanchâtre, finée, derrière laquelle on voit à chaque aile deux à trois petits yeux noirs, sans prunelle, mais ayant aux inférieures un iris légèrement ferrugineux. Ces dernières ailes ont la côte bordée par une ligne blanchâtre, & les premières ont sur le milieu plusieurs taches inégales de cette couleur.

De Surinam.

13. MORPHO Cythérés.

MORPHO Cytheris.

Mor. alis supra argenteo-cyaneis, nitidis : posticis dentatis, subtus fuscis plurimis argenteis ocellisque tribus diffitis. (Mas.)

Nous n'avons vu que des mâles de cette espèce.

Leur envergure est d'environ quatre pouces. Leur dessus est d'un bleu-argenté-luisant, avec une ligne sur tout le contour extérieur des premières ailes, & une série de points sur la tranche du bord terminal des secondes, noirs. Les premières ailes offrent une tache blanchâtre vers le milieu de la côte, & les secondes ont la région de l'angle anal divisée par une double ligne fauve, interrompue.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-pâle, avec une multitude de bandes argentées, transverses & flexueuses, dont les deux postérieures séparées des autres par des yeux noirs ayant la prunelle argentée, l'iris roux & cerclé de gris. Ces yeux sont écartés l'un de l'autre, & il y en a deux aux ailes de devant, trois à celles de derrière. Ces dernières ont l'angle de l'aube rayé de noir & de verdâtre. Le corps est bleuâtre en dessus, grisâtre en dessous.

Du Brésil. — Très-rare.

14. MORPHO Laertes.

MORPHO Laertes.

Mor. alis subdentatis, utrinquè margaritaceo-albis, anticarum fasciâ costali nigra : posticis subtus striga ocellorum.

Papilio N. Laertes, alis dentatis, cinereo-albis : anticis apice nigris : posticis subtus strigâ ocellorum fulvorum. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 84. n. 262.*

Papilio Laertes. DRURY, *Inf. 5. tab. 15.*

Papilio Laertes. JON. *Fig. pict. 5. tab. 46. fig. 1.*

Papilio Laertes. ESP. *Pap. exot. tab. 45. fig. 2.* (La femelle.)

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont légèrement dentées, d'un blanc-nacré de part & d'autre. Leur dessus offre, le long du bord postérieur, un double cordon de taches noires, mais plus grandes dans la femelle où elles sont d'ailleurs séparées par une ligne noire en tel-

ton. Les premières ailes des deux sexes ont en outre la moitié antérieure de la côte couverte par une raie noire qui se dilate en forme de crochet derrière la cellule sous-marginale.

En dessous, on retrouve les caractères du dessus, mais ils sont moins prononcés, & il y a au milieu de la surface une rangée transverse d'yeux noirs ayant l'iris fauve, & la prunelle formée par une ligne blanche. Ces yeux sont oblongs, au nombre de trois à quatre aux premières ailes; au nombre de sept, dont le postérieur semi-lunaire, aux secondes. Les premières ailes ont, vers le milieu de la cellule sous-marginale, deux petites taches brunes, plus ou moins allongées.

Nous avons vu, dans la collection de M. de Langsdorff, un individu femelle dont le dessous des ailes inférieures est varié de brun-pâle depuis la base jusqu'à l'extrémité.

Du Brésil.

15. MORPHO JAÏRUS.

MORPHO Jaïrus.

Mor. alis integris, fuscis: posticis disco basaeo albo, suprâ oculo maximo, subtus duobus diffitis.

Papilio F. Jaïrus, alis integerrimis, fuscis: posticis disco albo, suprâ oculo, subtus duobus.
FAB. *Gen. Inf. Mant.* 258. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 50. n.º. 525.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 54. n.º. 168.*

Papilio Castice. CLERCK, *Icon. tab. 29. fig. 3.*

Papilio Jaïrus. CRAM. *pl. 6. fig. A. B.*

Papilio Jaïrus. CRAM. *pl. 185. fig. A. B. C.*

Papilio Jaïrus. HERBST, *Pap. tab. 218. fig. 1. 2. 5.*

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un brun-obscur de part & d'autre. Les supérieures sont ordinairement sans taches dans le mâle; mais, dans la femelle, elles offrent, entre le milieu et le sommet, un espace blanchâtre, plus prononcé en dessous qu'en dessus.

Les ailes inférieures ont le milieu blanc, à partir de la base. Leur dessus n'a qu'un seul oeil, placé entre la couleur blanche & l'angle de l'aune. Leur dessous en a deux, dont un correspondant à celui de la surface opposée, l'autre appuyé sur la côte ou bord d'en haut. Ces yeux sont très-grands, noirs, avec la prunelle blanche & entourée d'atomes bleuâtres, l'iris d'un jaune-rouillâtre. Le corselet est d'un brun-obscur, l'abdomen & les palpes sont fauves, & les antennes sont noires.

Dans certaines femelles, l'œil postérieur du dessous des secondes ailes est accolé à un autre œil beaucoup moins grand.

De l'île d'Amboine.

N. B. M. le capitaine Freycinet a rapporté des îles Rawack un individu mâle, remarquable par

la petitesse de sa taille, ainsi que par la largeur de l'iris des ailes inférieures, & l'espace blanc qui longe de part & d'autre tout le bord interne des supérieures.

16. MORPHO ODANA.

MORPHO Odana.

Mor. alis subdentatis, nigricanti-fuscis: anticis fuscis violaceo-cærulea, nitida: posticis subtus oculo anali cæco.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu unique qui nous a paru être un mâle.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande courbe & oblique d'un bleu-violet vers le milieu des supérieures, lesquelles ont en face du sommet une tache blanchâtre peu prononcée. Les ailes inférieures n'ont pas de taches, seulement la cellule de leur base est plus noirâtre que le reste de la surface.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-ensumé & un peu chatoyant, avec des bandes violâtres, bordées de brun-marron. Les ailes supérieures en ont quatre, dont les trois antérieures plus courtes & appuyées transversalement près de l'origine de la côte, la quatrième se dirigeant obliquement vers le bord postérieur, qui est plus pâle que le reste de la surface. Les ailes inférieures n'en ont que trois, savoir: deux très-courtes à la base, & une plus longue sur le milieu. Cette dernière aboutit presque à un œil noirâtre, assez grand, sans prunelle, mais ayant un iris jaune qu'entoure un cercle noir. Indépendamment de cet œil, il y a vis-à-vis du sommet un point jaunâtre, & à l'angle anal une tache noire, semi-lunaire. Le bord postérieur des mêmes ailes est aussi plus pâle, & il est divisé dans le sens de la longueur par une ligne blanchâtre, ondulée.

De Java.

17. MORPHO OGINA.

MORPHO Ogina.

Mor. alis subdentatis, suprâ violaceo-fuscis, fuscâ postica cærulecente: posticis subtus ocellis 2-5.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun glacé de violet, avec une bande postérieure & transverse d'un bleu-pâle & chargée d'un rang de points bruns. Cette bande n'existe quelquefois qu'aux ailes supérieures. Les ailes inférieures ont vers le milieu une tache noire, veloutée, ronde & coupée par une nervure burchue.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-verdâtre un peu glacé de violet, avec deux bandes très-brunes, dont l'antérieure sinuée & plus courte; l'autre discoidale, & suivie aux secondes ailes

d'une rangée de deux à cinq yeux qui ont la prunelle blanche & en croissant, l'iris jaune & entouré d'un cercle noir. Le corps est de la couleur des ailes, c'est-à-dire, d'un brun-violet en dessus, d'un brun-jaunâtre en dessous. Les antennes sont fauves.

De Java.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

18. ΜΟΡΦΟ Céliade.

ΜΟΡΦΟ Celine.

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-fuscis, fuscâ mediâ cœrulescente: anticis apice fulvo-punctatis: posticis subtus ocellis duobus remotis.

Papilio Celine. STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM.* pl. 37. fig. 1 & 1. A.

Il seroit bien possible que ce lépidoptère fût la femelle du précédent; car, d'après la figure de Stoll, il paroît n'en différer que parce que la bande bleue du dessus des ailes est discordale & plus large, & parce que l'extrémité des supérieures offre une rangée transverse de sept points fauves. Le dessous des secondes ailes n'a que deux yeux; mais, comme nous l'avons dit en parlant de l'*Odana*, le nombre des taches oculaires varie de deux à cinq.

De Java.

19. ΜΟΡΦΟ Tullia.

ΜΟΡΦΟ Tullia.

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-fuscis, apice flavo maculato: subtus punctis baseos fuscis.

Papilio N. Tullia, alis dentatis, fuscis, maculis ocellaribus: subtus fasciâ violacâ, posticorum ocellis duobus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3.* pars 1. p. 98. n°. 505.

Papilio Tullia. CRAM. pl. 81. fig. A. B.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un échantillon sans abdomen, & par la figure de Cramer.

Il est de la taille de l'*Odana*. Le dessus des ailes est d'un brun légèrement glacé de violet, avec des taches jaunâtres, orbiculaires, disposées, parallèlement au bord terminal, sur trois rangs, dont les deux intérieurs plus courts. Les premières ailes ont eu outre une bande jaunâtre, fincée, se dirigeant obliquement du milieu de la côte vers le sommet.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-sale, avec deux bandes brunâtres, transversales, dont la troisième, à partir de la base, plus large, & offrant, mais seulement aux secondes ailes, deux yeux à prunelle blanche, à iris jaune & cercle de noir. Indépendamment de cela, il y a près de la

base de toutes les ailes plusieurs points bruns, rapprochés deux à deux.

De la Chine.

20. ΜΟΡΦΟ Ménéthon.

ΜΟΡΦΟ Menetho.

Mor. alis dentatis, fuscis, margine flavo maculato: posticis subtus ocellis duobus. FAB.

Papilio N. Menetho. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3.* pars 1. p. 85. n°. 260.

Papilio Menetho. JON. *Fig. pict. 5. tab. 61.*

Papilio Menetho. DONOW. *Of an Epitome of the Nat. Hist. of the Insects of India, cal. 2. pl. 1. fig. 1.*

Ce lépidoptère paroît ressembler beaucoup au précédent; peut-être même n'en est-il qu'une variété.

Voici ce qu'en dit Fabricius: les quatre ailes sont dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec deux rangées transverses & presque terminales de taches jaunes.

En dessous le fond des ailes est jaunâtre, avec deux bandes obscures & communes, entre lesquelles les secondes ailes ont deux yeux sans prunelle.

De l'Inde.

N. B. D'après la figure de Donovan, il y a sur le milieu de la côte des quatre ailes une tache jaune, transversale, dont ne parle pas Fabricius. Cette tache appartient probablement à la femelle.

II. Cellule discoidale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu & d'où part un rameau longitudinal qui s'étend jusqu'au bord postérieur.

A. Ailes supérieures non concaves. Inférieures ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

21. ΜΟΡΦΟ Aétorion.

ΜΟΡΦΟ Aetorion.

Mor. alis integris, supra umbrinis: anticis fasciâ apicis nîsâ areâque interiori nitidè violacâ.

Papilio P. U. Aetorion, alis subcaudatis, fuscis: primoribus fasciâ lutescente exteriori maculique cœruleâ posticâ, subtusque ocello. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 794. n°. 262.* — *Amœn Acad. tom. 6. p. 409. n°. 78.*

Papilio Aetorion. CLERCK, *Icon. tab. 36. fig. 2.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 41. fig. 17. 18.*

Papilio D. F. Aetorion. FAB. *Syst. Ent. p. 553. n°. 386.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 61. n°. 271.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 29. n°. 312.*

Papilio Aëlion. CRAM. pl. 49. fig. C. D. (Le mâle.)

Papilio Aëlion. HERBST, Pap. tab. 152. fig. 5. 4.

Linnaeus a placé cette espèce dans la division des *Plébiens urbicoles*, division qui correspond en partie à notre genre *POLYOMMATE*.

Elle n'a guère plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est couleur de terre d'ombre, avec une bande rouille, courbe en arrière, allant du milieu de la côte au milieu du bord terminal, & précédée en dehors de deux petits points blancs. Dans le mâle, ces mêmes ailes ont une tache postérieure, & dans la femelle une bande discoidale, d'un violet-luisant. Les secondes ailes ont le bord interne largement échauré à la partie inférieure. Leur dessus est aussi couleur de terre d'ombre, mais sans taches.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux & finement ondé ou réticulé de gris, avec deux points blancs & un oeil noir à prunelle violette & à iris jaune au sommet des supérieures; avec deux yeux jaunâtres à prunelle brune vers le milieu du bord antérieur des inférieures. Celles-ci offrent en outre, sur le prolongement de l'angle de l'anus, un trait noir, longitudinal, & bordé intérieurement de blanc-violet. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont rouilles.

De Surinam & du Brésil.

N. B. Le mâle a deux touffes de poils: l'une jaunâtre dans la gouttière du bord interne, l'autre brune à la base des secondes ailes.

B. Ailes supérieures concaves. Inférieures plus ou moins prolongées en dehors.

22. MORPHO Aorfa.

MORPHO Aorfa.

Mor. alis supra nigricanti-fuscis, strigis subterminali fulva: posticis subtus reticulatis biocellatisque.

Par le port & par la couleur des ailes, cette espèce se rapproche du satyre *Europa* de Fabricius, ou *Berne* de Cramer; mais, par les palpes & par les antennes, elle appartient aux *Morphos* qui ont la cellule discoidale des secondes ailes fermée postérieurement.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, un peu chatoyant, avec une ligne fauve, partant du tiers postérieur de la côte des premières, & se continuant sur la tranche du bord terminal des secondes. Celles-ci ont une queue extérieure, obtuse & assez longue; celles-là ont au sommet, derrière la ligne fauve dont il vient d'être question, une rangée de trois points blancs.

Le dessous des ailes supérieures est à peu près de la couleur du dessus, & présente les caractères suivans: vers la base est une bande rouille, transverse, courte, droite, & comprise entre deux lignes blanchâtres également droites & transverses. Viennent ensuite deux bandes d'un blanc-jaunâtre-luisant, en forme de chevron, & opposées par leur convexité. Près du sommet, qui est d'une teinte violâtre, sont deux yeux noirs, dont l'antérieur sans prunelle, l'autre en ayant une blanche avec un iris jaunâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-noirâtre, ondé de jaunâtre, surtout vers le bord postérieur, ainsi qu'à la base où l'on voit deux taches obscures & orbiculaires. Indépendamment de ces taches, il y a, sur le milieu, deux yeux très-écartés, dont l'antérieur ferrugineux, marqué d'un croissant très-blanc, & pourvu d'un iris noir que borde un cercle jaunâtre; le postérieur noir, saupoudré de gris-verdâtre, ayant une prunelle très-blanche en croissant, & un iris ferrugineux. On remarque de plus entre ces yeux deux points rouffâtres, peu prononcés.

Du Brésil. — Très-rare jusqu'à présent.

Nota. Le dessous des secondes ailes offre, au bas de la cellule discoidale, un renflement elliptique très-prononcé.

23. MORPHO Automédon.

MORPHO Automédon.

Mor. alis supra nigro-fuscis, disco communi violaceo: anticarum apice (sem.) strigis fulvis: posticis subtus ocellis duobus, postremo sequialtero.

Papilio N. Automédon, alis angulato-repandis, fuscis: subtus lividiusculis, ocellis anguli anti. FAB. *Gen. Inf. Mant.* 253. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 25. n. 105.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 15. n. 120.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars. 1. p. 87. n. 272.*

Papilio Automédon. CRAM. pl. 41. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Automédon. CRAM. pl. 589. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Automédon. HERBST, Pap. tab. 51. fig. 3. (Le mâle.)

Papilio Automédon. HERBST, Pap. tab. 52. fig. 1. (Le mâle.) fig. 2. 3. (La femelle.)

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noir, avec le milieu violet, mais d'un ton plus vil dans le mâle que dans la femelle. Celle-ci a en outre la tranche du bord postérieur des secondes ailes jaunâtre, & l'extrémité de ses premières ailes est coupée par une raie fauve, transverse, interrompue, tantôt interrompue, tantôt dilatée & marquée de

deux taches noires près du sommet, lequel offre dans chaque sexe un double point blanc.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-grisâtre ou jaunâtre, ondé de noirâtre en deux endroits, faveur : à la base où il y a une bande blanche, commune & oblique; ensuite vers l'extrémité où sont trois lignes noirâtres, transverses & sinuées, mais plus apparentes aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Sur le milieu, où l'on remarque quelques hiéroglyphes noirs, les secondes ailes ont deux yeux, dont l'antérieur presque ovale & appuyé obliquement sur la côte, le postérieur placé beaucoup plus bas & réuni extérieurement à un autre qui est beaucoup plus petit. Ces yeux sont jaunâtres, cerclés de noir, & marqués d'un enroulement blanc. L'œil postérieur est en outre pointillé de gris-olivâtre. Aux deux points blancs du sommet des premières ailes correspondent deux points semblables, mais s'alignant ici avec deux taches noirâtres, réuniformes, bordées de jaunâtre & apérgées de blanc.

De Surinam & du Brésil.

C. Ailes supérieures peu ou point concaves. Inférieures sans prolongement.

24. ΜΟΡΦΟ Euryloque.

ΜΟΡΦΟ Eurylochus.

Mor. alis subdentatis, supra fusco-cærulescentibus : subtus anticis ocellis duobus, posticis tribus, omnibusque strigâ nigrâ, angulatâ, mediâ.

Papilio Eurilochus. CRAM. pl. 53. fig. A.

Papilio Eurilochus. CRAM. pl. 54. fig. A.

Papilio Eurilochus. ESP. Pap. exot. tab. 44. fig. 2.

Papilio Eurylochus. HERBST, Pap. tab. 29. fig. 1. 2.

Elle a de six pouces & demi à sept pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un ton ardoisé-obscure, avec le limbe terminal largement noir, & divisé en outre aux supérieures par deux lignes brunâtres, transverses, sinuées, dont l'intérieure plus courte, & séparée de l'extérieure par une suite de trois petites lunules blanches qui sont face au sommet.

Le dessous des quatre ailes est brun, finement ondé de blanchâtre & de noirâtre, avec trois lunules blanches & un petit œil noir au sommet des supérieures dont le bord de derrière est entièrement longé par une double ligne noirâtre en zigzag; avec un arc de trois yeux écartés, & dont le postérieur très-grand, sur le milieu des inférieures. Ce dernier œil est surmonté d'une ligne noire flexueuse, ligne que Cramer n'a pas indiquée, non plus qu'une autre, à peu près semblable, & non moins caractéristique, que l'on voit sur le mi-

lieu des ailes de devant. Le corps est d'un bleu-obscure en dessus, brun en dessous. Les antennes sont noirâtres.

La femelle ressemble au mâle, mais elle est plus grande.

De la Guyane & du Brésil.

25. ΜΟΡΦΟ Iliouée.

ΜΟΡΦΟ Ilioueus.

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-cærulescentibus, limbo nigro, anticarum strigis duabus, posticarum sinubus, flavidis.

Papilio Ilioueus. CRAM. pl. 52. fig. A.

Papilio Ilioueus. HERBST, Pap. tab. 50. fig. 1.

SEEA, Mus. 4. tab. 51. fig. 5. 4.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe terminal largement noir, bordé de jaunâtre aux inférieures, & divisé transversalement aux supérieures par deux lignes également jaunâtres, entre lesquelles il y a vis-à-vis du sommet un groupe de deux ou trois petites lunules blanches.

Le dessous des ailes supérieures est brun & ondé de noirâtre, avec cinq bandes blanchâtres, sinuées, transversales, dont les trois antérieures plus courtes; les deux postérieures renfermant trois petites lunules blanches correspondant à celles du dessus, plus deux yeux, dont l'un faisant suite à ces lunules, l'autre placé à égale distance du précédent & de l'angle interne. On voit en outre une tache blanchâtre, semi-lunaire, devant la première des deux bandes postérieures.

Le dessous des ailes inférieures est coloré & ondé comme celui des supérieures, avec trois bandes blanchâtres, peu prononcées, & un arc discoidal de trois yeux, dont l'intermédiaire beaucoup plus petit, le postérieur médiocrement grand & surmonté d'un petit arc noir, au-dessus duquel il y a une tache blanchâtre, centrale. Le corps est bleuâtre en dessus, brun en dessous. Les antennes sont noirâtres.

La femelle ressemble au mâle, mais elle est un peu plus grande, & le sommet de ses ailes inférieures offre en dessus trois lunules blanches, tandis qu'il n'y en a que deux dans le mâle.

De la Guyane & du Brésil.

26. ΜΟΡΦΟ Teucer.

ΜΟΡΦΟ Teucer.

Mor. alis subdentatis : anticis supra lividiusculis ; posticis supra basi cærulescente, subtus ocellis tribus distinctis, postremo maximo.

Papilio E. A. Teucer, alis subrepandis, lividiusculis ; subtus nebulosis, posticis ocellis tribus, postremo maximo. LANS. Syst. Nat. 2. p. 755. n. 44. — Mus. Lud. Ulr. p. 212.

MERIAN, *Surin. Inf. p. 23. tab. 23.*

SLOAN, *Jamaic. 2. p. 219. n. 24.*

Papilio N. Teucer. FAB. *Syfl. Ent. p. 458. n. 60.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 23. n. 102.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 13. n. 119.* — *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 87. n. 271.*

Papilio Teucer. GRAM. *pl. 51. fig. A. B.*

Papilio Teucer. HERBST, *Pap. tab. 51. fig. 1. 2.*

Papilio Teucer. ESP. *Pap. exot. tab. 44. fig. 1.*

Elle a de cinq à six pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'une teinte livide vers la base, d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, & traversé obliquement au milieu par une ligne jaunâtre un peu flexueuse.

Le dessus des secondes ailes a la moitié antérieure d'un bleu-ardoisé; l'autre moitié noire, avec la tranche du bord terminal légèrement blanchâtre.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus de l'*Illionée*, mais l'œil postérieur des inférieures est sensiblement plus grand.

Elle habite une grande partie de l'Amérique méridionale.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

27. MORPHO Idoméénée.

MORPHO *Idomeneus.*

Mor. alis subdentatis, supra nigro-fuscis, omnium basi posticarumque limbo caeruleo-violeis: posticis subtus ocellis duobus maculaque centrali albâ.

Papilio E. A. Idomeneus, alis subcrenatis, fuscis, caeruleo-fuscis: subtus nebulosis, ocellis duobus, postico magno, flavescente. LINN. *Syfl. Nat. 2. p. 733. n. 45.* — *Mus. Lud. Ulr. p. 215.*

Papilio Idomeneus. CLERCK, *Icon. tab. 20. fig. 1.*

GRONOW, *Zooph. 721.*

MERIAN, *Surin. Inf. p. 60. tab. 60.*

Papilio N. Idomeneus, alis subcrenatis, fuscis, basi cyaneis: subtus nebulosis, posticis oculo magno flavescente. FAB. *Syfl. Ent. p. 459. n. 68.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 20. n. 105.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 13. n. 123.* — *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 88. n. 275.*

Papilio Surinamensis, maximus: subtus perbellè ocellatus & marmoratus. PETIV. *Gazoph. 43. tab. 28. fig. 1.*

Papilio Idomeneus. GRAM. *pl. 52. fig. B.*

Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

Papilio Idomeneus. GRAM. *pl. 50. fig. A. B.*

Papilio Idomeneus. HERBST, *tab. 50. fig. 2.*

DAUBENTON, *pl. enlum. 96. fig. 1. 2.*

Elle a environ six pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noir, avec la base des quatre, & le bord terminal des inférieures, d'un bleu-ardoisé. Les premières ailes ont une raie jaunâtre, se dirigeant obliquement de la partie postérieure de la côte vers le milieu du bord interne où elle se perd dans la couleur bleue. Cette raie est moins apparente dans certaines femelles que dans le commun des mâles.

Le dessous des ailes est d'un brun-rouffâtre, ondé de noir, avec deux bandes blanches, communes & ourdées comme le fond. Entre ces bandes, les secondes ailes ont, indépendamment d'une tache blanche centrale, deux yeux écartés, dont l'antérieur roux, ayant un large iris noir & une prunelle blanche en croissant; le postérieur beaucoup plus grand, noir, faiblement verdâtre, ayant une prunelle semblable à celle que nous venons d'indiquer, & un très-large iris jaunâtre qui entoure un cercle noir, mais plus étroit en arrière qu'en avant. Les premières ailes ont entre les deux bandes susdites, deux raies blanches, finies, dont la postérieure très-oblique, interrompue inférieurement; & vis-à-vis du sommet, deux yeux noirs, séparés l'un de l'autre par deux petites lunules blanches. Après ces yeux viennent deux lignes noirâtres, en zig-zag, & descendant de la côte à l'angle interne.

La chenille, selon Merian, est rougeâtre, avec trois tubercules bleus à tous les anneaux, tubercules de chacun desquels part une aigrette noirâtre, longue. Sa nourriture n'est pas indiquée.

La chrysalide est verdâtre, dentée, & pourvue de deux éminences, dont l'antérieure placée sur la tête & courbée en arrière; l'autre située sur le dos & courbée en avant. L'insecte parfait n'y reste guère que quinze jours, & paraît dans le courant de janvier.

De Surinam & du Brésil.

28. MORPHO Inachis.

MORPHO *Inachis.*

Mor. alis subdentatis, supra violaceo-caeruleis, omnium limbo nigro anticarumque apice lateo: posticis subtus ocellis duobus oblongis.

Elle a de six pouces à six pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet, avec le limbe terminal largement noir. Outre cela, les premières ailes ont le sommet d'un jaune-fauve, avec deux lutures & trois petites lunules blanches, derrière lesquelles il y a une tache noire, transversale.

Le dessous des quatre ailes ressemble beaucoup au dessous de l'*Idoméne*, mais le fond est d'un brun moins rouffâtre; le limbe terminal des supérieures est presque entièrement ondé; les deux yeux des inférieures sont oblongs, & la tache centrale qui les sépare est jaunâtre & beaucoup plus petite.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle est un peu plus grande & qu'elle a l'abdomen plus gros.

Du Brésil & du Pérou.

29. MORPHO Maria.

MORPHO Maria.

Mor. alis subdentatis : anticis utrinque arcu centrali albâ ; posticis supra violaceis, subtus biocellatis.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, avec la partie inférieure de la base légèrement glacée de violet, & le milieu traversé par une bande blanche, large, mais n'atteignant pas l'angle interne. Le sommet offre en outre un groupe de deux petites taches blanches. En dessous, le fond de ces ailes est brun, avec des hiéroglyphes noirs à la base; une bande blanche, jaspée, sur le milieu; quatre yeux, puis deux lignes flexueuses, noirs, à l'extrémité. Les yeux sont alignés vis-à-vis du sommet, & l'inférieur d'encre eux a un iris roux.

Les secondes ailes ont le dessus d'un violet assez vif, avec le limbe postérieur noir & liseré de blanchâtre aux bords. Leur dessous est brun, avec des ondes griffées à la base & à l'extrémité, des hiéroglyphes noirs & deux yeux écartés sur le milieu. L'œil antérieur est rouffâtre, avec l'iris noir & la prunelle blanche. L'œil postérieur est beaucoup plus grand, noir, avec la prunelle très-blanche & lunulée, l'iris jaune, cerclé de noir & surmonté d'un arc de cette couleur.

Décrite d'après deux individus mâles pris au Brésil par M. le chevalier de Langsdorff.

30. MORPHO Taramela.

MORPHO Taramela.

Mor. alis subintegris : anticis supra fuscescenti-luteis, limbo nigro ; posticis subtus ocellis duobus strigatis undatâ cœrulescente.

Elle a de cinq pouces à cinq pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-jaunâtre un peu obscur depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite noir jusqu'au bout, avec une ligne brunâtre, transverse & flexueuse.

Le dessus des secondes ailes est d'un jaune très-obscur à la base; d'une teinte ardoisée au milieu; noir à l'extrémité, avec la tranche du bord posté-

rieur griffâtre dans le mâle, jaunâtre dans la femelle.

Le dessous des premières ailes est brun, avec des taches blanchâtres, irrégulières, à la base; une bande transverse également blanchâtre sur le milieu; deux lignes noires, flexueuses, à l'extrémité. Entre ces lignes & la bande susdite, font des ondes blanches, derrière lesquelles on voit, en face du sommet, une suite de quatre petits yeux noirs, dont le postérieur cerclé de roux.

Le dessous des secondes ailes est brun, avec des ondes blanches à la base & derrière le milieu; des ondes noirâtres à l'extrémité. Sur le milieu font deux yeux écartés, dont l'antérieur rouffâtre, entouré de noir & marqué d'un croissant blanc; le postérieur beaucoup plus grand, noir, avec la prunelle blanche & en croissant, l'iris jaunâtre, environné de noir, & surmonté d'une liure flexueuse de cette couleur, puis d'un point jaunâtre. Entre ces yeux & le bord postérieur, il y a une ligne bleuâtre, sinuée, courbe, & allant de la côte au bord interne. Le corps est jaunâtre en dessus, brun en dessous.

Dans la femelle, le dessus des ailes supérieures offre, entre la partie jaune & la ligne brunâtre du limbe, une série transverse de sept petites taches blanches.

Du Brésil.

31. MORPHO Saronia.

MORPHO Saronia.

Mor. alis subintegris, supra luteis, limbo nigro : subtus anticarum disco fasciâ bifidâ flavescente, posticarum ocellis duobus remotis.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses premières ailes sont entières, les secondes sont un peu sinuées. Le dessus des quatre est d'un jaune plus ou moins rouffâtre depuis la base jusqu'au-delà du milieu, ensuite d'un noir-brun jusqu'au bout. Il y a en outre, au sommet des ailes supérieures, un arc transversal de trois points d'un jaune d'ocre.

Le dessous des premières ailes a environ la moitié antérieure d'un brun-tanné-clair, avec deux bandes jaunâtres, dont l'intérieure étroite, bordée de noir, se prolongeant, mais en devenant plus pâle, jusqu'au centre des secondes ailes; l'extérieure très-large, & ayant la partie supérieure profondément bifide. Après cette dernière bande, le fond devient d'un brun presque marron, & présente près de la côte un espace griffâtre, ondé de blanc, en forme de triangle renversé, & suivi de trois points blancs, dont les deux postérieurs séparés par un œil noir à l'iris d'un jaune-paille & à prunelle semi-lunaire d'un beau blanc. Le long du bord terminal, qui est d'un gris-vertâtre, sont deux lignes noires, flexueuses, dont l'extérieure moins prononcée.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-noirâtre, avec des ondes très-fines, lesquelles sont rouffâtes près de la base & avant le bord postérieur; d'un gris-fale sur ce même bord; blanchâtres sur le milieu où il y a deux yeux écartés, dont l'antérieur ferrugineux & à iris noir; le postérieur noir, avec l'iris jaune & bordé de ferrugineux ou de noir. Ces yeux ont l'un & l'autre une prunelle comme l'œil des ailes de devant, mais elle est moins étroite. Le corps est fauve en dessus, d'un gris-brun en dessous. Les antennes sont ferrugineuses.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

32. MORPHO Acadina.

MORPHO Acadina.

Mor. alis subdentatis, suprâ fuscescenti-corticinis, strigâ apicis fulvâ, anticarum geminâ: postlicis subtus fuscâ sesquialterâ albâ ocellisque duobus remotis.

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus des premières ailes est d'un brun-tanné-pâle, avec l'extrémité noirâtre & chargée de deux lignes fauves, transverses, dont l'extérieure courbe & maculaire, l'intérieure anguleuse & plus courte. Ces deux lignes sont séparées près de la côte par un arc transversal de trois points d'un jaune d'ocre. Le dessous des secondes ailes est d'un brun plus ou moins obscur, avec le limbe terminal noirâtre & chargé d'un rang de lunules fauves, rapprochées deux à deux.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec quatre bandes jaunes, bordées de noir, étroites & transversales, dont les deux intermédiaires renfermant deux petites taches de leur couleur; la postérieure n'atteignant pas le bord d'en haut, ayant sur son côté interne un petit œil noir à prunelle blanche, & sur son côté externe une double ligne noire, marginale, sinuée. On voit de plus, entre cette dernière bande & la précédente, quelques ondes noirâtres, ainsi que trois points correspondant à ceux de la surface opposée, mais blancs, au lieu d'être d'un jaune d'ocre.

Le dessous des secondes ailes est brun, finement ondé de blanchâtre au bord interne, & ensuite de rouffâtre jusqu'au limbe postérieur, avec deux bandes blanches, transverses, discoïdales, onduées de même, dont l'intérieure moitié moins longue & séparée de la suivante par deux yeux à peu près semblables à ceux qu'on voit dans le *Saronia*. Le limbe postérieur est roux & divisé dans toute la longueur par deux lignes jaunes, sinuées & bordées de noir à leur côté interne. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont d'un rouge-ferrugineux.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le

dessus des ailes inférieures légèrement glacé de violet dans son milieu.

Du Brésil.

53. MORPHO Rufina.

MORPHO Rufina.

Mor. alis subdentatis, suprâ nigris, arcâ nitidâ œruleâ tunque fuscâ communi, anticarum ochraceâ, postlicarum albâ: postlicis subtus ocellis duobus remotis.

Elle est à peu près de la taille du *Saronia*. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec un espace d'un bleu-violet-luisant, faivi aux supérieures d'une bande oblique d'un jaune d'ocre, & aux inférieures d'une bande blanche également oblique. Dans la femelle, les ailes supérieures out, près de la côte, une double liture jaunâtre.

Le dessous des ailes est brun & ondé de gris-jaunâtre, avec une bande correspondante à celle du dessus, mais fortement blidie aux supérieures, & renfermant dans la fissure un petit œil noir à prunelle blanche. Cette bande est précédée immédiatement aux ailes inférieures de deux yeux roux à iris noir & à prunelle blanche. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres & annelées de noir.

Du Brésil, collection de M. le chevalier de Langfordorff.

54. MORPHO Anaxandra.

MORPHO Anaxandra.

Mor. alis subdentatis, suprâ fusco-nigris, fuscâ singularum pallidæ ochraceas: postlicis subtus ocellis tribus in arcum digestis.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun-chatoyant, avec une bande d'un jaune d'ocre pâle sur chacune des quatre. La bande des secondes ailes est plus ou moins longue: dans certains individus des deux sexes, elle va de l'angle externe à la partie inférieure du bord abdominal; dans d'autres, au contraire, elle ne descend pas jusqu'au milieu de la surface. Sa largeur est également variable. La bande des premières ailes se dirige obliquement du sommet vers l'origine du bord interne, & elle a fort souvent le milieu dilaté. Ces mêmes ailes sont en outre vergetées de jaune-pâle sur la majeure partie de leur bord d'en haut.

En dessous, le fond de chaque aile est brun & finement ondé de gris ou de verdâtre, excepté aux endroits où reparoit la bande jaune du dessus. Indépendamment de cela, il y a, au sommet des ailes supérieures, un groupe de deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-obscur; & sur le milieu des inférieures, un arc transversal de trois yeux séparés, d'un roux-foncé, ayant l'iris

noir, la prunelle très-blanche & en croissant. Ces trois yeux sont allez grands, & le postérieur d'entre eux, qui est encore un peu plus grand, a le milieu noir. Le corps est brun en dessus, plus pâle en dessous. Les antennes font noirâtres.

Allez commune dans quelques parties du Brésil.

Nota. Le mâle a près de la base des ailes inférieures un petit bouquet de poils jaunâtres.

35. MORPHO ANAXARÈTE.

MORPHO Anaxarete.

Mor. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinque ad apicem albo maculatis : posticis subtus griseo-nufescentibus, punctis basios nigricantibus.

Papilio Anaxarete. CRAM. pl. 95. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Anaxarete. CRAM. pl. 574. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Anaxaretus. HERBST, *Pap.* tab. 151. fig. 1. 2. (Le mâle.) fig. 3. 4. (La femelle.)

Elle est à peu près de la taille de l'*Anaxandra*. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun-chatoyant. Les premières ont neuf taches blanches, dont quatre réunies en une bande oblique au-delà du milieu de la côte, trois groupées vers l'angle interne, & deux plus petites faisant face au sommet. Les secondes ailes ont, entre le disque & le bord terminal, une petite bande transverse & flexueuse, qui est blanche dans la femelle, d'un cendré-bleuâtre dans le mâle. Outre cela, la tranche du bord postérieur de toutes les ailes est blanchâtre ou plus claire que le fond.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que la moitié antérieure de la côte est largement rouffâtre, & le sommet grisâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un roux plus ou moins obscur, avec des mouchetures brunâtres, & un arc discoïdal de trois taches blanchâtres, dont les deux antérieures presque orbiculaires; la postérieure bilobée, & marquée par en haut d'un croissant blanc que surmonte un petit arc noir. Il y a en outre, vers la base, un groupe de points noirâtres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont blanchâtres.

De Surinam & du Brésil.

36. MORPHO ANOSIA.

MORPHO Anosia.

Mor. alis dentatis, nigricanti-fuscis : anticis utrinque suscra maculari albâ : posticis subtus strigis flexuosis, ocellisque sex, postremo bipillato.

Elle a le port & la taille de l'*Anaxandra*. Ses ailes sont dentées & d'un brun-noirâtre en dessus. Les premières ont une bande blanche, maculaire,

un peu courbe, & allant du milieu de la côte à l'angle interne. Leur sommet offre en outre un point blanc, au-dessus duquel il y a deux lites jaunâtres. Les secondes ailes ont une lunule blanche sur chacune des deux échancrures antérieures.

Le dessous des ailes de devant ressemble au dessus, mais il est un peu plus pâle, & il y a au sommet, qui est nuancé de grisâtre, un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, placé au bas du point blanc dont nous avons parlé en décrivant le dessus de ces ailes.

Le dessous des ailes de derrière est d'un brun-pâle, avec cinq lignes noires, transverses & flexueuses, dont trois vers la base, & deux vers le bord terminal. Entre ces deux dernières lignes & les trois précédentes, l'on voit une rangée courbe de six yeux à prunelle blanche, à iris jaunâtre & cerclé de noir. Les deux yeux antérieurs, & le postérieur, qui est bipupillé, sont noirs; les trois autres sont de la couleur du fond de l'aile, mais faiblement teintés de violet. Le corps est du même ton que les ailes. Les antennes sont noirâtres.

Dans les deux sexes, l'extrémité des ailes supérieures, à partir de la bande blanche, est d'un brun plus noir que le reste de la surface.

Du Pérou & du Brésil. — Très-rare.

37. MORPHO DARIUS.

MORPHO Darius.

Mor. alis integerrimis, fuscis : anticis albo maculatis : posticis subtus arcu nigro. FAB.

Papilio F. Darius. FAB. *Syst. Ent.* p. 482. n^o. 175. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 57. n^o. 249. — *Nant. Inf.* tom. 2. p. 27. n^o. 288. — *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 52. n^o. 161.

Ce lépidoptère pourroit bien être une variété mâle de l'*Anaxarete*; mais, dans le doute, nous traduisons la description que Fabricius en a donnée.

Il est grand, d'un brun-noirâtre en dessus. Les premières ailes ont cinq taches blanches, dont une oblongue vers le milieu de la côte, trois plus petites près de l'angle interne, & une en forme de liture vis-à-vis du sommet.

Les secondes ailes sont sans taches. Leur dessous est gris, avec un arc noir & une petite lunule blanchâtre sur le milieu.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle. Les antennes sont noirâtres.

Du Brésil.

38. MORPHO ÆTHON.

MORPHO Æthon.

Mor. alis integerrimis, fuscis, strigis marginali

fulvâ : postlicis subtus subundatis, ocellis septem.
FAB.

Papilio N. Æthon. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 59. n.º 259.* — *Mant. Inf. tom. 2. pag. 28. n.º 299.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 152. n.º. 465.*

Fabricius la décrit ainsi : elle a tout-à-fait le port de la M. de la *Casse*. Ses quatre ailes sont entières, d'un brun-obscur en dessus, avec une raie fauve, transverse, placée aux inférieures le long du bord terminal, & aux supérieures vers l'extrémité. Le fommet de ces dernières offre en dessus quelques points blancs, & en dessous un petit œil noir.

Le dessous des secondes ailes a des ondes blanches & brunes, peu prononcées, avec sept yeux. De Surinam.

59. Морфо Бѣрѣцинтус (1).

Морфо *Berecynthus*.

Mor. alis integris, suprâ fusco-nigris, fasciâ fulvâ, terminali: anticarum angulatâ : postlicis subtus strigî sex ocellorum.

Papilio N. Berecynthus, alis integerrimis, suprâ atris, fasciâ marginali flavâ : subtus postlicis maculis sex ocellaribus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 59. n.º 259.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n.º 298.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 151. n.º. 462.*

Papilio Berecynthia. CRAM. *pl. 184. fig. B. C.*

STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 3. fig. 4. A.* (La chenille jeune.) *fig. 4. B.* (La chenille adulte.) *fig. 4. C.* (La chrysalide.)

Papilio Berecynthius. HERBST, *Pap. tab. 150. fig. 2. 3.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 13. fig. 2. 3.*

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, & les supérieures ont le bord terminal un peu concave. Le dessus des quatre est d'un noir-brun, avec une bande fauve. La bande des premières ailes descend de la côte à l'angle interne, en faisant un coude en arrière vers le milieu de sa longueur. Elle est en outre précédée en dehors de trois points blancs, disposés en un arc transversal vis-à-vis du fommet. La bande des se-

condes ailes est tout-à-fait terminale, & un peu fluuée à son côté interne.

En dessous, le fond est d'un brun plus clair qu'en dessus, & finement ondé de grisâtre, avec deux taches ferrugineuses, bordées de noir, près de la base de chaque aile. Indépendamment de ces taches, les premières ailes ont, non loin du fommet, un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Les secondes ailes offrent, un peu au-delà du milieu, une rangée courbe & transverse de six yeux semblables, mais inégaux, saupoudrés de gris-cendré, & pourvus d'un iris ferrugineux.

Nous avons vu un mâle sans bande fauve, & la femelle nous est inconnue.

La chenille, selon Stoll, est d'un brun-clair, avec des lignes obscures & longitudinales. Entre la cinquième & la neuvième incisions, sont alignées cinq épines noirâtres, dorsales & aiguës. Il y en a six autres fur la tête; mais elles sont obtuses, velues & brunes. L'anus se termine par une fourche assez longue. Avant la quatrième mue, cette chenille a le dos vert, avec une seule épine, placée sur une tache noire. Elle vit fur le *cacaoyer* (*theobrana*).

La chrysalide est un peu anguleuse, brune & mouchetée de noir, avec des points argentés à l'enveloppe des ailes. Elle est suspendue par la queue, & la dépouille de la chenille y reste attachée.

De Surinam.

40. Морфо Xanthus.

Морфо *Xanthus*.

Mor. alis subintegris, suprâ fusco-nigris : anticis, fasciâ fulvâ, angulatâ : postlicis subtus ocellis duobus remotis, antico reniformi.

Papilio D. F. Xanthus, alis integerrimis, suprâ fuscis, fasciâ ferrugineâ : postlicis subtus ocellis duobus, altero lunari. LINS. *Syst. Nat. 2. p. 767. n.º. 122.* — *Mus. Lud. Ulr. p. 267.*

CLERCK, *Icon. tab. 54. fig. 1. 2.*

Papilio N. Xanthus, alis integerrimis, fuscis, fasciâ ferrugineâ : postlicis subtus griseo marmoratis, ocellis duobus. FAB. *Syst. Ent. p. 485. n.º. 177.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 58. n.º. 257.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n.º. 296.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 150. n.º. 460.*

Papilio Xanthus. CRAM. *pl. 185. fig. A. B.*

Papilio Xanthus. HERBST, *Pap. tab. 127. fig. 1. 2.*

Elle a le port & à peu près la taille du *Bêrecynthus*, & elle n'en diffère en dessus que parce que la bande fauve de ses ailes supérieures est tantôt interrompue par le milieu, tantôt unidentée en dehors; parce que celle des inférieures est nulle ou

(1) Cette espèce & les suivantes font le passage des *MORPHOS* aux *BRASSOLIDES*, en raison de leurs antennes un peu plus renflées vers l'extrémité, & d'une fente longitudinale, couverte de poils, fente que l'on remarque, ainsi que dans les *BRASSOLIDES*, près du bord interne des ailes inférieures du mâle. Ce dernier caractère peut servir à distinguer ces espèces des *NYMPHÉALES*, avec lesquelles on seroit d'abord tenté de les confondre, si l'on n'avoit égard qu'aux palpes & aux antennes.

à peine indiquée au bord du sommet, du moins dans le commun des individus.

Le dessous des quatre ailes est à peu près de la couleur du dessus, avec des taches blanchâtres & des taches brunes en échiquier sur presque toute la surface des supérieures, & à la base des inférieures. Celles-ci sont ondulées de blanc à la naissance de la côte, & de gris-roussâtre depuis le milieu jusqu'au bord terminal. Sur leur milieu sont deux yeux écartés, dont l'antérieur presque réniforme, brun & chargé d'un croissant blanc; le postérieur rond, noir, sablé de verdâtre, ayant la prunelle blanche & arquée, l'iris brun & très-large. Non loin du sommet des ailes de devant, il y a un moyen œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, œil que séparent de la côte quelques ondes, & trois points, blancs. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont ferrugineuses.

La femelle ressemble au mâle, excepté qu'elle n'a pas de fente près du bord interne des ailes inférieures, & que son abdomen est plus gros.

De Surinam & du Brésil.

Nota. Cramer a mal rendu les marbrures du dessous des ailes. Il n'a pas fait non plus sentir les sinuosités du bord terminal.

41. MORPHO Caryatis.

MORPHO Caryatis.

Mor. alis dentatis, fusco-nigris: anticis suprà fuscâ, fulvâ posticâ, subtus albâ mediâ: posticum paginâ inferâ ocellis duobus dimidiatis.

Papilio Cassiope. GRAM. pl. 57. fig. A. B.

Papilio Cassiopos. HERBST, *Pap. tab.* 128. fig. 3. 4.

Nous donnons cette Morpho d'après la figure de Cramer.

Elle a le port & la taille des trois précédentes. Ses ailes sont dentées, d'un noir-brun en dessus. Les inférieures n'ont pas de taches. Les supérieures offrent, indépendamment de trois points blancs placés au sommet, une bande fauve, un peu oblique, assez large, bidentée en dehors, unidentée en dedans, atteignant la côte & l'angle interne.

Le dessous des quatre ailes est d'un ton ferrugineux, avec des ondes grisâtres vers la base, & des ondes cendrées vers le bout. Sur le milieu des inférieures, sont deux yeux très-écartés, semi-lunaires, roux, avec l'iris blanc & bordé de noir. Le milieu des ailes supérieures est traversé par une bande blanche, un peu courbe en arrière, & leur sommet offre un œil noir à iris jaunâtre & à prunelle blanche.

De Surinam

42. MORPHO de la Cassie.

MORPHO Cassie.

Mor. alis dentatis, suprà nigricanti-fuscis: anticis utrinquè fuscâ, fulvâ: posticis subtus ocellis duobus diffitis, antico majore, subrotundato.

Papilio D. F. Cassie, alis integerrimis, fuscis: primoribus posticarumque margine fuscâ, ferrugineâ: omnibus subtus ocellatis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 767. n.º 120. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 265.

CLERCK, *Icon. tab.* 34. fig. 3. 4.

MERIAN, *Surin. Inf. pag.* 3. tab. 32.

Papilio N. Cassie, alis repandis, fuscis, fuscâ ferrugineâ, apice bifidâ: posticis subtus cinereis, ocellis duobus. FAB. *Syst. Ent.* p. 483. n.º 178. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 58. n.º 258. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 28. n.º 297. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 150. n.º 401.

Papilio N. Glycerie, alis dentatis, fuscis: anticis, fuscâ, fulvâ: subtus anticis ocello, posticis duobus cæcis. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 94. n.º 291.

Papilio Cassia. GRAM. pl. 105. fig. A. B.

Papilio Cassia. GRAM. pl. 106. fig. A.

Papilio Quiteria. GRAM. pl. 513. fig. 3. 4.

STOLL, *Suppl. à GRAM. pl.* 3. fig. 3. A. (La chenille.) fig. 5. B. (La chrysalide.)

Papilio Cassia. HERBST, *Pap. tab.* 129. fig. 1. 2. fig. 3. (Mas.)

Papilio Quiterius. HERBST, *Pap. tab.* 127. fig. 3. 4.

Papilio Quiterius. HERBST, *Pap. tab.* 128. fig. 1. 2. (Mas.)

Fabricius fait de ce lépidoptère deux espèces, savoir : l'une sous le nom de *Cassie*, appartenant à l'Amérique; l'autre sous celui de *Glycerie*, appartenant aux Indes orientales.

Les ailes sont plus ou moins dentées, & varient pour l'envergure depuis trois pouces jusqu'à quatre & demi. Leur dessus est d'un brun-noirâtre. Celui des supérieures offre une bande fauve, sinuée, quelquefois bifide antérieurement, descendant du milieu de la côte à l'angle interne où elle se termine par un petit crochet aigu & dont la pointe est tournée du côté de la base de l'aile; derrière cette bande sont deux points blancs, placés vis-à-vis du sommet. Le dessous des secondes ailes est tantôt nud, tantôt coupé parallèlement au bord postérieur par une bande continue ou seulement par quelques taches d'un fauve-ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes a beaucoup de rapport avec le dessous du *Xanthus*; mais ce qui

l'en distingue, c'est que les supérieures sont moins tachetées de brun & de blanchâtre, & que leur bande fauve se reproduit ici presque en totalité; c'est qu'indépendamment de cela, l'œil postérieur des secondes ailes est moins grand que l'antérieur. Le corps & les antennes sont comme dans le *Xanthus*.

La chenille, selon Stoll & Merian, est verte, avec des lignes rosées, longitudinales, & les stigmates ferrugineux. Elle a en outre, au dessus des pattes, une raie jaunâtre ou blanchâtre. Sa tête est d'un brun-obscur, & couronnée de quatre épines rougeâtres, velues. Le corps se termine par une fourche assez longue, dont les extrémités sont

jaunâtres. Elle vit sur la *caste* (*castia*), & se transforme vers la fin de mai. Le papillon commence à paroître dans la première quinzaine de juin.

La chrysalide est presque ovoïde, un peu arquée, bifide antérieurement, brune & mouchetée de noir, avec des taches argentées.

De Surinam & du Brésil.

N. B. Linnæus rapporte cette espèce à la figure 29 de Clerck. C'est sans doute par inadvertance, car ladite figure représente le *Jairus*.

Il y a aussi une erreur dans l'*Entomologie systématique* de Fabricius, à l'occasion de son papillon *Cassia*. On y lit: *tab. 43, &c.*, au lieu de *tab. 54, fig. 3. 4.*



GENRE BRASSOLIDE.

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES inférieurs courts, ne s'élevant pas au-delà du chaperon, point barbus; antennes terminées par une massue épaisse et en forme de cône renversé. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière, comme dans les MORPHOS de la seconde division.

ESPÈCES.

Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

1. BRASSOLIDE du Sophora.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande jaune, sinuée : dessous des inférieures avec trois yeux séparés.

2. BRASSOLIDE Astyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec une bande jaunâtre large : dessous des inférieures avec trois yeux séparés : bout de l'abdomen, et des points sur la poitrine, ferrugineux.



Bord postérieur des quatre ailes arrondi & entier.

1. BRASSOLIDE du *Sophora*.

BRASSOLIS Sophoræ.

Br. f. alis suprà, fuscis : anticis utrinquè, fuscis à sulvâ, repundâ : posticis subtus ocellis tribus distinctis.

Papilio D. F. Sophoræ, alis integerrimis, fuscis, fuscâ ferrugineâ : subtus primoribus oculo unico, posticis tribus. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 767. n.º 121. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 266.

Papilio Sophoræ. CLERCK, *Icon. tab.* 55. *fig.* 3.

MERIAN, *Surin. Inf. tab.* 55. *fig.* 1. 2.

ROES, *Inf.* 4. *tab.* 4. *fig.* 1. 2.

Papilio. N. Sophoræ, alis integerrimis, fuscis, fuscâ ferrugineâ : posticis subtus brunneis, ocellis tribus. FAB. *Syst. Ent.* p. 483. n.º 176. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 58. n.º 256. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 28. n.º 293. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. p. 150. n.º 459.

Papilio Sophoræ. CRAM. *Pap. pl.* 255. *fig.* A. B. C.

STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAM. *pl.* 5. *fig.* 2. A. (La chenille.) *fig.* 2. B. (La chrysalide.)

Papilio Sophoræ. HERBST, *Pap. tab.* 129. *fig.* 4. 5.

Papilio Sophoræ. HERBST, *Pap. tab.* 150. *fig.* 1.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Ses ailes font très-entières & d'un brun-obscur en dessus. Les premières, dont le bord antérieur est très-arqué, sont traversées, à partir du milieu de ce même bord, par une bande fauve, courbe, un peu sinuée, aboutissant à l'angle interne, & se prolongeant quelquefois, mais en perdant de sa largeur, jusques à l'angle correspondant des secondes ailes. Cette bande est plus ou moins bifide à son origine.

Le dessous des quatre ailes est plus pâle que le dessus & finement pointillé de gris. Celui des supé-

rieures offre, indépendamment de la bande fauve dont nous venons de parler, un petit œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, œil peu distant du fommet & que précède en dehors une double ligne obscure, ondulée, presque marginale. Le dessous des ailes inférieures a une rangée courbe & discordale de trois yeux séparés, bruns, ayant l'iris noir, la prunelle blanche & en croissant. On voit de plus à la base de toutes les ailes une tache fauve, orbiculaire. Le corps est brun. Les antennes sont noires.

La chenille, selon Stoll & Merian, est pubescente, d'un brun-clair, avec des lignes noirâtres, longitudinales. Ses pattes antérieures sont noires, ainsi que la tête, sur laquelle il y a une petite ligne jaunâtre, transversale. Elle vit en société très-nombreuse dans un tissu ferré qu'elle fabrique, & d'où elle ne sort que pendant la nuit pour manger. La plupart des auteurs disent qu'elle se nourrit du *sophora*; d'après Stoll & Merian, elle vivroit aussi sur le *cocotier* & sur le *cacaoyer*. Sa métamorphose a lieu au commencement d'avril, & l'insecte parfait paroît quinze jours après.

La chrysalide est ovoïde, ramassée, un peu courbe, d'une couleur pâle, mouchetée de brun-ferrugineux & marquée de quatre points argentés. Elle est suspendue par la queue, & la dépouille de la chenille y reste attachée.

De Surinam & du Brésil.

2. BRASSOLIDE *Astya*.

BRASSOLIS Astya.

Br. f. alis suprà fusco-nigris : anticis utrinquè fuscâ lutescente, latâ : posticis subtus ocellis tribus distinctis : abdominis apice pectorisque punctis ferrugineis.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a le fond des ailes d'un brun plus noir, & la bande fauve au contraire plus pâle & plus large; en ce que la partie postérieure de l'abdomen est ferrugineuse, & en ce qu'il y a des points de cette couleur sur la poitrine & sur le devant du corselet.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le corps beaucoup plus gros,

Du Brésil.



GENRE EURYBIE (1).

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES inférieurs courts, dépassant à peine le chaperon; antennes en fuseau allongé et un peu courbe. Cellule discoïdale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle aigu, et d'où part un rameau longitudinal, qui se prolonge jusqu'au bord postérieur.

ESPÈCES.

A. Sommet des premières ailes aigu et un peu prolongé. Bord postérieur des secondes ayant le milieu dilaté en angle.

1. EURYBIE Caroline.

Ailes d'un brun-noirâtre, ayant en dessus des taches ferrugineuses, et en dessous une rangée terminale de points oculaires.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

2. EURYBIE Nicæus.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-noirâtre, et offrant vers le milieu un œil sans prunelle; dessus des inférieures glacé de violet, avec deux rangs de taches rousses, ocellées, à l'extrémité.

3. EURYBIE Dardus.

Dessus de toutes les ailes d'un brun-obscur, et offrant à l'extrémité deux cordons de taches ocellées: supérieures avec un œil presque central et sans prunelle.

(1) Nous donnons par addition ce genre d'Illiger. Il ne se compose jusqu'à présent que de quelques espèces, propres à l'Amérique méridionale.



A. Sommet des premières ailes aigu & un peu prolongé. Bord postérieur des secondes ayant le milieu dilaté en angle.

1. EURYBIE Caroline.

EURYBIA Carolina.

Eur. alis fuscis, supra ferrugineo maculatis, subtus strigis terminali punctorum ocellarum.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique, appartenant à M. le chevalier de Langsdorff.

Il a le port & la taille du Citron ou Coliade du Nerprun. (Voyez p. 89. n. 2.) Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec huit petites taches ferrugineuses sur le milieu des supérieures, & neuf semblables sur le milieu des inférieures. L'extrémité des ailes supérieures offre en outre deux points & un croissant blancs.

Le dessous diffère du dessus, en ce que le fond est plus pâle; en ce que les ailes supérieures sont sans taches ferrugineuses; enfin en ce que l'on voit le long du bord terminal des quatre une rangée de points noirâtres, oculaires. Le corps est de la couleur des ailes, avec les palpes, & le tour des yeux, fauves. Les antennes sont annelées de noir & de gris, avec la sommité de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi & entier.

2. EURYBIE Nicæus.

EURYBIA Nicæus.

Eur. alis anticis supra nigricanti-fuscis, ocello centrali cæco; posticis violaceo nitentibus, apice strigis duabus ocellaribus rufis.

Papilio F. Nicæus, alis integerrimis, fuscis: anticis ocello, posticis supra fuscis rubra marginali punctisque ocellaribus. FAB. *Syst. Ent. p. 482. n. 175.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 37. n. 251.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n. 290.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 55. n. 163.*

Papilio Salome. GRAM. *pl. 12. fig. G. II.*

Papilio Salome. HERBST, *tab. 225. fig. 1. 2.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun-noirâtre, avec une tache violette, presque centrale, encadrée de fauve, & suivie d'un groupe de deux points blancs. Il y a en outre, le long du limbe posté-

rieur, un cordon de taches noires, entourées d'un iris plus pâle que le fond de l'aile.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun plus ou moins glacé de violet, selon le sexe, avec une double rangée de taches oculaires à iris roux. Les taches de la rangée intérieure sont ordinairement moins apparentes que celles de la rangée extérieure.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris-cendré, avec deux rangées transverses & presque terminales de petites taches blanchâtres, dont les extérieures orbiculaires & ayant le milieu noir. A la tache violette du milieu des premières ailes correspond ici une tache semblable, mais encadrée de jaune, & suivie de deux points de plus que du côté opposé. Il y a en outre, vers le milieu de la côte des secondes ailes, deux points blanchâtres, plus ou moins ombrés de noirâtre. Le corps est noirâtre en dessus, cendré en dessous, avec les palpes d'un jaune-orangé. Les antennes sont noirâtres, annelées de gris, avec la sommité jaunâtre.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Fabricius a fait sa description d'après la figure de Cramer. Nous en jugeons du moins par ces mots: *ailes inférieures avec une bande rousse, marginale, sur laquelle sont des points entourés d'un anneau jaune.*

3. EURYBIE Dardus.

EURYBIA Dardus.

Eur. alis omnibus supra fuscis, apice strigis duabus ocellaribus: anticis ocello subcentrali cæco.

Papilio N. Dardus, alis integerrimis, fuscis: anticis utrinque ocello medio cyaneo: omnibus subtus strigis duabus ocellaribus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 156. n. 482.*

Papilio Lamia? GRAM. *pl. 150. fig. C.*

Papilio Lamia? HERBST, *tab. 225. fig. 3.*

Ce lépidoptère n'est peut-être qu'une variété du *Nicæus*. En effet, il n'en diffère que parce qu'il est un peu plus petit, & parce que le dessus des premières ailes offre, avant le cordon de taches oculaires de l'extrémité, une rangée transverses de points, tantôt blancs, tantôt roussâtres.

Le dessous des secondes ailes est sans reflet violet, du moins dans les femelles, car nous n'avons pas vu de mâles.

De Surinam.



G E N R E S A T Y R E .

C A R A C T È R E S D U G E N R E .

PALPES inférieures s'élevant notablement au-delà du chaperon, plus ou moins hérissés de poils en avant; antennes finissant tantôt par un bouton court et un peu en cuilleron, tantôt par une massue grêle et presque en fuseau. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes fermée en arrière par une nervure en angle plus ou moins aigu et d'où part une seule branche longitudinale. Chenilles nues ou presque rasées, et ayant l'anus terminé par une pointe fourchue. Chrysalides, du moins pour la plupart, suspendues par la queue.

I. *Cellule discoïdale des secondes ailes fermée par un angle peu aigu.*

Partie du genre HÆTHERA de Fabricius. (Pap. *Lena*, *Nereis*, *Piera*, etc.)

II. *Cellule discoïdale des secondes ailes fermée par une nervure en angle très-aigu.*

Le genre HIPPARCHIA de Fabricius, MANIOLA de Schrank. (Pap. *Circe*, *Hermione*, *Briseis*, *Galathea*, *Mæra*, *Jauira*, *Tithonias*, etc.)

N. B. La massue des antennes ne peut pas être prise ici pour caractère; puisque, par exemple, elle est renflée et en cuilleron dans l'*Hermione*, tandis qu'elle est grêle et presque en fuseau dans le *Circe*, espèces d'ailleurs si voisines l'une de l'autre. Mais un caractère constant, et auquel on n'a peut-être pas fait assez d'attention, c'est que tous les SATYRES, tant exotiques qu'indigènes, ont les deux premières nervures des ailes supérieures très-renflées à leur origine.

E S P È C E S .

A. Sommet des premières ailes plus ou moins tronqué. Bord postérieur des secondes finissant extérieurement par une petite queue.

1. SATYRE Constantia.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : sommet des supérieures avec une bande jaunâtre et deux points oculaires.

2. SATYRE ? Bernard.

Ailes en queue, fauves : extrémité des supérieures noire, avec une bande jaune; inférieures avec une rangée transverse de points oculaires. FAB.

3. SATYRE Banksia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : sommet des supérieures avec deux yeux, dont un moitié plus petit; dessous des quatre avec des bandes plus foncées, et une rangée transverse de points blancs.

4. SATYRE Léda.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre ou d'un brun-tanné : sommet des supérieures avec deux yeux, dont un moitié plus petit; dessous des quatre réticule de gris, et offrant une rangée transverse d'yeux.

SATYRE. (Insecte.)

5. SATYRE GERDRUTUS.

Ailes en queue, d'un brun-obscur : sommet des supérieures avec une tache oculaire ; dessous (des quatre) ferrugineux, avec un point blanc aux supérieures, et deux aux inférieures. FAB.

6. SATYRE EUROPA.

Ailes d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec une bande blanche, oblique ; dessous des inférieures avec une série d'yeux, plus une ligne blanchâtre, basilare, et commune aux ailes de devant.

7. SATYRE CAHMAS.

Dessous des ailes d'un gris-roussâtre, avec trois lignes ferrugineuses, transverses : limbe terminal des inférieures avec six yeux à prunelle formée par des atomes dorés.

8. SATYRE ? ROHRIA.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande blanche ; dessous des inférieures avec sept yeux, dont plusieurs ponctués de blanc. FAB.

9. SATYRE ? PANTHÉRA.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-noirâtre : leur dessous ondulé ; celui des inférieures avec deux yeux bleuâtres sur le milieu, et cinq vers l'extrémité.

B. Bord postérieur des premières ailes en faulx. Bord correspondant des secondes un peu prolongé à l'angle de l'anus, et terminé en dehors par une queue obtuse et très-oblique.

10. SATYRE CHORINÉE.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : supérieures avec une bande fauve, transversale ; dessous des inférieures avec une ligne allant obliquement de l'angle externe à l'angle de l'anus.

C. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures terminées en dehors par une petite queue aiguë, et ayant entre cette queue et l'angle de l'anus une dent obtuse.

11. SATYRE PHILOCTÈTE (1).

Dessus des ailes d'un brun-violet : inférieures offrant, vers l'angle de l'anus, trois taches bleues, dont les deux extérieures chargées chacune d'un point noir.

12. SATYRE MORNA.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des inférieures avec deux yeux et trois points blancs. FAB.

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en dehors par un prolongement plus ou moins remarquable.

13. SATYRE LÉNA.

Ailes un peu transparentes, d'un brun-obscur : dessus des secondes ayant la moitié postérieure d'un noir-foncé, avec des taches bleues, éparées, et chargées pour la plupart d'un point blanc.

14. SATYRE DINDYMÈNE.

Ailes d'un brun-obscur et un peu transparentes : dessus des inférieures avec une série de points oculaires ; dessous des quatre avec trois lignes transverses, et des points à la base, plus obscurs.

15. SATYRE LUNA.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, avec des lignes transverses plus foncées : inférieures avec deux yeux : dessous des quatre avec quatre points. FAB.

(1) Dans cette espèce et dans les sept suivantes, la cellule di-coxale des secondes n'est fermée par un angle moins aigu que chez les autres SATYRES, et les antennes sont presque hiliformes. Ces espèces se rapportent au genre *Hetera* de Fabricius.

SATYRE. (Insecte.)

16. SATYRE Néréïs.

Ailes d'un brun-obscur et un peu transparentes, avec une bande blanche, linéaire, commune : inférieures fauves vers l'extrémité, avec deux yeux très-noirs.

17. SATYRE Piétra.

Ailes transparentes : supérieures sans taches ; inférieures ayant sur le milieu une ligne obscure, transversale, et à l'extrémité deux yeux séparés par deux points blancs.

18. SATYRE Andromède.

Ailes transparentes : supérieures avec deux lignes brunes, transversales ; inférieures d'un rouge-cramoisi vers l'angle de l'anus, et offrant au sommet un seul œil.

E. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures un peu tronquées vers l'angle de l'anus.

19. SATYRE Girondius.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et offrant à l'extrémité quatre yeux rapprochés deux à deux ; dessous des inférieures avec un point noir à la base.

20. SATYRE Bétro.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures avec une bande roussâtre à l'extrémité ; dessous des inférieures avec une rangée transverse de points jaunâtres.

F. Sommet des premières ailes plus ou moins aigu. Bord terminal des secondes offrant vers l'angle de l'anus trois dents, dont l'extérieure souvent plus prononcée.

21. SATYRE Chélys.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches ; dessous des inférieures d'un ferrugineux-sombre, ou d'un gris-verdâtre, avec une rangée transverse de points jaunâtres.

22. SATYRE Rébecca.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous légèrement glacé de violet, avec deux lignes transverses, et un point central, d'un ferrugineux-obscur.

23. SATYRE Mermétia.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous d'un ferrugineux-sombre, avec une ligne cendree, transverse, discoïdale, et six points blanchâtres, oculaires.

G. Sommet des premières ailes un peu tronqué. Bord postérieur des secondes inégalement denté.

24. SATYRE Lachès.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec une bande postérieure d'un gris-violet et offrant aux supérieures cinq yeux peu prononcés, aux inférieures six.

25. SATYRE Célia.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous avec une bande postérieure d'un gris-violet et offrant aux supérieures quatre yeux peu prononcés, aux inférieures cinq.

H. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

26. SATYRE Valentine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches ; dessous avec une bande d'un blanc-violet, chargée de cinq yeux à chaque aile ; milieu des inférieures d'un jaune-cramoisi.

27. SATYRE Orchame.

Dessus des ailes d'un noir-ensumé, et sans taches ; dessous avec une rangée transverse de points oculaires ; troisième point des ailes supérieures adhérent par son côté interne à une lunule d'un rouge-faive.

SATYRE. (Insecte.)

28. SATYRE Pénécléa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : dessous des inférieures centré à la base, avec un espace longitudinal jaunâtre; d'un brun-marron vers le sommet; violâtre vers l'angle anal, avec deux à quatre yeux.

29. SATYRE Péribas.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec un seul œil : leur dessous gris, avec une ligne jaunâtre, transversale, et deux points blancs aux supérieures, cinq à six noirs aux inférieures.

30. SATYRE Dénina.

Ailes sinuées, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous cendré, avec une bande blanche, commune, discoïdale; inférieures ayant six yeux rapprochés trois à trois, et dont le quatrième plus grand.

31. SATYRE Quantius.

Ailes d'un brun-obscur, sans taches en dessus : dessous des inférieures avec une bande discoïdale et le limbe postérieur d'un cendré-violâtre, plus une rangée intermédiaire de points jaunâtres.

32. SATYRE Halyina.

Ailes dentées, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous pâle, avec des bandes fauves, plus cinq yeux aux supérieures, sept aux inférieures. FAB.

33. SATYRE Hcimès.

Ailes entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, communes, et l'extrémité grisâtre; inférieures offrant cinq yeux, dont le 3^e, le 4^e. et le 5^e. à double prunelle.

34. SATYRE Ocyète.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et sans taches : leur dessous d'un gris-violet, avec cinq lignes ferrugineuses, communes; bord terminal des inférieures denté, et offrant six yeux bipupillés, dont le postérieur très-écarté des autres.

35. SATYRE Argulus.

Ailes presque entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous plus pâle, avec trois lignes ferrugineuses, communes; inférieures offrant cinq yeux bipupillés.

36. SATYRE Myrcéa.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous gris, avec quatre lignes ferrugineuses, communes; inférieures offrant cinq yeux bipupillés, dont l'anal visible en dessus.

37. SATYRE Crantor.

Ailes entières, d'un brun-obscur : dessus des inférieures avec un seul œil bipupillé; leur dessous avec cinq yeux, dont le premier (à partir d'en bas) et le quatrième bipupillés. FAB.

38. SATYRE Celmis.

Ailes presque entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous avec trois lignes transverses plus obscures; inférieures ayant cinq yeux, dont le second et le troisième peu prononcés, le quatrième bipupillé et plus grand.

39. SATYRE Pénélope.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec un seul œil : leur dessous grisâtre, avec deux lignes ferrugineuses, communes; angle anal des supérieures jaunâtre, inférieures avec deux yeux bipupillés.

SATYRE. (Insecte.)

40. SATYRE Lydius.

Ailes entières, blanches : leur dessous avec quatre bandes ferrugineuses ; inférieures offrant trois yeux, dont l'anal plus grand et bipupillé.

41. SATYRE Ocithoc.

Ailes presque entières, d'un beau blanc en dessus, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un brun-obscur, avec trois bandes blanches ; inférieures offrant cinq yeux, dont le troisième, le quatrième et le cinquième bipupillés.

42. SATYRE Brixius.

Ailes entières, minces, d'un bleu-cendré, offrant de part et d'autre six raies brunes, transversales : quatrième raie des ailes inférieures offrant en dessous cinq yeux bipupillés.

43. SATYRE Pison.

Toutes les ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus : dessous des inférieures jaunâtre à la base et au sommet ; puis d'un brun-obscur, avec quatre yeux bipupillés et formant deux groupes écartés.

44. SATYRE Giron.

Ailes presque entières, d'un brun-obscur : leur dessous avec trois raies plus obscures, transverses et ondulées ; inférieures ayant deux yeux bipupillés, et un troisième séparé des autres par deux taches jaunâtres.

45. SATYRE Mæpius.

Ailes entières, d'un brun-obscur : leur dessous avec trois raies ferrugineuses, et la moitié postérieure grisâtre ; inférieures ayant cinq yeux bipupillés, dont le troisième, le quatrième et le cinquième visibles en dessus.

46. SATYRE Pagytis.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, transverses et ondulées ; inférieures grisâtres à la base, puis jaunâtres, avec des taches argentées, et une noire chargée de deux points.

47. SATYRE Pharès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : dessous des supérieures jaunâtre, dessous des inférieures grisâtre, avec trois raies ferrugineuses, communes : les deux surfaces des ailes inférieures, avec six yeux, dont le troisième double.

48. SATYRE Tolumnia.

Ailes presque entières, minces, d'un brun glacé de bleu : leur dessous avec quatre raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux, dont le quatrième alongé, les autres bipupillés.

49. Satyre Aranée.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-noirâtre, dessus des inférieures d'un bleu-luisant : dessous des quatre avec trois raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux, dont le second et le cinquième plus grands.

50. SATYRE Léa.

Ailes presque entières, bleues en dessus : leur dessous d'un brun-violâtre, avec trois raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant six yeux, dont le cinquième plus grand.

51. SATYRE Clécia.

Ailes minces, d'un violet-cendré : inférieures dentées, ayant de part et d'autres cinq yeux, et en dessous trois lignes et une bande brunes partant de la côte des ailes supérieures.

SATYRE. (Insecte.)

52. SATYRE CORNÉLIUS.

Ailes très-entières, d'un cendré-obscur : inférieures avec quatre yeux rapprochés. FAB.

53. SATYRE DORITIS.

Ailes presque-entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous d'un bleu-pâle, avec cinq raies brunes et transversales ; troisième raie des ailes inférieures chargée de quatre yeux formant deux groupes écartés.

54. SATYRE DOXÈS.

Ailes d'un brun-bleuâtre : leur dessous avec deux raies ferrugineuses, transversales ; inférieures ayant cinq yeux ovales, et couverts intérieurement d'une poussière argentée.

55. SATYRE CANTHUS.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre : dessous des premières avec quatre yeux, dessous des secondes avec six. LINN.

56. SATYRE CAUTHÉUS.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : dessous des inférieures avec six yeux. FAB.

57. SATYRE EURYTHRIS.

Ailes entières, d'un brun-obscur, ayant en dessus deux yeux bipupillés et écartés : dessous des quatre avec deux lignes ferrugineuses, transversales ; inférieures offrant quatre yeux rapprochés deux à deux et séparés par autant de points.

58. SATYRE ARÉOLÉ.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, sans taches en dessus : leur dessous avec deux lignes transverses, et un cercle ferrugineux ; inférieures ayant six yeux, dont le troisième, le quatrième et le cinquième très-allongés.

59. SATYRE PHOCION.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : dessous des inférieures avec des lignes jaunes, transversales, et trois yeux oblongs.

60. SATYRE HERSÉIS.

Ailes entières, minces, d'un brun glacé de bleuâtre : dessous des inférieures avec trois lignes ferrugineuses, transverses et anguleuses, plus cinq yeux, dont le troisième et le quatrième allongés.

61. SATYRE PACAFUS.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, sans taches en dessus : dessous des supérieures avec deux lignes ondulées plus obscures, dessous des inférieures avec trois et cinq yeux ayant la prunelle formée par des atomes argentés.

62. SATYRE PÉRIPHAS.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, avec un seul œil en dessus : leur dessous avec une ligne ferrugineuse, transversale ; inférieures ayant trois yeux, dont l'un séparé des autres par quatre points.

63. SATYRE SOSYHIUS.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec trois lignes transverses, et une liture centrale, plus obscures ; inférieures ayant six yeux, dont le troisième et le quatrième peu prononcés.

64. SATYRE GALÉSUS.

Ailes entières, d'un brun-obscur, sans taches en dessus : leur dessous avec trois lignes transverses plus obscures ; supérieures sans aucun point, inférieures avec cinq points noirâtres.

SATYRE. (Insecte.)

65. SATYRE Phronius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le limbe terminal plus foncé : leur dessous avec des ondes et des lignes transverses d'un brun-obscur; supérieures avec un point, inférieures avec quatre, blancs.

66. SATYRE Mélusine.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec le milieu plus pâle : leur dessous blanchâtre; celui des supérieures avec deux yeux écartés, celui des inférieures avec sept rapprochés, dont le quatrième et le cinquième plus grands.

67. SATYRE Bysès.

Ailes entières, minces, d'un brun-violetâtre en dessus : leur dessous lilas et ondulé de brun, celui des inférieures avec deux yeux séparés par quatre points blancs.

68. SATYRE ? Polixènes.

Ailes entières, d'un brun-obscur : dessous des inférieures piqué de gris et de brun. FAB.

69. SATYRE Écho.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures ayant à l'extrémité un espace ferrugineux : dessous des quatre avec une rangée postérieure de points blancs.

70. SATYRE Gripus.

Ailes entières, d'un brun-tanné : extrémité des supérieures jaunâtre de part et d'autre : dessous des quatre avec une rangée centrale de points blancs.

71. SATYRE ? Arcésilaus.

Ailes très-entières, ferrugineuses et sans taches en dessus : leur dessous obscur, avec deux lignes transverses plus obscures et renfermant une série de points jaunâtres.

72. SATYRE Abéona.

Ailes dentées, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre deux bandes orangées, dont une plus courte, avec deux yeux : dessous des inférieures avec deux lignes jaunes renfermant deux yeux écartés.

73. SATYRE Gélanor.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre et tacheté de fauve : supérieures avec un point blanc : dessous des inférieures d'un gris-violetâtre, avec deux lignes brunes renfermant deux yeux écartés. (Femelle.)

74. SATYRE Mardanie.

Ailes dentées, fauves : supérieures ayant le sommet noir, avec une bande blanche; inférieures avec quatre points jaunes, oculaires.

75. SATYRE ? Blomfieldia.

Ailes dentées, jaunes, avec l'extrémité noire : dessous des inférieures obscur et ondulé de blanc, avec quatre yeux, dont les intermédiaires sans prunelle. FAB.

76. SATYRE Lycroon.

Ailes dentées : supérieures d'un brun-obscur, tachetées de jaune et de blanc; inférieures ferrugineuses, avec six yeux; leur dessous varié, avec huit yeux. FAB.

77. SATYRE Hetsé.

Ailes dentées, d'un ferrugineux-obscur : supérieures ponctuées de blanc; inférieures ayant de part et d'autre sept yeux sans prunelle. FAB.

78. SATYRE Minerve.

Ailes dentées, fauves, avec l'extrémité noire et tachetée de blanc : inférieures ayant en dessus cinq yeux sans prunelle, et en dessous sept avec une prunelle. FAB.

SATYRE. (Insecte.)

79. SATYRE Proserpine.

Ailes dentées, fauves : extrémité des supérieures noire, avec des points jaunes : dessous des inférieures marbré, avec quatre yeux, dont les intermédiaires sans prunelle. FAB.

80. SATYRE Mérope.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec un seul œil : les deux surfaces des premières avec la moitié postérieure noire et tachetée de jaune : dessous des inférieures cendré et lavé de brun, avec deux yeux, et un troisième très-petit. (Femelle.)

81. SATYRE Archémor.

Dessus des quatre ailes et dessous des supérieures fauves, variés de noir, avec un seul œil : dessous des inférieures d'un jaune-cendré, avec trois lignes brunes, ondulées, deux yeux, et un troisième, petits. (Mâle.)

82. SATYRE Achauta.

Dessus des quatre ailes et dessous des supérieures fauves, rayés de noir, avec un seul œil : dessous des inférieures varié de brun et de jaunâtre, avec deux yeux écartés.

83. SATYRE Sirius.

Ailes très-entières, d'un roux-obscur : dessus des supérieures avec deux yeux, dessous des inférieures avec quatre. FAB.

84. SATYRE Terminus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec un espace fauve : dessus des supérieures avec un seul œil, dessous des inférieures avec quatre. FAB.

85. SATYRE Rémulia.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le milieu fauve : leur dessous roussâtre à la base, gris à l'extrémité ; celui des inférieures avec six yeux, dont le deuxième, le troisième, le sixième, petits.

86. SATYRE Macra.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande fauve : les deux surfaces des supérieures ayant un œil bipupillé, et un autre très-petit : dessous des inférieures gris, avec deux lignes brunes, ondulées, et six yeux à iris double.

87. SATYRE Mégère.

Ailes dentelées, fauves en dessus, et rayées de noirâtre : les deux surfaces des supérieures ayant deux yeux, dont un moitié plus petit : dessous des inférieures cendré, avec deux lignes brunes, ondulées, éclairées de jaunâtre, et six yeux à iris double.

88. SATYRE Roxelane.

Ailes dentées, d'un brun faiblement obscur en dessus : les deux surfaces des supérieures avec le milieu fauve et coupé par les nervures ; dessous des inférieures gris, avec cinq lignes brunes, et cinq yeux à iris simple.

89. SATYRE Egérie.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec beaucoup de taches jaunes ou fauves, et un seul œil : dessous des inférieures d'un gris-verdâtre, avec deux lignes brunes, ondulées, et une série de points oculaires.

90. SATYRE Xiphia.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec beaucoup de taches fauves, et un seul œil : dessous des inférieures d'un gris-roussâtre avec une bande blanche appuyée transversalement sur la côte, et une série de points oculaires.

SATYRE. (Insecte.)

91. SATYRE Galathée.

Ailes dentelées, d'un blanc-jaunâtre, avec la base et l'extrémité noires en dessus et tachetées de blanc : tache de la base presque ovale; inférieures avec deux et trois yeux noirs, nuls ou peu distincts en dessus.

92. SATYRE Lachésis.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base, noires et tachetées de blanc à l'extrémité; inférieures avec deux et trois yeux noirs, visibles de part et d'autre.

93. SATYRE Argé.

Ailes dentelées, d'un blanc-jaunâtre, avec la base noire en dessus et marquée d'une tache blanche presque ovale : les deux surfaces des inférieures offrant de part et d'autre vers l'extrémité deux et trois yeux, puis une ligne noire, anguleuse.

94. SATYRE Amphitrite.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base, noires et tachetées de blanc à l'extrémité; inférieures avec deux et trois yeux, noirs en dessus, roux en dessous.

95. SATYRE Psyché.

Ailes dentelées, blanches, sans taches en dessus à la base; noires, avec des taches blanches et des yeux noirs à l'extrémité: dessous des inférieures avec des veines, et deux plus trois yeux, bruns.

96. SATYRE Déjanire.

Ailes presque dentées, d'un brun-obscur : les deux surfaces des supérieures avec cinq yeux : dessous des inférieures avec une bande blanche, sinuée et offrant six yeux, dont le troisième très-petit, l'anal bipupillé.

97. SATYRE Minéus.

Ailes d'un brun-obscur : leur dessous avec une ligne sur le milieu, et quatre à l'extrémité, blanches : inférieures avec sept yeux, dont le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième, plus gros.

98. SATYRE Hésione.

Ailes d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous avec une raie blanche, commune, et des yeux entourés chacun d'un cercle couleur de plomb; yeux des ailes supérieures au nombre de deux, yeux des inférieures au nombre de trois, dont un plus petit.

99. SATYRE Constantius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur, avec une rangée marginale de points noirâtres. FAB.

100. SATYRE Nécys.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : leur dessous d'un cendré-obscur, avec trois lignes brunes, transversales, et une rangée de six points blanchâtres.

101. SATYRE Polydecta.

Ailes d'un brun-obscur : dessus des supérieures avec un seul œil, ou deux, dont un plus petit : dessous des quatre avec deux lignes noirâtres; celui des inférieures offrant sept yeux ou sept points oculaires.

102. SATYRE Martius.

Ailes très-entières, noires : leur dessous avec quatre points oculaires aux supérieures, sept aux inférieures. FAB.

103. SATYRE Zachéus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec deux yeux en dessus : dessous des supérieures avec quatre, dessous des inférieures avec six. FAB.

SATYRE. (Insecte.)

104. SATYRE Tabitha.

Ailes dentées, noires: supérieures avec un seul œil: dessous des quatre obscur, avec une rangée de points oculaires. FAB.

105. SATYRE Clérimon.

Ailes un peu sinuées, d'un brun-obscur: dessus des supérieures avec un œil très-noir: dessous des quatre avec quatre yeux très-petits. FAB.

106. SATYRE Florimel.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur: dessus des supérieures avec deux yeux, dessous des inférieures avec quatre. FAB.

107. SATYRE Mergus.

Ailes très-entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-obscur: supérieures avec quatre yeux, dont l'antérieur bipupillé; inférieures avec cinq. FAB.

108. SATYRE Circé.

Ailes dentées, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande blanche, commune: dessous des inférieures avec deux, dont une plus courte: bande des supérieures maculaire de part et d'autre, et n'offrant le plus souvent qu'un seul œil.

109. SATYRE Briséis.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, avec une bande blanche, commune: bande des supérieures maculaire et offrant deux yeux écartés.

110. SATYRE Herminone.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, ayant de part et d'autre une bande blanche, commune: bande des supérieures avec deux yeux écartés, bande des inférieures avec un seul.

111. SATYRE Sémélé.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaunâtre, sinuée, interrompue: bande des supérieures offrant deux yeux de part et d'autre: dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec une bande blanchâtre, anguleuse.

112. SATYRE Alcione.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaune, bordée de noir: bande des supérieures non sinuée et offrant de part et d'autre deux yeux: dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, sans bande.

113. SATYRE Aréthuse.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande fauve, maculaire, et offrant un œil sans prunelle: dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec une bande blanchâtre, courbe en arrière.

114. SATYRE Autoaoé.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande jaunâtre: bande des supérieures offrant deux yeux de part et d'autre: dessous des inférieures nébuleux, avec des veines et quelques lignes trasverses, blanchâtres.

115. SATYRE Aëlo.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en dessus, avec une bande plus claire: les deux surfaces des supérieures (femelle) avec deux points ocellés, leur dessous (mâle) avec un seul: dessous des inférieures marbré de brun et de cendré, avec des veines blanchâtres.

SATYRE. (Insecte.)

116. SATYRE Norna.

Ailes dentées, d'un jaune-obscur en dessus, avec une bande plus claire : les deux surfaces des supérieures (mâle) avec deux points ocellés, (fem.) avec trois : dessous des inférieures marbré de blanchâtre et de cendré, avec une bande obscure, flexueuse, discoïdale.

117. SATYRE Fortunatus.

Ailes minces, dentelées, d'un gris-jaunâtre, avec la tranche du bord postérieur ponctuée de noir : dessous des inférieures avec des atomes, et deux lignes transverses, ondulées, d'un brun-obscur.

118. SATYRE Tarpéius.

Ailes entières, d'un fauve-obscur en dessus : leurs deux surfaces avec une rangée de quatre à cinq points noirs : dessous des inférieures nébuleux, avec une bande plus obscure, sinuée, et des veines blanchâtres.

119. SATYRE Phrynéus.

Ailes minces, entières, d'un blanc de lait et sans taches en dessus : leur dessous d'un brun-obscur, avec des veines d'un blanc-argenté, et une bande pâle chargée de cinq à six yeux.

120. SATYRE Fidia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, glacé de verdâtre; supérieures avec deux yeux, pupillés de part et d'autre, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures varié de brun et de blanc, avec deux lignes noires, flexueuses, dont une plus courte.

121. SATYRE Fauna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur, glacé de verdâtre: supérieures avec deux yeux, sans prunelle au-dessus, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures cendré, avec deux lignes noires, flexueuses, dont une plus courte, et une bande blanchâtre, discoïdale.

122. SATYRE Cordula.

Ailes presque dentées, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, avec une bande rousse, peu prononcée : supérieures offrant de part et d'autre deux yeux pupillés, et séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures cendré, avec une bande et le bord postérieur blanchâtres, et deux points très-noirs intercalés vers l'angle de l'anus.

123. SATYRE Bryce.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux très-noirs, séparés par autant de points blancs : dessous des inférieures avec deux bandes grises, étroites.

124. SATYRE Actœa.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre un seul œil dans le mâle, deux dans la femelle, et deux points blancs intercalaires, mais visibles seulement en dessous dans le mâle : dessous des inférieures avec deux bandes blanches, crénelées, dont l'antérieure plus large et plus vive.

125. SATYRE Podarcé.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : supérieure ayant de part et d'autre un seul œil dans le mâle, deux dans la femelle, et deux points blancs intercalaires, mais visibles seulement en dessous dans le mâle : dessous des inférieures avec deux bandes transverses, et des veines, blanches.

126. SATYRE Phœdra (1).

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux très-noirs à prunelle d'un bleu-violet.

(1) Cette espèce, et les suivantes jusqu'à l'*Hypêranthus* inclusivement, sont connues sous le nom de nègres.

SATYRE. (Insecte.)

127. SATYRE Alopé.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande d'un jaune d'ocre, avec deux yeux écartés : dessous des quatre ondé ; celui des inférieures avec six yeux, dont quatre peu distincts.

128. SATYRE Pégala.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures avec une bande rousse et un seul œil ; dessous des inférieures avec un œil, leur dessous avec six. FAB.

129. SATYRE Zangis.

Ailes très-entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous ferrugineux, avec quatre lignes noires ; celui des supérieures avec un œil bipupillé, celui des inférieures avec deux, dont l'anal sans prunelle.

130. SATYRE Servatius.

Ailes entières, d'un noir-bleu et sans taches en dessus : leur dessous ferrugineux, avec quatre lignes violâtres ; celui des supérieures avec deux yeux, celui des inférieures avec sept, dont le cinquième plus grand.

131. SATYRE Hysius.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur : dessus des inférieures et les deux surfaces des supérieures avec un espace ferrugineux, presque terminal : dessous des quatre avec une ligne grise, transverse, et un seul œil, lequel est bipupillé aux supérieures.

132. SATYRE Clytus.

Ailes très-entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande jaune, bifide et renfermant deux yeux : dessous des inférieures avec deux et cinq yeux.

133. SATYRE Cassus.

Ailes très-entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre le milieu ferrugineux, et le sommet marqué d'un œil à double prunelle ; dessous des inférieures avec quatre à cinq yeux, leur dessous avec sept peu prononcés.

134. SATYRE Cassius.

Ailes très-entières, d'un brun-noirâtre : supérieures ayant de part et d'autre le milieu ferrugineux, et le sommet marqué d'un œil à double prunelle ; dessous des inférieures avec deux yeux rapprochés, leur dessous avec trois très-petits.

135. SATYRE Hyperbius.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur, avec un espace roux : supérieures avec un œil à double prunelle : dessous des inférieures avec sept points. LINN.

136. SATYRE Gorgé.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse : les deux surfaces des supérieures avec un œil double, celles des inférieures avec un œil simple : dessous des inférieures cendré, avec trois lignes noirâtres, ondulées.

137. SATYRE Manto.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les deux surfaces des supérieures avec une bande ferrugineuse, chargée de quatre points très-noirs : dessous des inférieures gris, avec trois lignes noirâtres, transversales, dont les deux antérieures ondulées, la postérieure formée par des points.

138. SATYRE Dromius.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre deux yeux rapprochés : dessous des inférieures d'un gris-luisant avec deux lignes brunes, transverses et ondulées.

SATYRE. (Insecte.)

139. SATYRE Aretéc.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse: bande des supérieures avec un œil double, ou un autre écarté: dessous des inférieures d'un vert-grisâtre, avec une rangée transverse de points blancs.

140. SATYRE Arachné.

Ailes entières, d'un noir-brun à reflet violet: supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec deux yeux rapprochés, ou un autre écarté: dessous des inférieures cendré, avec une bande discoïdale, sinuée, et le bord postérieur, noirâtres.

141. SATYRE Goante.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse: supérieures ayant de part et d'autre un œil double, et un autre écarté et très-petit: dessous des inférieures d'un gris-nébuloux, avec une bande discoïdale plus obscure et bordée de blanc,

142. SATYRE Stiriüs.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse: les deux surfaces des supérieures avec un œil double, et un autre écarté; celles des inférieures avec quatre yeux: dessous des inférieures cendré, avec une bande postérieure plus claire. (Fem.)

143. SATYRE Dalmata.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant une rangée d'yeux de part et d'autre: sommet des premières avec un petit œil extérieur: dessous des secondes veiné de gris vers l'extrémité. (Fem.)

144. SATYRE Afra.

Ailes entières, d'un noir-brun: les deux surfaces des supérieures et dessus des inférieures avec une bande ferrugineuse, maculaire, chargée de cinq à six yeux: dessous des inférieures avec des veines blanchâtres et une série de six à sept yeux.

145. SATYRE Griéla.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun: supérieures ayant de part et d'autre quatre à cinq yeux faiblement pupillés: dessous des inférieures cendré, avec une bande noirâtre, discoïdale, sinuée: sinus du bord terminal des quatre ailes gris.

146. SATYRE Æthiops.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux: supérieures semblables de part et d'autre: dessous des inférieures avec une bande sinuée d'un cendré-luisant et offrant des points oculaires.

147. SATYRE Ligéa.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun, offrant de part et d'autre une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux: dessous des inférieures avec une ligne blanche près du côté interne de la bande ferrugineuse: sinus du bord terminal des quatre ailes blancs.

148. SATYRE Emyale.

Ailes un peu dentées, d'un noir-brun, offrant en dessus une bande ferrugineuse chargée de trois à quatre yeux: dessous des inférieures avec une bande dentée, blanchâtre ou jaunâtre, et marquée de points oculaires: sinus du bord terminal des quatre ailes blancs.

SATYRE. (Insecte.)

149. SATYRE Mnestra.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse : bande des supérieures large, chargée de deux points ou de deux yeux : dessous des inférieures cendré et sans taches à l'extrémité.

150. SATYRE Stygné.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant en dessus une bande ferrugineuse : les deux surfaces des supérieures avec un œil double, et un autre très-petit écarté, celles des inférieures avec trois.

151. SATYRE Mélas.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse (oblitérée dans le mâle), avec un œil double, ou un autre très-petit écarté ; inférieures avec trois yeux, mais sans bande en dessous.

152. SATYRE Alecton.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, oblitérée, sans yeux ou avec deux dans le mâle, avec quatre dans la femelle : dessous des inférieures d'un noir-foncé et sans yeux.

153. SATYRE Machabée.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec deux points très-noirs et rapprochés : dessous des inférieures avec deux taches à la base et une bande vers l'extrémité, jaunâtres.

154. SATYRE Cassiope.

Ailes entières, d'un noir-brun : supérieures ayant de part et d'autre une bande ferrugineuse, avec trois points d'un noir-foncé : dessus des inférieures avec deux à quatre taches ferrugineuses, pupillées de noir ; leur dessous brun ou cendré, avec des points seulement.

155. SATYRE Mélampus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures avec deux points très-noirs et rapprochés ; bande des inférieures avec trois, écartés.

156. SATYRE Pharté.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire et sans points.

157. SATYRE Épiphron.

Ailes entières, d'un noir-brun à reflet verdâtre, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures ayant de part et d'autre deux à quatre yeux ; bande des inférieures avec trois à cinq en dessous.

158. SATYRE OEmé.

Ailes entières, d'un noir-brun : sommet des supérieures offrant de part et d'autre une tache ferrugineuse avec deux yeux très-petits : inférieures avec trois taches ferrugineuses en dessus, quatre à cinq en dessous.

159. SATYRE Psodéa.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une bande ferrugineuse, maculaire : bande des supérieures avec un double œil et d'autres plus petits : bande des inférieures avec quatre yeux dans le mâle, six dans la femelle.

160. SATYRE Céto.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun, avec une rangée de six taches ferrugineuses, chargées chacune d'un point oculaire.

SATYRE. (Insecte.)

161. SATYRE MÉDUSE.

Ailes entières, ou un peu dentées, d'un noir-brun, avec une bande maculaire, ferrugineuse ou jaunâtre : bande des supérieures ayant trois à cinq yeux de part et d'autre; bande des inférieures en ayant quatre à sept en dessous.

162. SATYRE HYPÉRANTHUS.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous plus pâle; celui des inférieures avec deux ou trois yeux.

163. SATYRE JADIRA.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en dessus : sommet des supérieures offrant de part et d'autre un seul œil : dessous des inférieures d'un cendré-jaunâtre, avec une bande plus claire, marquée de un à trois points noirs.

164. SATYRE EUDORA.

Ailes dentées, d'un brun faiblement obscur en dessus : supérieures avec un point noir dans le mâle, deux dans la femelle, et autant d'yeux en dessous : dessous des inférieures d'un cendré-grisâtre, avec une bande plus claire et sans taches.

165. SATYRE CLYMÈNE.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : supérieures ayant de part et d'autre le milieu roux, et le sommet marqué d'un œil; inférieures avec une rangée de trois à quatre taches oculaires en dessus, de sept en dessous.

166. SATYRE TITHONIUS.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures d'un jaune-nébuléux, avec deux bandes plus claires, dont une plus courte, et cinq points ocellés.

167. SATYRE IDA.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures d'un gris-nébuléux, avec deux bandes plus claires, et pas de points ocellés.

168. SATYRE BATHSCBA.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec la base et les bords obscurs : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures noirâtre, avec une bande jaunâtre, discoidale, unidentée en dehors, et bordée par cinq yeux.

169. SATYRE OËDIPE.

Ailes entières, d'un noir-brun en dessus : leur dessous d'un jaune-obscur; celui des inférieures avec une série de six yeux bordés par une ligne argentée, et dont l'antérieur solitaire.

170. SATYRE HÉRO.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous plus pâle; celui des inférieures avec une série de six yeux bordés en dedans par une bandelette blanche, anguleuse, et en dehors par une ligne argentée.

171. SATYRE IPHIS.

Ailes entières : supérieures roussâtres de part et d'autre; dessous des inférieures d'un brun-obscur; leur dessous d'un cendré-verdâtre, avec une série de six yeux bordés en dedans par une bande blanche, interrompue, et en dehors par une ligne mine de plomb.

172. SATYRE ARCANIUS.

Ailes entières : supérieures fauves de part et d'autre, avec le bout obscur : dessous des inférieures d'un brun-noirâtre; leur dessous d'un roux-cendré, avec une

SATYRE. (Insecte.)

bande blanche anguleuse, chargée de cinq à six yeux, dont l'antérieur solitaire, les autres bordés en dehors par une ligne argentée.

173. SATYRE CORINUS.

Ailes catières, fauves : supérieures avec un œil sans prunelle en dessus : dessous des inférieures d'un roux-cendré, avec une bande blanche, interrompue, chargée de cinq yeux, dont l'antérieur isolé, les autres bordés en dehors par une ligne argentée.

174. SATYRE PHILÉUS.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : milieu des supérieures fauve de part et d'autre : dessous des inférieures d'un brun-verdâtre, avec une bande blanche, courbe en arrière, et chargée de six yeux bordés extérieurement par une ligne argentée.

175. SATYRE DORUS.

Ailes entières : dessus des supérieures brunâtre dans le mâle, d'un jaune-faive dans la femelle, avec un œil sans prunelle : inférieures d'un jaune-faive, offrant en dessous une bande blanchâtre, bordée en dehors par une ligne argentée, et chargée de six yeux, dont l'antérieur isolé.

176. SATYRE LÉANDRE.

Ailes entières : supérieures fauves, avec le bout obscur ; inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, chargée en dessus d'une série de points noirs, en dessous d'une rangée d'yeux bordés extérieurement par une ligne argentée.

177. SATYRE IRIUS.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le contour extérieur d'un brun-obscur : dessous des inférieures cendré, avec une bande jaunâtre, terminale, chargée de deux yeux et d'un point intermédiaire

bordés intérieurement par une ligne ferrugineuse, et extérieurement par une ligne argentée.

178. SATYRE LYLLUS.

Ailes entières, d'un fauve-pâle en dessus, avec le limbe postérieur obscur : dessous des supérieures avec un seul œil et une ligne argentée, courte, presque terminale ; dessous des inférieures d'un gris-jaunâtre, avec une bande blanchâtre, oblitérée, et trois à quatre points très-blancs à iris noir.

179. SATYRE PAMPHILE.

Ailes entières, d'un fauve-pâle en dessus, avec le limbe postérieur faiblement obscur : dessous des supérieures avec un seul œil ; dessous des inférieures d'un gris-verdâtre, avec une bande blanchâtre, sinuée, et trois à quatre points très-blancs à iris ferrugineux.

180. SATYRE DAVUS.

Ailes catières, d'un brun faiblement obscur : dessus des supérieures avec un ou deux points noirs, leur dessous avec autant d'yeux ; dessous des inférieures d'un roux-verdâtre, avec une bande blanche, interrompue, et six yeux noirs.

181. SATYRE NARCISSE.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec un espace fauve ; roussâtres en dessous, avec des ondes brunes : supérieures avec un seul œil de part et d'autre, inférieures avec deux très-petits.

182. SATYRE MAGUS.

Ailes très-entières, d'un fauve-obscur : supérieures ayant de part et d'autre un œil à double prunelle ; dessous des inférieures avec deux yeux, leur dessous avec trois. FAB.

SATYRE. (Insecte.)

183. SATYRE Aphnius.

Ailes entières : supérieures d'un brun-obscur , avec un œil très-grand et bipupillé : dessus des inférieures d'un brun-obscur , avec une bande fauve ; leur dessous ondé de blanc et de cendré , et offrant quatre petits yeux , visibles sur la surface opposée.

184. SATYRE Baldus.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus : supérieures ayant de part et d'autre un œil bipupillé : dessous des inférieures avec six yeux , rapprochés deux à deux.

185. SATYRE Arctoüs.

Ailes entières , d'un brun-obscur en dessus , plus claires et ondées de gris-cendré en dessous : les quatre n'ayant de part et d'autre qu'un seul œil , mais bipupillé et plus grand aux supérieures..



A. Sommet des premières ailes plus ou moins tronqué. Bord postérieur des secondes linéant extérieurement par une petite queue.

1. SATYRE *Constantia*.

SATYRUS Constantia.

Sat. alis suprà fuscis : anticarum apice fasciâ lutescente punctifque duobus ocellatis.

Papilio Constantia. CRAM. pl. 135. fig. A. B.

Papilio Constantia. HERBST, *Pap. tab. 173. fig. 6. 7.*

Il a environ trois pouces & demi d'ouverture. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec trois points blancs oculaires entre l'angle anal & la petite queue des inférieures, & deux points semblables, mais dont l'un plus gros, vis-à-vis du sommet des supérieures. Ces dernières ailes ont une bande jaune, courbe, sinuee, partant de la côte, & finissant presque en pointe à l'angle interne.

Le dessous des quatre ailes est grisâtre, avec une multitude d'atomes bruns, & une ou deux lignes transverses de cette couleur. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont sur le limbe postérieur une rangée courbe & transversale de six yeux noirs, dont l'antérieur, le quatrième & le cinquième plus grands, le postérieur bipupillé, & tous pourvus d'une prunelle blanche & d'un iris jaune-paille. Le limbe analogue des secondes ailes offre, sur un fond plus pâle que le reste de la surface, une rangée de trois à quatre points blancs, oculaires.

La bande du dessus des ailes supérieures est plus étroite & plus foncée dans le mâle que dans la femelle.

Des Moluques.

2. SATYRE? *Bernard*.

SATYRUS Bernardus.

Sat. alis caudatis, fulvis : anticis apice atris, fasciâ flavâ ; posticis strigâ punctorum ocellatorum. FAB.

Papilio N. Bernardus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 71. n.º 225.*

Papilio Bernardus. JON. *Fig. pict. 4. tab. 65. fig. 2.*

Quoique nous n'ayons pas vu ce lépidoptère, nous soupçonnons qu'il doit plutôt appartenir aux SATYRES qu'aux NYMPHALES. Il paroît, il est vrai, se rapprocher beaucoup de notre nymphale *Polyxo* ou *Polyxena* de Cramer (voyez n.º 169); mais la *Polyxo* n'a point de queue, & elle présente d'ailleurs d'autres petites différences qui viennent encore à l'appui de notre opinion.

Le corps est grand, fauve, avec les antennes noires. Les quatre ailes sont fauves en dessus, &

les supérieures ont l'extrémité noire, avec une large bande jaune derrière laquelle il y a un petit point pareillement jaune. Les ailes inférieures se terminent par une queue, & elles offrent une rangée transverse de sept points noirs à prunelle blanche, dont l'extérieur double & plus grand que les autres.

Le dessous des quatre ailes est panaché, & il y a aux inférieures une ligne peu prononcée de points blancs & de points noirs.

De la Chine.

(Traduction de Fabricius.)

3. SATYRE *Bankia* (1).

SATYRUS Bankia.

Sat. alis suprà fuscis : anticis oculo apicis f. f. quialtero : omnibus subtilis obscuris fuscicatis, strigâ punctorum albidorum.

Papilio N. Bankia, alis angulatis, suprà fuscis : anticis disco flavescente oculo atro pupillâ geminâ. FAB. *Syst. Ent. p. 499. n.º 245. — Spec. Inf. tom. 2. p. 84. n.º 571. — Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n.º 448. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 106. n.º 527.*

Papilio Bankia. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New. Holl. pl. 25. fig. 1.*

Papilio Bankia. HERBST, *Pap. tab. 173. fig. 1. 2.*

Papilio Phedima. HERBST, *Pap. tab. 173. fig. 4.* (Variété.)

Papilio Arceusia. HERBST, *Pap. tab. 173. fig. 5.* (Variété.)

Papilio Ismene. CRAM. pl. 26. fig. A. B.

Papilio Mycena. CRAM. pl. 291. fig. F. (Variété.)

Papilio Phedima. CRAM. pl. 292. fig. B. (Variété.)

Papilio Arceusia. CRAM. pl. 292. fig. C. (Variété.)

Il a le port du *Constantia*, mais il est un peu moins grand. Le dessus de ses ailes est d'un brun plus ou moins noirâtre. Non loin du sommet des supérieures sont deux yeux noirs à prunelle blanche, & dont l'antérieur plus petit, oblong, disposé longitudinalement. Ces yeux sont bordés du côté de la base par un croissant fauve, plus vif dans les mâles que dans les femelles. Les secondes ailes ont, vers l'angle anal, de un à trois petits points blancs.

Le dessous des quatre ailes varie beaucoup.

(1) Si cette espèce sur restée parmi les NYMPHALES, il eût fallu s'en traduire le nom pour apprendre au lecteur qu'elle a été dédiée par Fabricius au Mécène des savans & des naturalistes européens, à M. Banks, président de la Société royale de Londres.

Tantôt il est d'un brun-jaunâtre, tantôt d'un brun presque marron, avec des bandes transverses plus foncées, lesquelles sont au nombre de deux ou de trois sur les ailes supérieures, d'une ou de deux sur les inférieures. Quelquefois ces bandes sont mouchetées de noir, & le fond est cendré & parsemé d'atomes bruns. Outre cela, il y a vers l'extrémité des ailes inférieures une rangée courbe de trois à six points d'un blanc-verdâtre, & vers l'extrémité des supérieures une rangée de deux à quatre points semblables. Ces différences ne constituent pas des espèces, comme l'a pensé Cramer. Aussi les papillons *Phedima*, *Mycena*, *Brenesia* ne sont-ils pour nous que des variétés. La dernière n'a pas d'yeux aux ailes supérieures en dessus, mais simplement deux points blancs, dont l'antérieur plus gros. Le corps & les antennes sont d'un brun-obscur.

Du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnaeus a connu ce satyre, mais il l'a pris pour la femelle du *Leda*.

4. SATYRE LÉDA.

SATYRUS Leda.

Sat. alis supra fuscis, seu corticino-fuscis: anticis oculo apicis sesquialtero: omnibus subtus griseo reticulatis, singâ ocellorum.

Papilio N. Leda, alis angulatis, luridis: primoribus oculo geminato: posticis subtus ocellatis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 775. n. 150.

EDW. *Av.* 297.

Papilio N. Leda, alis angulatis, fuscis: anticis supra oculo geminato: subtus griseo reticulatis; posticis ocellis sex. FAB. *Syst. Ent.* p. 500. n. 246. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 85. n. 570. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 46. n. 454. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 108. n. 555.

Papilio Leda. GRAM. *pl.* 196. *fig.* C. D.

Papilio Leda. GRAM. *pl.* 292. *fig.* A.

Papilio Leda. DRURY, *Inf.* 1. *tab.* 15. *fig.* 5. 6.

Papilio Leda. HERBST, *Pap.* *tab.* 175. *fig.* 5.

SEBA, *Mus.* 4. *tab.* 42. *fig.* 5. 6.

Papilio N. Solandra, alis angulatis, fuscis: anticis oculo sesquialtero; posticis duobus, subtus quatuor. FAB. *Syst. Ent.* p. 500. n. 244. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 84. n. 572. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 45. n. 449. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. *pars* 1. p. 106. n. 528.

Papilio Solandra. DOXOW. *Gen. Illustr. of Entom. part.* 1. *an Epitome of the Inf. of New-Holl.* *pl.* 25. *fig.* 1.

Nous avons réuni sous le même nom le *Leda* & le *Solandra* de Fabricius, parce qu'il nous est suffisamment démontré que le second n'est qu'une variété du premier.

Il a le port & la taille du *Bankfia*. Le dessus des ailes est tantôt d'un brun-noirâtre, tantôt d'un brun-tanné-obscur. Les premières ont, vis-à-vis du sommet, deux yeux noirs à prunelle blanche, & dont l'antérieur plus petit, oblong, disposé longitudinalement. Les secondes ailes ont, près de l'angle de l'aisselle, un œil noir à prunelle blanche & à iris rouillâtre, lequel est parfois précédé en dehors d'un ou de deux autres plus petits.

En dessous les quatre ailes sont finement réticulées ou mailleées de gris, depuis leur origine jusqu'à leur extrémité, & l'on voit sur les supérieures de deux à quatre yeux noirs, inégaux, ayant tous un iris jaunâtre & une prunelle blanche. Les ailes inférieures ont une rangée d'yeux semblables, dont l'antérieur beaucoup plus grand, l'anale pourvu d'une double prunelle. Ces yeux sont ordinairement au nombre de six: nous disons ordinairement, parce que parfois il n'y en a que cinq de bien apparens, & même quatre comme dans le *Solandra* de Fabricius. Le corps & les antennes sont d'un brun-obscur.

Cramer & Drury le disent de la Chine & du Bengale. Fabricius, qui en fait deux espèces, le *Leda* & le *Solandra*, indique le premier comme se trouvant à Sierra-Leone en Afrique, & le second à la Nouvelle-Hollande. Ce que nous pouvons dire de certain à cet égard, c'est qu'il est commun à l'île de France, & que c'est de cette colonie qu'il a été rapporté par M. Catoire, payeur militaire.

5. SATYRE GERDRUDTUS.

SATYRUS Gerdrudtus.

Sat. alis caudatis, fuscis: anticis maculâ apicis ocellari: subtus (omnibus) ferrugineis, puncto anticarum albo, posticarum duobus. FAB.

Papilio N. Gerdrudtus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. *pars* 1. p. 72. n. 224.

Papilio Gerdrudta. JON. *Fig. pict.* 4. *tab.* 5. *fig.* 2.

Fabricius le décrit ainsi: il a presque le port du *Bankfia*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur. Les supérieures ont vers l'extrémité une tache fauve, & au sommet une tache très-noire, ayant une prunelle blanche & un iris formé par un croissant fauve. Les ailes inférieures sont sans taches, & leur extrémité est tronquée & terminée en queue.

Le dessous de toutes les ailes est d'un ferrugineux-pâle, avec une ou deux lignes transverses plus obscures, un seul point blanc sur les supérieures, & deux sur les inférieures.

Il habite....

6. SATYRE EUROPA.

SATYRUS Europa:

Sat. alis fuscis : anticis utrinque fasciâ albâ obliquâ : posticis subtus serâ ocellorum, strigâque bascos albidâ, als pr. moribus communi.

Papilio N. Europa, alis subcaudatis, fuscis : posticis subtus fuscâ ocellari albidâ. FAB. Syst. Ent. p. 500. n. 247. — Spec. Inf. tom. 2. p. 86. n. 580. — Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n. 580. — Ent. Syst. eu. tom. 5. pars 1. p. 76. n. 253.

Papilio Berœ. CRAM. pl. 79. fig. C. D.

Papilio Arctæ. CRAM. pl. 515. fig. E. F. (Variété.)

Il a entre deux & trois pouces de largeur. Ses ailes sont d'un brun-obscur de part & d'autre. Les premières ont le bord postérieur droit & entier dans les mâles, dentelé & un peu concave dans les femelles. Du milieu du bord antérieur de ces ailes part une bande blanche qui va obliquement aboutir à leur angle interne. Il y a en outre, vis-à-vis de leur sommet, deux ou trois points blancs, disposés à peu près dans le même sens que cette bande.

Les secondes ailes sont légèrement dentées dans les deux sexes & un peu prolongées en queue en dehors. Leur dessus offre, le long du bord terminal, une double ligne ondulée, blanchâtre ou cendrée, & précédée intérieurement d'un cordon de quatre à cinq points noirs, plus apparens dans certains individus que dans d'autres.

Le dessous des ailes supérieures présente les caractères que voici : vers la base est une ligne transverse plus ou moins blanche. Vient ensuite une bande semblable à celle du dessus & colorée de même; puis une autre bande atteignant intérieurement la précédente & composée de quatre à six yeux grisâtres à prunelle noire.

Le dessous des secondes ailes a, vers la base, une ligne blanche, faisant suite à celle de la base des premières ailes; & vers le bout, entre deux lignes ondulées grisâtres, une rangée courbe de six yeux adhérens entr'enx, & dont l'antérieur plus gros. Ces yeux sont ronds dans les mâles, noirs, avec la prunelle blanche, l'iris jaunâtre & de plus entouré d'un cercle violâtre. Dans les femelles, au contraire, ils sont oblongs, plus grands, d'un brun-jaunâtre, avec le milieu faiblement de blanc & de noir, & l'iris d'un gris de perle.

Des îles de Java & d'Amboine.

Nota. Le dessus des premières ailes est quelquefois sans bande blanche; & dans la variété que Cramer donne sous le nom d'*Arctæ*, cette bande n'existe ni en dessus, ni en dessous.

7. SATYRE CAUMAS.

SATYRUS CAUMAS.

Sat. alis subtus rufo-griscentibus, strigis tribus ferrugineis : posticarum limbo ocellis sex pulveræ inaurato pupillatis.

Papilio Arcadiæ. CRAM. pl. 116. fig. D. E. (La femelle.)

Il a le port de l'*Europa*, mais il est un peu plus petit.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-rouffâtre, avec trois lignes ferrugineuses & transverses, dont la deuxième & la troisième plus ondulées que l'antérieure, & embrassant aux secondes ailes six yeux jaunâtres, contigus, ayant l'iris d'un gris de perle, la prunelle noire & parsemée d'atomes qui paroissent comme dorés. Ces mêmes lignes n'embrassent aux premières ailes que quelques points ocellés, peu distincts.

Le dessus du mâle, si toutefois celui que nous avons vu n'est pas une variété, le dessus du mâle, disons-nous, est d'un brun-obscur, avec une petite touffe de poils noirs sur le disque de la partie inférieure; & une tache cendrée, elliptique, longitudinale, entourée de noir, vers le milieu du bord interne des ailes supérieures.

Le dessous de la femelle est d'un fauve-obscur, terminé aux premières ailes par un espace noirâtre triangulaire & très-grand, sur lequel il y a une bande blanche, maculaire, transverse, couverte en arrière, & suivie d'un point blanc qui fait face au sommet. Les secondes ailes ont, parallèlement au bord d'en bas, une rangée de quatre gros points noirs, oculaires. On les aperçoit aussi dans le mâle, quoiqu'il soit d'une couleur plus obscure. Le corps est brun. Les antennes sont rouffâtres.

De l'île de Java.

Nota. Fabricius y rapporte, avec doute il est vrai, son papillon *Muerva* qui est différent.

8. SATYRE? ROHRIA.

SATYRUS ROHRIA.

Sat. alis dentato-caudatis, fuscis : anticis fasciâ albâ : posticis subtus ocellis septem, pluribus albo punctatis. FAB.

Papilio X. Rohriæ. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n. 446. — Ent. Syst. eu. tom. 5. pars 1. p. 75. n. 253.

Il est de moyenne taille, d'un brun-obscur en dessus. Ses premières ailes ont une bande blanche qui n'atteint pas le bord postérieur. Ce bord offre des taches blanches, indépendamment desquelles il y en a deux autres vis-à-vis du sommet.

Les secondes ailes ont une queue, & elles sont liserées de blanc en dehors.

En dessous, toutes les ailes sont lisses & onduées de violâtre. Les supérieures ont une bande blanche, & trois yeux noirs sans prunelle. Les inférieures ont sept yeux, dont l'antérieur plus gros, noir & à prunelle blanche; les trois suivants oblongs, offrant des points noirs chargés chacun d'un point blanc; le cinquième plus grand & dépourvu de prunelle; les deux postérieurs réunis &

fablés de blanc. Les antennes ont la masse noirâtre, avec la sommité ferrugineuse.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

9. SATYRE? *Panthera*.

SATYRUS Panthera.

Sat. alis dentato-caudatis, fuscis: subtus undatis, posticis ocellis duobus disci, quinque marginalibus, caerulecentibus. FAB.

Papilio N. Panthera. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 59. n. 407.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 75. n. 254.*

Il est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est noir, avec le bord obscur. Les inférieures ont des dents & une queue.

Le dessous de toutes les ailes est ondulé. Celui des inférieures offre, sur le milieu, deux petits yeux à prunelle bleuâtre, & à l'extrémité, qui est d'un cendré-obscur, cinq yeux noirs, dont la prunelle est également bleuâtre. Le corps est d'un brun-noirâtre.

De Trinquebar.

(Traduction de Fabricius.)

B. Bord postérieur des premières ailes en faulx. Bord correspondant des secondes un peu prolongé à l'angle de l'anus, & terminé en dehors par une queue obtuse & très-oblique.

10. SATYRE Chorinée.

SATYRUS Chorinæus.

Sat. alis suprà fuscis: anticis fuscis sulvâ, transversâ: posticis subtus strigâ ab angulo externo ad analem obliquè ductâ.

Papilio N. Chorinæus, alis integerrimis, fuscis: anticis fuscis, fuscis sulvâ: posticis caudatis. FAB. *Syst. Ent. p. 484. n. 182.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 60. n. 200.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 29. n. 506.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 72. n. 225.*

Papilio Arcefilaus. SULZ. *Inf. edit. ROEM. p. 142. tab. 14. fig. 4.*

Papilio Arcefilaus. GRAM. *pl. 294. fig. A. B.* (Le mâle.) *fig. B. C.* (La femelle.)

STOLL, *Pap. Suppl. à GRAM. pl. 6. fig. 1.* (La chenille.) *fig. 1. A.* (La chrysalide.)

Papilio Arcefilaus. ESP. *Pap. exot. tab. 54. fig. 5-7.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 41. fig. 15. 16.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 42. fig. 15. 16.*

Il a de quatre pouces à quatre pouces & demi

d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, large, sinuée, descendant du milieu de la côte à l'angle interne où elle suit en pointe arrondie. Il y a en outre un gros point blanc vis-à-vis du sommet.

Le dessus des secondes ailes est couleur de terre d'ombre, avec le limbe postérieur plus clair, & divisé par une ligne de trois à quatre points blanchâtres, points qui ne sont que l'empreinte plus ou moins visible de ceux de la surface opposée.

Le dessous des quatre ailes est cendré, finement ondulé de noirâtre, avec quelques lignes brunâtres disposées transversalement, à l'exception toutefois de la postérieure des secondes ailes, laquelle va obliquement de l'angle externe à l'angle interne. Le corps est brun, avec un collier fauve.

La chenille, selon Stoll, est d'un rouge-ponceau, avec les côtés du ventre & les pattes fauves. Elle a tout le long du dos une bande jaune, formée par une suite de taches à peu près elliptiques, & coupées de noirâtre dans le sens de leur longueur. La tête est ferrugineuse, bordée & rayée de jaunâtre. L'anus se termine par une longue fourche grisâtre, ciliée de noir. Cette chenille vit sur la canne à sucre.

La chrysalide est courte, d'un brun-pâle, avec des mouchetures noires. Elle est suspendue par la queue.

De Surinam.

C. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures terminées en dehors par une petite queue aiguë, & ayant entre cette queue & l'angle de l'anus une dent obtuse.

a. Bord interne des ailes supérieures fortement arqué dans les mâles.

11. SATYRE Philodète (1).

SATYRUS Philodetes.

Sat. alis suprà violaceo-fuscis: posticis ad angulum ani maculis tribus caeruleis, externis duabus puncto nigro fixis.

Papilio E. A. Philodetes, alis subcaudatis, fuscis: posticis ocellis duobus caeruleis pupillâ nigra punctisque tribus albis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 750. n. 29.* — *Mus. Lud. Ulr. p. 219.*

Papilio Philodetes. CLERCK, *Icon. tab. 50. fig. 5.*

Papilio E. A. Philodetes. FAB. *Syst. Ent.*

(1) Dans cette espèce & dans les sept suivantes, la cellule aréolaire des secondes ailes est terminée par un angle moins aigu que chez les autres SATYRES, & les antennes sont presque histormes. Ces espèces répondent au genre *HEGEMA* de Fabricius.

p. 456. n°. 56. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 22. n°. 90.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 12. n°. 106.*

Papilio N. Philoctetes. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 83. n°. 259.*

Papilio Philoctetes. ESP. *Pap. exot. tab. 46. fig. 4.*

Papilio Philoctetes. GRAM. *pl. 20. fig. A. (Le mâle.) fig. B. C. (La femelle.)*

Papilio Philoctetes. DRURY, *Inf. 2. pl. 1. fig. 1-3.*

Papilio Philoctetes. HERBST, *Pap. tab. 53. fig. 2. 5.*

SCULZ, *Inf. edit. ROEM. tab. 15. fig. 5.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 4. fig. 9. 10.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 21. fig. 7. 8.*

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes supérieures sont entières, d'un brun enfumé en dessus, avec un léger reflet violet vers la base, & deux petits points blancs vis-à-vis du sommet.

Les ailes inférieures ont le dessus d'un noir-brun, glacé de violet, avec trois taches bleues, dont la plus intérieure disposée transversalement au dessus de l'angle anal, les deux autres chargées chacune d'un très-gros point noir & placées longitudinalement entre la précédente & l'origine de la petite queue. A la suite de ces taches, en remontant vers l'angle extérieur, il y a une rangée de trois points blancs.

Le dessous des premières ailes est couleur de café au lait pâle, avec deux lignes d'un noir-brun, transverses & parallèles, dont la postérieure discoidale, plus longue & doublée de blanc intérieurement; sans compter une bande violâtre, étroite, environnée de brun-marron, & descendant directement de la côte à l'angle interne. Les mâles ont en outre, vers le milieu du bord intérieur, un faisceau de poils brunâtres & divergens, dont l'empreinte forme sur la surface opposée une tache ovale d'un ton noirâtre.

Le dessous des secondes ailes est couleur de café au lait pâle vers sa naissance, avec trois points, puis une ligne, d'un noir-brun. Sur le milieu de la surface est une bande transverse d'un brun-marron, immédiatement suivie d'une bande violâtre sur laquelle reparoissent les trois points blancs du dessus, ainsi que les deux gros points noirs qui occupent chacun le centre des deux taches bleues longitudinales dont nous avons parlé en décrivant le dessus.

Commun à Surinam.

Nota. Dans la figure de Drury, les ailes inférieures sont sans queue.

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

12. SATYRE MORNA.

SATYRUS MORNA.

Sat. alis dentatis, fuscis: posticis ocellis utrinque duobus punctisque tribus albis. FAB.

Papilio N. Morna. FAB. *Syst. Ent. p. 500. n°. 245.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 46. n°. 432.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 107. n°. 551.*

Fabricius le décrit ainsi: les ailes supérieures sont d'un brun-obscur, avec un point blanc au sommet.

Les inférieures sont dentées, d'un brun encore plus obscur, avec trois points blancs près de l'extrémité, & deux yeux noirs, sans prunelle, mais ayant un large iris bleu. Il y a en outre une tache bleue près de l'angle de l'anus.

Le dessous des quatre ailes est blenâtre vers la base, avec des taches noires; d'un brun-obscur vers le bout, avec une ligne cendrée, transversale, laquelle offre aux secondes ailes deux yeux comme en dessus, mais précédés ici de trois points blancs discoidaux.

Des Indes occidentales.

Nota. Ne seroit-ce pas une variété sans queue du satyre *Philoctète*?

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en dehors par un prolongement plus ou moins remarquable.

15. SATYRE LÉNA.

SATYRUS LENA.

Sat. alis subhyalinis, fuscis: posticis supra dimidio apicali atro maculis cœruleis, sparatis, plerisque puncto albo fœtis.

Papilio N. Lena, alis subdentatis, fuscis: posticis posticæ atris, albo cœruleoque punctatis; subtus biocellatis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 784. n°. 206.*

Papilio N. Lena. FAB. *Syst. Entom. p. 514. n°. 301.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 377.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n°. 455.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars. p. 108. n°. 554.*

Papilio Lena. GRAM. *pl. 198. fig. D. E.*

Papilio Lena. GRAM. *pl. 291. fig. A. B.*

Papilio Lena. HERBST, *Pap. pl. 224. fig. 3-6.*

KLEM. *Inf. tab. 10. fig. 5. 4.*

SEBA, *Muf. 4. tab. 56. fig. 13. 14.*

Il a presque un pouce de moins que le *Philoctète*. Ses premières ailes sont entières & un peu transparentes. Leur dessus est d'un brun-obscur, tantôt sans taches, tantôt coupé parallèlement au bord postérieur par une suite de quatre ou cinq points, dont le second, à partir de la côte, noir & ca-

touré d'un cercle gris; les autres tout-à-fait bleuâtres.

Les secondes ailes sont un peu dentées, & terminées en dehors par une petite queue obtuse. Leur dessus a environ la moitié antérieure d'un brun glacé de violet; la moitié postérieure d'un noir-foncé, avec une vingtaine de taches bleues, chargées pour la plupart d'un point très-blanc. Le bout de la queue est pareillement blanc.

Le dessous des premières ailes est d'un brun légèrement glacé de violet, avec une bande blanche, linéaire, droite, descendant du bord antérieur au bord interne, près de l'angle de ce nom, & se prolongeant ensuite jusqu'au disque des ailes inférieures. Indépendamment de cette bande, on voit, vers la base, trois ou quatre points noirs, éparés; & vers l'extrémité, une suite de points blanchâtres, correspondant à ceux de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est à peu près du même ton de couleur que le dessous des premières, avec sept à huit points d'un blanc-jaunâtre, disséminés entre le disque & le bord terminal; & deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaune, placés vis-à-vis du sommet. Il y a en outre, près de la base, quatre ou cinq points noirs, faiblement ocellés, qu'enveloppe extérieurement une ligne brune, transverse, courbe & un peu ondulée. Le corps est gris en dessous; d'un brun-violet en dessus, avec un collier blanchâtre. Les antennes sont roulées & finement annelées de noir.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Le manque de queue est purement accidentel, & non particulier à l'un des sexes, comme l'ont cru Fabricius & Cramer.

14. SATYRE Dindymène.

SATYRUS Dindymene.

Sat. alis fuscis, subhyalinis: postlicis supra ferrie punctorum ocellatorum: subtus omnibus strigis tribus punctisque basales obscurioribus.

Papilio N. Dindymene, alis dentatis, fuscis: postlicis supra violaceis, punctis quatuor albis. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 86. n. 578. — Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n. 456. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 103. n. 555.

Papilio Dindymene. CRAM. pl. 198. fig. F. G.

Papilio Dindymene. HERBST, Pap. tab. 224. fig. 1. 2.

Papilio Lamia. SULZ. Inf. edit. ROEM. tab. 18. fig. 1.

Papilio Rhea, alis rotundatis, fusco-hyalinis: postlicis punctis quinque ocellaribus albis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 18. n. 179. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 103. n. 554.

Il a le port, la taille & la légère transparence du *Léna*, mais les ailes inférieures n'ont pas de prolongement sensible. Le dessus de ces ailes est d'un brun un peu violâtre, avec une rangée courbe & postérieure de quatre ou cinq points noirs, plus ou moins gros, & ayant le milieu blanc. Dans les mâles, il y a en outre, près du bout de l'abdomen, une tache jaunâtre, oculaire.

Les ailes supérieures sont d'un brun-obscur dans la femelle, avec deux points blanchâtres, alignés transversalement vis-à-vis du sommet. Dans le mâle, le milieu de ces ailes est plus clair, & jette à certains aspects un reflet d'un vert émeraude.

Le dessous des deux sexes est d'un brun un peu teinté de violet, avec une multitude d'atomes cendrés, & trois lignes transverses d'un brun plus obscur que le fond. Aux points ocellés des ailes inférieures correspondent ici cinq points blanchâtres. Les ailes supérieures en ont trois semblables près de l'angle externe, & un noir près de la base. La base des secondes ailes en offre trois ou quatre de cette dernière couleur. Le corps est grisâtre en dessous; brun en dessus, avec un collier jaunâtre. Les antennes sont noires & finement annelées de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. Le *Rhea*, mentionné dans la synonymie, se rapporte au *Dindymène* par l'ensemble des caractères. C'est donc à tort que Fabricius en a fait en dernier lieu une variété du *Léna*.

15. SATYRE LUNA.

SATYRUS Luna.

Sat. alis dentatis, fuscis, obscurius strigosis: postlicis ocellis duobus: subtus omnibus punctis quatuor. FAB.

Papilio N. Luna. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 109. n. 556.

Papilio Luna. JON. Fig. pict. 4. tab. 9. fig. 1.

Suivant Fabricius, ce lépidoptère a le port du *Dindymène*, auquel il ressemble beaucoup. Les premières ailes sont d'un brun-obscur, avec trois lignes transverses plus foncées, & trois points blancs en dessus, quatre en dessous. Les secondes ailes sont aussi d'un brun-obscur, avec des lignes plus foncées. Leur extrémité, qui est plus obscure que le reste de la surface, offre deux yeux très-noirs, dont le postérieur sans prunelle. Ces yeux se reproduisent en dessous & ils y sont accompagnés de trois ou quatre points blancs. Le corps est brun en dessus avec les incisions de l'abdomen jaunes.

De Surinam.

N. B. Ne seroit-ce pas une variété du précédent?

16. SATYRE NÉRÉIS.

SATYRUS Nereis.

Sat. alis fuscis, subhyalinis, vittâ connumi albi : posticis ad apicem fulvis, ocellis duobus atris.

Papilio P. Nereis, alis repandis, fuscis : posticis fasciâ niveâ discoque fulvo ocellis duobus atris. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 134. n°.* 563.

Papilio Nereis. DRURY, *Inf. 3. pl. 53. fig. 4.*

Papilio Nereis. HERBST, *Pap. tab. 84. fig. 1. 2.*

Papilio Nereis. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 26. fig. 5.*

Papilio Nereis. JON. *Fig. pict. 2. tab. 55. fig. 2.*

Il a près de trois pouces d'envergure. Les ailes supérieures sont un peu transparentes, d'un brun-obscur de part & d'autre, avec une bande blanche, linéaire, descendant obliquement du bout de la côte au bout du bord interne.

Le dessus des secondes ailes a environ la moitié antérieure & le bord terminal d'un brun-obscur; & tout le reste fauve ou couleur de tabac d'Espagne, avec une bande très-blanche, bordée de noirâtre, fortement dilatée en dehors à sa partie inférieure, n'atteignant pas le bord interne, mais s'alignant avec la bande des ailes supérieures. Entre cette bande des secondes ailes & leur bord postérieur, il y a deux yeux très-noirs à prunelle bleuâtre, lesquels sont séparés l'un de l'autre par deux points blancs; sans compter un point semblable placé près de la côte au-dessus de l'œil antérieur.

Le dessous de ces ailes est généralement plus pâle que le dessus, & il n'a point le bord postérieur obscur; les deux yeux noirs y sont beaucoup plus petits & entourés d'un cercle grisâtre; la bande blanche s'y prolonge davantage, & l'on voit près de la base une ligne noirâtre, fine, oblique, un peu ondulée. Le corps est grisâtre en dessous; brun en dessus, avec un collier blanc-âtre.

La femelle a de part & d'autre, vis-à-vis du sommet des premières ailes, une rangée transverse de trois points blancs.

De la Guyane & du Brésil.

17. SATYRE PIÉRA.

SATYRUS Piera.

Sat. alis hyalinis : anticis immaculatis ; posticis disco rufescentibus strigâ fuscâ , apice ocellis duobus punctisque totidem albis interjectis.

Papilio H. Piera, alis oblongis, integerrimis, hyalino-diaphanis : posticis ocellis binis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 754. n°.* 52. — *Mus. Lud. Ulr. p. 220.*

Papilio P. Pient. FAB. *Syst. Ent. p. 467. n°.* 103. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 57. n°.* 153. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 17. n°.* 175. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 185. n°.* 566.

CLERCK, *Icon. tab. 56. fig. 7. 8.*

MERIAN, *Surin. Inf. tab. 16. fig. super. à gau-*
che.

KLEM. *Inf. 1. tab. 6. fig. 1. 2.*

SULZ. *Inf. edit. ROEM. tab. 15. fig. 5.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 8. fig. 9. 10.*

Papilio Piera. CRAM. *pl. 291. fig. C. D. E.*

Papilio Piera. HERBST, *Pap. tab. 84. fig. 3. 5.*

Il a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont entières, transparentes, avec les nervures & les bords brunâtres. Les ailes supérieures sont sans taches. Les inférieures ont le milieu d'une teinte rouillâtre, avec une ligne obscure, transverse & tortueuse, derrière laquelle il y a deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre, & séparés l'un de l'autre par deux points blancs. Le corps est cendré. Les antennes sont fauves.

La femelle ressemble au mâle.

La chenille, selon Merian, est garnie de poils blancs, très-touffus, longs & rabotans sur les côtés du corps. Elle se trouve à Surinam sur *Lucajou* (anacardium). LINNÆUS l'a prise pour celle de son *pap. Anacardii*, papillon qui est le même que notre vanesse AGLATONICE. (*Voy. le Supplément.*)

18. SATYRE ANDROMÈDE.

SATYRUS Andromeda.

Sat. alis hyalinis : anticis strigis duabus suffescentibus ; posticis ad angulum ani chemesinis, apice ocello unico.

Papilio P. Andromeda, alis rotundatis hyalino-albis : posticis apice rubris ocello utraque unico. FAB. *Syst. Ent. p. 467. n°.* 107. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 57. n°.* 153. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 18. n°.* 180. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 184. n°.* 569.

Papilio Pireta. CRAM. *pl. 315. fig. A.*

Papilio Philis. CRAM. *pl. 337. fig. E.* (Var.)

Papilio Menander. DRURY, *Inf. 3. pl. 53. fig. 5.*

Papilio Menander. HERBST, *Pap. tab. 84. fig. 6.*

Papilio Philis. HERBST, *Pap. tab. 84. fig. 7.* (Var.)

Il a le port du précédent, mais il est d'environ un tiers plus petit. Ses ailes sont aussi transparentes & entières. Les supérieures ont le milieu tra-

versé, d'un bord à l'autre, par deux lignes brunâtres, obliques & parallèles, dont la postérieure se prolongeant sur les secondes ailes. Celles-ci sont d'un rouge-cramoisi vers l'angle de l'anüs, & leur sommet ou angle postérieur offre de part & d'autre un œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre, au bas duquel on distingue un petit point blanc. Le corps est cendré en dessus; plus pâle en dessous. Les antennes font noirâtres.

Il se trouve à Surinam & à la Jamaïque.

Cramer a figuré, sous le nom de *Phylis*, une variété dont les premières ailes n'ont qu'une ligne brunâtre, & dont l'angle anal des secondes ailes est d'un cramoisi plus foncé.

E. Ailes supérieures triangulaires. Inférieures un peu tronquées vers l'angle de l'anüs.

19. SATYRE Girondius.

SATYRUS Girondius.

Sat. alis suprà fuscis, apice ocellis quatuor geminatis : posticis subtus puncto bascos nigro.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-obscur, avec quatre yeux noirs, rapprochés deux à deux, mais moins gros & moins prononcés aux ailes inférieures qu'aux supérieures. Ces yeux ont une prunelle d'un blanc-bleuâtre & un iris d'un roux-fale.

En dessous, où le fond est plus pâle, & quelquefois légèrement teinté de violet, les ailes de devant ont une rangée postérieure de quatre points blanchâtres, & celles de derrière une rangée de six points semblables. La base de ces dernières offre en outre un point noir.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

20. SATYRE BÉTO.

SATYRUS Betro.

Sat. alis nigricanti-fuscis : anticis suprà fasciâ apicis rufescente : posticis subtus strigâ punctorum flavescantum.

Il est de la taille du *Girondius*. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux inférieures, avec une bande roussâtre, transversale, vers l'extrémité des supérieures.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec une légère teinte violâtre à l'angle externe des supérieures, & une rangée de six points jaunâtres près de l'extrémité des inférieures. On aperçoit en outre, mais d'une manière peu distincte, deux lignes d'un ferrugineux-obscur sur le milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Brésil par M. le chevalier de Langsdorff.

Nota. Les premières ailes ont le bord antérieur très-arcué, & le bord postérieur entier.

F. Sommet des premières ailes plus ou moins aigu. Bord terminal des secondes offrant vers l'angle de l'anüs trois dents, dont l'extérieure souvent plus prononcée.

21. SATYRE Chélyus.

SATYRUS Chelys.

Sat. alis suprà fuscis, immaculatis : posticis subtus nebulosè ferrugineis aut virescenti-griseis, strigâ punctorum flavescantium.

Papilio N. Chelys, alis dentato-caudatis, fuscis : subtus variegatis, strigâ punctorum flavescantium. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 80. n^o. 249.

Papilio Chelys. JON. Fig. piçt. 3. tab. 78. fig. 2.

Notre *Chélyus* paroît bien être le même que celui de Fabricius.

Il a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Le dessous des supérieures est à peu près de la couleur du dessus, avec l'extrémité un peu glacée de violâtre, & divisée vis-à-vis du sommet, qui est ferrugineux ou grisâtre, par un rang de quatre petits points jaunâtres.

Le dessous des ailes inférieures est d'un ferrugineux-obscur dans le mâle, d'un gris plus ou moins verdâtre dans la femelle, avec une bande discoïdale plus foncée, & une rangée postérieure de cinq points jaunâtres, dont l'anal plus gros & oculaire. Le milieu de la bande discoïdale offre dans chaque sexe un point noir.

Du Brésil.

22. SATYRE Rébecca.

SATYRUS Rebecca.

Sat. alis suprà fuscis, immaculatis : subtus nidenti-subviolaceis, strigis duabus punctoque centrali obscurè-ferrugineis.

Papilio N. Rebecca, alis dentato-caudatis, fuscis, immaculatis : subtus pallidioribus, strigis duabus brunneis punctisque subocellaribus albis. FAB. Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 75. n^o. 256.

Papilio Virgilia. CRAM. pl. 96. fig. C.

Papilio Virgilius. HERBST, Pap. tab. 193. fig. 6.

Fabricius ne rapporte son papillon *Rebecca* à aucune figure; mais la description qu'il en donne & la patrie qu'il lui assigne ne permettent pas de douter que ce ne soit le même que le *Virgilia* de Cramer.

Il a de trois pouces à trois pouces & demi d'en-

vergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous est d'un brun légèrement glacé de violet, avec deux lignes obliques d'un ferrugineux-obscur, & renfermant entr'elles un point central de leur couleur. La seconde ligne, qui a le côté externe doublé de grisâtre, est suivie d'un cordon de points blancs oculaires, au nombre de cinq sur les ailes supérieures, au nombre de six sur les inférieures, & séparés du bord terminal des unes & des autres par une ligne brune, ondulée & très-fine. Le corps & les antennes sont à peu près du même brun que les ailes.

De la Guyane & du Brésil.

23. SATYRE Merméria.

SATYRUS Mermeria.

Sat. alis suprà fuscis, immaculatis : subtùs obscurè ferrugineis, strigà cinerea, medià, punctisque sex ocellaribus albidis.

Papilio Mermeria. CRAM. pl. 96. fig. C.

Papilio Mermeria. CRAM. pl. 289. fig. E. F.

Papilio Mermerius. HERBST, *Pap. tab. 192. fig. 1. 2. 3.*

Sa taille est à peu près la même que celle du précédent. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous est d'un brun-ferrugineux, piqué de noirâtre, avec une ligne ceadrée, oblique & discoidale, près du côté extérieur de laquelle il y a une rangée de six points blanchâtres, oculaires, séparés du bord terminal par une ligne ceadrée, flexueuse & plus ou moins apparente. On voit parfois vers la base une ligne arquée de cette dernière couleur.

Dans certaines femelles, le dessous des ailes est d'un gris-verdâtre ou violâtre, depuis le milieu jusqu'au bord postérieur; mais cela n'empêche pas d'y retrouver les caractères que nous venons d'indiquer.

Dans d'autres, les points oculaires ont un léger iris jaunâtre.

De la Guyane & du Brésil.

G. Sommet des premières ailes un peu tronqué. Bord postérieur des secondes inégalement denté.

24. SATYRE Lachès.

SATYRUS Laches.

Sat. alis fuscis, suprà immaculatis : subtùs fuscisà posticà violaceo-griseà ocellis anticarum quinque, posticarum sex obsoletis.

Papilio S. Laches, alis dentatis, fuscis : (subtùs) fuscisà caeruleà ocellis anticarum quinque,

posticarum sex. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 229. n.º. 719.*

Papilio Laches. JON. *Fig. piã. 3. tab. 81. fig. 2.*

Papilio Adromeda. CRAM. pl. 96. fig. A.

Papilio Thamyra. CRAM. pl. 242. fig. B.

Papilio Andromedus. HERBST, *Pap. tab. 192. fig. 7.*

Papilio Thamyrus. HERBST, *Pap. tab. 194. fig. 1.*

Quoique Fabricius dise que son satyre *Laches* a toutes les ailes très-dentées (*alæ omnes valdè dentatæ*), nous y rapportons sans le moindre scrupule les papillons *Adromeda* & *Thamyra* de Cramer qui ne sont qu'une seule & même espèce.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Le dessous est aussi d'un brun-obscur, & l'on voit à l'extrémité une large bande d'un gris-violet. Sur cette bande, les ailes supérieures ont une série de cinq yeux peu prononcés, dont le deuxième un peu en arrière des autres; & les secondes ailes une rangée courbe de six yeux, dont les deux extrêmes plus petits, l'avant-dernier plus ou moins noirâtre. Ces yeux ont tous une prunelle blanche ou jaunâtre. La base des quatre ailes est en outre d'un gris-violet, surtout dans les femelles, avec une ligne brune, transverse & arquée. Le corps est brun en dessus, un peu plus pâle en dessous. Les antennes sont rouffâtres.

De la Guyane & du Brésil.

25. SATYRE Célia.

SATYRUS Celia.

Sat. alis fuscis, suprà immaculatis : subtùs fuscisà posticà violaceo-griseà ocellis anticarum quatuor, posticarum quinque obsoletis.

Papilio Celia. CRAM. pl. 242. fig. C.

Papilio Celius. HERBST, *Pap. tab. 194. fig. 2.*

Si la figure de Cramer est exacte, ce satyre ne diffère en dessous du précédent que parce que la ligne brune de la base des ailes est flexueuse, au lieu d'être arquée; & parce que les supérieures n'ont que quatre yeux placés sur la même ligne, & les secondes cinq qui sont tous égaux.

De la Guyane.

H. Bord postérieur des quatre ailes arrondi.

26. SATYRE Valentine.

SATYRUS Valentina.

Sat. alis fuscis, suprà immaculatis, subtùs fuscisà violaceo-albidà ocellis singularum quinque : posticis disco latefcente.

Papilio Valentina. CRAM. pl. 242. fig. A.

Papilio Valentinus. HERBST, Pap. tab. 193. fig. 7.

Il est un peu moins grand que le *Zachès*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous est un peu plus clair que le dessus, avec une bande postérieure, violâtre en avant, blanche en arrière, & chargée sur chaque aile d'une série de cinq yeux à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Entre cette bande & la base, il y a une ligne très-brune, flexueuse & transverse, derrière laquelle les premières ailes offrent une tache oblique, & les secondes une tache orbiculaire, d'un jaune-chamois.

De la Guyane.

Nota. Décrit d'après Cramer.

27. SATYRE Orchaume (1).

SATYRUS Orchanus.

Sat. alis suprà fusco-nigris, immaculatis, subtus strigà punctarum ocellarum: puncto anticarum tertio lunula rubre intus adnato.

Satyre Orchus. *Recueil d'observations de zool. & d'anat. comp. par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, tom. 2. p. 72. pl. 35. fig. 1. 2.*

Il a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-ensumé-mat, sans aucune tache, mais avec le bord terminal des supérieures un peu plus clair.

Le dessous de toutes les ailes est d'un brun-obscur, avec une teinte plus foncée au milieu des premières & à la base des secondes. La teinte de ces dernières forme comme deux bandes transverses, dont la postérieure beaucoup plus large & se dilate en angle obtus au milieu de son côté externe. A la suite de ces bandes, les ailes de devant ont une rangée transverse de quatre points noirs à prunelle bleuâtre, & dont le troisième adhérant par son côté interne à une lunule d'un rouge-fauve. Les ailes de derrière offrent une suite de cinq à six points semblables, mais ils sont plus petits, entourés d'un cercle un plus pâle que le fond de l'aile, & le dernier d'eux ou l'anal est bipupillé. Le corps est d'un noir-brun, avec les côtés des palpes & une grande partie des pattes grisâtres. Les antennes sont noires, finement annelées de gris, avec un peu de brun fous l'extrémité de la massue.

Du Pérou.

Nota. Nous ignorons si les deux sexes se ressemblent. Celui que nous décrivons paroît être le mâle.

(1) Nous avons changé le nom de cette espèce, parce qu'il y en a une qui porte plus anciennement le nom d'*Orchus*.

28. SATYRE Pénéla.

SATYRUS Penelea.

Sat. alis suprà fuscis, immaculatis: posticis subtus basi cinereis arcu longitudinali lutescente, tunc ad angulum externum castaneis, ad internum subviolaceis ocellis 2-4.

Papilio N. Penelea, alis dentatis, suprà fuscis: subtus omnibus ocellis duobus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 55. n.º 368.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 92. n.º 286.*

Papilio Penelea. CRAM. pl. 101. fig. 6.

Papilio Peneleus. HERBST, Pap. tab. 194. fig. 3.

On a placé ce lépidoptère dans la division des NYMPHALES, mais il a bien tous les caractères des SATYRES.

Son envergure est de deux pouces & un quart. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Le dessous des premières est à peu près de la couleur du dessus, avec deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaune, placés sur un fond violâtre vis-à-vis du sommet, entre deux lignes anguleuses d'un brun-foncé & allant de la côte au bord opposé.

Le dessous des secondes ailes est cendré vers son origine; d'un brun-marron vers le sommet, avec un espace jaunâtre, longitudinal, se dirigeant de la base au tiers postérieur de la surface, où le fond devient violâtre, & présente, en tirant du côté de l'angle anal, quatre yeux comme ceux des ailes supérieures, mais dont les deux extrêmes plus petits & manquant quelquefois. Ces yeux sont séparés du bord terminal par deux lignes ondulées, dont l'extérieure jaunâtre, l'intérieure d'un brun-foncé. On en voit une, pareille à cette dernière, près de la base.

De la Guyane & du Brésil.

29. SATYRE Péribas (1).

SATYRUS Peribas.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, ocello unico: subtus griseis, strigà flavescente punctisque anticarum 2 albis, posticarum 5-6 atris.

Papilio S. Peribæa, alis dentatis, fuscis: anticis ocello obsoleto, subtus strigà flavescente, posticis punctis ocellaribus atris. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 254. n.º 730.*

Il est à peu près de la taille des deux précédents. Ses ailes sont dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec un grand oeil noir à iris jaunâtre & à prunelle

(1) Nous avons changé le nom que Fabricius a donné à cette espèce, parce qu'il y a une pierre appelée *Peribæa*.

blanche sur les supérieures, & un petit œil peu prononcé sur les inférieures. Celles-ci ont le bord terminal rayé.

Le dessous des quatre ailes est gris, avec une ligne jaunâtre, transversale, indépendamment de laquelle il y a sur les premières deux points blancs, très-petits, & sur les secondes cinq à six points oculaires d'un noir-foncé.

Il se trouve à Surinam.

30. SATYRE *Dénina* (1).

SATYRUS Denina.

Sat. alis repandis, supra fuscis: subtus cinereis, fuscis communi albidis, mediâ; posticis ocellis sex ternatis, quarto majori.

Papilio S. Delila, alis repandis, fuscis: anticis oculo minuto: subtus anticis ocellis duobus, posticis sex, quarto majori. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 254. n. 731.

Il est de moyenne taille; d'un brun-obscur en dessus, avec un œil très-petit au sommet des ailes supérieures.

En dessous le fond des quatre ailes est cendré, avec une bande blanchâtre, transversale & discoïdale, indépendamment de laquelle les premières ont deux yeux noirs, dont le postérieur plus grand, & les secondes six, rapprochés trois à trois, petits, à l'exception du quatrième qui est très-grand. Tous ces yeux ont une prunelle blanche. Les antennes sont noirâtres, avec la base & le bout de la massue ferrugineux.

Fabricius le dit de la Guinée. Mais est-ce bien là qu'il se trouve?

31. SATYRE *Quantius*.

SATYRUS Quantius.

Sat. alis fuscis, supra immaculatis: posticis subtus fuscis mediâ limboque posteriori violaceo-cinereis, strigâ punctorum flavescens interpositâ.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un brun-obscur. Leur dessous n'a aucune tache.

Le dessous des ailes inférieures offre deux bandes d'un cendré-violet, l'une discoïdale, transversale & bordée par deux lignes un peu plus obscures que le fond; l'autre tout-à-fait terminale, dentée à son côté interne, & séparée de la précédente par une rangée transversale de six points jaunâtres.

Le dessous des ailes supérieures a le bord de derrière cendré & précédé de quatre points de la couleur de ceux des ailes inférieures, mais plus petits.

(1) Fabricius a employé deux fois le nom de *Delila*. D'abord pour la *Cétoïde*, que nous avons donnée sous le n. 2, ensuite pour l'espèce dont il est ici question.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Brésil à M. le chevalier Latreille.

32. SATYRE *Halyma*.

SATYRUS Halyma.

Sat. alis dentatis, supra fuscis, immaculatis: subtus pallidis, sulco fasciatis; anticis ocellis quinque, posticis septem. FAB.

Papilio S. Halyma. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 245. n. 758.

N'ayant pas vu ce lépidoptère, nous le donnons d'après la description que Fabricius en a faite.

Il a le port de l'*Eudora*, c'est-à-dire, qu'il n'a guère que deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous est blanchâtre, avec une bande discoïdale, large, plus claire dans son milieu, & quelques lignes transversales, fauves. Les ailes supérieures ont en outre cinq yeux, dont le second plus gros; & les inférieures sept, dont le troisième & le septième également plus gros.

Des Indes occidentales.

33. SATYRE *Hermès*.

SATYRUS Hermes.

Sat. alis integerrimis, fuscis, supra immaculatis: subtus strigis duabus ferrugineis apiceque griseis; posticis ocellis quinque, 3^o, 4^o, 5^o, bipupillatis.

Papilio N. Hermes? alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis: posticis ocellis sex, tribus caecis. FAB. Syst. Ent. p. 487. n. 195. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 65. n. 292.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 32. n. 559.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n. 486.*

Papilio Hermes? HERBST, Pap. tab. 192. fig. 4.

Papilio Antonae. CRAM. pl. 60. fig. E. F.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont bien entières. Leur dessous est d'un brun-obscur & sans taches.

Leur dessous a environ la moitié antérieure du même brun, avec deux raies ferrugineuses, obliques & légèrement sinuées. L'autre moitié est d'un gris un peu violet, avec une rangée de trois yeux aux ailes supérieures; avec une rangée de cinq, dont le second & l'anal très-noirs & plus grands, aux inférieures. Ces yeux ont tous un iris jaune & une prunelle blanche, mais la prunelle des trois postérieurs des secondes ailes est double. Il y a en outre le long du bord terminal de chaque aile une double ligne obscure.

De la Guzane & du Brésil.

Nota. Fabricius dit que les ailes inférieures ont six yeux, dont trois sans prunelle. Cependant

la figure de Cramer, à laquelle il renvoie, n'en indique que cinq, ce qui est conforme à ce que nous avons vu.

34. SATYRE *Ocypète*.

SATYRUS Ocypete.

Sat. alis suprà fuscis, immaculatis : subtus violaceo-griseis, strigis quinque ferrugineis ; posticorum margine dentato ocellis sex bipupillatis, posteriori remotissimo.

Papilio N. Ocypete ? alis dentatis, suprà fuscis, immaculatis : subtus glaucis, strigis tribus obscuris ; posticis ocellis quinque. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 96. n^o. 296.

Papilio Helle ? CRAM. pl. 194. fig. F. G.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses premières ailes sont très-entières, les secondes assez fortement dentées. Le dessus des unes & des autres est d'un brun-cendré, un peu chatoyant & sans taches.

Le dessous est d'un gris-violet-luisant, avec quatre raies communes d'un ferrugineux-obscur, mais plus particulièrement l'avant-dernière, sur laquelle les ailes supérieures ont deux à trois yeux peu apparens ; & les inférieures cinq contigus, dont le second & le cinquième plus gros & ayant, ainsi que les trois autres, un iris jaune & une double prunelle argentée. Les ailes inférieures ont un sixième œil, très-petit & placé à leur bord interne sur la raie précédente. Elles offrent en outre, très-près de leur naissance, une petite raie ferrugineuse qui se prolonge rarement sur les ailes supérieures. A tous les caractères que nous venons d'indiquer, il faut ajouter encore pour le dessous de toutes les ailes une double ligne noirâtre, terminale.

De la Guyane & du Brésil.

N. B. L'*Ocypète* de Fabricius, ou *Helle* de Cramer, ressemble bien au lépidoptère dont il s'agit ici, mais il n'a que cinq yeux ; celui du bord interne manque. Ce sixième œil est, il est vrai, fort petit, & par cette raison peu distinct.

35. SATYRE *Argulus*.

SATYRUS Argulus.

Sat. alis subintegris, suprà fuscis, immaculatis : subtus pallidioribus, strigis tribus ferrugineis ; posticis ocellis quinque bipupillatis.

Papilio Argante. CRAM. pl. 204. fig. c. d.

Fabricius le rapporte au satyre que nous donnons sous le nom de *Canthéus* (voyez n^o. 56) ; mais nous avons cru devoir l'en séparer, par la raison que les yeux des secondes ailes sont bipupillés, & seulement au nombre de cinq.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le

dessus des ailes est d'un brun-obscur & sans taches.

Le dessous est d'un brun plus clair que le dessus, avec trois lignes d'un ferrugineux-sombre, entre la seconde & la postérieure desquelles les ailes supérieures ont une rangée de trois à quatre yeux plus ou moins distincts ; & les ailes inférieures une rangée de cinq yeux presque égaux, noirs, avec un iris jaunâtre & une double prunelle argentée. Sur le bord terminal, qui est sinué aux secondes ailes, on voit, en dessus comme en dessous, une ligne blanchâtre que précède en dehors une ligne noirâtre.

De Surinam.

36 SATYRE *Myncea*.

SATYRUS Myncea.

Sat. alis integris, suprà fuscis : subtus griseis, strigis quatuor ferrugineis ; posticis ocellis quinque bipupillatis, anali suprà conspicuo.

Papilio Myncea. CRAM. pl. 293. fig. C.

Papilio Mynceus. HERBST, Pap. tab. 195. fig. 3.

On seroit tenté de le prendre pour notre *Ocypète*, sans les différences ci-après : il a environ un demi-pouce de moins ; les ailes inférieures sont entières ou à peine sinuées ; leur dessus offre à l'angle anal, du moins dans les individus que nous avons pu voir, un œil noir à double prunelle argentée & à iris jaune ; on aperçoit aussi, mais d'une manière moins distincte, un œil au sommet des ailes supérieures.

En dessous, où le fond est gris & sans reflet violâtre, les secondes ailes n'ont pas, comme dans l'*Ocypète*, la petite raie ferrugineuse qui avoisine la base, & le sixième œil placé près du bord interne.

De la Guyane & du Brésil.

37. SATYRE *Crantor*.

SATYRUS Crantor.

Sat. alis integerrimis, fuscis : posticis suprà ocello unico bipupillato ; subtus quinque, primo quartoque bipupillatis. FAB.

Papilio N. Crantor. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n^o. 489.

Papilio Crantor. JON. Fig. piç. 4. tab. 18. fig. 1.

Papilio Crantor. DOXOW. Of an Epitome of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 3. pl. 5. fig. 4.

Fabricius le décrit ainsi : il a le port & la taille du *Minéus*. Ses quatre ailes sont entières, d'un brun-obscur en dessus, sans aucune tache aux supérieures, avec un œil noir à iris jaune & à double prunelle aux inférieures.

En

En dessous, le fond est plus pâle qu'en dessus, avec des raies transverses très-obscurées, indépendamment desquelles les ailes de devant ont deux yeux, & celles de derrière cinq, dont le premier & le quatrième, à partir d'en bas, très-noirs & à double prunelle, le troisième & le cinquième sans prunelle.

Du Brésil.

38. SATYRE *Celmis*.

SATYRUS Celmis.

Sat. alis subintegris, fuscis: subtus strigis tribus obscurioribus; posticis ocellis quinque, 2^o. & 3^o. obsoletis, 4^o. bipupillato majoreque.

Nous n'avons vu que le mâle de ce satyre.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures; avec un œil noir à iris jaune & à prunelle blanche vers l'angle anal des inférieures.

Le dessous est un peu plus clair que le dessus, avec trois lignes transverses très-obscurées, entre l'extérieure & l'intermédiaire desquelles les ailes de devant ont un petit œil peu distinct, & les ailes de derrière une rangée de cinq yeux, dont le second & le troisième presque effacés, les trois autres noirs, ayant un iris jaune & une prunelle blanche, laquelle est double au quatrième œil qui est le plus grand de tous. Le bord terminal de chaque aile est en outre longé par une double ligne noirâtre, llexueuse, & un tant soit peu sensible en dessus.

Du Brésil.

39. SATYRE *Pénélope*.

SATYRUS Penelope.

Sat. alis integris, suprâ fuscis, oculo unico: subtus griseiscentibus, strigis duabus ferrugineis; anticis angulo uni lutescente, posticis ocellis duobus bipupillatis.

Papilio N. Penelope, alis subdentatis, fuscis, oculo unico: posticis subtus duobus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 96. n^o. 298.*

Papilio Clarissa. CRAM. *pl. 293. fig. D. E.*

Papilio Clarissus. HERBST, *Pap. tab. 195. fig. 6. 7.*

Cette espèce paraît bien être la même que le *Clarissa* de Cramer.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un œil noir à iris fauve & à prunelle argentée au sommet des supérieures; avec un œil semblable, mais un peu plus gros & bipupillé, près de l'angle anal des inférieures.

En dessous, où le fond est d'un gris légèrement violâtre, avec deux raies obliques d'un ferrugi-

neux-obscur, les premières ailes ont vers l'angle postérieur un espace d'un jaune-fauve, & à l'angle du sommet trois taches argentées, entre la première & la seconde desquelles il y a un œil correspondant à celui du dessus, mais bipupillé. Les ailes inférieures ont également trois taches argentées, dont l'antérieure appuyée sur la côte, les deux autres groupées entre deux yeux noirs à iris jaune & à double prunelle argentée. Indépendamment de cela, on voit le long du bord terminal de chaque aile trois lignes noires, dont la plus intérieure inégalement dentée & précédée d'atomes obscurs.

De la Guyane.

40. SATYRE *Lydius*.

SATYRUS Lydius.

Sat. alis integris, albis: subtus fuscis quatuor ferrugineis; posticis ocellis tribus, anali majore bipupillatoque.

Papilio Lydia. CRAM. *pl. 148. fig. C. D.*

Nous ne connoissons ce satyre que par l'individu que Cramer a figuré, & cet individu paroît être une femelle.

Son envergure est de deux pouces & un quart. Le dessus des premières ailes est d'un brun-obscur, avec à peu près la moitié antérieure du bord interne d'un blanc-sale.

Le dessus des secondes ailes est d'un beau blanc, avec le limbe terminal chargé de deux yeux écartés, derrière lesquels il y a deux lignes noires, flexueuses.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc un peu violâtre, avec quatre bandes ferrugineuses, communes & obliques, dont la postérieure plus large, offrant aux premières ailes deux yeux contigus, & aux secondes trois dont l'antérieur plus petit, l'anal plus gros & bipupillé. Ces yeux sont noirs, avec l'iris jaune, & la prunelle argentée. Il y a en outre trois points argentés entre le second œil & celui de l'angle de l'anus, & le bord postérieur de toutes les ailes est longé par deux lignes noires, dont l'intérieure en feston.

De Surinam.

Nota. Fabricius rapporte son papillon *Lydia* à celui de Cramer, mais il y a bien de la différence entre l'un & l'autre.

41. SATYRE *Ocyrrhoe*.

SATYRUS Ocyrrhoe.

Sat. alis integris, suprâ niveis, apice fusco: subtus fuscis, fuscis tribus albis; posticis ocellis quinque, 3^o, 4^o, 5^o. bipupillatis.

Papilio N. Ocyrrhoe, alis dentatis, suprâ albis, apice fuscis: subtus fuscis, fuscis duabus

albis ; posticis ocellis quinque. FAB. Ent. *Syst.* em. tom. 5. pars 1. p. 96. n°. 297.

Papilio Ciffia. GRAM. pl. 148. fig. C. D.

SULZ. *Inf. edit.* ROEM. tab. 17. fig. 3. 4.

SEBA, *Muf.* 4. tab. 38. fig. 3. 4.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un beau blanc-fatiné, avec toute la côte, & à peu près le tiers postérieur des premières d'un brun-noirâtre ; avec une double ligne ondulée de cette couleur sur le bord terminal des secondes.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec trois bandes blanches, commuées & obliques, dont l'antérieure moins vive & moins large ; plus une rangée d'yeux à iris jaune & à prunelle argentée sur le linal & postérieur, lequel est grisâtre & coupé dans toute sa longueur par deux lignes noirâtres dont l'inférieure flexueuse. Les yeux des ailes supérieures sont au nombre de trois ou de quatre ; ceux des ailes inférieures au nombre de cinq, dont le deuxième & le cinquième très-noirs & plus gros ; le troisième & le quatrième ayant, ainsi que l'anal, la prunelle double.

La femelle a la côte des premières ailes plus largement bordée de noirâtre, & les secondes ailes ont souvent en dessus un petit œil qui correspond à l'anal de la surface opposée.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Cramer dit que les mâles sont tout blancs en dessus. Cela peut être vrai à l'égard de quelques individus ; mais en général ils ont du brun aux cuadrats que nous avons indiqués. Ils en ont même parfois, ainsi que certaines femelles, avant la double ligne marginale du dessus des secondes ailes.

42. SATYRE BRIXIUS.

SATYRUS Brixius.

Sat. alis integris, teneris, cœrulescentibus, strigis utrinque sex fuscis : posticarum quartâ subtus ocellis quinque bipupillatis.

Il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-cendré, avec six raies transverses, & une double ligne terminale, d'un brun-noirâtre.

En dessous, on retrouve le dessin du dessus, mais le fond est plus clair, & la quatrième raie des ailes inférieures offre cinq yeux dont le premier, le second & le dernier à iris blanchâtre, les deux autres sans iris. Tous ces yeux sont noirs avec une double prunelle argentée.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du Brésil par M. le chevalier de Langsdorff.

43. SATYRE PÆON.

SATYRUS Pæon.

Sat. alis omnibus dentatis, suprâ fuscis : posticis subtus basi apiceque stravescentibus, tunc fuscis, ocellis quatuor bipupillatis per paria diffusa approximatis.

Nous décrivons ce satyre d'après un individu unique.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont dentées, surtout les inférieures. Leur dessus est d'un brun légèrement obscur avec une double ligne noirâtre, ondulée & terminale.

Le dessous des premières ailes est un peu plus pâle que le dessus, avec quatre lignes noirâtres, transverses, dont deux sur le milieu, & deux le long du bord postérieur. Il y a en outre un point blanc, oculaire, vis-à-vis du sommet.

Le dessous des secondes ailes a environ la moitié antérieure & l'angle externe jaunâtres & piqués de noirâtre ; le reste de la surface d'un brun très-obscur, avec quatre yeux noirs à double prunelle blanche & à iris nébuleux. Ces yeux sont rapprochés deux à deux, les uns du bord d'en haut, les autres du bord interne. A la double ligne marginale du dessus répond une ligne semblable, & la moitié jaunâtre, qui a le côté postérieur très-finué, offre dans son milieu une raie noirâtre, transversée & atteignant les deux bords.

Du Brésil.

44. SATYRE GRIMON.

SATYRUS Grimon.

Sat. alis subintegris, fuscis : subtus strigis tribus obcursoribus undatis ; posticis ocellis duobus alteroque bipupillatis, maculis flavidis duabus interpositis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes, dont le bord terminal est entier ou à peine dentelé, sont d'un brun faiblement obscur de part & d'autre. Leur dessus est sans taches.

Leur dessous offre trois lignes plus obscures, transverses & ondulées, entre l'intermédiaire & l'extérieure desquelles les secondes ailes ont une rangée de cinq taches, dont l'antérieure, la suivante & la postérieure oculaires, noires, avec une double prunelle blanche & un iris d'un jaune-rouillâtre ; la troisième & la quatrième jaunâtres & un tant soit peu réniformes. Les premières ailes ont aussi deux taches jaunâtres, semblables, & surmontées d'un œil bipupillé. Il y a en outre, le long du bord postérieur des quatre ailes, une double ligne noirâtre, dont l'empreinte se fait sentir en dessus.

Décrit d'après un seul individu, envoyé du Brésil par M. le chevalier de Langsdorff.

45. SATYRE MÆPIUS.

SATYRUS Mæpius.

Sat. alis integris, fuscis : subtus strigis tribus ferrugineis dimidioque apicali griseiscente ; posticis ocellis quinque bipupillatis, 2^o, 4^o, 5^o. supra conspicuis.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur.

Leur dessous est, à une légère nuance près, du même brun depuis la base jusqu'au milieu, avec deux lignes ferrugineuses & transversales; ensuite grisâtre jusqu'au bout, avec une raogée de quatre yeux aux ailes supérieures, & une rangée de cinq, dont le second, le quatrième & l'anul visibles en dessus, aux ailes inférieures. Ces yeux, que précèdent en dehors une ligne ferrugineuse & une double ligne noirâtre, ondulées, sont très-noirs, avec un iris jaunâtre & une double prunelle argentée. Parmi ceux des ailes supérieures, il en est deux, le premier & le dernier, dont l'impreinte se distingue en dessus.

De la Guyane.

46. SATYRE Pagyris.

SATYRUS Pagyris.

Sat. alis supra fuscis : subtus strigis duabus ferrugineis undatis ; posticis basi griseiscentibus, tunc flavescens, maculis argenteis utraq̃ue bipunctatâ.

Nous décrivons ce satyre d'après le seul individu qu'il nous a été possible d'obtenir.

Sa largeur est d'environ un pouce & demi. Le dessus des ses ailes est d'un brun foiblement obscur. Les supérieures sont entières & sans taches. Les inférieures sont dentées, blanchâtres vers l'angle de l'anus, avec une suite de trois points noirs, dont l'intermédiaire plus gros.

Le dessous des premières ailes est de la couleur du dessus, avec deux lignes ferrugineuses, transverses & ondulées, indépendamment desquelles il y a, le long du bord postérieur, une série de neuf à dix points argentés, peu brillans.

Le dessous des secondes ailes est grisâtre vers la base, avec deux lignes ferrugineuses faisant suite à celles des ailes de devant; puis jaunâtre jusque vers le bout, avec sept taches argentées, dont cinq, à peu près orbiculaires, rangées parallèlement au bord terminal; les deux autres, & surtout celle qui avoisine le bord interne, allongées & atteignant la seconde ligne ferrugineuse. Entre la quatrième & la cinquième taches orbiculaires, on en voit une noire, qui est grande, ovale, disposée transversalement, & chargée de deux gros points argentés. Sur le bord postérieur, dont le fond est du même gris que la base, il y a une double ligne noirâtre, flexueuse.

Du Brésil.

47. SATYRE Pharés.

SATYRUS Pharus.

Sat. alis integris, supra fuscis : subtus antice flavescens, posticis griseiscentibus, strigis tribus ferrugineis : posticarum utraq̃ue paginâ ocellis sex, 5^o. ditymo.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures; avec six yeux, dont le second & le quatrième plus gros, le troisième double, aux inférieures. Ces yeux sont noirs, avec une double prunelle argentée & un iris jaune.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-rouillâtre, avec le sommet d'un gris-rougâtre & marqué d'un ou de deux petits yeux.

Le dessous des secondes ailes est gris, aspergé de brun, avec les mêmes yeux que du côté opposé. Il y a en outre à chaque aile trois lignes d'un ferrugineux-obscur & légèrement ondulées, favori: deux vers la base, la troisième vers le bord postérieur, lequel est longé par une ligne noirâtre en feston.

Du Brésil.

Nota. Dans le nombre des individus que nous avons observés, il s'est trouvé une variété dont le dessus des secondes ailes n'estroit distinctement que les deux yeux qui avoisinent l'angle de l'anus.

48. SATYRE Tolumnia.

SATYRUS Tolumnia.

Sat. alis subintegris, teneris, fusco-cæruleiscentibus : subtus strigis quatuor ferrugineis ; posticis ocellis quinque, 4^o. elongato, cæters bipupillatis.

Papilio N. Tolumnia, alis dentatis, atris : posticis subtus strigis ferrugineis cæruleisque, ocellis quinque, postico majori FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n^o. 374. — Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n^o. 451. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 107. n^o. 350. (Le mâle.)

Papilio Tolumnia. CRAM. pl. 150. fig. F. G. (Le mâle.)

Papilio Chloris CRAM. pl. 295. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Tolumnia. HERBST, Pap. tab. 185. fig. 5. 6.

Papilio Chloris. HERBST, Pap. tab. 195. fig. 1. 2.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, & glacé de bleu vers l'angle anal des secondes ailes.

Le dessous de la femelle est d'un brun entièrement glacé de bleu.

Le dessous des deux sexes est d'un violet pâle & luisant, avec quatre raies obliques d'un ferrugineux-obscur, sur la troisième desquelles les

ailes de devant ont un petit œil plus ou moins distinct, & celles de derrière une rangée de cinq yeux, dont le quatrième, à partir d'en haut, oblong, argenté, bordé de fauve; le troisième brun, bordé comme celui que nous venons de citer, mais arrondi & bipupillé; les autres pareillement arrondis, noirs, avec un iris d'un jaune-paille & une double prunelle argentée. Le cinquième œil est très-grand, le second moyen, l'anérieur petit. Derrière les yeux, chaque aile a une double ligne noirâtre, terminale. Tous ces caractères s'aperçoivent en dessus, en raison de la ténacité des ailes.

Il habite la Guyane, le Brésil, l'île Saint-Thomas, &c. C'est par erreur que Fabricius dit que son *Tolamia* est des Indes orientales. D'ailleurs, la description qu'il en donne prouve qu'il l'a décrit d'après la figure de Cramer.

49. SATYRE ARANEA.

SATYRUS Aranea.

Sat. alis anticis suprâ fuscis, posticis nitidè-cyanèis: omnibus subtùs strigis tribus ferrugineis; posticis ocellis quinque 2^o. & 4^o. majoribus.

Papilio N. Aranea, alis subdentatis, fuscis: posticis carulefcntibus, subtùs ocellis quinque. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 97. n^o. 299.*

Papilio Ebusa. CRAM. *pl. 292. fig. F. G.*

La description que Fabricius donne de son papillon *Aranea* convient parfaitement à l'*Ebusa* de Cramer. Aussi ne balançons-nous pas à regarder l'un comme étant l'identique de l'autre.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, un peu chatoyant.

Le dessus des secondes est d'un bleu-luisant, avec le bord antérieur largement brun.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun légèrement glacé de bleu, avec trois raies communes d'un ferrugineux-obscur. La raie postérieure est précédée aux premières ailes de trois yeux, dont le supérieur bipupillé; & aux secondes de cinq, dont le deuxième & l'anal plus gros, noirs, ainsi que le premier, les deux intermédiaires bruns. Ces yeux ont un iris jaune & une prunelle blanche. Le bord postérieur de toutes les ailes est en outre longé par une ligne jaunâtre, bordée de noir.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De la Guyane & du Brésil.

50. SATYRE LÉA.

SATYRUS Lea.

Sat. alis subintegris, suprâ cyanèis: subtùs violaceo-fuscis, strigis tribus ferrugineis; posticis ocellis sex, 5^o. majore.

Papilio Lea. CRAM. *pl. 151. fig. C. D.*

Papilio Junia. CRAM. *pl. 292. fig. D. E.*

Fabricius y rapporte, avec doute il est vrai, son papillon *Aranea*.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, tantôt sans taches, tantôt avec le sommet des supérieures noirâtre.

Le dessous est d'un brun glacé de violet, avec trois raies communes d'un ferrugineux-obscur, savoir: deux disposées obliquement entre la base & le milieu, l'autre parallèle au bord terminal, lequel est un peu finué aux ailes inférieures. Ces ailes ont, dans l'espace qui sépare la raie postérieure de la précédente, six yeux dont le pénultième plus gros, noir, ainsi que les autres, & ayant comme eux une simple prunelle argentée & un iris jaunâtre. Les ailes supérieures offrent trois yeux, mais dont l'anérieur beaucoup plus distinct. Il y a en outre sur chaque aile une double ligne noirâtre, terminale.

De Surinam.

Nota. Nous avons réuni sous la même dénomination le *Lea* & le *Junia* de Cramer, parce que la seule différence qu'il y ait entre eux, c'est que le second est tout bleu en dessus, tandis que le premier a le sommet des ailes supérieures noirâtre. L'un est probablement le mâle, & l'autre la femelle.

51. SATYRE CLUERIA.

SATYRUS Clueria.

Sat. alis teneris, cinerascenti-violaceis: posticis dentatis, utrinquè ocellis quinis, subtùs lineis tribus, fuscis, & que brunneis, anticarum à costâ deductis.

Papilio S. Clueria, alis dentatis, fuscis: posticis fuscis caruleâ ocellis quinque atris, subtùs fuscis fuscis ocellis quinque. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 229. n^o. 716.*

Papilio Clueria. JON. *Fig. piâ. 4. tab. 9. fig. 2.*

Papilio N. PH. Cluena. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 7. fig. 5. 6.*

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont minces, d'un violet cendré en dessus, sans aucune tache aux supérieures; avec cinq yeux adhérens, noirs, à prunelle & à iris lilas aux inférieures. Ces dernières ailes ont le bord terminal denté & coupé dans toute sa longueur par une ligne violâtre en sillon.

Le dessous des quatre ailes est lilas, avec trois lignes brunes, dont la postérieure flexueuse, & séparée des autres par une bande brune, sur laquelle les ailes de devant ont deux ou trois yeux, celles de derrière cinq comme en dessus, mais plus petits, non adhérens, & ayant l'iris jaune, même le troisième & le quatrième qui sont bruns au lieu d'être noirs. Sur le bord postérieur, qui est brun, il

une ligne lilas, correspondant à celle de dessus. Les antennes sont rouffes, avec la massue noire. Du Brésil.

52. SATYRE Cornélius.

SATYRUS Cornelius.

Sat. alis integerrimis, obscurè cinereis : posticus ocellis quatuor approximatis. FAB.

Papilio S. Cornelius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 220. n° 689.*

Papilio Cornelius. JON. *Fig. pict. G. tab. 49. fig. 2.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des ailes est d'un cendre-obscur, sans taches aux supérieures; avec quatre yeux bruns, contigus & marginaux, aux inférieures.

Le dessous est un peu plus pâle que le dessus, avec des ondes brunes. Aux yeux des ailes inférieures correspondent quatre yeux très-noirs à prunelle argentée.

Il habite....

(Traduction de Fabricius.)

53. SATYRE Doritis (1).

SATYRUS Doritis.

Sat. alis subintegris, suprâ fuscis : subtus cœruleo-fuscibus, strigis quinque fuscis ; posticarum tertâ ocellis quatuor per paria diffusa geminatis.

Papilio N. Doris, alis dentatis, fuscis : subtus cœruleis, nigro fuscatis, ocellis trium parium. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 101. n° 514.*

Papilio Doris. CRAM. *pl. 8. fig. B. C.*

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, sans taches aux supérieures, avec une ligne blanche, ondulée & terminale, aux inférieures.

En dessous, le fond des ailes est d'un brun-violet, pâle, avec cinq raies transverses, & une double ligne marginale, d'un brun-noirâtre. Sur la troisième raie, les ailes supérieures ont, près du bord d'en haut, deux yeux à prunelle blanche & à iris sauve; & les ailes inférieures quatre yeux semblables, dont deux groupés contre la côte, les deux autres contre le bord interne.

De la Guyane & du Brésil.

54. SATYRE Donès.

SATYRUS Donès.

Sat. alis cœruleo-fuscis : subtus strigis dua-

(1) Nous avons changé le nom de Fabricius, parce qu'il y a une héliconie qui porte le nom de *Doris*.

bus ferragineis ; posticus ocellis quinque ovatis & intus argenteo pulverulentis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-bleuâtre de part & d'autre. Le dessus des supérieures est sans taches. Le dessous des inférieures a, vers l'angle de l'aube, un gros point noirâtre, & le long du bord terminal, qui est plus ou moins denté, une double ligne fincée, également noirâtre.

En dessous, chaque aile offre une ligne marginale semblable, & l'on y voit trois lignes ferrugineuses, ondulées & transverses, dont la postérieure séparée des autres, mais seulement aux secondes ailes, par une rangée de cinq yeux ovales, dont le second, le troisième & le quatrième plus gros. Ces yeux, qu'entoure un iris d'un jaune-roussâtre, sont noirs du côté du bord postérieur de l'aile, bruns & couverts d'une poussière argentée du côté de la base. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont annelées de brun & de blanchâtre, & elles ont la massue rouffe, avec la sommité noire.

Il est des individus qui ont un œil de plus près de la côte des secondes ailes, mais il est plus petit & moins apparent que tous les autres.

Du Brésil.

55. SATYRE Canthus.

SATYRUS Canthus.

Sat. alis integerrimis, fuscis : subtus primoriibus ocellis quatuor, posticus senis. LINN.

Papilio D. F. Canthus. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 768. n° 129.*

Papilio Euridice. LINN. *Amœn. Acad. tom. 6. p. 406. n° 65.*

Fabricius a réuni ce lépidoptère au suivant; mais il nous paroît former une espèce différente, à en juger du moins par la description que voici.

Il ressemble à l'*Hyperanthus*. Ses ailes sont entièrement, d'un brun-obscur en dessous, avec de faibles vestiges d'yeux aux inférieures.

Le dessous des ailes supérieures a, vers le bord terminal, quatre yeux noirs à prunelle blanche.

Le dessous des inférieures a cinq yeux contigus, & un sixième séparé des autres.

Des environs de Philadelphie.

(Traduction de Linnæus, AMËN. ACAD.)

Nota. Nous n'avons pas voulu éloigner ce satyre de celui auquel Fabricius l'a réuni. Mais, s'il n'a que les caractères que nous venons de citer, sa place est à côté de l'*Hyperanthus* qui n'a que des yeux aux ailes.

56. SATYRE Canthéus.

SATYRUS Cantheus.

Sat. alis integris, suprâ fuscis, immaculatis : posticus subtus ocellis sex. FAB.

Papilio N. Canthus. FAB. *Syfl. Ent.* p. 486. n^o. 191. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 51. n^o. 555. — *Ent. Syfl. em. ton.* 5. pars 1. p. 157. n^o. 488.

Sa taille est à peu près la même que celle du précédent.

Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre & sans taches.

Le dessous est un peu plus clair que le dessus, avec deux lignes ferrugineuses, obliques & courbées. Les ailes supérieures ont trois petits yeux peu prononcés. Les inférieures ont le bord terminal rayé, avec six yeux, dont le cinquième très-grand, le sixième très-petit & placé à l'angle de l'anus.

De l'Amérique septentrionale.

(Traduction de Fabricius.)

57. SATYRE Eurythris.

SATYRUS Eurythris.

Sat. alis integerrimis, fuscis, supra ocellis duobus bipunctatis remotisque: subtus strigis duabus ferrugineis; posticis ocellis quatuor geminatis posticisque totidem interjectis.

Papilio F. Eurytus, alis integerrimis, fuscis: anticis ocellis utrinque duobus; posticis supra unico, subtus quatuor: omnibus pupillâ geminâ. FAB. *Syfl. Ent.* p. 487. n^o. 194. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 65. n^o. 291. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 52. n^o. 557.

Papilio N. Eurytris. FAB. *Ent. Syfl. em. ton.* 3. pars 1. p. 157. n^o. 485.

Papilio Eurytris. HERBST, *Pap. tab.* 196. fig. 7. 8.

Papilio Cymela. CRAM. *pl.* 152. fig. C. D.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont entières, d'un brun faiblement obscur en dessus, surtout à leur extrémité où l'on voit deux yeux très-noirs à iris jaunâtre & à double prunelle argentée. Ces yeux sont très-éloignés l'un de l'autre, & séparés du bord terminal par une triple ligne noirâtre.

En dessous, le fond est encore plus pâle qu'en dessus, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, & placées vers le milieu de la surface. Aux yeux des premières ailes correspondent deux yeux semblables, mais entre lesquels il y a deux doubles points argentés. Les secondes ailes ont quatre yeux, savoir : deux, dont l'anérieur plus petit, près de la côte, & deux, dont le postérieur aussi plus petit, près de l'angle de l'anus; sans compter deux doubles points argentés, intermédiaires, & entourés quelquefois d'un nis jaunâtre. Après les yeux viennent trois lignes noirâtres, terminales. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & leur massue est ferrugineuse.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale & à la Jamaïque. C'est donc d'après des renseignements inexacts que Fabricius le dit du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Dans certains individus, le plus petit des deux yeux de l'angle anal des ailes inférieures paroît en dessus; ce qui fait de ce côté trois yeux, au lieu de deux.

58. SATYRE Aréolé (1).

SATYRUS Areolatus.

Sat. alis integerrimis, nigro-fuscis, supra immaculatis: subtus strigis duabus circumloque ferrugineis, posticis ocellis sex, 3^o, 4^o, 5^o, valde elongatis.

Papilio S. Areolatus, alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis: subtus strigâ communi marginique circumloque testaceis; pmonibus ocellis quatuor, posticis sex, intermediis elongatis. SMITH-ABBOT, *The Nat. Hist. of the rarer Lepid. Inf. of Georgia*, vol. 1. p. 25. tab. 15.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes font bien entières & d'un brun-noirâtre. Leur dessus est sans taches.

Leur dessous est un peu plus clair que le dessus, avec deux lignes ferrugineuses & transversales, dont l'une vers la base, l'autre le long du bord postérieur. Entre ces lignes, il y a un cercle allongé, également ferrugineux, dans lequel les premières ailes ont trois à quatre yeux, ronds, noirs, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaune. Ce cercle renferme aux secondes ailes six yeux, dont le troisième, le quatrième & le cinquième très-oblongs & ayant la prunelle ovale, les autres arrondis comme ceux des ailes de devant.

La chenille, selon Abbot, est d'un vert-foncé, avec des raies longitudinales plus claires. Elle vit sur le *barbon penché* (*andropogon nutans*).

La chrysalide est verdâtre, & lulpéduer par la queue. Le papillon écède en juin. On le trouve communément en Georgie, le long des ruisseaux.

59. SATYRE Phocion.

SATYRUS Phocion.

Sat. alis integerrimis, supra fuscis, immaculatis: posticis subtus strigis flavis ocellisque tribus oblongis. FAB.

Papilio S. Phocion. FAB. *Ent. Syfl. em. ton.* 3. pars 1. p. 218. n^o. 685.

Fabricius le décrit ainsi : il est petit. Le dessus

(1) Abbot a appelé ce satyre *Areolatus*, pour indiquer qu'il a sous chaque aile une aire ou surface ovale, renfermant des yeux. Nous ne pouvions donc traduire ce nom que par le mot *aréolé*, mot que les botanistes emploient à peu près dans le même sens.

de les quatre ailes & le dessous des supérieures font d'un brun-obscur, & sans taches.

Le dessous des inférieures est également d'un brun-obscur, & l'on y voit quatre lignes jaunes, transversales, dont la seconde & la troisième se réunissent par leurs extrémités & embrassant trois yeux très-allongés, noirs, avec un iris jaune & une prunelle formée de plusieurs points argentés.

La patrie de ce satyre n'est pas indiquée; mais l'analyse nous fait soupçonner qu'il habite l'Amérique.

60. SATYRE Herféis.

SATYRUS Herféis.

Sat. alis integris, teneris, carulescentibus: posticis subtus strigis tribus ferrugineis, angulatis, ocellisque quinque, 5^o. & 4^o. elongatis.

Papilio Herfè. CRAM. pl. 10. fig. C. D.

Son envergure est approchant de deux pouces. Ses ailes sont très-minces. Leur dessus est d'un brun glacé de bleuâtre.

Leur dessous est à peu près de la couleur du dessus, avec trois raies d'un ferrugineux-obscur, obliques aux ailes supérieures; anguleuses, surtout l'intermédiaire & la suivante, aux ailes inférieures. Sur la raie postérieure, les ailes de devant ont un petit œil faisant face au sommet; & celles de derrière une rangée de cinq yeux, dont le troisième & le quatrième, à partir d'en haut, oblongs, argentés & bordés de jaune. Les autres yeux sont ronds, noirs, avec un iris jaune & une prunelle argentée, laquelle est double à l'œil le plus voisin de l'angle anal. Il y a en outre, tout le long du bord postérieur de chaque aile, deux lignes noires, parallèles, dont l'empreinte, ainsi que celle des raies ferrugineuses & des yeux, s'aperçoit en dessus.

De la Guyane & du Brésil.

Décrit d'après Cramer.

61. SATYRE Pacarus.

SATYRUS Pacarus.

Sat. alis integris, nigricanti-fuscis, suprâ immaculatis: subtus anticis strigis duabus obscurioribus undatis, posticis tribus ocellisque quinque atomis papillaribus argenteis.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, & d'un brun-noirâtre de part & d'autre. Leur dessus est sans taches.

Leur dessous offre, vers l'extrémité, deux lignes plus obscures que le fond. Les secondes ailes ont une troisième ligne semblable, placée transversalement vers le milieu, & séparée des autres par une rangée de cinq yeux ronds, très-noirs, ayant une prunelle formée par des atomes argentés, & un iris brunâtre qu'entoure un cercle plus foncé. Les premières ailes n'ont pas d'yeux.

Décrit sur un individu unique, pris au Brésil.

62. SATYRE Périphas.

SATYRUS Periphās.

Sat. alis integerrimis, fuscis, suprâ oculo unico: subtus strigis ferruginea; posticis ocellis tribus punctisque quatuor interjectis.

Il diffère de l'*Eurythris*, en ce qu'il est plus petit; en ce que le dessus des quatre ailes & le dessous des supérieures n'offrent qu'un seul œil; en ce que le dessous des inférieures n'a que trois yeux, savoir: un près de la côte, & deux, dont le postérieur plus petit, près de l'angle de l'anus; enfin, en ce qu'il n'y a qu'une ligne brune, au lieu de deux, sur le milieu de la surface inférieure de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique, pris au Brésil.

63. SATYRE Solybius.

SATYRUS Solybius.

Sat. alis integerrimis, fuscis, suprâ immaculatis: subtus strigis tribus liturâque centrali obscurioribus; posticis ocellis sex, 5^o. & 4^o. oboletois.

Papilio S. Solybius, alis integerrimis, suprâ fuscis, immaculatis: subtus anticis ocellis quinque; posticis sex, intermediis cæcis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 219. n^o. 684.

Papilio Solybius. JOS. Fig. piç. 6. tab. 52. fig. 2.

Papilio Camerta. CRAM. pl. 293. fig. F.

Papilio Camertus. HERBST, Pap. tab. 195. fig. 8.

La description que Fabricius donne de ce satyre ne permet pas de douter que ce ne soit le même que le *Camerta* de Cramer.

Il est petit. Ses ailes sont entières & d'un brun-obscur. Leur dessus n'a pas de taches.

Leur dessous, qui est un peu plus clair que le dessus, offre trois lignes très-obscurcs, transversales & ondulées. Entre la ligne antérieure & la seconde, il y a une liture discoidale, également très-obscurc; &, entre la seconde & la troisième lignes, une rangée de quatre à cinq yeux aux ailes supérieures, & une rangée de six aux inférieures. Les yeux des ailes de devant sont plus ou moins distincts. Ceux des ailes de derrière sont noirs, avec une simple prunelle blanche & un iris jaunâtre; mais le premier, le second & le troisième sont parfois moins prononcés, & même presque nuls. Ce qui a fait dire à Fabricius qu'ils étoient sans prunelle. Indépendamment des trois lignes dont nous venons de parler, il en

exulte une noirâtre, qui est double & tout-à-fait terminale.

La femelle ressemble au mâle.
De la Guyane & du Brésil.

64. SATYRE Galéfus.

SATYRUS Galefus.

Sat. alis integris, fuscis, supra immaculatis: subtus strigis tribus obscurioribus; anticis punctis nullis, posticis quinque nigricantibus.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Ses quatre ailes sont entières & d'un brun faiblement obscur. Leur dessus est sans tache.

Leur dessous offre trois lignes plus obscures, dont l'intermédiaire éclairée de gris-violet en dehors, la postérieure très-fine & en fesson. Cette dernière ligne est séparée de la précédente, mais seulement aux secondes ailes, par une rangée de cinq points noirâtres. Les premières ailes n'ont aucun point, du moins dans l'individu d'après lequel nous donnons cette description.

Du Brésil.

65. SATYRE Phronius.

SATYRUS Phronius.

Sat. alis integris, supra fuscis, limbo suturatiore: subtus flavidis, undis strigisque tribus fuscis; anticis puncto, posticis quatuor, albis.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec le limbe postérieur plus foncé.

Le dessous est jaunâtre, avec une multitude d'ondes, & trois lignes transverses, d'un brun-obscur. La ligne postérieure est flexueuse, précédée aux premières ailes d'un seul point blanc, & aux secondes de quatre, dont les deux extrêmes cerclés de noir.

Décrit d'après un individu sans corps & sans antennes, envoyé du Brésil.

66. SATYRE Mélusine.

SATYRUS Melusina.

Sat. alis supra fuscis, disco pallidioris: subtus, albidis; anticis ocellis duobus distinctis, posticis septem approximatis, 4^o. & 5^o. majoribus.

Papilio N. Melusina, alis dentatis, fuscis, disco albo: subtus albidis, anticis ocellis duobus, posticis septem. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n^o. 450.

Papilio S. Melusina. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3 pars 1. p. 240. n^o. 750.

Papilio S. Miriam, alis dentatis, fuscis: subtus cinereis, anticis ocellis duobus, posticis

septem. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 242. n^o. 754.

Papilio Miriam. JON. Fig. pict. 6. tab. 52. fig. 2.

Papilio Miriam. HERBST, Pap. tab. 204 fig. 3. 4.

Papilio Dorothea. CRAM. pl. 204. fig. E. F.

Il suffit de rapprocher la description du papillon *Melusina* de Fabricius, de celle de son papillon *Miriam*, pour être convaincu sur-le-champ qu'ils ne forment qu'une seule & même espèce.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec le milieu des supérieures & la base des inférieures beaucoup plus pâles. Les ailes supérieures sont entières, les inférieures sont légèrement dentées.

Le dessous des unes & des autres est d'un blanc-faile, avec tout le pourtour extérieur largement couvert d'atomes obscurs, & une ligne en zig-zag de cette couleur sur le milieu de la surface. Entre cette ligne & le bord terminal, les ailes de devant ont deux yeux très-écartés, dont le postérieur plus grand. Les ailes de derrière en ont sept contigus, dont le quatrième & le cinquième aussi plus grands. Ces yeux sont noirs, avec la prunelle blanche & l'iris jaune, & le bord qu'ils avoient est divisé dans toute la longueur par une double ligne noirâtre, flexueuse. Le corps est brun en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont obscures, avec la massue ferrugineuse.

Ce satyre n'est ni des Indes, ni de Sierra-Leone, comme le disent Fabricius & Cramer; mais de l'île King (mer du Sud), d'où il a été rapporté par MM. Péron & le Sueur.

Nota. Le dessus des secondes ailes est garni près de la base d'un faisceau de poils grisâtres, divergens.

67. SATYRE Byfès.

SATYRUS Byfès.

Sat. alis integris, teneris, supra caerulefcentifuscis: subtus caerulefcentibus, fusco undatis; posticis ocellis duobus punctis,que totidem albis interjectis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont entières, minces. Leur dessus est d'un brun-violet, sans aucune tache.

Leur dessous est lilas, finement ondé de brun, avec une rangée transverse de trois à quatre petits points blancs vis-à-vis du sommet des ailes supérieures; avec deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-paille près du bord terminal des inférieures. Ces yeux sont très-éloignés l'un de l'autre, & il y a entr'eux deux points blancs ou jaunâtres. Le corps est brun en dessus, plus clair

clair en dessous. Les antennes sont annelées de brun & de blanc, & leur massue est rouffâtre, avec l'extrémité noire. Les pattes sont jaunâtres. Du Brésil.

68. SATYRE Polixènes.

SATYRUS Polixenes.

Sat. alis integris, fuscis : posticis subtus fusco griseoque nebulosis. FAB.

Papilio N. Polixenes. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 152. n. 466.*

Le corps est velu, noir. Le dessus des quatre ailes & le dessous des supérieures sont d'un brun-obscur, sans taches.

Le dessous des inférieures est piqué de gris & de brun, avec une bande plus obscure sur le milieu.

De l'Amérique méridionale.

(Décrit d'après Fabricius.)

69. SATYRE Echo.

SATYRUS Echo.

Sat. alis dentatis, fuscis : anticis utrinque areâ apicis ferrugineâ : singulis subtus strigâ posticâ punctorum alborum.

Papilio N. Echo, alis dentatis, fuscis : omnibus subtus strigâ punctorum alborum. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 91. n. 599. — Mant. Inf. tom. 2. p. 49. n. 484. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 180. n. 503.*

Papilio Echo. СВАМ. *pl. 57. fig. C. D.*

Il a près de trois pouces d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-obscur. Les premières, dont le bord postérieur est entier, ont de part & d'autre, près de leur extrémité, un espace ferrugineux en forme de bande transverse. Les secondes ailes sont dentées, & sans aucune tache en dessous.

Le dessous des quatre ailes est traversé par une rangée postérieure de points blancs.

De Surinam.

70. SATYRE Gripus.

SATYRUS Gripus.

Sat. alis integris, corticino-fuscis : anticis utrinque apice flavis : singulis subtus strigâ mediâ punctorum alborum.

Papilio N. Gripus, alis integris, subfuscis : subtus strigâ punctorum alborum. FAB. *Syst. Ent. append. 829. — Spec. Inf. tom. 2. p. 58. n. 255. — Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n. 294. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 149. n. 457.*

Papilio Gripus. HERBST, *Pap. tab. 155. n. 3. 4.*

Hist. Nat. Inf. Tom. I.X.

Papilio Eumea. СВАМ. *pl. 185. fig. C. D.*

Papilio Eumeus. DRURY, *Inf. tom. 1. pl. 2. fig. 5.*

Il a environ trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont arrondies & entières. Le dessus des premières est d'un brun-tanné, avec une bande jaunâtre, large, courbe & presque terminale. Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache.

Le dessous des quatre ailes est approchant de la couleur du dessus, avec une rangée transverse & presque centrale de gros points blancs, renfermée entre deux lignes noires, dont l'antérieure plus distinte.

De l'Inde, selon Fabricius; de la Chine, selon Cramer & Drury.

71. SATYRE? Arcefilaus.

SATYRUS Arcefilaus.

Sat. alis integerrimis, supra ferrugineis, immaculatis : subtus fuscis, strigis duabus obscurioribus punctorum flavescentium seriem includentibus.

Papilio N. Arcefilaus? alis integerrimis, supra ferrugineis, immaculatis : subtus fuscis, strigis duabus obscurioribus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 153. n. 470.*

Papilio Arcefilaus. DONOV. *Of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 2. pl. 1. fig. 2.*

Comme nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure, nous ne sommes pas bien certains qu'il appartienne au genre SATYRE.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, ferrugineuses, & tout-à-fait sans taches en dessous.

Leur dessous est obscur, avec deux lignes transverses, encore plus obscures, & recfermant une rangée de points jaunâtres, très-petits. La base offre en outre, mais d'une manière moins distincte, une autre ligne obscure.

Du royaume de Siam.

Nota. Fabricius ne parle pas de la rangée de points jaunâtres du dessous des secondes ailes. Il est vrai que ces points sont peu apparents.

72. SATYRE Abeona.

SATYRUS Abeona.

Sat. alis dentatis, fusco-nigris : anticis utrinque fuscâ sesquialtera aurantiacâ ocellisque duobus : posticis subtus strigis duabus flavis ocellos totidem dispositos includentibus.

Papilio Abeona, alis dentatis, fuscis : anticis fuscâ testaceâ, ocellis duobus ; posticis supra ocello, subtus duabus. DONOV. *Gen. Illustr. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New Holl. pl. 22. fig. 1.*

Il a de deux pouces & demi à trois pouces d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun en dessus. Les premières, dont le bord postérieur est entier, ont, sur leur milieu, une bande orangée, transverse, anguleuse, rétrécie antérieurement; &, vers leur extrémité, deux yeux, dont l'inférieur plus gros & adhérent au côté externe de la bande, le supérieur séparé de cette même bande par une ligne ou par une liture orangée qui s'appuie obliquement sur la côte. Ces yeux sont bleus, avec la prunelle blanche & l'iris d'un noir-foncé. Les secondes ailes sont dentées, & elles ont deux yeux noirs à prunelle bleue; mais l'œil du bord d'en haut est sans iris; l'œil de l'angle anal au contraire en a un d'un rouge-fauve.

Le dessous des quatre ailes est moins foncé que le dessus. Celui des supérieures a, indépendamment des caractères que nous avons indiqués, deux points bleuâtres, placés entre les taches oculaires. Celui des ailes inférieures a deux yeux semblables à l'œil anal du dessus, & ils font renfermés entre deux lignes jaunes ondulées, dont l'extérieure double & se prolongeant sur le bord terminal des premières ailes. Le corps & les antennes sont d'un noir-brun.

Les femelles ressemblent aux mâles; cependant, chez quelques-unes, les taches oculaires du dessous des secondes ailes sont entourées d'un cercle blanchâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

75. SATYRE GÉLANOR.

SATYRUS Gelanor.

Sat. alis suprà fuscis, subvò maculatis : anticis puncto albo : posticis subtus violaceo-griseis, strigis duabus fuscis ocellis totidem dissitis includentibus. (La femelle.)

• Nous ne connoissons que la femelle de ce Satyre.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec des taches fauves. Les ailes supérieures en ont six, dont quatre, plus grandes, disposées obliquement sur le disque; les deux autres placées près du sommet & séparées par un point blanc. Les ailes inférieures en ont cinq, dont une, très-large, occupant le milieu du bord antérieur; les quatre autres groupées vers le bord terminal qui est dentelé. Il y a en outre près de l'angle de l'aune un œil noir à prunelle blanche & à iris fauve.

Le dessous des premières ailes ressemble beaucoup au dessus; mais il est plus pâle, & le sommet offre, sur un fond cendré, un petit œil surmontant le point blanc de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-violet-luisant, avec deux petits yeux, dont un

correspondant à celui du dessus, l'autre touchant presque le bord d'en haut. Ces yeux sont noirs, avec la prunelle blanche & l'iris obscur, & ils sont renfermés entre deux lignes brunes, flexueuses, dont l'antérieure discoïdale, la postérieure longeant le bord qui est brun. Le corps est obscur, avec un petit collier blanc & le haut du corselet ferrugineux.

De la Nouvelle-Hollande.

74. SATYRE MARDANIE.

SATYRUS Mardania.

Sat. alis dentatis, flavis : anticis apice nigris fasciâ albâ, posticis punctis quatuor ocellaribus flavis. FAB.

Papilio S. Mardania. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 249. n.º. 776.*

Papilio Mardania. JON. *Fig. piñ. 4. tab. 70. fig. 1.*

Le corps est obscur. Les premières ailes, dont le dessus est fauve & tacheté de brun-obscur, ont le sommet noir, avec une bande blanche. Les secondes ailes sont fauves en dessus, avec quatre points jaunes, oblongs, à prunelle noire, & suivis d'une ligne obscure, peu prononcée.

Le dessous des quatre ailes est verdâtre, nuancé de brun, avec une bande noirâtre sur le milieu, & une ligne de points également noirâtres vers le bord terminal. Les points supérieurs des ailes de devant ont un iris jaune.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

75. SATYRE? BLOMFILDA.

SATYRUS Blomfilda.

Sat. alis dentatis, flavis, apice nigris : posticis subtus fuscis, albo undatis, ocellis quatuor, intermediis cæcis. FAB.

Papilio N. Blomfilda. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 84. n.º. 570. — Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n.º. 447. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 106. n.º. 526.*

Ce Lépidoptère a été dédié par Fabricius à M. Blomfield, amateur anglais.

Il est grand, fauve en dessus. Ses ailes supérieures ont l'extrémité noire & glacée de bleu, avec trois taches blanches. Les ailes inférieures ont une ligne noire, marginale.

Le dessous des premières ailes est à peu près semblable au dessus.

Le dessous des secondes ailes est obscur, avec des traits sinueux & des anneaux blancs. Outre cela, il y a vers le bord terminal quatre yeux, dont l'antérieur noir, avec la prunelle blanche & l'iris ferrugineux; les deux intermédiaires verdâ-

tres, sans prunelle, & ayant l'iris gris; le postérieur rougeâtre, avec la prunelle blanche & l'iris noir.

Du Brésil.

(Traduction de Fabricius.)

76. SATYRE LYCAON.

SATYRUS LYCAON.

Sat. alis dentatis : anticis fuscis, flavo albo-maculatis : posticis ferrugineis, ocellis juxta cæcis; subtis variegatis, ocellis octo. FAB.

Papilio S. Lycaon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 228. n.º 714.*

Papilio Lycaon. JON. *Fig. pict. 4. tab. 17. fig. 1.*

Le corps est de médiocre grandeur, brun, avec les côtés de l'abdomen fauves. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun-obscur, tacheté de jaune & de blanc, avec un œil noir à l'iris roux & sans prunelle. Le dessus des ailes inférieures est obscur à la base, avec une rangée de cinq taches jaunes; roux à l'extrémité, avec six taches noires, oculaires.

Le dessous des ailes de devant est jaune à la base, avec des taches obscures; brun à l'extrémité, avec une ligne jaune, terminale, précédée de trois taches blanches & de deux yeux noirs, ayant chacun un iris jaune, mais dont le postérieur sans prunelle, tandis que l'anterieur en a une blanche.

Le dessous des ailes de derrière est varié de jaune & de brun, avec une rangée de huit yeux noirs à l'iris jaune & à prunelle bleue.

Il habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

77. SATYRE HERSE.

SATYRUS HERSE.

Sat. alis dentatis, fusco-ferrugineis : anticis albo punctatis; posticis utrinque ocellis septem cæcis. FAB.

Papilio S. Herse. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 229. n.º 718.*

Papilio Herse. JON. *Fig. pict. 4. tab. 7. fig. 2.*

Le dessus de ses ailes supérieures est d'un ferrugineux-obscur, avec une bande de six taches blanches au-delà du milieu & quatre points de cette couleur au sommet. Leur dessous est un peu plus pâle.

Le dessus des ailes inférieures est aussi d'un ferrugineux-obscur, avec une rangée de sept yeux noirs, ayant tous un iris fauve, mais dont le second & le troisième seulement pourvus d'une prunelle blanche, les cinq autres sans prunelle. En dessous ces mêmes ailes sont plus pâles, & leurs

sept yeux sont bleus, avec l'iris jaune & entouré d'un cercle noir.

Il habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

78. SATYRE MINERVE.

SATYRUS MINERVA.

Sat. alis dentatis, fulvis, apice nigris albomaculatis : posticis ocellis supra quinque cæcis, subtis septem pupillatis. FAB.

Papilio N. Minerva. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 95. n.º 295.*

Les premières ailes sont entières, fauves en dessus, avec l'extrémité noire, & marquée de quatre ou cinq taches blanches. Il y a en outre un trait jaunâtre avant la partie noire. Les secondes ailes sont dentées, fauves en dessus, avec une raie marginale, & cinq yeux sans prunelle, d'un brun-obscur.

Le dessous des quatre ailes est cendré : celui des supérieures offre deux lignes ferrugineuses, avec le trait jaunâtre & les taches blanches du dessus; celui des inférieures a une rangée de sept yeux à prunelle blanchâtre.

Dé l'Amérique.

(Traduction de Fabricius.)

N. B. Ce lépidoptère est celui que Fabricius a rapporté avec doute à notre *Cuumas* ou *Arcadius* de Cramer. (Voyez SATYRE n.º 7.)

79. SATYRE PROSERPINE.

SATYRUS PROSERPINA.

Sat. alis dentatis, fulvis : anticis apice atris, punctis flavis : posticis subtis marmoratis, ocellis quatuor, intermedis cæcis. FAB.

Papilio S. Proserpina. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 228. n.º 713.*

Papilio Proserpina. JON. *Fig. pict. 5. tab. 24. fig. 1.*

Il est grand, fauve en dessus. Ses premières ailes ont l'extrémité noire, avec trois taches jaunes. Les secondes ailes ont sur le bord postérieur une ligne noire, interrompue.

Le dessous des ailes supérieures est jaune à la base, avec des taches noires; d'un noir-brun vers le bout, avec des taches blanches.

Le dessous des ailes inférieures est marbré, & l'on y voit quatre yeux, dont le premier fauve & ayant l'iris noir, le second & le troisième sans prunelle, le quatrième à l'iris fauve & à prunelle blanche.

Il habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

80. SATYRE Mérope.

SATYRUS Merope.

Sat. alis dentatis, suprâ fulvis, ocello unico : anticis utriusque dimidio apicali nigro maculis flavis : posticis subtus fusco-cinereis, ocellis duobus alteroque minutissimis. (Fem.)

Papilio N. Merope, alis dentatis, fulvis, apice nigris ocello unico : posticis subtus cinereis, ocellis tribus minutissimis. FAB. *Syst. Ent.* p. 495. n^o. 228. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 40. n^o. 408. — *Ent. Syst.* em. tom. 5. pars 1. p. 99. n^o. 506.

Papilio Merope. DOXOW. *Gen. Illustr. of Entom. part 1. an Epitome of the Inf. of New Holl.* pl. 28. fig. 2.

Nous décrivons cette espèce d'après des individus femelles, n'ayant pu parvenir à voir un seul mâle. Fabricius & Donovan n'ont aussi connu que la femelle de ce satyre.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Les premières ailes, dont le bord terminal est entier, ont environ la moitié antérieure fauve, avec la côte & le bord interne obscurs; l'autre moitié noire, avec trois taches plus ou moins jaunes, dont l'inférieure adhérent à la partie fauve, la supérieure exterie plus petite, & terminée d'un oeil très-noir à prunelle bleue & à iris roux. Les secondes ailes sont dentées, fauves en dessus, avec le bord postérieur noirâtre, & un oeil presqu'anal, pareil à celui dont nous venons de parler, & compris entre deux lignes noires, ondulées, qui se croisent un peu au-delà de l'angle extérieur & s'écartent ensuite de plus en plus sans atteindre le bord abdominal de l'aile.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais le sommet est cendré jusqu'à l'œil.

Le dessous des ailes inférieures est cendré, lavé de brun sur le disque & sur la moitié postérieure du bord de ce nom. On y distingue trois yeux noirs, très-petits, dont deux groupés près du bord d'en haut, le troisième correspondant à celui de la surface opposée. Outre cela, la nervure qui ferme intérieurement la cellule du milieu est d'une teinte jaune. Le corps est fauve en dessus, d'un gris-fale en dessous. Les antennes sont brunes, annelées de blanchâtre, avec la massue noire & terminée de roux.

De la Nouvelle-Hollande.

81. SATYRE Archémor.

SATYRUS Archemor.

Sat. alis omnibus suprâ anticisque subtus fulvis, nigro rariis, ocello unico : posticis subtus cinereo-lutescentibus, strigis tribus fuscis, andactis, ocellisque duobus & altero minutis. (Mas.)

Nous n'avons vu que des mâles de ce satyre.

Il est un peu moins grand que le *Mérope*, au-

quel il ressemble par le dessus des secondes ailes.

Les deux surfaces des premières ailes sont variées de fauve & de noir-obscur, & elles offrent, vis-à-vis du sommet qui est un peu plus pâle en dessous, un oeil noir à prunelle bleue & à iris fauve.

Le dessous des secondes ailes est d'un jaune-cendré, avec trois lignes brunes, transverses, ondulées, interrompues, & trois petits yeux disposés comme dans le *Mérope*, mais plus distincts.

De la Nouvelle-Hollande.

Nota. Ne seroit-ce pas le mâle du *Mérope* ?

82. SATYRE Achanta.

SATYRUS Achanta.

Sat. alis omnibus suprâ, anticisque subtus fulvis, nigro striatis, ocello unico : posticis subtus fusco flavidoque variegatis, ocellis duobus distinctis.

Papilio Achanta, alis dentatis, fulvis, fusco fuscis : anticis ocello, posticis duobus, anteriore suprâ minore. DOXOW. *Gen. Illustr. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New Holl.* pl. 22. fig. 2.

Il est de la taille du *Mera*. Ses premières ailes sont entières. Leur dessus est fauve, ainsi que leur dessous, & rayé obliquement de noirâtre depuis le milieu jusqu'au bord terminal qui est lui-même noirâtre. Il y a en outre, vis-à-vis du sommet, un oeil noir à prunelle blanche.

Les secondes ailes sont dentelées, fauves en dessus, avec une ligne discordante, deux postérieures & le bord de ce nom noirâtres; sans compter un oeil semblable à celui dont nous venons de parler, & placé près de l'angle de l'anus dans un cercle de la concour des lignes.

Le dessous des mêmes ailes est d'un brun-obscur, avec un mélange alternatif de taches & de raies transverses d'un jaune plus ou moins foncé, indépendamment desquelles on voit deux yeux, dont un correspondant à celui de la surface opposée, l'autre appuyé sur le bord antérieur. Ces yeux sont noirs aussi, avec la prunelle blanche, l'iris jaune & bordé d'un cercle noirâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

N. B. Il est des individus qui ont deux points blancs entre les taches oculaires du dessous des secondes ailes.

83. SATYRE Sirius.

SATYRUS Sirius.

Sat. alis integerrimis, obscurè rufis : suprâ anticis ocellis duobus, posticis quatuor. FAB.

Papilio S. Sirius. FAB. *Syst. Entom.* p. 488. n^o. 201. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 66. n^o. 298. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 52. n^o. 545. — *Entom. Syst.* em. tom. 5. pars 1. p. 220. n^o. 688.

Papilio Sirius. DOXOW. *Gen. Illustr. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New Holl.* pl. 28. fig. 5.

Il est approchant de la taille de l'*Hypéranthus*. Le dessus des ailes supérieures est d'un roux-obscur, avec l'extrémité brumâtre & marquée de deux yeux ferrugineux ayant la prunelle blanche, l'iris brun & entouré d'un anneau très-noir. Le dessus des ailes inférieures est également d'un roux-obscur, avec le bord terminal brun, coupé par des lignes plus foncées, & précédé de quatre yeux dont les intermédiaires plus grands.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-violâtre du côté de la base, avec deux arcs & une ligne transverse ferrugineux; plus obscur vers le bout, avec quatre yeux, dont les intermédiaires plus grands, aux ailes supérieures, & sept, dont l'anale très-petit, aux ailes inférieures.

De la Nouvelle-Hollande.
(Traduction de Fabricius.)

84. SATYRE *Terminus*.

S. terminus Tenninus.

Sat. alis integris, fuscis, arcu nsa: supra anticis oculo unico, posticis quatuor. FAB.

Papilio S. Tenninus. FAB. *Syst. Entom. p. 488. n. 200. — Spec. Inf. tom. 2. p. 66. n. 297. — Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n. 544. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 220. n. 687.*

Papilio Terminus. VONOW. *Gen. Illust. of Entom. part 1. an Epitome of the 1st. of New Holl. pl. 28. fig. 4.*

Il est à peu près de la taille de l'*Hypéranthus*. Ses quatre ailes sont entières. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec un espace fauve, plus large & plus vil sur les supérieures. Celles-ci ont un œil noir à prunelle blanche. Les inférieures ont, dans un iris rouillâtre, quatre yeux semblables, dont le quatrième peu prononcé.

Le dessous de chaque aile est brun vers son origine; plus clair vers le bout, avec une ligne noire, marginale & ondulée, que précèdent intérieurement sur les ailes supérieures cinq yeux presque effacés, & sur les inférieures six yeux distincts, dont le deuxième, le troisième & le sixième plus grands. Les secondes ailes ont en outre, près de la base, une ligne transverse très-obscur.

De la Nouvelle-Hollande.

85. SATYRE *Remulia*.

Satyrus Remulia.

Sat. alis integris, supra fuscis, disco fulvo: subtus basi rufescentibus, apice griseis; posticis ocellis sex, 2°, 5°, 6°, minutis.

Papilio Remulia. GRAM. *pl. 257.*

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, & d'un brun-obscur en dessus. Les supérieures ont sur le milieu un espace fauve,

grand, arrondi en dehors, courant tout le bord interne, excepté l'angle de ce nom, & offrant vers le milieu du bord terminal un œil noir à prunelle blanche. Les ailes inférieures ont, vis-à-vis du sommet, une bande fauve, courbe en arrière, avec laquelle s'alignent trois yeux, dont l'anale beaucoup plus petit. Ces yeux sont noirs, cerclés de fauve, & pourvus d'une prunelle blanche.

Le dessous des quatre ailes a la moitié antérieure d'un brun-rouillâtre & formant un triangle dont le côté externe est oblique; l'autre moitié blanchâtre, avec des yeux semblables à ceux que nous venons de citer. Les premières en ont de deux à quatre, dont le postérieur beaucoup plus grand. Les secondes ailes en ont six, dont le deuxième, le troisième & le postérieur, très-petits. Il y a en outre, le long du bord postérieur de chaque aile, une double ligne ondulée d'un brun-noirâtre.

De l'île de Java.

Nota. Il est bien voisin du *Terminus*.

86. SATYRE *Mæra*.

Satyrus Mæra.

Sat. alis denticulatis, supra fuscis, fuscisâ subvâ: anticis utrinque oculo bipupillato alteroque minuto: posticis subtus griseis, strigis duabus fuscis, undatis, ocellisque sex inde duplici.

Papilio N. Mæra, alis subdentatis, fuscis: utrinque primoribus sesquicoello; posticis ocellis supra tribus. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 771. n. 141. — Faun. Suec. edit. 2. p. 275. n. 1049.*

Papilio Satyrus. LINN. *Faun. Suec. edit. 1. p. 258. n. 735.*

Papilio S. Mæra, alis dentatis, fuscis: utrinque anticis sesquicoello; posticis ocellis supra tribus, subtus sex. FAB. *Syst. Entom. p. 491. n. 211. — Spec. Inf. tom. 2. p. 71. n. 519. — Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n. 575. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 227. n. 711.*

Papilio Hiera. FAB. *Gen. Inf. Mant. p. 262. n. 256-57.*

Papilio Mæra. ESP. *Pap. part. 1. tab. 6. fig. 2.*

Papilio Mæra. VAR. ESP. *Pap. part. 1. tab. 49. Suppl. 25. fig. 1.*

Papilio Megaxæ. VAR. ESP. *Pap. part. 1. tab. 68. cont. 18. fig. 1. 2.*

Papilio Mæra. FEM. ESP. *Pap. part. 1. tab. 68. cont. 18. fig. 5.*

Papilio Mæra. FEM. HERBST, *Pap. tab. 207. fig. 5. 6.*

Papilio Mæra. HERBST, *Pap. tab. 207. fig. 7. 8.*

- Papilio Mæra*. HERBST, *Pap. tab.* 203. *fig.* 1. 2. (Var.)
 NATURF. 8. *tab.* 3. *fig.* A. B.
 NATURF. 10. *tab.* 2. *fig.* 8. 9.
Papilio Mæra. WIEN, *Verz.* p. 166. *fam.* F. n^o. 4.
Papilio Mæra. ILLIC. N. *Aufg.* Dessf. *tom.* 2. p. 176. n^o. 4.
Papilio Mæra. ILLIC. *Magaz.* *tom.* 5. p. 198.
Papilio Hiera. ILLIC. *Magaz.* *tom.* 5. p. 195.
Papilio Mæra. SCHÆFF. *Icon. tab.* 58. *fig.* 2. 3.
 KLEMANN, *Beytr. tab.* 45.
Papilio Mæra. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 81, 82 & 259. n^o. 20.
 BORKH. *Rhein. Magaz.* *tom.* p. 257. 258.
Papilio Mæra. SCOP. *Ent. Carn.* p. 154. n^o. 451.
 ROSSI, *Mant.* *tom.* 2. p. 10. n^o. 347.
 SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 116. n^o. 55.
 FÜESSL. *Suiff. Inf.* p. 29. n^o. 558.
 FÜESSL. N. *Magaz.* *tom.* 3. p. 149. n^{os}. 61 & 72. p. 165. n^o. 182.
 MULLER, *Zool. Dan.* p. 114. n^o. 1520.
 LANG. *Verz.* 2. p. 13. n^o. 101-105.
 SCHWARZ, *Raup. Calend.* p. 616. 741.
Papilio Mæra. HUBN. *Pap. tab.* 39. *fig.* 174. 175.
Papilio Hiera. HUBN. *Pap. tab.* 39. *fig.* 176. (Var.)
Papilio Mæra. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 231. n^o. 31.
Papilio Hiera. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 4. *Suppl.* p. 135.
Papilio Adrafla. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 4. *Suppl.* p. 137. n^o. 32.
Mæn. Mæra. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom.* 2. p. 172. n^o. 1500.
 SATYRE. DE GEER, *Hijl. Inf. tom.* 2. *part.* 2. p. 144. *tab.* 2. *fig.* 1. 2.
 Le SATYRE. GEOFF. *Hijl. Inf. tom.* 2. p. 50. n^o. 19.
 Le Némusien. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 120. *pl.* 26. *fig.* 51. a. b.
 L'Ariane. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 305. *pl.* 32. 2^e. *Suppl. pl.* 3. *fig.* 50. a. b. c. bis.

Il a approchant deux pouces d'envergure. Ses

quatre ailes sont faiblement dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec les sinus blanchâtres. Les premières ont, vers le bout, une bande fauve, transversale, plus ou moins coupée par les nervures, sinuée sur le côté interne, rétrécie à sa partie inférieure, & chargée à sa partie supérieure de deux yeux noirs, dont l'extérieur très-petit, l'autre grand & pourvu le plus souvent d'une double prunelle blanche. Le milieu de la surface de ces ailes est en outre fauve, avec une raie noirâtre, large & oblique dans les mâles, étroite & en zigzag dans les femelles. Les secondes ailes ont une bande fauve, courbe & maculée, sur laquelle il y a de trois à quatre yeux, dont deux, le second & le troisième, à partir d'en haut, plus grands.

Le dessous des ailes supérieures ne diffère du dessus que parce qu'il est généralement plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est gris, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, parallèles & presque discoïdales; à la suite desquelles vient une rangée courbe de six yeux noirs, dont l'antérieure, la quatrième & la cinquième plus gros, l'autre double. Ces yeux ont tous une prunelle blanche & deux iris jaunâtres, entourés chacun d'un cercle noirâtre. Il y a en outre une ligne ondulée de cette couleur le long du bord terminal de chaque aile. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

Ce satyre est très-commun en Europe. Les individus des parties chaudes de ce continent ont le fauve du disque des premières ailes moins prononcé ou presque nul, & le gris du dessous des secondes ailes d'un ton plus rembruni; ce qui a porté quelques auteurs à en faire une espèce distincte sous le nom d'*Hiera*.

Les individus des parties froides ont, au contraire, presque tous le dessus des ailes rouffâtre, sans néanmoins dissérer en dessous. M. Ochsenheimer a fait de ces derniers une nouvelle espèce sous le nom d'*Adrafla*; mais ce n'est pour nous qu'une variété aussi bien que l'*Hiera*.

Esper donne une autre variété dans laquelle le noir des taches oculaires est tellement oblitéré qu'on ne voit que des points blancs sur la bande fauve.

La chenille est pubescente ou légèrement velue, d'un vert-tendre, avec l'anus terminé en pointe bifide. Elle mange plusieurs sortes de *graminées*, entr'autres le *paturin annuel* (*poa annua*), la *scélouge flottante* (*Juncus fluitans*).

La chrysalide est verdâtre ou noirâtre, suivant l'âge, avec deux rangs parallèles de points blancs tuberculeux sur la partie postérieure du dos, & une tache noire à la sommité du corselet. Elle est suspendue par la queue. Le papillon paroît pour la première fois en mai, & pour la seconde en juillet & août. Il se repose sur les murs, sur les tas de pierres, &c.

87. SATYRE Mægère.

SATYRUS Mægæra.

Sat. alis denticulatis, supra fulvis, fusco strigatis: anticis utrinque f. squicello: posticis subtus cineris, strigis duabus fuscis, undatis, flavescenti inductis, ocellisque sex inde duplici.

Papilio N. Mægæra, alis fubdentatis, luteis, fusco fasciatis: utrinque primoribus sesquicello; posticis supra quinis. LÉNN. *Syst. Nat.* 2. p. 771. n^o. 142.

Papilio N. Mægæra, alis dentatis, luteis, fusco fasciatis: anticis ocello; posticis supra quinis, subtus sex. FAB. *Syst. Entom.* p. 492. n^o. 215. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 75. n^o. 524. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 36. n^o. 580. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 94. n^o. 292.

Papilio Mægæra. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 6. fig. 5.

Papilio Mægæra. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 68. cont. 18. fig. 4. (Mas.)

ESP. *Pap. part.* 1. tab. 94. cont. 49. fig. 6-8. (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Mægæra. HERBST, *Pap. tab.* 207. fig. 3. 4.

Papilio Mægæra. WIEN. *Verz.* p. 166. *sum.* F. n^o. 3.

Papilio Mægæra. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 175. n^o. 5.

Papilio Mægæra. ILLIG. *Magaz.* tom. 3. p. 198.

Papilio Mægæra. SCHIEFF. *Icon. tab.* 148. fig. 3. 4.

Papilio Mægæra. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 79 & 257. n^o. 18.

BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 256. n^o. 16.

Papilio Mægæra. ROSSI, *Faun. Etr.* tom. 2. p. 146. n^o. 1002.

SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 114. n^o. 54.

FUESSL. *Saiff. Inf.* p. 29. n^o. 559.

MULLER, *Zool. Dan.* p. 114. n^o. 1321.

LÂNG. *Verz.* 2. p. 18. n^o. 97-100.

SCHWARZ, *Ruup. Calend.* p. 40. 542.

BERGST. *Nomencl.* tab. 72. fig. 1-6.

SEPP. *Nieder. Inf. part.* 2. tab. 2. 3.

LEWIN, *Inf.* tab. 21. fig. 1-5.

Papilio Mægæra. HUBNER. *Pap. tab.* 39. fig. 177. 178. (Mas.)

Papilio Mægæra. OCHSENH. *Pap. Eur.* tom. 1. p. 255. n^o. 52.

Man. Mægæra. SCHRANK, *Faun. Boic.* tom. 2. p. 171. n^o. 1299.

Le Satyre. GEOFFR. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 50. n^o. 19.

Le Satyre. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 118. pl. 26. fig. 50. a. b. c. d. (e. f. Var.)

Le Satyre. ENGRAM. *Pop. d'Europe*, tom. 1. p. 261. pl. 65. *Suppl.* 11. fig. 50. g. h.

ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 322. 3e. *Suppl.* pl. 4. fig. 50. l. (La chrysalide.)

Geoffroy l'a confondu avec le *Mæra*, dont il est en effet très-voisin.

Les quatre ailes sont faiblement dentées, fauves en dessus, avec les nervures, le bord terminal, & trois lignes ondulées, dont l'intérieure plus courte, noirâtres. Les premières ailes ont, vis-à-vis du sommet, un œil noir à prunelle blanche, lequel est précédé en dehors, notamment en dessous, d'un autre œil beaucoup plus petit & pupillé de même. Dans le mâle, les trois lignes transverses du milieu de ces ailes sont coupées obliquement par une bande noirâtre un peu finuée. Les secondes ailes ont la base plus ou moins obscure, suivant le sexe, & leur extrémité offre une rangée courbe de trois à cinq yeux noirs, dont la prunelle est d'un blanc-bleuâtre.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris piqué de noirâtre, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, parallèles, & ayant sur un de leurs côtés une petite éclaircie jaunâtre, caractère constant qui n'existe ni dans le *Mæra*, ni dans ses variétés. Entre ces lignes & le bord postérieur est une rangée courbe de six yeux noirs, dont le troisième, le quatrième & le cinquième un peu plus gros, l'anal double. Ces yeux ont une prunelle blanche, & deux iris jaunâtres, entourés chacun d'un cercle obscur. Le corps & les antennes sont comme dans le *Mæra*.

La chenille est pubescente, d'un vert-tendre, avec une ligne blanche le long de chaque côté. Son corps est terminé par une pointe bide. Elle vit sur plusieurs *graminées* & se métamorphose vers la mi-avril.

La chrysalide, quoi qu'en dise Hubner, est comme celle du *Mæra*. On la trouve suspendue par la queue au pied des arbres & contre les murs des jardins. Le papillon en sort au commencement de mai. Il donne ensuite une seconde fois dans le cours de l'été. Ses mœurs sont les mêmes que celles du *Mæra*. Il est très-commun aux environs de Paris & dans beaucoup de parties de la France; mais il paroît qu'il est assez rare dans certaines contrées de l'Allemagne. Fabricius, qui en connoissoit la chenille, l'a rangé parmi les *NUMPHALES*, tandis qu'il a mis dans les *SATYRES* le *Mæra*.

dont il connoissoit aussi la chenille. Il arrive souvent à cet auteur d'éloigner plus ou moins l'une de l'autre deux espèces presque semblables, pour avoir moins de peine à faire ses phrases spécifiques.

33. SATYRE ROXELANE.

SATYRUS Roxelana.

Sat. alis dentatis, supra dilute fuscis : anticis utrinquè disco fulvo, nervis diviso : posticis subtus griseis, fligris quinque fuscis ocellisque septem inde simplicis.

Papilio S. Roxelana, alis dentatis, fuscis, supra cecis : posticis subtus undatis, ocellis septem, anteriori pupillâ geminâ. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 72. n^o. 520. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n^o. 374.* — *Ent. Syst. entom. tom. 3. pars 1. p. 227. n^o. 712.*

Papilio Roxelana. GRAM. pl. 161. fig. C. D. (Le mâle.) fig. E. F. (La femelle.)

Papilio Roxelanus. HERBST, *Pap. tab. 222. fig. 5. 4.* (Le mâle.) fig. 5. 6. (La femelle.)

Papilio Roxelana. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 217.*

Il a le port du *Mura*; mais il est d'environ un tiers plus grand. Le dessus des quatre ailes est d'un brun faiblement obscur, avec le milieu des supérieures fauve & divisé par des nervures de la couleur du fond de l'aile. Dans les individus femelles, le sommet offre en outre quatre taches jaunâtres, dont la plus intérieure en forme de bande transverse, les trois autres orbiculaires, disposées sur une ligne courbe dont le milieu est marqué d'un gros point noirâtre. Les ailes intérieures ont, outre le milieu & le bout, une rangée de trois à cinq yeux noirs à iris rouffâtre & à prunelle blanchâtre.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que la côte est coupée transversalement par trois ou quatre lignes obscures en zig-zag, & parce que le gros point noirâtre placé sur la ligne courbe de taches jaunâtres forme un œil bien caractérisé.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris-obscur dans le mâle, d'un gris plus clair dans la femelle, avec trois lignes brunes, très-flexueuses, à la suite desquelles vient une rangée de sept yeux, dont le troisième & le quatrième plus petits, l'anal pourvu d'une double prunelle. Ces yeux ressemblent à ceux de la surface opposée, mais ils sont plus vifs, & séparés du bord par une double ligne brune en sillon. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes, annulées de blanc, avec la massue noire & terminée de fauve.

On le trouve aux environs de Constantinople, dans les îles de l'Archipel, &c. M. de Darville, lieutenant de la marine royale, l'a pris communément près d'Athènes.

39. SATYRE ÉGÉRIE.

SATYRUS Aegeria.

Sat. alis denticulatis, fuscis : anticis utrinquè maculis plurimis ochraceis aut fulvis ocelloque unico : posticis subtus viridicent-griseis, fligris duabus fuscis, undatis, jenuque puriorum ocellatorum.

Papilio N. Aegeria, alis dentatis, fuscis, luteo maculatis : utrinquè primoribus ocello ; posticis supra tribus. LIXN. *Syll. Nat. 2. p. 771. n^o. 145.*

Papilio N. Aegeria, alis dentatis, fuscis, luteo maculatis : anticis utrinquè ocello ; posticis supra ocellis, subtus punctis quatuor. FAB. *Syll. Entom. p. 492. n^o. 214.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 75. n^o. 525.* — *Mart. Inf. tom. 2. p. 57. n^o. 581.* — *Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 94. n^o. 295.*

Papilio Aegeria. ESP. *Pap. part. 1. tab. 7. fig. 1.*

Papilio Meone. ESP. *Pap. part. 1. tab. 95. cont. 50. fig. 1.*

Papilio Aegeria. HERBST, *Pap. tab. 217. fig. 5. 4.*

Papilio Meone. HERBST, *Pap. tab. 191. fig. 7. 8.*

Papilio Aegeria. HUBN. *Pap. tab. 40. fig. 181. 182.*

Papilio Meone. HUBN. *Pap. tab. 40. fig. 179. 180.*

Papilio Aegeria. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 175. n^o. 2.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 184.*

Papilio Meone. ILLIG. *Magaz. tom. 1. p. 450.* — *tom. 3. p. 198.* — *tom. 4. p. 28.*

Papilio Aegeria. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 258. n^o. 55.*

Papilio Meone. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 240. n^o. 54.*

Papilio Meone. GRAM. *Pap. pl. 514. fig. E. F.*

Papilio Aegeria. WIEN. *Verz. p. 166. sum. F. n^o. 2.*

Papilio Aegeria. SCOP. *Ent. Carn. p. 156. n^o. 452.*

ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 146. n^o. 1005.*

PANZ. *Faun. Germ. 28-21.*

SCHNEFF. *Icon. tab. 75. fig. 1. 2.*

SEPP. *Niederl. Inf. tom. 1. tab. 6. fig. 1-7.*

ROES. *nf. 4. tab. 55. fig. 5. 4.*

KLEMANN, *Beyr. tab. 19. fig. A. B.* (La chenille & la chrysalide.)

Papilio

Papilio Ægeria. BERGST. *Nomencl. tab.* 22. fig. 1-7.

Papilio Ægeria. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 78 & 256. n^o. 17.

BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 256. n^o. 15.

SCHNEID. *Syfl. Besch. p.* 118. n^o. 57.

FUESSL. *Suiff. Inf. p.* 29. n^o. 560.

BRANN. *Inf. Calend. p.* 215. n^o. 111.

LANG. *Verz. 2. p.* 17. n^o. 97-96.

SCHWARZ, *Raup. Calend. p.* 485. 616. 748.

Man. Ægeria. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 171. n^o. 1298.

REAU. *Mem. Inf. tom.* 1. tab. 27. fig. 16. 17.

Tircis. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 48. n^o. 16.

Le Tircis. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 117. pl. 25. fig. 49. a-d.

Le Tircis. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 261. pl. 65. *Suppl.* 11. fig. 49. c.

Sous le nom d'*Égérie* nous réunissons l'*Ægeria* & le *Meone* des auteurs, parce qu'ils ne le distinguent l'un de l'autre que par plus ou moins d'intensité dans la couleur jaune des taches de leurs ailes.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, notamment les inférieures, d'un brun-obscur en dessus, avec des taches d'un jaune d'ocre comme dans l'*Ægeria*, ou fauves comme dans le *Meone*. Les ailes supérieures en ont une douzaine, savoir : trois sur la côte, cinq sur le disque, une sur le milieu du bord terminal, & vis-à-vis du sommet, trois, dont l'intermédiaire marquée d'un œil noir à prunelle blanche. Les ailes inférieures en ont deux, un peu échancrées intérieurement ; l'une occupe le milieu du bord d'en haut, l'autre l'extrémité postérieure de la cellule discoidale. Entre ces taches & le bord de derrière, on en voit quatre autres, contiguës, dont les trois inférieures chargées chacune d'un œil noir à prunelle blanche, & la supérieure d'un point noir très-petit.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, seulement le fond & les taches sont un peu pâles.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-vertâtre, légèrement chatoyant, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, à la suite desquelles viennent deux taches jaunâtres, puis une rangée courbe de cinq à six points blanchâtres, entourés de brun, & correspondant aux taches oculaires du dessus. Le bord postérieur est d'une teinte violâtre luisante, & les échancrures sont blanches, ainsi que celles du bord analogue des

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

ailes de devant. Les deux surfaces du corps font du même ton que celles des ailes. Les antennes sont annelées de noir & de blanc, avec l'extrémité de la massue fauve.

La chenille est d'un vert-mat, avec des lignes longitudinales, les unes d'un vert-foncé, les autres blanches, & de petits poils de cette dernière couleur. Elle vit sur le *triticum repens* (le *chiendent*) & sur plusieurs autres *graminées*.

La chrysalide est anguleuse, tantôt d'un vert-pâle, tantôt d'un vert-noirâtre. Elle passe l'hiver, & le papillon en sort vers la fin d'avril ou au commencement de mai. Il donne une seconde fois en juillet & en août. On le trouve communément dans les bois & dans les prairies. Les individus des contrées froides ou tempérées de l'Europe ont les taches d'un jaune d'ocre plus ou moins foncé ; ceux des parties chaudes de ce continent & de la côte de Barbarie les ont fauves.

90. SATYRE Xiphia.

SATYRUS Xiphia.

Sat. alis denticulatis, fuscis : anticis utrinquè maculis plurius, fulvis ocelloque unico : posticis subtis rufescenti-griseis, fasciâ costali albâ, transversâ, serieque punctorum ocellatorum.

Papilio N. *Xiphia, alis dentatis, fuscis, flavo maculatis : utrinquè anticis ocello, posticis supra tribus, subtis quatuor.* FAB. *Syfl. Ent. p.* 492. n^o. 215. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 74. n^o. 326. — *Man. Inf. tom.* 2. p. 57. n^o. 582. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 95. n^o. 294.

Il ne diffère du précédent que parce que les taches sont constamment fauves ; que le dessous des secondes ailes est rouffâtre, au lieu d'être verdâtre, & a sur le milieu du bord d'en haut une bande blanche, transverse, courte, & étroite, un peu dilatée à son origine, & terminée par un petit crochet dont la pointe regarde le bord interne. Dans quelques individus, les deux taches fauves, qui correspondent à cette bande sur la surface opposée, sont liées entr'elles par un trait de leur couleur.

On le trouve dans les îles de Madère & de Ténériffe. Peut-être n'est-il qu'une variété de l'*Égérie*, plus modifiée encore par le climat que le *Meone*.

91. SATYRE Galathée.

SATYRUS Galathea.

Sat. alis denticulatis, fuscis, albis, basi supra apiceque nigris, albo maculatis : maculâ bascos subovatâ ; posticis ocellis duobus tribusque nigris, supra nullis aut obsoletis.

Papilio N. *Galathea, alis dentatis, albo nigroque variis : subtis anterioribus ocello unico,*

posterioribus quinque obsoletis. LANN. *Syfl. Nat.* 2. p. 772. n°. 147.

Papilio S. Galathea, alis dentatis, albo nigroque variis: subtus anticis ocello unico, posticis quinque. FAB. *Syfl. Entom.* p. 496. n°. 250. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 79. n°. 349.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n°. 420.* — *Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n°. 745.*

Papilio Galathea. ESP. *Pap. part. 1. tab. 7. fig. 3.*

Papilio Galathea mas, var. ESP. *Pap. part. 1. tab. 111. cont. 66. fig. 4.*

Papilio N. G. Galaxaera, alis subdentatis, nigris, concoloribus, maculis pallidis: inferioribus ocellis tribus binisque distantibus anguli externi. ESP. *Pap. part. 1. p. 97. tab. 111. cont. 66. fig. 5. (Var.)*

Papilio N. G. Leucomelas, alis subdentatis, albo nigroque variis: inferioribus subtus pallide maculatis, absque ocellis. ESP. *Pap. part. 1. p. 141. tab. 81. cont. 51. fig. 1. 2. (Var.)*

Papilio Galathea. HERBST, *Pap. tab. 185. fig. 5. 4.*

Papilio Procida. HERBST, *Pap. tab. 185. fig. 5. 6. (Var.)*

Papilio Galathea. WIEN. *Verz. p. 166. fam. F. n°. 1.*

Papilio Galathea. ILLIG. *N. Aufg. Dessl. tom. 2. p. 175. n°. 1.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 194. — tom. 4. p. 26.*

Papilio Procida. ILLIG. *Magaz. tom. 1. p. 450. — tom. 4. p. 27. (Var.)*

Papilio Leucomelas. ILLIG. *Magaz. tom. 1. p. 450. — tom. 3. p. 197. — tom. 4. p. 26. 27. (Var.)*

SCHROFF. *Icon. tab. 98. fig. 7-9.*

ROES. *Inf. 3. tab. 37. fig. 1. 2.*

ROES. *Inf. 3. tab. 79. fig. 6. (La chenille.)*

Papilio Galathea. BORCK. *Pap. Eur. part. 1. p. 105 & 245. n°. 48. — part. 2. p. 210.*

Papilio Galathea. BORCK. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 255. n°. 14.*

Papilio Galathea. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 84. n°. 27.*

Papilio Leucomelas. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 80. n°. 26. (Var.)*

Papilio Galathea. HUFNAG. *Magaz. tom. 2. p. 70. n°. 25.*

BERGST. *Nomencl. tab. 16. fig. 1. 2. — tab. 92. fig. 1-6.*

PANZ. *Faun. Germ. 28. 24.*

LEWIN. *Inf. tab. 28. fig. 1-4.*

LANG. *Verz. 2. p. 17. n°. 89-92.*

SCHWARZ, *Raup. Calend. p. 154.*

Papilio Galathea. SCOP. *Ent. Cum. p. 151. n°. 427.*

ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 148. n°. 1009.*

FUSSL. *Suiff. Inf. p. 29. n°. 562.*

FUSSL. *Alt. Magaz. tom. 1. p. 250. tab. 2. fig. 5. (La chrysalide.)*

NATURF. 14. *tab. 2. fig. 7. (La chenille.) fig. 2. 3. (La chrysalide.)*

Papilio Liriope. CYRILL. *Ent. Neap. Specim. 1. tab. 12. fig. 8. (Var.)*

Papilio Galathea. HUBS. *Pap. tab. 41. fig. 185. 185.*

Papilio Leucomelas. HUBS. *Pap. tab. 102. fig. 517. 518. (Var.)*

Papilio Galathea. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 242. n°. 55.*

Mim. Galathea. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. p. 170. n°. 1297.*

Le Demi-Deuil. GEOFFR. *Hist. Inf. tom. 2. p. 74. n°. 46. pl. 11. fig. 3. 4.*

Le Demi-Deuil. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 154. pl. 50. fig. 60. a-d.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 324. 3°. Suppl. pl. 5. fig. 60. g. (Var.)*

Il a environ deux ponces d'envergure. Ses quatre ailes sont légèrement dentées. Leur dessus est varié de noir & de blanc-jaunâtre, de telle manière que ces deux couleurs y dominent à peu près autant l'une que l'autre. En effet la base est noire, avec une tache blanche, grande & presque ovale; le milieu blanc, avec de fines nervures noirâtres; l'extrémité noire, avec des taches marginales & la frange des échantures blanches. Les taches marginales sont triangulaires sur les ailes inférieures, & en forme de points sur les supérieures. Celles-ci ont environ les trois quarts antérieurs de la côte jannière, & leur sommet offre, entre les taches du milieu & celles du bord, quatre autres taches blanches, sur la plus longue desquelles est un œil noir sans prunelle. Les secondes ailes n'ont pas d'yeux vers le bout, ou bien elles en ont tantôt trois, tantôt cinq peu prononcés.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que les taches du bout sont triangulaires & plus grandes; en ce que dans la femelle elles sont lavées de jaune-sale, couleur qui s'étend sur toute

La côte & autour du petit œil, lequel est marqué ici d'un point bleuâtre pupillaire.

Le dessous des secondes ailes est blanc dans le mâle, avec les nervures noires. Entre la base & le dique, est une bande obscure, transverse, irrégulière, fortement étranglée dans son milieu, atteignant la côte ainsi que le bord interne. Le long du bord terminal sont deux lignes noires, dont l'intérieure est feston, & précédée en dedans de cinq petits yeux noirs, dont l'un est double, les deux antérieurs séparés des autres & groupés contre le bord d'en haut. Ces yeux ont une prunelle bleuâtre, & un iris jaunâtre qu'entoure un cercle d'atomes noirs. Dans la femelle le dessous des mêmes ailes présente des caractères semblables; mais il est lavé de jaune-sale, particulièrement sur la bande transverse & sur les taches oculaires. Le corps est noir en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes ont anneaux de blanc & de noir, avec la massue ferrugineuse.

Elle a figuré deux variétés prises aux environs de Carlsbad en Croatie.

La première, tab. 111, fig. 4, a plus de noir que les individus ordinaires, attendu que les taches blanches marginales manquent aux quatre ailes en dessus, & aux supérieures en dessous.

La seconde, que cet auteur appelle *Galaxaent*, a la tache de la base de chaque aile plus petite, & le sommet des inférieures nu; ce qui la rend plus noire en dessus.

La variété, que plusieurs entomologistes ont donnée sous le nom de *Leucomelas*, a le dessous des secondes ailes tout blanc. On y voit seulement une légère empreinte des parties noires de la surface opposée.

La chenille est verte ou jaunâtre, avec trois lignes longitudinales plus obscures, savoir: une sur le dos & une sur chacun des côtés. Sa tête est d'un brun-rougeâtre, & son corps se termine par une pointe bifide, sur laquelle sont deux petites épines rouges. On la trouve en mai sur le *phleum pratense* (la stéole des prés), gramin auquel les Anglais donnent le nom de *timothy*.

La chrysalide est ovoïde, jaunâtre, avec deux taches noires, oculaires, sur chaque côté de la tête. Le papillon paroît en juillet & en août dans les bois des parties tempérées de l'Europe. Il est très-commun aux environs de Paris.

92. SATYRE Lacheſis.

SATYRUS Lacheſis.

Sat. alis denticulatis, albis, basi supra immaculata; apice nigro maculis albis; posticis ocellis duobus tribusque nigris, utrinque conspicuis.

Papilio Arge Nemaſiaca. ESP. *Pap. part. 1. tab. 96. cont. 51. fig. 1. 2.*

LICG. Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. 4. p. 272.

Papilio Lacheſis. HERBST, *Pap. tab. 137. fig. 2.*

Papilio Lacheſis. HUBN. *Pap. tab. 41. fig. 139. 137. (Le mâle.)*

Papilio Lacheſis. HUBN. *Pap. tab. 42. fig. 133. 139. (La femelle.)*

Papilio Lacheſis. HUBN. *Beitr. tom. 2. taf. 5. fig. P. 1. 2.*

Papilio Lacheſis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 247. n. 56.*

Le dessous des deux sexes est, à une légère nuance près, comme dans le *Galathée*.

Mais le dessus, au lieu d'être noir à la base des ailes, avec une tache blanche ovale, est blanc, avec l'origine du bord interne un peu obscure; & l'extrémité des secondes ailes offre constamment quatre à cinq yeux semblables à ceux du dessous, ou pareil nombre de points bleuâtres.

De l'Espagne, du Portugal & du département des Pyrénées-Orientales. M. Duponchel l'a pris en juin dans les environs de Perpignan.

Nota. Engramelle n'a point connu cette espèce.

93. SATYRE Argé.

SATYRUS Arge.

Sat. alis denticulatis, flavescenti-albis, basi supra nigra macula albâ subovata; posticis utrinque ad apicem ocellis binis tribusque lineâque angulata nigris.

Papilio S. Arge, alis dentatis, albis, nigro strigosis; anticis ocello unico, posticis quinque. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n. 422. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 239. n. 746.*

Papilio Arge Russica. ESP. *Pap. part. 1. tab. 84. cont. 34. fig. 1. 2.*

Papilio Japygia, alis dentatis, albido-lutescentibus, nigro maculatis, maculis supra marginalibus rotundatis albido-lutescentibus; superioribus utrinque ocello unico, inferioribus duobus tribusque distantibus. ESP. *Pap. part. 1. p. 66. tab. 105. cont. 60. fig. 3. (Le mâle.)*

Papilio Japygia. ESP. *Pap. part. 1. tab. 111. cont. 66. fig. 3. (La femelle.)*

Papilio Japygia. CYRILL. *Ent. Neap. Specim. 1. tab. 3. fig. 5.*

Papilio Arge Russica. DE PRUNNER, *Lept. pedem. p. 70. n. 136.*

Papilio Arge Russica. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 107. n. 51. — part. 2. p. 211.*

Papilio Suwarovius. HERBST, *Pap. tab. 132. fig. 5-7.*

Papilio Clotho. HUBN. *Pap. tab. 42. fig. 190.* 191. (La femelle.)

Papilio Atropos. HUBN. *Pap. tab. 45. fig. 192.* 195. (Le mâle.)

Papilio Clotho. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 190.*

Papilio Atropos. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 187.*

Papilio Clotho. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 86.*

Papilio Clotho. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 248. n^o. 57.*

L'Éclair. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 325. pl. 5. 5^e. Suppl. fig. 61. a. b. bis.*

Il a près de deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes supérieures le rapprochent infiniment des ailes correspondantes du *Galathée*, mais les inférieures offrent des différences assez notables.

Les différences du dessus consistent en ce que la tache blanche de la base est accompagnée dans le mâle de deux taches extérieures plus petites, également blanches; en ce que l'extrémité est toujours de cette dernière couleur, avec cinq yeux bien distincts comme du côté opposé, puis deux lignes noires dont l'intérieure en feston.

Les différences du dessous portent sur ce que la bande un peu obscure n'a pas le milieu étranglé, & sur ce que la couleur du fond est la même dans la femelle que dans le mâle, c'est-à-dire, d'un blanc légèrement jaunâtre.

Il habite le Piémont, la Calabre, la Hongrie & les parties les plus méridionales de la Russie.

94. SATYRE Amphitrite (1).

SATYRUS Amphitrite.

Sat. alis denticulatis, albis, basi supra immaculata, apice nigro maculis albis; posticis ocellis duobus tribusque supra nigris, subtus rufis.

Papilio Arge. ESP. *Pap. part. 1. tab. 27. Suppl. 5. fig. 1.*

Papilio Arge. ESP. *Pap. part. 1. tab. 70. cont. 20. fig. 1.*

Papilio Arge, mas. ESP. *Pap. part. 1. tab. 111. cont. 66. fig. 2.*

Papilio Arge. HERBST, *Pap. tab. 182. fig. 3. 4.*

Papilio Arge. SULZ. *Inf. edit. ROM. p. 144. tab. 16. fig. 8. 9.*

Papilio Arge. FUSSL. *All. Magaz. tom. 1. p. 202.*

(1) Hubner a donné la femelle de cette espèce sous le nom d'*Amphitrite*, & le mâle sous celui de *Théïs*. Mais nous avons adopté le nom de la femelle, parce qu'il y a déjà une NYMPHEALE qui porte le nom de *Théïs*.

Papilio Arge. CYRILL. *Ent. Neap. Specim. 1. tab. 4. fig. 6.*

Papilio Arge. PETAGNA, *Specim. Inf. p. 56. tab. adjec. fig. 25.*

Papilio Arge. BERGSTR. *Nomencl. tab. 92. fig. 8. 9.*

Papilio Arge. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 85. n^o. 28.*

Papilio Arge. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 251. n^o. 58.*

Papilio Arge ficula. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 107 & 245. n^o. 50.*

Papilio Thetis. HUBN. *Pap. tab. 45. fig. 196.* 197. (Le mâle.)

Papilio Amphitrite. HUBN. *Pap. tab. 45. fig. 194.* 195. (La femelle.)

Papilio Amphitrite. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 205.*

Le Demi-Deuil aux yeux bleus. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 156. pl. 50. fig. 61. a. b.*

Il est de la taille du *Galathée*. Ses ailes font blanches & légèrement dentées. Leur dessus, dont l'origine est seulement un peu obscure, à l'extrémité noire, avec des taches blanches comme dans les espèces précédentes, & en outre une ligne marginale également blanche, mais plus prononcée dans la femelle que dans le mâle. Avant les taches, les secondes ailes ont une bande interrompue de cinq yeux noirs à prunelle bleue. Les premières ailes ont deux yeux semblables vis-à-vis du fomet, & une tache ou raie noire oblique entre la naissance & le milieu de la côte.

En dessous, où les nervures font noires, on retrouve tous les caractères que nous venons d'indiquer; mais les yeux font d'un roux-vif, avec un iris jaunâtre qu'entoure un cercle noir, & les secondes ailes ont vers la base deux lignes noires, transversales, dont l'extérieure double, & sensible en dessous dans les mâles.

Il habite la Sicile, la Calabre, l'Espagne & le Portugal. — Eugramelle se trompe en disant qu'il se trouve en Allemagne.

95. SATYRE Pêche.

SATYRUS Pêche.

Sat. alis denticulatis, albis, basi supra immaculata, apice nigro maculis albis & ocellis nigris; posticis subtus venis, ocellisque duobus & tribus, brunneis.

Papilio Syllius, alis albis, apice nigro maculatis, ocellis obsoletis: subtus ocellis quinque, venis fusco marginatis. HERBST, *Pap. part. 8. p. 15. tab. 182. fig. 8. 9.*

Papilio Syllius. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 254. n^o. 39.*

Papilio Arge Occitanica, alis dentatis, albo nigroque varis : inferioribus subtis venis ocellisque rufis inductis. ESP. *Pap. part. 1. p. 17. tab. 96. cont. 51. fig. 5. 4.*

Papilio Pfyche. HUBN. *Pap. tab. 44. fig. 198. 199.* (La femelle.)

Papilio Pfyche. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 202.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 135. pl. 50. fig. 60. c. 1.*

Il ne diffère essentiellement de l'*Amphitrite* que parce que tout le dessous des secondes ailes, & le dessous des premières au sommet, sont veinés de brun, & parce que le fond des yeux est aussi de cette couleur, au lieu d'être d'un roux-vif.

On le trouve dans le midi de la France, en Portugal, &c.; & non en Angleterre, comme l'a crû Engramelle.

96. SATYRE Déjanire.

SATYRUS Dejanira.

Sat. alis subdentatis, fuscis : anticis utrinque ocellis quinque : posticis subtis sex in fuscis alba repandâ, tertio minuto, anali bipupillato.

Papilio N. Dejanira, alis dentatis, fuscis : primoribus utrinque ocellis quinque : posticis subtis sex fuscisque albâ repandâ. LINN. *Syl. Nat. s. p. 774. n^o. 154. — Mus. Lud. Ulr. p. 282. n^o. 100.*

Papilio S. Dejanira. FAB. *Syl. Entom. p. 494. n^o. 222. — Spec. Inf. tom. 2. p. 76. n^o. 556. — Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n^o. 393. — Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 250. n^o. 719.*

Papilio Dejanirus. HERBST, *Pap. tab. 197. fig. 1. 2.*

ROES. *Inf. 4. tab. 55. fig. 1. 2.*

Papilio Dejanira. ESP. *Pap. part. 1. tab. 9. fig. 2.*

Papilio Dejanira. WIEN. *Verz. p. 166. sam. F. n^o. 5.*

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 177. n^o. 5.*

Papilio Dejanira. BERGESTR. *Nomencl. tab. 57. fig. 6. 7.*

BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 70 & 251. n^o. 7. — part. 2. p. 200.*

BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 259. n^o. 19.*

SCHNEID. *Syl. Besch. p. 177. n^o. 56.*

FUSSL. *Suiff. Inf. p. 29. n^o. 566.*

LANG. *Verz. 2. p. 18. n^o. 104. 105.*

Papilio Dejanira. HUBN. *Pap. tab. 58. fig. 170. 171.*

Papilio Dejanira. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 229. n^o. 50.*

Papilio Achine. SCOP. *Ent. Carn. p. 156. n^o. 455.*

La Bacchante. GEOFFR. *Hysl. Inf. tom. 2. p. 47. n^o. 15.*

La Bacchante. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 115. pl. 25. fig. 48. a. b.*

Sa largeur ordinaire est d'environ deux pouces. Les quatre ailes font légèrement dentées, d'un brun-obscure en dessus, avec une rangée courbe & transversale de cinq yeux noirs à iris jaunâtre vers le bout des supérieures, & trois à quatre yeux semblables, mais dont les deux postérieurs plus grands, vers le bout des ailes inférieures.

En dessous, où le fond est plus clair, ces yeux ont une prunelle blanche. Les cinq des premières ailes font précédés intérieurement d'une bande jaunâtre, pâle, transversale & flexueuse, dont l'empreinte paroît plus ou moins sur la surface opposée. Ceux des secondes ailes font placés sur une bande blanche, large, également flexueuse, & ils font au nombre de six, dont le troisième très-petit, & quelquefois effacé; le sixième ou l'anal à prunelle double & moins grand que les deux qui le précèdent immédiatement. Il y a en outre, vers la base de chaque aile, un trait blanchâtre, transversal, & le long du bord postérieur, une double ligne jaunâtre, un peu ondulée. Les petites échancrures de ce bord font blanches de part & d'autre. Le corps est du même brun que les ailes. Les antennes font noires & annelées de blanc en dessus, ferrugineuses en dessous.

Cette espèce paroît dans la première quinzaine de juin. Elle habite les bois. Son vol sautillant, ou plutôt par saccades, lui a fait donner le nom français de *Bacchante*. On la trouvoit assez communément au bois de Boulogne; mais elle ne s'y montre plus depuis une vingtaine d'années. Il faut aller la chercher à Saint-Germain & à Bondy. On la rencontre aussi à Meudon & à Vincennes du côté de Saint-Maur & de Fontenay-sous-Bois. — En Piémont, & même dans le département de la Charente-Inférieure, elle est plus grande & plus colorée. M. de Lavaux, actuellement professeur au Collège royal de Nîmes, a pris dans les environs de Saintes, lorsqu'il professoit l'Histoire naturelle à l'École centrale de cette ville, des individus dont la taille surpassoit de près d'un demi-pouce celle des individus que l'on trouve autour de Paris.

La chenille, suivant Hubner, est verte, avec des lignes longitudinales plus touchées & des pois

menus. Elle vit, disent les auteurs du *Catalogue systématique des Lépidoptères des environs de Genève*, sur le *Iolium temulentum* (Vivraie annuelle).

97. SATYRE Mineus.

SATYRUS Mineus.

Sat. alis fuscis : subtus strigâ mediâ lineisque quatuor apicalibus albis ; posticis ocellis septem, 1^o, 5^o, 4^o, 5^o majoribus.

Papilio D. F. Mineus, alis integerrimis, subfuscis : subtus posticis ocellis septem, anticis duobus, suprâ unico. Linn. *Syst. Nat.* 2. p. 768. n^o. 126?

Papilio D. F. Mineus, alis integerrimis, fuscis : anticis suprâ ocello unico : posticis subtus septem fasciâque albâ. Fab. *Syst. Ent.* p. 488. n^o. 197. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 65. n^o. 294. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 32. n^o. 341.

Papilio N. Mineus. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 158. n^o. 488.

Papilio N. Blasius, alis integerrimis, fuscis, suprâ immaculatis : subtus anticis ocellis tribus, posticis septem. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 5. *Suppl.* p. 426. n^o. 488-9.

Papilio Juslinus. Cram. *pl.* 326. *fig.* C.

Papilio Drusia. Cram. *pl.* 84. *fig.* C. D. (Var. ?)

Papilio Juslinus. Herbst, *Pap. tab.* 194. *fig.* 5.

Papilio Mineus. Herbst, *Pap. tab.* 196. *fig.* 1. 2. (Var.)

Le *Mineus* & le *Blasius* de Fabricius ne font qu'une seule espèce, dont le port, la taille & la couleur font comme dans le *Polydecta*. (Voyez n^o. 101.)

Le *Blasius* est sans taches en dessus. Le *Mineus* a sur chacune des quatre ailes, ou sur les supérieures seulement, un œil plus ou moins gros, suivant le sexe, noir, avec une prunelle blanche & un iris jaunâtre.

Le dessous de toutes les ailes, dans le *Blasius* comme dans le *Mineus*, est traversé obliquement par une ligne blanche, discoidale, à la suite de laquelle viennent deux lignes également blanches, tortueuses, réunies par leurs extrémités, embrassant des yeux noirs qui ont une prunelle blanche & un iris jaune. Les yeux des secondes ailes forment une rangée de sept, dont l'antérieure, le troisième, le quatrième & le cinquième plus gros. Les yeux des premières ailes varient de deux à cinq, dont un, celui qui se reproduit en dessus, plus gros. Il y a en outre, le long du bord terminal de chaque aile, une ligne, double & ondulée, du même blanc que les précédentes.

De la Chine & du Bengale.

Nota. Linnæus ne dit pas si son papillon *Mineus* a des lignes blanches en dessous. Peut-être étoient-elles oblitérées dans l'individu qu'il a décrit, individu qui du reste ressemble parfaitement à la plupart de ceux que nous avons vus.

Quant au *Drusia* de Grainer, il offre les caractères que nous indiquons, mais il n'a que six yeux.

98. SATYRE Hésione.

SATYRUS Hésione.

Sat. alis fuscis, suprâ immaculatis : subtus strigâ communi albâ ocellisque singulatim annulo plumbeo cinctis, anticarum duobus, posticarum sesquitertis.

Papilio N. Hésione, alis integerrimis, fuscis : subtus strigâ obliquâ albâ, anticis ocellis duobus, posticis sesquitertis. Fab. *Ent. Syst. em. tom.* 5. *pars* 1. p. 100. n^o. 508.

Papilio D. F. Medus, alis integerrimis, fuscis : subtus strigâ niveâ ocellisque anticarum duobus, posticarum tribus. Fab. *Syst. Ent.* p. 488. n^o. 198. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 66. n^o. 295. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 32. n^o. 342.

Papilio Hésione. Cram. *Pap. pl.* 11. *fig.* C. D.

Papilio Hésione. Cram. *Pap. pl.* 362. *fig.* C.

Papilio Hésione. Herbst, *Pap. tab.* 193. *fig.* 4. 5.

Nous réunissons l'*Hésione* & le *Medus* de Fabricius, parce que le second n'est bien certainement qu'une variété du premier.

Il a à peu près deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscure, avec une ligne blanchâtre, ondulée & terminale.

Le dessous est un peu plus foncé que le dessus, du moins dans beaucoup d'individus, & traversé obliquement au milieu par une raie blanche, entre laquelle & le bord les premières ailes ont deux yeux séparés, & les secondes trois dont l'antérieur plus petit & contigu au suivant. Ces yeux sont noirs, avec une prunelle blanche & un iris jaunâtre; ils sont en outre renfermés chacun dans un cercle couleur de mine de plomb. Il y a indépendamment de cela une double ligne jaunâtre sur le bord postérieur de chaque aile, bord qui est un peu finé aux inférieures. Le corps est brun; les antennes sont annelées de blanc & de noir, avec le bout de la massue rouffâtre.

Trouvé dans l'île de Java par M. Leschenault, & dans celle de King (mer du Sud) par MM. Péron & Lefeuve. C'est donc fur de faux renseignements que Fabricius le dit de Surinam.

Le *Medus* du même n'est point du Cap de Bonne-Espérance, mais de Java. Ce n'est, comme nous l'avons dit, qu'une variété de l'*Hésione*. Ellis

ne s'en distingue que parce que le cercle plombé qui entoure les yeux du dessous des ailes est nul ou plutôt effacé.

99. SATYRE Constantius.

SATYRUS Constantius.

Sat. alis integerrimis, obscurè cinereis, strigis marginali punctorum fusciorum. FAB.

Papilio N. Constantius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 152. n. 468.*

Papilio Constantius. JON. *Fig. piçl. 6. tab. 50. fig. 1.*

Voici ce qu'en dit Fabricius : les quatre ailes sont cendrées. Leur dessus offre une rangée terminale de points noirâtres, entourés chacun d'une lunule blanche.

Leur dessous est traversé, au-delà du milieu, par une bande pâle, large, & sur laquelle il y a une série de points obscurs.

Il habite. . . .

100. SATYRE Nécys.

SATYRUS Nécys.

Sat. alis integerrimis, supra nigricantibus, immaculatis : subtus nebuloso-cinereis, strigis tribus fuscis sericque punctorum sex albidorum.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre, & sans taches en dessus.

Leur dessous est cendré, piqué de brun, avec deux lignes obscures, transverses & ondulées, dont deux entre la base & le milieu, la troisième presque marginale & précédée intérieurement à chaque aile d'une série de six points blanchâtres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres & annelées de gris en dessus, ferrugineuses en dessous.

Du Brésil.

101. SATYRE Polydecta.

SATYRUS Polydecta.

Sat. alis fuscis : anticis supra ocello unico vel sesquialtero : subtus omnibus strigis duabus nigricantibus ; posticis ocellis seu punctis ocellaribus septem.

Papilio N. Polydecta, alis dentatis, fuscis : anticis ocello ; posticis supra duobus, subtus septem. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 83. n. 375. — Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n. 450. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 107. n. 329.*

Papilio S. Perseus, alis integerrimis, fuscis : subtus punctis ocellaribus, anticis tribus, posticis septem. FAB. *Syst. Ent. p. 488. n. 199. — Spec. Inf. tom. 2. p. 66. n. 296. — Mant. Inf. tom. 2.*

p. 32. n. 345. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 219. n. 685.

Papilio Polydecta. CRAM. *Pap. pl. 144. fig. E. F.*

Papilio Otreus. CRAM. *Pap. pl. 314. fig. A. B.*

Papilio Mamerta. CRAM. *Pap. pl. 326. fig. D.*

Papilio Franciscus. CRAM. *Pap. pl. 326. fig. E. F.*

Papilio Polydectus. HERBST, *Pap. tab. 196. fig. 5. 6.*

Papilio Otreus. HERBST, *Pap. tab. 196. fig. 3. 4.*

Papilio Mamertus. HERBST, *Pap. tab. 197. fig. 6.*

Papilio Franciscus. HERBST, *Pap. tab. 194. fig. 7. 8.*

Papilio Perseus. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New Holl. pl. 26. fig. 3.*

Papilio Perseus. JON. *Fig. piçl. 6. tab. 49. fig. 1.*

Le *Polydecta* & le *Perseus* de Fabricius nous paroissent ne former qu'une seule espèce, dont les papillons *Otreus*, *Mamerta* & *Franciscus* de Cramer sont des variétés.

Sa taille varie entre un pouce & demi & deux pouces. Les quatre ailes sont d'un brun-obscur en dessus. Les supérieures, dont le bord terminal est entier, ont, entre ce même bord & le disque, un grand ou un moyen œil noir à pruneau blanche & à iris jaunâtre, indépendamment duquel on voit parfois un autre très-petit vis-à-vis du sommet.

Les ailes inférieures sont sinuées. Leur dessus est ordinairement sans taches. Néanmoins, dans quelques individus de l'un & l'autre sexe, il y a, vers le milieu du bord postérieur, deux petits yeux colorés comme celui des premières ailes. Cela a lieu, par exemple, pour les *Polydecta*, *Otreus* & *Franciscus* de Cramer.

Le dessous des quatre ailes est tantôt beaucoup plus pâle que le dessus, tantôt d'un brun-obscur à reflet vineux, avec une suite d'yeux ou de points oculaires, le plus souvent au nombre de quatre sur les premières ailes, & toujours au nombre de sept sur les secondes. Entre ces yeux & la base, font deux lignes noirâtres, transverses, un peu ondulées, dont la postérieure ayant le côté interne plus ou moins éclairé de blanchâtre. Le long du bord terminal règne une double ligne obscure en feston, mais elle n'est bien distincte que dans le *Polydecta* proprement dit. Les points oculaires sont noirs, avec le milieu blanc ; & lorsqu'ils sont remplacés par des yeux, l'iris est grisâtre. Le corps

& les antennes font bruns. Celles-ci ont la massue rouffâtre & le dessous blanchâtre.

De la Chine & du Beugale.

N. B. Suivant Fabricius & Donovan cette espèce se trouveroit aussi à la Nouvelle-Hollande. C'est du moins la patrie qu'ils assignent à leur *Perseus* qui, comme nous l'avons dit, nous paroît être le même que le *Polydecta*.

102. SATYRE Martius (1).

SATYRUS Martius.

Sat. alis integerrimis, nigris: subtus punctis ocellaribus, anticis quatuor, posticis septem. FAB.

Papilio S. Martius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. n.º. 686.*

Papilio Martius. JON. *Fig. pict. 6. tab. 49. fig. 1.*

Fabricius le décrit ainsi : il a le port du *Perseus* (*Polydecta var.*), auquel il ressemble. Mais il forme une espèce distincte. Le dessus des ailes est noir & sans taches.

Leur dessous est pareillement noir, avec le bord plus pâle & précédé aux ailes supérieures de quatre yeux, dont le deuxième & le quatrième très-petits, & aux ailes inférieures de sept, dont le troisième plus grand.

Il habite. . . .

105. SATYRE Zachæus.

SATYRUS Zachæus.

Sat. alis integris, fuscis, suprâ ocellis duobus: subtus anticis quatuor, posticis sex. FAB.

Papilio S. Zachæus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 217. n.º. 679.*

Papilio Zachæus. JON. *Fig. pict. 4. tab. 15. fig. 2.*

Fabricius le décrit ainsi : il a le port du *Clérimon*. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec deux yeux à prunelle blanche sur chacune d'elles. Les inférieures en ont quelquefois un troisième, plus petit, près de l'aisselle.

Le dessous est de la même couleur que le dessus, avec quatre yeux à prunelle blanche sur les ailes de devant, & six semblables sur celles de derrière.

Il habite. . . .

104. SATYRE Tabitha.

SATYRUS Tabitha.

(1) N'ayant pas vu ce satyre, ni les trois suivans, nous ne sommes pas sûrs qu'ils forment des espèces distinctes. Nous penchons même à croire qu'ils doivent se rapporter au *Polydecte* ou au *Mancus*, lesquels sont peut-être aussi variétés l'un de l'autre.

Sat. alis dentatis, nigris: anticis ocello unico: subtus obscuris, frigâ punctorum ocellatorum. FAB.

Papilio S. Tabitha. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 243. n.º. 756.*

Il a le port de l'*Eudoru*. (*Voyez n.º. 164.*) Ses ailes font dentées, noires en dessus, avec un petit œil plus foncé & à prunelle blanche au sommet des supérieures.

En dessous le fond des quatre ailes est obscur, avec une rangée de points blancs, oculaires.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

105. SATYRE Clérimon.

SATYRUS Clerimon.

Sat. alis subrepandis, fuscis: anticis suprâ ocello atro: omnibus subtus quatuor minutis. FAB.

Papilio S. Clerimon. FAB. *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 217. n.º. 678.*

Papilio Clerimon. JON. *Fig. pict. 4. tab. 15. fig. 1.*

Il est de la taille de l'*Hypéranthus*. (*Voyez n.º. 162.*) Ses ailes sont légèrement finuées. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec un grand œil noir à prunelle blanche & à iris jaune sur les supérieures, & deux petits yeux à prunelle semblable sur les inférieures.

Le dessous de chaque aile a l'extrémité plus pâle, avec quatre petits yeux à prunelle blanche.

Il habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

106. SATYRE Florimel.

SATYRUS Florimel.

Sat. alis integerrimis, fuscis: subtus anticis ocellis duobus, posticis septem. FAB.

Papilio S. Florimel. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 215. n.º. 675.*

Papilio Florimel. JON. *Fig. pict. 6. tab. 50. fig. 2.*

Il est de moyenne taille & d'un brun-obscur en dessus. Les ailes supérieures ont deux yeux dépourvus de prunelle. Les inférieures sont sans taches.

En dessous le fond est plus pâle, & traversé au milieu par une large bande brunâtre, derrière laquelle les premières ailes ont deux yeux, dont le postérieur plus grand, & les secondes sept, dont le troisième, à partir du bas, aussi plus grand. Ces yeux sont noirs, avec une prunelle blanche & un iris jaune.

Il habite. . . .

(Traduction de Fabricius.)

107. SATYRE Mergus.

SATYRUS Mergus.

Sat. alis integerrimis, concoloribus, fuscis : anticis ocellis quatuor, anteriore pupillâ geminâ ; posticis quinque. FAB.

Papilio N. Mergus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 159. n°.* 490.

Papilio Mergus. JON. *Fig. piçã. 4. tab. 41. fig. 2.*

Ses ailes sont de part & d'autre d'un brun-obscur, avec quatre yeux noirs à prunelle blanche & à iris fauve sur les supérieures, & cinq sur les inférieures. L'œil antérieur des premières ailes est double.

De l'Afrique.

(Traduction de Fabricius.)

108. SATYRE Circe.

SATYRUS Circe.

Sat. alis dentatis, fusco-nigris, suprà fasciâ communi albâ : anticarum ocellis septem unice ; anticarum utrinquè maculari oculo sepius unico.

Papilio S. Circe, alis dentatis, fuscis, fasciâ utrinquè albâ : anticarum ocellis unico. FAB. *Syst. Entom. p. 495. n°.* 226. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 77. n°.* 342. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 59. n°.* 405. — *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 255. n°.* 726.

Papilio Circe. SCHÆFF. *Icon. tab. 82. fig. 1. 2.*

Papilio Circe. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 147. n°.* 1006.

ROES. *Inf. part. 1. tab. 27. fig. 5. 4.*

Papilio Proserpina. HERBST, *Pap. tab. 216. fig. 1. 4.*

Papilio Proserpina. ESP. *Pap. part. 1. tab. 59. Suppl. 15.*

Papilio Proserpina. ESP. *Pap. part. 1. tab. 42. Suppl. 18. fig. 5. — tab. 26. Suppl. 2. (La chenille.)*

Papilio Proserpina. WIEN. *Verz. p. 169. fam. F. n°.* 25.

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 196. n°.* 25.

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 202.*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 95. fig. 1. 2. & tab. 426. fig. 1. 2.*

Papilio Proserpina. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 65. n°.* 2. — *part. 2. p. 199. n°.* 2.

SCHNEID. *Syst. Besch. p. 92. n°.* 34.

LANG. *Verz. 2. p. 26. n°.* 190-193.

HILL. *Nat. Inf. Tome IX.*

Papilio Proserpina. SCHWARZ, *Raup. Cat. Ind. p. 45. n°.* 180.

Papilio Proserpina. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. p. 184. n°.* 1519.

Papilio Proserpina. HUBN. *Pap. tab. 26. fig. 119. (Mas.) fig. 120. 121. (Fem.)*

Papilio Proserpina. OCHSENI. *Pap. Eur. tom. 1. p. 167. n°.* 1.

Papilio Hermione. FUESSL. *Suff. Inf. p. 29. n°.* 564.

Papilio Velleda. NATURF. *p. 17. n°.* 5.

Le Silène. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 70. pl. 20. fig. 35. a. b.*

Le Silène. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 502. pl. 81. 2°. Suppl. pl. 2. fig. c. (La chenille.) fig. d. e. (Variétés du pap.)*

Il a près de trois ponces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande blanche, transverse, située vers le bord postérieur dont les échancrures sont également blanches. La bande des ailes inférieures est continue, un peu courbe en arrière & sinuée sur les côtés. Celle des ailes supérieures est composée de six taches dont l'antérieure oblongue & chargée dans son milieu d'un œil noir sans prunelle ; la suivante petite & pareillement oblongue ; les quatre autres presque triangulaires.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que l'œil de la bande a une prunelle d'un blanc-vif ; en ce qu'il y a près du milieu de la côte deux taches blanches, parallèles & un peu orbiculaires ; en ce que toute la côte & le sommet sont piqués de grisâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun piqué de gris, avec deux bandes blanches, transversales, dont l'intérieure courte, dilatée à son origine, très-étroite vers son extrémité ; l'extérieure correspondante à celle du dessus, mais plus fortement sinuée en dedans, & précédée en dehors d'un point oculaire avoisinant l'angle anal. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes ont le bout de la masse fauve.

Engramelle a figuré deux variétés. L'une a un second œil plus petit, placé vers le milieu de la bande des ailes de devant.

L'autre a la bande extérieure du dessous des ailes de derrière rouffâtre, au lieu de l'avoir blanche.

Cette espèce se trouve dans le midi de l'Allemagne, en Italie, & dans plusieurs contrées de la France. Elle donne en juillet & en août.

La chenille est, comme toutes celles du genre *Satyre*, terminée par une pointe bise. Son corps est d'un brun-noirâtre, avec six raies longitudinales, dont deux grises sur le dos, une rouffâtre sur chaque côté & une jaunâtre au dessus des pat-

res. Pendant le jour elle se tient cachée au pied de la plante, & ne sort pour manger qu'après le coucher du soleil. Sa démarche est lente. Elle vit sur la *flouve odorante* (*anthoxantum odoratum*), *Vivaine* (*lolium*), le *brome des bois* (*bromus sylvaticus*). Au mois de juin, elle fait fa chrysalide dans une cavité qu'elle pratique en terre.

109. SATYRE Brifeis.

SATYRUS Brifeis.

Sat. alis dentatis, supra fuscis, virescentimicantibus, fasciâ communi albâ: anticarum maculari ocellis duobus distinctis.

Papilio N. Brifeis, alis dentatis, fuscis, viridimicantibus, fasciâ albâ: anterioribus ocellis duobus, posterioribus cæcis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 770. n^o. 159. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 226.

Papilio S. Brifeis. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 76. n^o. 559. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 58. n^o. 596. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 251. n^o. 721.

Papilio Brifeis. HERBST, *Pap. tab.* 216. fig. 5. 6. & tab. 217. fig. 1. 2.

Papilio Brifeis. NATURF. 10. tab. 2. fig. 5. 4.

Papilio Brifeis. SCHÛFF. *Icon. tab.* 274. fig. 5. 6.

Papilio Brifeis. RHEIN. *Magaz. tom.* 1. p. 246. n^o. 54.

Papilio Brifeis. LANG. *Verz.* 2. p. 25. n^o. 179. 182.

Papilio Brifeis. WIEN. *Verz.* p. 169. *funt. F.* n^o. 20.

Papilio Brifeis. OCSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 170. n^o. 5.

Papilio Anthe. OCSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 169. n^o. 2. (Var. fem.?)

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. p. 193. n^o. 20.

ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 188.

ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 182. (Var. fem.?)

Papilio Brifeis. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 182. n^o. 1516.

Papilio Janthe. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 185. n^o. 1517.

Papilio Brifeis. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 69 & 250. n^o. 5.

Papilio Janthe. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 68 & 229. n^o. 4.

Papilio Daedale. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 67 & 229. n^o. 3.

Papilio Brifeis. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 96. fig. 1. 2.

Papilio Janthe. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 94. fig. 4. 5.

Papilio Daedale. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 94. fig. 1. 2.

Papilio Janthe major. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 26. *Suppl. 2.* fig. 1.

Papilio Janthe minor. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 26. *Suppl. 2.* fig. 2.

Papilio Pirata, alis dentatis, fuscis: superioribus fasciâ rufescente in sex areolas divisâ maculisque duabus rotundatis nigris subtus albo pupulatis; posticis supra fasciâ rufescente, subtus albidis atomis græfescens numerosis. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 100. *cont.* 55. fig. 3. (Var. fem.)

Papilio Brifeis. HUBN. *Pap. tab.* 28. fig. 150. 151.

Papilio Pirata. HUBN. *Pap. tab.* 118. fig. 604. 605. (Var. fem.)

Papilio Persephone. HUBN. *tab.* 115. fig. 589. 590. (Var. fem.?)

Papilio Janthe. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 95. n^o. 56.

Papilio Janthe. PALLAS, *Voy.* p. 17. n^o. 58.

Papilio Pirata. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem.* p. 75. n^o. 149.

L'Hermite. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 75. *pl.* 21. *fig.* 56. a-d.

L'Hermite. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 254. *pl.* 65. *Suppl.* 9. *fig.* 56. a-f.

Il a d'ordinaire à peu près un pouce de moins que le *Circé*. Les ailes supérieures sont légèrement dentées; les inférieures le sont davantage, surtout dans la femelle. Le dessus des quatre est d'un brun-noirâtre à reflet verdâtre, avec une bande oblique d'un blanc-sale. La bande des secondes ailes est continue, un peu finuée & dilatée dans son milieu. Celle des premières ailes est partagée en six ou sept taches longitudinales, dont l'antérieure & la quatrième chargées chacune d'un œil noir à prunelle blanche, mais moins prononcé dans le mâle que dans la femelle, surtout le postérieur. La côte de ces ailes est en outre blanchâtre jusqu'àuprès du sommet.

Le dessous des mêmes ailes est moins foncé que le dessus; la bande blanche y est plus large, moins interrompue, teintée de rouffâtre sur le côté externe; le sommet & le bord terminal y sont grisâtres; la partie antérieure de la surface est cendrée ou blanchâtre, avec une tache noire presqu'orbitulaire & appuyée sous le milieu de la côte.

Le dessous des secondes ailes est cendré à la base, avec deux taches noirâtres dans le mâle, sans taches dans la femelle; blancâtre ou plus clair sur la partie qui correspond à la bande du dessus; puis d'un brun-obscur, avec deux ou trois points blancs, dont le postérieur ocellé; enfin, terminé par une bande blancâtre ou cendrée qui a le côté interne finé. Les deux surfaces du corps sont de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres en dessus, pâles en dessous.

Le *Pirata* de quelques auteurs n'est qu'une variété femelle qui a la bande du dessus des quatre ailes rouflâtre, au lieu de l'avoir blanche. On la trouve particulièrement dans le midi de la France.

Le *Persephone* d'Hubner, ou *Anthe* de M. Ochsenheimer, ne paroît différer de cette variété qu'en ce que les yeux des ailes de devant sont sans prunelle de part & d'autre; en ce que les ailes de derrière ont un œil semblable près de l'angle de l'anus, & que leur dessous est partout du même brun, avec des marbrures grâtres.

Le *Briseis* habite à peu près toute l'Europe. Il paroît en juillet & en août dans les endroits pierreux. Nous l'avons pris sur la côte d'Anney près de Paris. — Dans le Midi les individus sont plus grands & plus colorés que dans le Nord.

110. SATYRE Hermione.

SATYRUS Hermione.

Sat. alis dentatis, fuscis, virescenti-micantibus, utrinque fasciâ communi albidâ: anticarum ocellis duobus distinctis, posticarum unico.

Papilio N. Hermione, alis dentatis, fuscis, fasciâ pallidâ: primoribus ocellis supra duobus, subtis unico. LINS. *Syst. Nat.* 2. p. 775. n^o. 149. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 281. n^o. 99.

Papilio S. Hermione. FAB. *Syst. Entom.* p. 495. n^o. 225. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 77. n^o. 541. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 59. n^o. 402. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 252. n^o. 727.

Papilio Hermione. HERBST, *Pap.* tab. 215. fig. 1-6.

Papilio Hermione. WIEN. *Verz.* p. 169. *fam. F.* n^o. 22.

Papilio Alcyone. WIEN. *Verz.* p. 169. *fam. F.* n^o. 21.

ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 194. n^{os}. 21 & 22.

ILLIG. *Magaz.* tom. 3. p. 184 & p. 194. — tom. 4. p. 36.

BERGST. *Nomenclat. tab.* 95. fig. 3. 4. — *tab.* 126. fig. 5-5. — *tab.* 127. fig. 1. 2. 3.

Papilio Hermione. BORKE. *Pap. Eur.* part. 1. p. 63 & 228. n^o. 1. — *part.* 2. p. 199.

BORKE. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 248. n^o. 55.

Papilio Hermione. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 91. n^o. 35.

Papilio Alcyone. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 89. n^o. 52.

Papilio Hermione. LANG. *Verz.* 2. p. 26. n^o. 185-186.

Papilio Alcyone. LANG. *Verz.* 2. p. 26. n^o. 187-189.

Papilio Hermione minor. ESP. *Pap.* part. 1. tab. 8. fig. 2.

Papilio Hermione major. ESP. *Pap.* part. 1. tab. 8. fig. 3.

Papilio Hermione major. ESP. *Pap.* part. 1. tab. 70. cont. 20. fig. 4. (Mas. Var.)

ROES. *Inf.* part. 3. tab. 34. fig. 5. 6.

Papilio Hermione. HUBN. *Pap.* tab. 27. fig. 122. (Mas.) fig. 123. 124. (Fem.)

Papilio Alcyone. HUBN. *Pap.* tab. 27. fig. 125. 126.

Papilio Hermione. SCHRANK, *Faun. Boic.* tom. 2. p. 183. n^o. 1518.

Papilio Hermione. OCHSENH. *Pap. Eur.* tom. 1. p. 175. n^o. 4.

Papilio Alcyone. OCHSENH. *Pap. Eur.* tom. 1. p. 176. n^o. 5.

ROSSI, *Faun. Etr.* tom. 2. p. 147. n^o. 1005.

Papilio Fagi. SCOP. *Ent. Carn.* p. 151. n^o. 428.

Papilio Jurtina. HUFNAG. *Magaz.* tom. 2. p. 78. n^o. 42.

NATURF. 6. p. 10. n^o. 42.

La Silène. GEOFFR. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 46. n^o. 15.

Le Silvandre. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 71. pl. 20. fig. 54. a. b. c.

Le petit Silvandre. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 255. pl. 65. *Suppl.* 8. fig. 55. a. b. c.

Il est presque aussi grand que le *Circé*. Les quatre ailes sont dentées & bordées de blanc aux échancrures. Leur dessous est d'un brun-noirâtre, légèrement glacé de verdâtre, avec une bande postérieure d'un blanc plus ou moins sale. Cette bande, dont le côté interne est crénelé, est courbe aux secondes ailes & précédée en dehors, vers l'angle anal, d'un petit œil noir à prunelle blanche : aux premières ailes, elle est marquée

de deux yeux semblables, & écartés, dont le supérieur un peu plus grand.

Le dessous de ces mêmes ailes ressemble au dessus, mais la côte & le fommet y sont piqués de gris; la bande y est plus claire & n'offre le plus souvent dans les mâles que l'œil antérieur; nous disons le plus souvent, parce que les deux yeux se retrouvent dans des mâles plus petits, & que plusieurs auteurs ont désigné sous le nom d'*Alcyone*.

Le dessous des ailes inférieures diffère du dessus, en ce que tout le fond est piqué de gris, & la bande de brun; en ce que celle-ci est bordée de noir sur les côtés, & en ce qu'il y a vers la base une ligne transverse & ondulée également noire. Le corps & les antennes sont du même ton que les ailes.

La chenille vit sur la *houque laineuse*, vulgairement appelée *foin blanc* ou *foin de mouton* (*holcus lanatus*). Elle est griffée, avec une ligne noire le long du dos.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, au mois d'août. Elle fréquente les bois & les hauteurs. Elle est très-commune à Fontainebleau.

L'*Alcyone*, que nous avons citée tout-à-l'heure, n'est, comme l'ont pensé Linnæus & Fabricius, qu'une variété plus petite, ayant deux yeux de part & d'autre sur la bande des ailes supérieures du mâle. Cette variété se prend avec les individus ordinaires, mais elle paroît s'être multipliée dans les endroits où la plante qui sert de nourriture à la chenille acquiert moins de développement.

111. SATYRE Sémélé.

Saturus Semele.

Sat. alis dentatis, supra fuscis, fuscis latefcente, sinuatâ, interruptâ; anticarum utrinque biocellata; posticis subtus cinereo fuscoque marmoratis, fuscis albidâ, angulatâ.

Papilio N. *Semele*, *alis dentatis, fuscis, fulvo fuscicatis; posterioribus albo nigroque varis*. Linn. *Syst. Nat.* 2. p. 772. n°. 148. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 276. n°. 1031.

Papilio S. *Semele*, *alis dentatis, fuscis maculari fulvâ ocellisque duobus; anticis subtis disco basalis fulvo*. Fab. *Syst. Ent.* p. 404. n°. 224. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 76. n°. 541. — *Blant. Inf.* tom. 2. p. 59. n°. 400. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 232. n°. 725.

Papilio Semele. Wien. *Verz.* p. 169. *Sam. F.* n°. 17.

ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 191. n°. 17.

ILLIG. *Magaz.* tom. 3. p. 204.

SCHREFF. *Icon.* tab. 207. fig. 3. 4.

SELZ. *Inf.* tab. 17. fig. 5. 6.

BERGSTR. *Nomencl.* tab. 28. fig. 7. 8. — *tab.* 52. fig. 3.

Papilio Semele. Esp. *Pap.* part. 1. tab. 8. fig. 1.

PANZ. *Faun. Germ.* 76. 25.

Papilio Semele. HERBST, *Pap.* tab. 211. fig. 5-8.

Papilio Semele. BORRH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 69 & 250. n°. 6.

BORRH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 246. n°. 53.

Papilio Semele. LEWIN. *Inf.* tab. 17. fig. 1-4.

SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 88. n°. 51.

LANG. *Verz.* 2. p. 25. n°. 175-178.

MULLER, *Zool. Dan.* p. 115. n°. 1523.

Papilio Semele. SCHRANK, *Faun. Boic.* tom. 2. p. 181. n°. 1314.

FUESSL. *Suiff. Inf.* p. 29. n°. 565.

ROSSI, *Faun. Etr.* tom. 2. p. 147. n°. 1004.

Papilio Semele. HUBN. *Pap. tab.* 51. fig. 143. 144. (Mas.)

Papilio Semele. OCHSENH. *Pap. Eur.* tom. 1. p. 197. n°. 15.

Papilio Danae. HUFNAG. *Magaz.* tom. 2. p. 82. n°. 50.

L'Agreste, ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 76. pl. 22. fig. 53. a. b. c.

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes sont dentelées, notamment les inférieures, avec les échancrures ciliées de blanc. Leur dessus est d'un brun-obscur depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite noirâtre jusqu'au bout, avec une bande d'un jaune plus ou moins fauve, linéée, interrompue, terminée aux ailes inférieures par un petit œil noir à prunelle blanche, offrant aux supérieures deux yeux semblables, mais plus grands, dont l'antérieur placé sur le milieu de la première tache à partir d'en haut, le postérieur sur le milieu de la quatrième.

En dessous, les ailes de devant ont le milieu fauve, avec la côte & le bord interne cendrés. Leur bande du dessus reparoit ici chargée de ses deux yeux, mais elle y est plus pâle, continue, & la portion du bord antérieur où elle prend son origine est marquée de blanc.

Le dessous des ailes de derrière est cendré, piqué de brun, avec une bande blanchâtre, transverse, anguleuse, discoidale, plus prononcée dans le mâle que dans la femelle, & un petit œil correspondant à celui de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunâtres en dessus, grises en dessous.

Le mâle a la bande fauve du dessus des ailes moins prononcée que la femelle.

On trouve cette espèce, en juillet & en août, dans presque toutes les parties de l'Europe. Elle aime les bois secs, les lieux pierreux, & s'attache volontiers aux arbres qui fument. — Les parcs de Saint-Cloud, de Boulogne, de Vincennes, sont les endroits des environs de Paris où on la prend le plus communément.

112. SATYRE Alcyone.

SATYRUS Alcyone.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, fuscis lateâ nigro marginatâ : anticarum haud sinuatâ, utrinquè biocellatâ : posticis subtus cinereo fuscoque marmoratis, fuscis nulla.

Papilio S. Alcyone, alis dentatis, fuscis, flavo fuscis : anticis utrinquè ocellis duobus : posticis subtus marmoratis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n. 599.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 231. n. 724.*

Papilio Agave. ESP. *Pap. part. 1. tab. 84. cont. 34. fig. 4.*

Papilio Agave. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 102. n. 45.* — *part. 2. p. 210.*

Papilio Agave. HUBN. *Pap. tab. 30. fig. 139. 140. (Fem.)*

Papilio Hippolyte. HERBST, *Pap. tab. 211. fig. 3. 4.*

Papilio Hippolyte. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 87. n. 50.*

Papilio Hippolyte. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 206. n. 20.*

L'Hippolyte. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 352. pl. 8. 5. Suppl. fig. 56. a. b.*

Il a de très-grands rapports avec le *Sémélé*. Mais ce qui l'en distingue, c'est que la bande jaune du dessus des ailes est mieux détachée du fond & bordée de noir; qu'elle est droite & presque continue aux supérieures; qu'elle n'a aucune tache, du moins bien distincte, aux inférieures; que le dessous de celles-ci est dépourvu de bande blanche anguleuse; que le dessous de celles-là, à l'exception des bords qui sont bruns, est partout d'un jaune-pâle & en outre coupé transversalement par des lignes noires, ondulées.

Il habite les lieux très-élevés des parties les plus méridionales de la Russie.

N. B. On ne doit pas le confondre avec cet *Hermione* varié, dont quelques auteurs ont, comme nous l'avons dit, fait une espèce à part, sous le nom d'*Alcyone*.

113. SATYRE Aréthuse.

SATYRUS Aréthusa.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, fuscis maculari fulvâ ocello cæco : posticis subtus cinereo fuscoque marmoratis, fuscis albidis recurvâ.

Papilio S. Aréthusa, alis dentatis, suprà fuscis fuscis maculari rufâ : anterioribus utrinquè ocello unico. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 59. n. 401.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 252. n. 726.*

Papilio Aréthusa. HERBST, *Pap. tab. 206. fig. 5-6.*

Papilio Aréthusa. WIEN. *Ferz. p. 69. sum. F. n. 16.*

ILLIC. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 196. n. 16.*

ILLIC. *Magaz. tom. 3. p. 186.* — *tom. 5. p. 182.*

Papilio Aréthusa. ESP. *Pap. part. 1. tab. 69. cont. 19. fig. 3. 4.*

Papilio Aréthusa. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 99 & 244. n. 59.* — *part. 2. p. 208.*

SCHNEID. *Syst. Besch. p. 87. n. 29.*

Papilio Aréthusa. HUBN. *Pap. tab. 34. fig. 154. 155.*

Papilio Aréthusa. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 208. n. 21.*

Le petit Agreste. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 77. pl. 22. fig. 59. a. b. c.*

Le Mercure. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 258. pl. 64. Suppl. 10. fig. 58. a. b. bis.*

Il est un peu plus petit que le *Sémélé*. Ses quatre ailes sont faiblement dentées, d'un brun-obscur en dessus, avec une bande fauve postérieure & maculaire, offrant vis-à-vis du sommet des supérieures & près de l'angle anal des inférieures un œil noir sans prunelle.

Le dessous des premières ailes est d'un roux plus ou moins vif, avec les bords obscurs & entrecoupés de noirâtre, surtout l'antérieur; plus un œil noir à prunelle blanche, correspondant à celui de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est cendré, piqué de brun, avec une bande blanchâtre, transversale, discoïdale, courbe en arrière, un peu sinuée en avant, & précédée en dehors d'un petit œil noir à prunelle blanche. Les échancrures du bord postérieur sont blanchâtres, & le corps est de chaque côté de la même couleur que les ailes inférieures.

Il habite la Russie, la Hongrie, le midi de l'Allemagne & plusieurs contrées de la France. On le trouve communément, au mois d'août, dans les forêts de Senart, de Fontainebleau, & près de Versailles.

N. B. Les femelles ont quelquefois deux yeux sur chaque surface des premières ailes. On voit

au contraire des mâles, comme le *Mercur* d'Engramelle, qui n'en ont pas aux secondes ailes.

114. SATYRE AUTONOE.

SATYRUS Autonoe.

Sat. alis dentatis, supra fuscis, fuscis flavescente: anticarum utrinque biocellata: posticis subtis nebulosis, venis strigisque aliquot albidis.

Pupilio S. Autonoe, alis dentatis, fuscis, flavo subfuscatis ocellisque duobus pupillatis: anticis subtis basi fuscis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n. 598.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 251. n. 725.*

Pupilio Autonoe. ESP. *Pap. part. 1. tab. 86. cont. 36. fig. 17. 2. 5.*

Pupilio Autonoe. HERBST, *Pap. tab. 212. fig. 1-6.*

Pupilio Autonoe. BORRH. *Pap. Eur. part. 1. p. 103.* — *part. 2. p. 210. n. 43.*

Pupilio Autonoe. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 94. n. 55.*

Pupilio Autonoe. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 137.*

Pupilio Autonoe. HUBN. *Pap. tab. 50. fig. 137. 138. (Fem.)*

Pupilio Autonoe. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 177. n. 6.*

JON. *Fig. piñ. 4. tab. 47. fig. 2.*

L'ICARE. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 555. pl. 8. 5. Suppl. fig. 40. a. b. bis.*

Il est approchant de la taille du *Sémélé*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bande jaunâtre, postérieure & transverse. La bande des premières ailes est plus prononcée & chargée de deux yeux noirs à prunelle blanche, & assez éloignés l'un de l'autre. Celle des secondes ailes offre, près de l'angle de l'anus, un œil beaucoup plus petit, qu'accompagnent quelquefois deux points blancs extérieurs.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, excepté que le disque est rouillâtre.

Le dessous des secondes ailes est cendré, piqué de brun, avec des veines blanchâtres, longitudinales, & trois raies transverses de cette couleur. On y retrouve en outre le petit œil de la surface opposée. Le bord de chaque aile est dentelé & cilié de blanc.

Des bords du Volga.

N. B. La phrase spécifique de Fabricius pourroit faire croire que le milieu des ailes supérieures est obscur, tandis qu'il est rouillâtre.

115. SATYRE AELLO.

SATYRUS Aello.

Sat. alis dentatis, supra fuscescenti-luteis, fuscis dilatore: anticis utrinque (fem.) punctis duobus ocellatis, subtis (mas) unico: posticarum punctis inferiori fusco cinereoque marmoratis, venis albidis.

Pupilio N. Ph. Aello, alis fuscis, limbo lato fuscescente: superioribus vittis longitudinali circumata nigricante, ocello apicis cæco altero re minori anguli postici: inferioribus supra ocellis duobus ad angulum anti, subtis punctis strigisque numerosis, venis albis. ESP. *Pap. part. 1. p. 103. tab. 115. cont. 70. fig. 1.*

Pupilio Aello. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 184.*

Pupilio Aello. HUBN. *Pap. tab. 51. fig. 141. 142. (Fem.)*

Pupilio Aello. HUBN. *Pap. tab. 102. fig. 519. 520. (Mas.) fig. 521. (Var. fem.)*

Pupilio Aello. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 199. n. 16.*

Il est à peu près de la taille du précédent. Ses ailes sont dentelées, avec les échancrures d'un blanc-grisâtre. Leur dessus est d'un jaune plus ou moins obscur, suivant le sexe, avec une bande postérieure un peu plus claire, sur laquelle le mâle offre à chaque aile deux points blancs bordés de noirâtre, & la femelle deux points semblables aux ailes de devant, un seul à celles de derrière.

Le dessous des premières ailes est de la couleur du dessus, avec l'angle & le bord postérieur marbrés de brun & de gris, & un point oculaire dans le mâle, deux dans la femelle.

Le dessous des secondes ailes est cendré, aspergé de brun-obscur, avec les nervures blanchâtres, & un point oculaire près de l'angle de l'anus.

Des Alpes & du Tyrol.

116. SATYRE NORNA.

SATYRUS Norna.

Sat. alis dentatis, supra fuscescenti-luteis, fuscis dilatore: anticis utrinque (mas) punctis duobus ocellatis, (fem.) tribus: posticis subtis albedo cinereoque marmoratis, fuscis fuscis, sinuata, mediâ.

Pupilio Norna, alis cinereo-flavescentibus: posticis subtis fusco marmoratis.

Var. α. *Alæ anticæ supra punctis sesquialteris, subtis ocellis tribus minutis; posticæ supra puncto, subtis ocello unico.*

Var. β. *Alæ anticæ supra punctis duobus, subtis ocellis totidem; posticæ absque punctis & ocellis.* THUNBERG, *Dissert. Acad. tab. 5. fig. 11.*

Pupilio Norna. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 201. n. 17.*

Papilio Celæno. HUBN. *Pap. tab. 50. fig. 142.* (Fem.)

Papilio Celæno. HUBN. *Pap. tab. 54. fig. 152.* 153. (Mas.)

Papilio Jutta. HUBN. *Pap. tab. 120. fig. 614.* 615.

Papilio Hilda. SCHNEID. *Ent. Magaz. 4.* p. 414. n^o. 5.

Papilio Norma. SCHNEID. *Ent. Magaz. 5.* p. 586.

Il est absolument de la taille & de la couleur de l'*Aello*. Mais il s'en distingue par le nombre des points oculaires & par le dessous des ailes inférieures. Le mâle a de part & d'autre deux de ces points aux ailes supérieures, & la femelle trois, dont l'intermédiaire plus petit. Les secondes ailes de deux sexes n'en offrent qu'un, encore maquet-il quelquefois. Le dessous de ces dernières n'a pas de veines blanchâtres, du moins bien prononcées, & le milieu de la surface est traversé par une bande plus obscure que le fond, & finée sur les côtés.

Telles sont les différences que nous a fournies la comparaison de plusieurs individus de l'un & de l'autre sexe. Elles s'accordent bien avec ce que Thunberg dit de ce fatyre dans les *Dissertations académiques*.

Du nord de la Laponie.

117. SATYRE Fortunatus.

SATYRUS Fortunatus.

Sat. alis teneris, denticulatis, flavescenti-griseis, margine postico extius nigro punctato: posticis subtus atomis sibilisque duabus undulatis fuscis.

Papilio S. Fortunatus, alis integris, fuscis: posticis subtus albo nigroque marmoratis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 214. n^o. 670.*

Papilio Bore, alis rotundatis, pallide ochraceis, atomis fuscis: inferioribus utrinque fuscis nebulosis nigricantibus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 100. cont. 55. fig. 1.*

Papilio Bore. ESP. *Pap. part. 1. tab. 103. cont. 65. fig. 1.*

Papilio Borv. HUBN. *Pap. tab. 29. fig. 154.* (Mas.) *fig. 153. 156.* (Fem.)

Papilio Bore. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 205. n^o. 19.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 183.*

Papilio Norma, alis dentatis, suprè griseo-testaceis, fusco marginatis: posticis subtus fuscis marmoratisque. SCHNEID. *Magaz. 4. p. 415. n^o. 4.*

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses ailes sont minces, légèrement dentées, d'un gris jaunâtre en dessus, avec les échancrures blanchâtres & séparées par de petits points noirs.

Le dessous des ailes supérieures est à très-peu de chose près semblable au dessus.

Le dessous des ailes inférieures est grisâtre, avec des atomes d'un brun-obscur, épars sur toute la surface, mais plus ferrés à la base & formant sur le milieu deux raies transverses, parallèles, ondulées & un peu visibles du côté opposé. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noires, avec le bout de la massue jaunâtre.

Il se trouve en Laponie.

118. SATYRE Tarpeius.

SATYRUS Tarpeius.

Sat. alis integris, suprè fuscescenti-luteis: omnibus utrinque serie punctorum 4-5 nigrorum: posticis subtus nebulosis, fuscis repandâ obscuriore venisque albidis.

Papilio S. Tarpeius, alis integris, fulvis: omnibus ocellis quatuor caecis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n^o. 538.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 214. n^o. 669.*

Papilio Tarpeia, alis flavescenti-fuscis, utrinquè serie punctorum nigrorum, subtus subpapillatis: inferioribus nebulosis. ESP. *Pap. part. 1. tab. 85. cont. 55. fig. 1. 2.*

Papilio Tarpeius. HERBST, *Pap. tab. 215.* *fig. 5-8.*

Papilio Tarpeia. BORKH. *Pap. Eur. part. 1.* p. 101. n^o. 41. — *part. 2. p. 209.*

Papilio Tarpeia. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1.* p. 205. n^o. 18.

Papilio Celanene. CRAM. *Pap. pl. 575. fig. E. F.*

Il est de la taille du *Fortunatus*. Le dessus des ailes est d'un fauve-obscur, avec le bord terminal brun & précé. d'un raog de gros points noirs, au nombre de quatre sur chaque aile, & quelquefois de cinq sur les inférieures.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais le fond est plus pâle & le sommet légèrement rayé de gris.

Le dessous des secondes ailes est cendré, moucheté de brun, avec une bande plus obscure, discordale, finée, & des veines blanchâtres, longitudinales, qui le dilatent sur les côtés de la bande fuscine. Les points de la surface opposée se reproduisent ici, mais ils sont moins noirs & presque oculaires.

Il habite les bords du Volga.

119. SATYRE Phryneus.

SATYRUS Phryneus.

Sat. alis teneris, integris, supra lacteis, im-maculatis: subtus fuscis, venis argenteo-candidis fuscis: que pallidiis oculis 5-6.

Papilio S. Phryneus, alis integerrimis, supra albis: subtus fuscis, albo venosis, oculis quinque. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n. 354. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 222. n. 697.*

Papilio Phryne. PALLAS, *Voy. part. 1. p. 572. n. 60.*

Papilio Phryne. ESP. *Pap. part. 1. tab. 89. fig. 5. 4.*

Papilio Phryne. ESP. *Pap. part. 1. tab. 115. cont. 68. fig. 6.*

Papilio Phryneus. HERBST, *Pap. tab. 215. fig. 1-4.*

Papilio Tircis. HERBST, *Pap. tab. 185. fig. 7. 8.*

Papilio Phryne. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 108 & 246. n. 52. — part. 2. p. 211.*

Papilio Phryne. HUBS. *Pap. tab. 44. fig. 200. 201.*

Papilio Phryne. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. n. n.*

Phryne. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 555. 5. Suppl. fig. 58. a. b. bis.*

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses ailes sont très-minces, entières, d'un blanc de lait & sans taches en dessus, avec une frange à peine cendrée.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec un trait discoïdal & de larges veines d'un blanc-argenté. Indépendamment de cela, il y a vers l'extrémité une bande pâle, chargée d'yeux noirs à prunelle blanche, lesquels sont au nombre de cinq & un peu plus grands sur les ailes supérieures, au nombre de cinq ou de six, dont l'anale très-petit, sur les ailes inférieures. Le corps est blanc, avec la partie antérieure du corselet brunâtre.

Il se trouve en Russie, sur les bords du Volga. Pallas dit qu'il ne l'a rencontré qu'auprès de *Syfrane*.

120. SATYRE *Fidia*.

SATYRUS Fidia.

Sat. alis dentatis, fuscis, viriscenti-micantibus: anticis oculis duobus utrinque pupillatis punctisque totidem albis intermedis: posticis subtus fusco alboque variis, strigâ sesquialterâ nigra, flexuosa.

Papilio N. Fidia, alis dentatis, supra fuscis, caeruleo micantibus: anterioribus oculis duobus punctisque duobus albis. LINS. *Syst. Nat. 2. p. 770. n. 158.*

Papilio S. Fidia, alis dentatis, supra fuscis: anticis oculis duobus punctisque duobus albis: posticis subtus strigâ angulatâ atrâ. FAB. *Syst.*

Entom. p. 491. n. 209. — Spec. Inf. tom. 2. p. 71. n. 517. — Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n. 570. — Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 225. n. 706.

Papilio Fidia. HERBST, *Pap. tab. 199. fig. 5. 6.*

Papilio Fidia. ESP. *Pap. part. 1. tab. 49. Suppl. 25. fig. 5.*

Papilio Fidia. DEVILLERS, *Ent. Linn. tom. 2. p. 22. n. 51. tab. 4. fig. 8.*

BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 72 & 255. n. 10. — part. 2. pag. 201.*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 195.*

SCHNEID. *Syst. Besch. p. 98. n. 59.*

ROSSI, *Mant. tom. 2. p. 9. n. 545.*

Papilio Fidia. HUBS. *Pap. tab. 52. fig. 147. (Mas.) 148. (Fem.)*

Papilio Fidia. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 179. n. 7.*

Le FAUNE. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 575. pl. 21. fig. 57. c. d.*

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Les quatre ailes sont dentelées, avec les échancrures des supérieures & le bord entier des inférieures ciliés de blanc de part & d'autre. Leur dessus est d'un brun-obscur, légèrement glacé de verdâtre. Celui des inférieures offre, vers le bout, deux yeux noirs à prunelle blanche, & séparés par deux points de cette dernière couleur. Le dessus des ailes inférieures a, non loin du bord terminal, une ligne arquée de quatre ou cinq points blanchâtres, dont le postérieur ocellé ou entouré de noir.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus, en ce que le fond est plus pâle; en ce que les deux yeux ont un iris jaunâtre & qu'ils sont précédés intérieurement d'une bande blanche, transverse, étroite, anguleuse, bordée de noirâtre du côté de la base & un peu sensible en dessus; en ce qu'il y a sur le milieu du bord d'en haut deux traits noirs, transversaux, dont l'intérieur droit, l'extérieur presque en S.

Le dessous des secondes ailes est varié de brun-cendré & de blanc, & l'on voit sur son milieu deux lignes noires, transversales & flexueuses, dont l'intérieure beaucoup plus courte. Au point oculaire de la surface opposée correspond ici un point semblable. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noirâtres en dessus, cendrées en dessous.

Il est très-commun, au mois de juillet, en Italie, en Portugal & dans le midi de la France.

121. SATYRE *Fauna*.

SATYRUS Fauna.

Sat.

Sat. alis dentatis, fuscis, virescenti-micantibus : anticis ocellis duobus supra cæcis punctisque totidem albis intermedis : posticis subtus cinereis, strigâ sesquialtera fuscâ, sexuosa, fistiâque media albicante.

Papilio S. Fauna, alis dentatis, supra fuscis : anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis subtus griseis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 571. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 226. n. 759.*

Papilio N. Allionia, alis dentatis, fuscis : anticis subtus ocellis duobus, posteriori cæco. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n. 566. — Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n. 442. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 104. n. 522.*

Papilio Fauna. SULZ. *Inf. tab. 17. fig. 8. 9.*

Papilio Fauna. PANZ. *Faun. Germ. 34. 25.*

Papilio Fauna. ESP. *Pap. part. 1. tab. 29. Suppl. 5.*

Papilio Fauna. ESP. *Pap. part. 1. tab. 65. cont. 15. fig. 7.*

Papilio Fidia, var. ESP. *Pap. part. 1. tab. 52. fig. 4.*

Papilio Arachne. ESP. *Pap. part. 1. tab. 95. cont. 50. fig. 2. 5.*

Papilio Allionia. ESP. *Pap. part. 1. tab. 105. cont. 60. fig. 4.*

Papilio Arachne. WIEN. *Verz. p. 169. sam. F. n. 18.*

Papilio Fauna. ILLIG. *Magaz. tom. 1. p. 450. — tom. 3. p. 195. — tom. 4. p. 50 & 54.*

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 192. n. 18.*

Papilio Fauna. БОРКН. *Pap. Eur. part. 1. p. 72 & 255. n. 11. — part. 2. p. 201.*

Papilio Allionia. БОРКН. *Pap. Eur. part. 1. p. 84. n. 22.*

Papilio Arachne. БОРКН. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 250. n. 57.*

Papilio Fauna. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 96. n. 37.*

Papilio Fauna. ROSSI, *Mant. tom. 2. p. 10. n. 346.*

BERGST. *Nomencl. tab. 152. fig. 3. 4.*

FUESSL. *Magaz. tom. 1. part. 2. p. 204.*

Papilio Arachne. LANG. *Verz. 2. p. 25. n. 161-164.*

Papilio Fidia. DE PRUNN. *Lepid. Pedem. p. 72. n. 145.*

Papilio Allionia. DE PRUNN. *Lepid. Pedem. p. 72. n. 146.*

Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

Papilio ALEXA. DE VILLERS, *Ent. Linn. tab. 4. fig. 9.*

Papilio Fauna. HUBN. *Pap. tab. 52. fig. 145. 146.*

Papilio Fauna. HUBN. *Pap. 100. fig. 507-511.*

Papilio Allionia. CYRILL. *Entom. Neap. 1. tab. 2. fig. 15.*

Papilio Fidia, mas. HERBST, *Pap. tab. 200. fig. 1. 2.*

Papilio Statilinus. HERBST, *Pap. tab. 200. fig. 5-6.*

Papilio Allionius. HERBST, *Pap. tab. 201. fig. 5. 6.*

Papilio Statilinus. NATUREF. 6. p. 15. n. 52.

Papilio Statilinus. HUNAF. *Magaz. tom. 2. p. 84.*

Papilio Allionia. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 181. n. 8.*

Papilio Statilinus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 184. n. 9.*

Le Faune (& par correctif Coronis). ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 75. pl. 21. fig. 37. a. b.*

Le Faune. ENGRAM. *P. p. d'Europe, tom. 1. p. 255. pl. 65. Suppl. 9. fig. 37. e. f.*

L'Arachné. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 257. pl. 63. Suppl. 9. fig. 37. a. b. c. bis.*

Le satyre *Fauna* & la nymphale *Allionia* de Fabricius ne font qu'une seule espèce à laquelle se rapportent le *Coronis* & l'*Arachné* d'Engramelle.

Cette espèce ressemble beaucoup au *Fidia*, mais elle est ordinairement plus petite ; les cils du bord terminal de ses quatre ailes sont gris & non d'un beau blanc ; les deux yeux du dessus des premières ailes & l'œil postérieur de leur dessous sont sans prunelle ; le dessous des secondes ailes, au lieu d'être panaché de brun & de blanc, est cendré, finement piqué de brun-obscur, & traversé dans son milieu par une bande blanchâtre, que borde du côté de la base la plus longue des deux lignes noires flexueuses. Cette bande est plus prononcée dans les individus du midi de l'Europe que dans ceux du nord, & c'est la seule différence réelle qu'il y ait entre le *Fauna* & l'*Allionia* de Fabricius, ou si l'on veut entre le *Coronis* & l'*Arachné* d'Engramelle.

Commune, au mois d'août, dans les environs de Paris, & particulièrement au bois de Boulogne. Elle aime les lieux arides.

122. SATYRE Cordula.

SATYRUS Cordula.

Sat. alis subdentatis, supra fuscis, fusca rufâ, obsoleta : anticarum utrinque ocellis duobus pupillatis punctisque totidem albis intermedis : posticis subtis cinereis, fuscâ margineque postico albidis, punctis duobus atris ad angulum aut interpositis.

Papilio S. Cordula, alis dentatis, fuscis : utrinque anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis punctis duobus atris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 226. n°. 703.

Papilio Cordula. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 190. n°. 12.

Papilio Cordula. HUBN. Pap. tab. 121. fig. 619. 620. (La femelle.)

Papilio Peas. HUBN. Pap. tab. 29. fig. 152. 155. (La femelle.)

Papilio Peas. ESP. Pap. part. 1. tab. 112. cont. 67. fig. 1.

Papilio Peas. DE PRUNNER, Lepid. Pedem. p. 70. n°. 137.

ILLIC. Magaz. tom. 5. p. 200. — tom. 5. p. 180.

Papilio Cyrillus. HERBST, Pap. tab. 206. fig. 1. 2.

Papilio Proserpina. CYRILL. Ent. Neap. 1. tab. 2. fig. 11.

Il a le port & la taille du *Fidia*. Ses ailes sont légèrement dentées. Leur dessus est d'un brun-noirâtre, chatoyant, avec une bande rouille, postérieure, peu prononcée, ornant aux supérieures deux grands yeux noirs à prunelle blanche, entre lesquels sont deux points blancs ; & vers l'angle anal des inférieures, un œil semblable à ceux dont nous venons de parler, mais très-petit.

Le dessous des premières ailes est d'un jauneroûssâtre, plus foncé dans le mâle que dans la femelle, avec la base & les bords obscurs. On y retrouve les deux yeux & les deux points de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est cendré, avec deux bandes blanchâtres, dont l'extérieure marginale & séparée de la précédente par deux points noirs, peu distans du bord interne. Le corps est de part & d'autre de la même couleur que le fond des ailes. Les antennes sont brunâtres.

Il habite l'Italie, le Piémont & le midi de la France.

123. SATYRE Bryce.

SATYRUS Bryce.

Sat. alis integris, fuscis : anticis utrinque ocellis duobus atris punctisque totidem albis intermedis : posticis subtis fuscis duabus griseis, angulatis.

Papilio N. G. Aëta, alis repandis, supra fuscis : anticis ocellis duobus punctisque duobus albis : posticis subtis marmoratis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n°. 569.

Papilio S. Actæa. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 225. n°. 705.

Papilio S. Ferula, alis repandis, nigris : subtis anticis ocellis duobus, posticis fuscis cinereis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 225. n°. 707. (An var. ?)

Papilio Aëta. VAR. (Fem.) ESP. Pap. part. 1. tab. 85. cont. 55. fig. 4.

ILLIC. Magaz. tom. 5. p. 188.

Papilio Bryce. HUBN. Pap. tab. 55. fig. 149. 150.

Papilio Bryce. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 185. n°. 11.

Papilio Hippolytus. HERBST, Pap. tab. 201. fig. 5. 4.

Il a le port & à peu près la taille du *Fidia*. Le mâle est d'un brun presque noir & jetant un petit reflet violet. La femelle est moins foncée, mais également chatoyante. Celle-ci a de part & d'autre aux premières ailes, & le mâle aussi le plus souvent, deux yeux très-noirs, dont l'antérieur plus gros, & entouré d'un iris jaunâtre mieux prononcé en dessous qu'en dessus. Ces yeux sont séparés par deux points blancs, & ils ont chacun une prunelle de cette couleur.

Le dessous des secondes ailes n'offre aucune tache. Leur dessous est cendré, piqué de noirâtre, & traversé entre le milieu & le bord terminal par deux bandes grises, étroites, un peu sinuées, tantôt plus, tantôt moins distantes.

Le dessous des premières ailes a sur la côte des lignes noires, transverses & flexueuses, dont les antérieures très-courtes, deux des postérieures descendant jusqu'au bord interne & embrassant les yeux.

Le corps & les antennes sont du même brun que les ailes.

On avoit cru jusqu'à présent que ce satyre étoit exclusivement propre à la Russie. Nous avons la certitude qu'il habite aussi la France ; car M. Duponchel, amateur que nous aurons souvent occasion de citer pour la justesse de ses observations, a pris dans la Lozère plusieurs sujets des deux sexes.

Nota. Le *Ferula* de Fabricius doit-il être cité comme une variété du *Bryce* ? Il n'en diffère que parce qu'il a un point ocellé à l'angle anal des secondes ailes.

124. SATYRE Aëta.

SATYRUS Aëta.

Sat. alis integris, fuscis : anticis utrinque

(mas) ocello unico, (fem.) duobus, interpositis totidem punctis albis & in mare tantummodo subitis conspicuis: posticis subitis fuscis duabus albis, crenatis, anteriore latiori, vividiore.

Papilio N. G. Actæa, alis subdentatis, fuscis, raso uncautibus: primariis untrinquè ocello punctisque subitis duobus albis: inferioribus subitis nebulosis fuscisque duabus crenatis. Esp. Pap. part. 1. tab. 57. cont. 7. fig. 1. a. (Mas.) fig. 1. b. (Fem.)

Papilio Actæa. HUBN. Pap. tab. 55. fig. 151. 152. (Mas.)

Papilio Actæa. HUBN. Pap. tab. 119. fig. 610. 611. (Fem.)

Papilio Actæa. BORKH. Pap. Eur. part. 1. tab. 98. n^o. 56. — part. 2. p. 208.

Papilio Actæa. SCHNEID. Syst. Besch. p. 97. n^o. 53.

Papilio Actæa. DE VILLIERS, Ent. Linn. tom. 2^e p. 56. n^o. 54. tab. 4. fig. 9.

Papilio Actæa. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 195. n^o. 15.

Papilio Actæus. HERBST, Pap. tab. 201. fig. 1. 2.

BERGSTR. Nomencl. tab. 151. fig. 5-6.

L'ALÉON. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 256. pl. 63. Suppl. 9. fig. 37. g. h.

ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 503. pl. 81. 2^e. Suppl. pl. 2. fig. 57. a-d. bis.

Il a de très-grands rapports avec le *Bryce*, mais il est un peu plus petit. Le mâle n'a de part & d'autre qu'un seul œil aux premières ailes, & cet œil n'est suivi de deux points blancs qu'en dessous. Dans l'un & dans l'autre sexe, les deux bandes du dessous des secondes ailes sont blanches, notamment l'antérieure, qui est en outre plus large & qui a le côté interne crénelé, au lieu de l'avoir un peu finu comme dans le *Bryce*.

La femelle est toujours moins foncée que le mâle.

Il habite l'Italie & les parties méridionales de la France. M. Marchand l'a trouvé aux environs de Chartres, & M. l'abbé Dubois, dans la forêt d'Orléans. Il a été pris aussi près de Crécy (Seine & Marne).

125 SATYRE Podarcé.

SATYRUS Podarce.

Sat. alis integris, fuscis: anticis utrinquè (mas) ocello unico, (fem.) duobus, interpositis totidem punctis albis & in mare tantummodo subitis conspicuis: posticis subitis fuscis duabus transversis venisque albis.

Papilio Podarce, alis subdentatis, fuscis:

anticis utrinquè ocello punctisque subitis duobus albis; posticis supra unimaculatis, subitis albo fuscoque marmoratis fuscis crenatè concolore albo marginatè venisque albis. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 195. n^o. 14.

Il diffère du *Bryce* par les mêmes caractères que l'*Actæa*, & en outre par les veines blanches, longitudinales, qu'il a sur la surface inférieure des secondes ailes.

Du Portugal.

126. SATYRE Phædra (1).

SATYRUS Phædra.

Sat. alis dentatis, fuscis: anticis utrinquè ocellis duobus atris pupillè violacèâ.

Papilio N. Phædra, alis dentatis, fuscis, coloribus: anterioribus ocellis duobus violaceis. LINN. Syst. Nat. 2. p. 775. n^o. 150.

Papilio S. Phædra. FAB. Syst. Ent. p. 495. n^o. 227. — Spec. Inf. tom. 2. p. 78. n^o. 547. — Mant. Inf. tom. 2. p. 59. n^o. 404. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 255. n^o. 729.

Papilio Phædra. SULZ. Inf. tab. 17. fig. 10.

Papilio Phædra. SCHNEID. Icon. tab. 210. fig. 1. 2.

Papilio Phædra. HERBST, Pap. tab. 199. fig. 1-4.

Papilio Phædra. SCHRANK, Faun. Boïc. tom. 2. part. 1. p. 181. n^o. 1315.

Papilio Phædra. ROSSI, Faun. Etr. tom. 2. p. 148. n^o. 1007.

FUSSL. Suiff. Inf. p. 29. n^o. 563.

Papilio Phædra. WIEN. Verz. p. 169. sam. F. n^o. 19.

ILLIG. N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 195. n^o. 19.

ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 200.

KLEM. Beitr. tab. 19. fig. 1. 2.

BERGSTR. Nomencl. tab. 24. fig. 1. 4.

BERGSTR. Nomencl. tab. 52. fig. 4. 5.

LANG. Verz. 2. p. 24. n^o. 166-173.

Papilio Phædra. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 186. n^o. 10.

Papilio Phædra. HUBN. Pap. tab. 26. fig. 127. (Mas.) 128. 129. (Fem.)

Papilio Phædra. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 243. n^o. 1.

(1) Cette espèce & les suivantes, jusqu'à l'*Hypéranthus* inclusivement, sont connues sous le nom de *négres*.

Papilio Phœdri. ВОРЖИ. *Pap. Eur. part. 1. p. 71 & 251. n. 9.*

Papilio Athene. ВОРЖИ. *Pap. Eur. part. 1. p. 71 & 251. n. 8.*

Papilio Brifeis. ЕСП. *Pap. part. 1. tab. 6. fig. 1.*

Papilio Dryas. ЕСП. *Pap. part. 1. tab. 40. cont. 16. fig. 1. 2.*

Papilio Dryas. СОРФ. *Ent. Carn. pag. 135. n. 429.*

Papilio Dryas. SCARNEID. *Syfl. Befchr. p. 100.*

Le grand Nègre des bois. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 79. pl. 25. fig. 49. a-c.*

Le grand Nègre des bois. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 258. pl. 64. Suppl. 10. fig. 49. g. h. (Var.)*

Il a de deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Ses ailes supérieures font foiblement dentées, les inférieures le font davantage. Le dessus des unes & des autres est d'un brun plus ou moins noirâtre, suivant le sexe. Les premières, dont le dessous ressemble au dessus, ont, entre le milieu & le bord terminal, deux yeux écartés, d'un noir foncé, avec une prunelle bleuâtre & un iris très-pâle ou presque nul.

Les secondes ailes font fans taches en dessus dans les femelles; mais dans les mâles, elles ont foveut un point oculaire pres de l'angle de l'anus. Leur dessous varie beaucoup: tantôt il est absolument comme le dessus, & tantôt il est traversé au milieu par une bande blanchâtre, peu prononcée. Quelquefois la moitié postérieure est plus claire que l'antérieure; dans certains individus, le tout est de la même nuance de brun, avec une multitude d'atomes plus foncés. Le corps & les antennes font de la couleur des ailes. Celles-ci ont le bout de la masse jaunâtre.

La chenille est d'un gris-cendré, avec deux rangs de taches noires, dorsales, alongées. Elle vit sur l'avoine élevée ou fromental (*avena elatior*).

L'insecte parfait paroît en juillet & en août dans les grands bois. Il se repose volontiers sur la bruyère commune (*erica vulgaris*).

N. B. La variété g. h, pl. 64, Suppl. 10, fig. 49, d'Engramelle, a la couleur du fond plus claire; les ailes supérieure & inférieure du côté gauche font presque entièrement traversées, en dessus & en dessous, par une bande blanchâtre, large, & les taches oculaires de ce côté font brunes, avec la prunelle blanche, tandis que sur les ailes de droite elles font comme dans les individus ordinaires. Nous avons pris cette même variété dans les environs d'Auxerre, où l'espèce est assez commune.

127. SATYRE Alope.

SATYRUS Alope.

Sat. alis integris, fusco-nigris: anticis utrinquè fuscis ochraceis ocellis duobus diffitis; junctis subtis undatis; posticis ocellis sex, quatuor obfoletis.

Papilio S. Alope, alis dentatis, fuscis: anticis utrinquè fuscis flavis ocellis duobus; posticis ocellis supra unico, subtis sex. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 229. n. 715.

Papilio Alope. JOX. Fig. piél. 4. tab. 12. fig. 1.

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-obscur. Leur dessous est plus pâle, & linement ondé de noir. Les premières ont de part & d'autre, parallèlement au bord terminal, une bande d'un jaune-d'ocre, large, courbe en arrière, un peu sinuée en avant, n'atteignant ni la côte, ni le bord opposé. Cette bande offre, loin l'un de l'autre, deux yeux noirs à prunelle bleuâtre.

Le dessous des secondes ailes a parfois, vers l'angle de l'anus, un petit œil semblable aux deux dont il vient d'être question. Leur dessous a une rangée de six yeux, dont les quatre antérieurs, ou bien les deux extrêmes & les deux plus intermédiaires à peine distincts. Ces yeux font tantôt sans iris, & tantôt ils en ont un jaunâtre. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes font annelées de blanc & de noir.

De l'Amérique septentrionale, d'où il a été envoyé au Muséum d'histoire naturelle par M. le peintre Milbert.

Nota. Fabricius parle d'une ligne noire, placée transversalement sur la bande jaune des ailes supérieures, entre les deux taches oculaires & le bord terminal. L'individu qu'il a décrit étoit probablement une variété, car tous ceux que nous avons vus n'avoient pas cette ligne.

128. SATYRE Pégala.

SATYRUS Pegala.

Sat. alis dentatis, fuscis: anticis fuscis rufis ocellis unico: posticis supra ocellis, subtis sex. FAB.

Papilio N. G. Pegala. FAB. Syst. Ent. p. 494. — Spec. Inf. tom. 2. p. 76. n. 558. — Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n. 595.

Papilio S. Pegala. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 250. n. 720.

Voici ce qu'en dit Fabricius: le corps est brun. Les ailes supérieures font d'un brun-obscur, avec une large bande rousse qui n'atteint point les bords. Elles ont en outre, de part & d'autre, un seul œil noir à prunelle blanche.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur, avec un œil noir à prunelle blanche & à iris fauve. Leur dessous est panaché, & l'on y voit six yeux, dont trois réunis vers le bord interne, le cinquième très-grand. Ces yeux, que Fabricius dit varier quant au nombre & quant à la forme, sont d'un noir-foncé, avec la prunelle blanchâtre & l'iris ferrugineux.

De l'Amérique.

129. SATYRE Zangis.

SATYRUS Zangis.

Sat. alis integerrimis, supra fusco-nigris: subtus ferrugineis, strigis quatuor nigris; anticis oculo bipupillato, posticis duobus, anali caeco.

Papilio D. F. Zangis, alis integerrimis, fuscis: omnibus subtus oculo, anticarum bipupillato. FAB. *Syst. Ent. p. 480. n.º 195. — Spec. Inf. tom. 2. p. 65. n.º 290. — Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n.º 556.*

Papilio S. Zangis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 218. n.º 682.*

Papilio Agnes. CRAM. *pl. 525. fig. A. B.*

Papilio Zangis. HERBST, *Pap. tab. 203. fig. 3. 4.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun-velouté, mais un peu plus pâle vers le bout, avec un petit œil très-noir à iris jaunâtre au bas de l'échancrure anale des inférieures. Cette échancrure est plus sensible que dans les espèces qui précèdent & qui suivent.

Le dessous des quatre ailes est d'un rouge-ferrugineux, avec quatre lignes noires, transverses & ondulées, dont deux entre la base & le milieu, les deux autres près du bord terminal. Indépendamment de ces lignes, les ailes supérieures ont, vis-à-vis du sommet, un grand œil très-noir à iris rouffâtre & à double prunelle blanche; & les ailes inférieures deux yeux, dont l'anal comme en dessus, l'autre semblable à celui des premières ailes, mais un peu oblong, & surmonté de trois points blancs, plus distincts dans certains individus que dans d'autres. Le corps est de la couleur des ailes.

Des Antilles & de la Caroline.

130. SATYRE Servatius.

SATYRUS Servatius.

Sat. alis: integerrimis, supra caeruleo-nigris; unimaculatis: subtus ferrugineo-fuscis, strigis quatuor violaceis; anticis ocellis duobus, posticis septem, 5.º majore.

Papilio Evadne. CRAM. *pl. 222. fig. E. F.*

Papilio Evadne. HERBST, *Pap. tab. 185. fig. 1. 2.*

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont entières, d'un noir-violet-luisant & sans aucune tache en dessus.

Leur dessous est d'un brun tirant sur le ferrugineux, avec quatre lignes violâtres, pâles, transverses & sinuées, dont deux entre le milieu & la base, les deux autres rapprochées du bord terminal & renfermant des yeux très-noirs à prunelle d'un blanc-bleuâtre & à iris d'un jaune-rouffâtre. Les yeux des premières ailes sont séparés, au nombre de deux, dont le postérieur plus grand. Les yeux des secondes ailes sont au nombre de sept, dont le cinquième double au moins de tous les autres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes font enclécés de noir & de blanc, & leur massue est entièrement ferrugineuse.

Cramer le dit de Sierra-Léone, en Afrique; mais nous le soupçonnons de l'Amérique.

Nota. Le dessus des secondes ailes offre près de la base un bouquet de poils grâfâtes, divergens.

131. SATYRE Hyfius.

SATYRUS Hyfius.

Sat. alis integerrimis, fuscis: posticis supra, anticis utrinque areolâ ferruginâ subterminali: omnibus subtus strigâ griseâ ocelloque unico, anticarum bipupillato.

Il est petit; d'un brun-obscur en dessus, avec un espace d'un rouge-ferrugineux vers le bord terminal de chaque aile.

En dessous, la couleur est la même qu'en dessus, avec un œil noir à iris jaunâtre & à double prunelle bleuâtre au sommet des ailes supérieures; avec un œil semblable, mais à prunelle simple, à l'angle anal des inférieures. Celles-ci ont en sus trois points blancs, alignés entre l'œil & la côte. Les ailes supérieures ont l'espace rouge du dessus, & un autre plus grand près de la base. Outre cela, les quatre ailes offrent, sur le milieu, une ligne grâfâtre, transverses, sinuée; & vers le bout, qui est aussi grâfâtre, une ligne noirâtre en feston.

Sa patrie nous est inconnue; mais nous le soupçonnons de l'Amérique septentrionale.

132. SATYRE Clytus.

SATYRUS Clytus.

Sat. alis integerrimis, fusco-nigris: anticis utrinque fuscâ ochraceâ, bifidâ ocellis, que duos includente: posticis subtus ocellis binis quinque.

Papilio D. F. Clytus, alis integerrimis fuscis: primoribus fuscis flavâ ocelloque subtripupillato; posticis ocellis quinque. LIX. *Syst. Nat. 2. p. 708. n.º 124. — Mus. Lud. Ulr. p. 263.*

Papilio S. Clytus. FAB. *Syfl. Ent.* p. 485. n°. 188. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 65. n°. 245. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 50. n°. 527. — *Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 214. n°. 671.*

Papilio Clytus. ESP. *Pap. tab. 66. cont. 16. fig. 2. 5. 4.*

Papilio Clytus. HERBST, *Pap. tab. 215. fig. 9. 10.*

Papilio Clytus. WULFEN, *Descrip. Cap. Inf.* p. 51. n°. 50.

Papilio S. Tiphone, alis dentatis, fuscis: anticis utrinquè ocellis duobus, posticis sex pupillâ violaceâ. FAB. *Gen. Inf. Mant.* p. 265. — *Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 245. n°. 757.*

Papilio Tiphone. NATURF. p. 16. n°. 2. *tab. 1. fig. 1. 2.*

Papilio Tiphone. BORRH. *Pap. Eur. part. 1. p. 259. n°. 21.*

LE HÉROS. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 46. a. b.*

Fabricius a fait de ce fatyre deux espèces différentes, dont l'une, exotique, sous le nom de *Clytus*; l'autre, indigène, sous celui de *Tiphone*. Sa méprise vient de ce que le NATURFOSCHER (le naturaliste) a, sur la foi du Père Engramelle, décrit & figuré ce même fatyre comme propre à l'Allemagne.

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un noir-brun. Les premières ont, vers le bout, une bande d'un jaune-d'ocre pâle, transverse, maculaire, courbe en dehors, atteignant en dessus la côte & le bord interne, mais ne descendant pas en dessous jusqu'au milieu de la surface. Cette bande a de part & d'autre, à sa partie antérieure, une fissure large & profonde dans laquelle sont deux yeux très-noirs à prunelle bleue.

Le dessus des secondes ailes offre, parallèlement au bord terminal, une rangée de cinq yeux semblables, mais dont l'anal plus petit, & pourvu, ainsi que chacun des quatre autres, d'un iris ferrugineux.

Le dessous des mêmes ailes est traversé, à partir de la base, par trois lignes noires, en zig-zag, & bordées de gris sur un de leurs côtés. Vient ensuite un cordon de sept yeux, dont deux groupés près du bord antérieur, les cinq autres placés plus bas. Ces yeux ressemblent à ceux du dessus; mais ils sont tous égaux, leur iris est plus pâle, environné d'un cercle gris, & le septième ou l'anal a une double prunelle. Les antennes sont ferrugineuses.

Le mâle ressemble à la femelle, mais il a la bande jaune du dessus des ailes supérieures plus foncée vers le bord interne.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Il arrive quelquefois que les secondes ailes n'ont que six yeux en dessous: l'œil antérieur manque. C'est probablement un individu à six yeux, que le *Naturfoscher* a donné pour son *Tiphone*.

155. SATYRE Cassius.

SATYRUS Cassius.

Sat. alis integerrimis, fusco-nigris: anticis utrinquè disco ferrugineo ocelloque apicis bipupillato; posticis supra ocellis 4-5, subtus 7 obsoletis.

Papilio D. F. Cassius. alis integerrimis, fuscis: primoribus ocello didymo; posticis ocellis tribus. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 768. n°. 125. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 269.

Papilio Cassius. CRAM. *pl. 514. fig. C. D.*

Papilio Cassius. HERBST, *Pap. tab. 204. fig. 1. 2.*

Il est de la taille & de la couleur du précédent, mais il a un rellet bleuâtre en dessus. Ses ailes supérieures ont de part & d'autre le milieu d'un rouge-ferrugineux, & le sommet précédé d'un grand œil noir à double prunelle blanche. En dessous, où le rouge s'étend moins vers l'extrémité, cet œil est renfermé entre deux lignes transverses, dont l'intérieure noire, l'extérieure d'un cendré-jaunâtre.

Le dessus des secondes ailes offre une rangée courbe & postérieure de quatre à cinq yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un rouge-ferrugineux.

Le dessous des mêmes ailes est traversé dans son milieu, d'un bord à l'autre, par deux lignes en zig-zag d'un cendré-jaunâtre, & bordées de noir, la première en avant, la seconde en arrière. Aux yeux de la surface opposée correspond une série de sept yeux, dont la prunelle & l'iris sont de la couleur des lignes transverses susdites.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Nous avons vu deux sujets mâles dont le dessus des premières ailes n'offre point d'œil au sommet, mais dont le dessous est absolument comme dans le commun des individus.

154. SATYRE Cassius.

SATYRUS Cassius.

Sat. alis integerrimis, fuscis: anticis utrinquè disco ferrugineo ocelloque apicis bipupillato; posticis supra ocellis duobus approximatis, subtus tribus minutis.

Papilio D. F. Hyperbius. FAB. *Syfl. Ent.* p. 485. n°. 188. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 65. n°. 244. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 51. n°. 528.

Papilio S. Hyperbius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 215. n^o. 672.

Papilio Hyperbius. CRAM. pl. 168. fig. C. D. (Le mâle.) fig. E. F. (Var. fem.?)

Papilio Hippiia. CRAM. pl. 222. fig. C. D. (La femelle.)

Papilio Hyperbius. HERBST, Pap. tab. 205. fig. 5. 6. (Le mâle.) fig. 7. 8. (Var. fem.?)

Papilio Hippius. HERBST, Pap. tab. 204. fig. 5. 6. (La femelle.)

Fabricius l'a réuni au précédent sous le nom d'*Hyperbius*; mais il forme bien certainement une espèce distincte. D'abord il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure; le dessus de ses ailes inférieures n'a que deux yeux, placés près de l'angle de l'anus, & ils ont la prunelle bleue dans les deux sexes, & l'iris jaune dans la femelle; le dessous des mêmes ailes est d'un gris plus ou moins obscur, avec trois yeux très-petits, dont deux correspondent à ceux du dessus, le troisième avoisinant la côte ou bord antérieur.

Quelquefois les trois petits yeux dont il vient d'être question manquent dans le mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

155. SATYRE *Hyperbius*.

SATYRUS Hyperbius.

Sat. alis integerrimis, fuscis, areâ rufâ: anticis oculo bipapillato: posticis subtus septem punctatis. LINN.

Papilio D. F. Hyperbius. LINN. Syst. Nat. 2. p. 769. n^o. 150. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 257.

Papilio Hyperbius, alis integerrimis nigris, areâ mediâ coffaceo-rufâ: primoribus oculo bipapillato: posticis subtus septem punctatis. WULFEN, *Descrip. Cap. Inf.* p. 32. n^o. 31.

N'ayant point vu ce satyre, nous le donnons d'après Linnæus & Wulfen.

Il est à peu près de la taille du précédent. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun, avec un espace discordant ferrugineux. Les supérieures, dont le dessous ressemble au dessus, ont, vis-à-vis du sommet, un grand œil noir à double prunelle d'un blanc-bleuâtre.

Les ailes inférieures sont tantôt sans yeux en dessus, & tantôt elles en ont un très-petit près de l'angle de l'anus. Le dessous de ces mêmes ailes est noirâtre, saupoudré de gris à la base, traversé au milieu par une ligne arquée de sept points blanchâtres peu distincts, & marqué à l'angle anal d'un petit œil correspondant à celui de la surface opposée.

Du Cap de Bonne-Espérance.

156. SATYRE Gorgé.

SATYRUS Gorge.

Sat. alis integris, suprâ fusco-nigris, fuscis ferrugineâ: anticis utrinque oculo didymo, posticis simplicis: posticis subtus cinereis, nigris tribus nigricantibus, undulatis.

Papilio Gorge, alis subdentatis, nigro-fuscis, rufis fuscatis: anticis utrinque ocellis duobus approximatis papillâ albâ: posticis subtus atro cinereoque mammaris fasciatisque. OCHSENI. *Pap. Eur. tom. 1. p. 294. n^o. 61.*

Papilio Gorge. ESP. *Pap. part. 1. tab. 119. cont. 74. fig. 4.* (Le mâle.) fig. 5. (La femelle.)

Papilio Erynis. ESP. *Pap. part. 1. tab. 121. cont. 76. fig. 5.* (Var.)

Papilio Gorge. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 194. — tom. 5. p. 179.*

Papilio Gorge. HUBN. *Pap. tab. 99. fig. 502. 503.* (Le mâle.) fig. 504. 505. (La femelle.)

Son envergure n'est guère que d'un pouce & demi. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse, postérieure, large (surtout dans la femelle), offrant au sommet des premières un double œil noir à prunelle blanche, & vers le sommet des secondes un œil simple, très-petit.

Le dessous des ailes supérieures est d'une couleur briquetée, mais plus claire à l'endroit de la bande, avec les bords obscurs & un double œil comme du côté opposé.

Le dessous des ailes inférieures est cendré, avec trois lignes noires, flexueuses, dont une près du bord terminal, les deux autres sur le milieu de la surface. On y voit en outre un petit œil correspondant à celui du dessus.

La variété qu'Esper donne sous le nom d'*Erynis* est sans yeux de part & d'autre.

Du Tyrol, de la Suisse & des Pyrénées.

157. SATYRE Manto.

SATYRUS Manto.

Sat. alis suprâ fusco-nigris: anticis utrinque fuscis ferrugineâ punctis quatuor atris: posticis subtus griseis, nigris tribus nigricantibus, anterioribus undulatis, posterioribus punctis foveis.

Papilio S. Manto, alis subdentatis, fuscis, punctis ocellaribus, anticarum quatuor posticarum tribus: posticis subtus cinereis, fusco-undulatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 58. n^o. 397. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 251. n^o. 722.*

Papilio S. Erina, alis dentatis, fuscis, fuscis maculari silvâ punctis ocellaribus nigris. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 41. n^o. 414. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 257. n^o. 759.*

- Papilio Manto*. WIEN. *Verz.* p. 169. *sum.* F. n°. 15.
- Papilio Manto*. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 190. n°. 15.
- Papilio Manto*. ILLIG. *Magaz.* tom. 3. p. 193.
- Papilio Manto*. HUDN. *Pap. tab.* 45. *fig.* 107. 108. (Fem.)
- Papilio Manto*. HUDN. *Pap. tab.* 101. *fig.* 512. 515. (Mas.) *fig.* 514. (Fem.)
- Papilio Manto*. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 296. n°. 62.
- Papilio Manto*. BORKH. *Pap. Eur. part.* 2. p. 209. n°. 40.
- Papilio Zilia*. BORKH. *Pap. Eur. part.* 2. n°. 40. 41.
- Papilio Pandrose*. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 95. n°. 54.
- Papilio Aglauros*. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 95. n°. 55. a.
- Papilio Pandrosus*. HERBST, *Pap. tab.* 202. *fig.* 7. 8.
- Papilio Aglauros*. HERBST, *Pap. tab.* 205. *fig.* 1. 2.
- Papilio Castor*. ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 2.
- Papilio Pollux*. ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 3.
- Papilio Lappona*. ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 108. *cont.* 63. *fig.* 5.
- Papilio* N. G. Lappona, *alis fuscis; anticis fuscis rufi punctis quatuor nigris; posticis supra fuscis, subtus griseis fuscis dentatis fuscis.* THUNB. *Dissert. Acad. vol.* 5. p. 51. *tab.* 5. *fig.* 6. 6.
- Papilio Castor*. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 108. n°. 49.
- Papilio Pollux*. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 109. n°. 50.
- Papilio Lappona*. SCHNEID. *Entom. Magaz. tom.* 1. *part.* 1. p. 426. n°. 9.
- Papilio Castor*. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem.* p. 20. n°. 57.
- Papilio Pollux*. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem.* p. 20. n°. 38.
- Papilio Dubius*. FUESSL. *Neuf. Magaz. tom.* 2. *part.* 4. p. 351. n°. 128.
- Man. Eaucis*. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 177. n°. 1507.
- Le grand Nègre Bernois. ENGRAM. *Pap. d'Eu-*

rope, tom. 1. p. 260. *pl.* 65. *Suppl.* 11. *fig.* 42. a. b. *tert.*

POLLUX. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 321. *pl.* 4. 5°. *Suppl. fig.* 42. a. b. *quint.*

Il est un peu plus grand que le *Gorgé*. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec un léger rellet bleuâtre. Les supérieures ont, vers le bout, une bande ferrugineuse, courbe & transversale, divisée dans le sens de sa longueur par une rangée de quatre points très-noirs. Les secondes ailes ont trois points semblables, entourés chacun d'un petit cercle ferrugineux, plus ou moins distinct.

Le dessous des ailes de devant est rougeâtre, surtout dans les femelles, avec les bords obliques, & le même nombre de points noirs que du côté opposé.

Le dessous des ailes de derrière est d'un gris-blanchâtre dans le mâle, d'un gris-cendré dans la femelle, avec trois lignes noires, dont la postérieure formée de trois à quatre points, les deux antérieures ondulées, parallèles, & se prolongeant sur les ailes supérieures.

On rencontre des individus qui n'ont que deux point noirs aux premières ailes. Il en est d'autres qui n'en ont également que deux aux secondes, & dont le dessous de ces mêmes ailes n'est traversé par aucune ligne noire.

Il habite la Laponie, l'Autriche, la Stirie, la Suisse, le Piémont & les Pyrénées.

158. SATYRE DROMUS.

SATYRUS DROMUS.

Sat. alis integris, fusco-nigris; anticis utrinque ocellis duobus approximatis; posticis subtus nutenti-griseis, strigis duabus fuscis, undulatis.

Papilio S. Dromus, *alis integerrimis, nigris; anticis utrinque disco raso ocello gemino.* FAB. *Ent. Syst. ent. tom.* 3. *pars* 1. p. 22. n°. 701.

Papilio D. F. Tyndarus, *alis integris, rotundatis, fuscis; superioribus ocellis duobus approximatis; inferioribus subtus striga in medio fuscâ, dentatâ.* ESP. *Pap. part.* 1. p. 97. *tab.* 67. *cont.* 17. *fig.* 1.

Papilio *Cassioides*. ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 105. *cont.* 58. *fig.* 2. 5. (Var.)

Papilio Tyndarus. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 108. n°. 48.

Papilio Tyndarus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 299. n°. 63.

Papilio Tyndarellus. HERBST, *Pap. tab.* 202. *fig.* 5. 6.

Papilio Herfe. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 94. n°. 55.

Papilio

Papilio Cleo. HUBN. *Pap. tab. 46. fig. 209. 210.* (Le mâle.) *fig. 211. 212.* (La femelle.)

Papilio Cleo. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 189.*

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses ailes font entières, d'un noir-brun en dessus, avec un léger reflet verdâtre. Les supérieures ont, vers l'extrémité, une bande ferrugineuse, sur laquelle il y a deux petits yeux rapprochés, noirs, à prunelle blanche. Les ailes inférieures sont tantôt sans taches, & tantôt elles ont une suite de trois ou quatre yeux dont l'iris est rougeâtre.

Le dessous des premières ailes est ferrugineux, avec les bords griffâtres & deux petits yeux correspondant à ceux de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris plus ou moins luisant, avec deux lignes brunes, transverses, ondulées, discoïdales, se prolongeant dans les femelles jusqu'à la côté des premières ailes. L'extrémité offre quelquefois une ligne semblable, mais beaucoup moins apparente.

Ce fatyre nous a présenté deux variétés. La première est tout-à-fait sans yeux aux ailes de devant.

La seconde, qu'Esper donne sous le nom de *Cassioïdes*, a tout le dessous des ailes de derrière d'un noir-brun & foiblement saupoudré de gris.

Il habite la Syrie, la Suisse, l'Italie, &c.

159. SATYRE Areté.

SATYRUS Arete.

Sat. alis integris, supra fusco-nigris, fasciâ ferrugineâ : anticarum oculo didymo alterove remoto : posticis subtus griseo-virescentibus, strigâ punctorum alborum.

Papilio S. Arete, alis integris, fuscis fasciâ rufâ : posticis utrinque strigâ punctorum alborum. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 42. n. 418.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 258 n. 743.*

Papilio Arete. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 186.*

Papilio Arete. HUBN. *Pap. tab. 50. fig. 251. 252.* (Fem.)

Papilio Arete. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 301. n. 64.*

Papilio Claudine. BORKH. *Pap. Eur. part. 2. p. 204. n. 16.*

Nous ne connoissons ce fatyre que par sa femelle.

Il est de la taille du précédent. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse. La bande des ailes supérieures a, vis-à-vis du sommet, un double œil noir, pupillé de blanc, & quelquefois un autre simple vers l'angle interne. La bande des ailes inférieures est maculaire, & l'on y voit ordinairement quatre yeux.

Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

Le dessous des ailes de devant ressemble au dessus, mais il a le disque d'un roux-foncé.

Le dessous des ailes de derrière est d'un vert-griffâtre, avec une rangée de sept points blancs, correspondant à la bande de la surface opposée.

Des parties montagneuses de l'Autriche.

140. SATYRE Arachné.

SATYRUS Arachne.

Sat. alis integris, fusco-nigris, cærulescenti micantibus : anticis utrinque fasciâ ferrugineâ ocellis duobus approximatis alterove remoto : posticis subtus cinereis, fasciâ mediâ repandâ margineque postico nigricantibus.

Papilio S. Arachne, alis integris, atris : anticis utrinque fasciâ rufâ ocellis duobus : posticis subtus fasciâ dentatâ cinereâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 41. n. 415.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 257. n. 740.*

Papilio Arachne. HUBN. *Pap. tab. 47. fig. 214.* (Mas.) *fig. 216. 217.* (Fem.)

Papilio Pitho. HUBN. *Pap. tab. 112. fig. 574. 575.* (Mas.) *fig. 576. 577.* (Fem.)

Papilio Arachne. BORKH. *Pap. Eur. part. 2. p. 203. n. 16. c.*

Papilio Pronoe. BORKH. *Pap. Eur. part. 2. p. 98. n. 57.*

Papilio Pronoe. HERBST, *Pap. tab. 210. fig. 1. 2.*

Papilio Pronoe. ESP. *Pap. part. 1. tab. 54. cont. 4. fig. 1.*

Papilio Persephone. ESP. *Pap. part. 1. tab. 121. cont. 76. fig. 4. 5. 6.*

Papilio Pronoe. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 107. n. 47.*

Papilio Pronoe. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 290. n. 59.*

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun, & leur dessus jette un léger reflet violet. Les supérieures ont une bande ferrugineuse, ordinairement plus prononcée en dessous qu'en dessus. Cette bande offre, vis-à-vis du sommet, deux yeux très-rapprochés, noirs, avec une prunelle blanche; & plus bas, un autre œil moins gros, manquant même dans beaucoup de mâles.

Le dessous des ailes inférieures est tantôt sans taches, tantôt coupé par une bande rougeâtre, courte & maculaire, sur laquelle on voit de deux à trois points ocellés. Le dessous des mêmes ailes est d'un cendré-griffâtre dans le mâle, d'un cendré-jaunâtre dans la femelle, avec une bande discoïdale, large, sinuée, & le bord postérieur, noircies.

Xxx

Il habite la Hongrie, la Stirie, la Suisse, &c.

141. SATYRE Goante.

SATYRUS Goante.

Sat. alis integris, supra fusco-nigris, fuscâ ferrugineâ: anticis utrinquè ocello didymo alteroque minori remoto: posticis subtus nebulosofuscis, fuscâ mediâ obscuriore alboque marginatâ.

Papilio N. G. Goante, alis supra fuscis, fuscâ subâ: superioribus utrinquè ocello apicis didymo alterove minori solitario; inferioribus supra ocellis tribus, subtus fusco nigroque maculatis striâ transversâ crentis marginalibus venisque albidis. Esp. Pap. part. 1. p. 115. tab. 116. cont. 71. fig. 1.

Papilio Goante. ILLIG. Magaz. tom. 5. p. 205.

Papilio Goante. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 295. n^o. 60.

Papilio Scæta. HUBN. Pap. tab. 50. fig. 255. 254.

Il est presque de la taille du précédent. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse, courbe, postérieure, offrant d'ordinaire aux ailes inférieures trois yeux également éloignés l'un de l'autre; & aux supérieures trois aussi, mais dont deux réunis en face du sommet, le troisième plus petit & placé isolément vers l'angle interne. Ces yeux sont très-noirs, avec la prunelle blanche.

Le dessous des ailes supérieures a le milieu ferrugineux, & l'extrémité traversée par une bande plus pâle, sur laquelle il y a le même nombre d'yeux que du côté opposé.

Le dessous des secondes ailes est gris, aspergé de brun, avec une bande discoidale & anguleuse plus obscure que le fond, & ayant les côtés bordés de blanc. Aux yeux du dessus correspond pareil nombre de taches noires à prunelle blanche.

Dans la femelle, les nervures du dessous des secondes ailes sont blanches.

Il habite la Suisse, le Piémont, la Savoie, &c.

Nota. Nous avons vu une variété femelle qui avoit de part & d'autre cinq yeux aux secondes ailes; & une autre qui en avoit quatre sur le dessus des premières ailes.

142. SATYRE Stirus.

SATYRUS Stirus.

Sat. alis integris, supra fusco-nigris, fuscâ ferrugineâ: primariis utrinquè ocello didymo alteroque remoto, secundariis quatuor: secundariis subtus cineris, fuscâ posticâ dilatatore. (Fem.)

Son envergure est d'environ deux pouces. Toutes les ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse, sur laquelle les supérieures ont deux yeux, dont l'antérieur double, l'autre solitaire; & les inférieures quatre.

Le dessous des premières ailes est ferrugineux, avec les bords cendrés, & des yeux comme du côté opposé.

Le dessous des secondes ailes est entièrement cendré, mais il offre vers son extrémité une bande plus claire & sinuée, sur laquelle sont quatre yeux correspondant à ceux du dessus.

Décrit d'après un individu femelle, pris aux environs de Clagenfurt, dans les Alpes de Stirie, par M. le lieutenant-général Baron Dejean.

143. SATYRE Dalmata.

SATYRUS Dalmata.

Sat. alis integris, fusco-nigris, strigâ utrinquè ocellorum: anticis ocellulo apicis externo: posticis subtus ad extimum griseo venosis. (Fem.)

Son envergure est aussi d'environ deux pouces. Toutes ses ailes sont entières, d'un noir-brun, avec une rangée postérieure d'yeux très-noirs à prunelle blanche & à iris ferrugineux. Les yeux des premières sont au nombre de six, dont cinq contigus, & le sixième plus petit & placé extérieurement près du sommet. Les yeux des secondes ailes sont au nombre de six, tous placés à la suite l'un de l'autre.

En dessous, les ailes supérieures ont le milieu rougeâtre, & leur extrémité n'offre que cinq yeux, par la raison que celui qui avoisine l'angle interne manque.

Le dessous des ailes inférieures est veiné de gris depuis le milieu jusqu'au bout, & l'on y compte sept yeux à iris cendré.

Décrit sur un individu unique & femelle, pris au bord de la mer, dans les environs de Sebenico en Dalmatie, par M. le lieutenant-général Baron Dejean.

144. SATYRE Afra.

SATYRUS Afra.

Sat. alis integris, fusco-nigris: anticis utrinquè, posticis supra fuscâ ferrugineâ maculari ocellis 5-6: posticis subtus venis albidis strigâque ocellorum 6-7.

Papilio S. Afra, alis integris, fuscis, ocellis sex: posticis cinereo venosis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 41. n^o. 415. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 256. n^o. 738.

Papilio Afer, alis rotundatis, integerrimis, rufescenti-fuscis: superioribus ocello connato, adjacentem minori, serie ad marginem ocellorum nigrorum: inferioribus venis dilatatis albidis. Esp. Pap. part. 1. tab. 85. cont. 55. fig. 4. 5.

Papilio Afer. HERBST, *Pap. tab.* 201. *fig.* 7. 8.

Papilio Afer. HERBST, *Pap. tab.* 202. *fig.* 1. 2.

Papilio Afer. SCHNEID. *Syfl. Befchr.* p. 104. n^o. 44.

Papilio Afer. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 275. n^o. 51.

Papilio Phegea. БОРЖН. *Pap. Eur. part.* 1. p. 101. n^o. 42. — *part.* 2. p. 210. n^o. 42.

Papilio Phegea. HUBN. *Pap. tab.* 98. *fig.* 500. 501. (Le mâle.)

ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 200.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une bande ferrugineuse, postérieure & maculaire, s'élève à chaque aile de cinq à six yeux noirs à prunelle blanche. Parmi les yeux des ailes de devant, il y en a deux qui sont réunis en face du sommet.

Le dessous de ces ailes ressemble au dessus, mais le milieu est rougeâtre.

Le dessous des ailes inférieures est brun, avec des veines blanchâtres, longitudinales, assez larges, & une série de six à sept yeux dont l'un est grisé.

Des parties désertes de la Russie méridionale.

145. SATYRE *Griela*.

SATYRUS Griela.

Sat. alis subdentatis, fusco-nigris : anticis utrinque ocellis 4-5 subcaecis : posticis subtus cinereis, fusciâ nigricante, mediâ, repandâ : alarum omnium sinubus griseis.

Papilio S. Griela, alis subdentatis, atris : anticis utrinque ocellis quatuor connatis. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 256. n^o. 737.

Papilio S. Ethus, alis integerrimis, fuscis : anticis ocello bipillato ; posticis supra ocellis tribus, subtus atris puncto medio albo. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 217. n^o. 680.

Papilio Griela. HUBN. *Pap. tab.* 49. *fig.* 228. 229. (Fem.)

Papilio Dioxippe. HUBN. *Pap. tab.* 105. *fig.* 558. 559. (Mas.)

Papilio Stheno. HUBN. *Pap. tab.* 109. *fig.* 561. 562. (Mas.)

Papilio Griela. ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 194.

Papilio Stheno. ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 204.

Papilio Gession. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 108. cont. 65. *fig.* 2.

Papilio Gession. SCHNEID. *Ent. Magaz. tom.* 1. p. 412. n^o. 2.

Papilio Embla. SCHNEID. *Ent. Magaz. tom.* 1. p. 411. n^o. 1.

Papilio N. G. Difa, alis fuscis : anticis fusciâ ferrugineâ, quadripunctatâ : posticis subtus cinereis fusciâ latâ atoque nigris. THUNB. *Dissert. Acad. vol.* 5. p. 51.

Papilio N. G. Embla, alis fuscis, supra ocellis quatuor : subtus anticis quadriocellatis, posticis quadripunctatis maculifque duabus albis. THUNB. *Dissert. Acad. vol.* 5. p. 52. tab. 5. *fig.* 8. 6.

Papilio Embla. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 287. n^o. 58.

Papilio Sophia. ACERRI, *Voy. au Cap Nord, vol.* 5. p. 175. pl. 16. n^os. 1. 2.

M. Ochsenheimer réunit le *Griela* & l'*Ethus* de Fabricius. Comme il a été plus à même que nous de constater l'identité, nous suivons son exemple, mais en conservant le premier des deux noms adoptés par l'entomologie de Kiel.

La taille du *Griela* est la même que celle du précédent. Ses ailes sont d'un noir-brun un peu luisant, & légèrement dentées, avec les échancrures grêlées. Les supérieures ont, de part & d'autre, tantôt immédiatement sur le bord de l'aile, tantôt sur une bande ferrugineuse oblitérée, cinq yeux très-noirs, avec une prunelle blanche, petite ou à peine distincte.

Le dessous des ailes inférieures est le plus souvent sans taches. Leur dessous est cendré, avec une bande noirâtre, transverse, discoïdale, large, sinieuse, moins foncée dans son milieu.

Il habite les plus hautes montagnes de la Lapponie.

N. B. Dans quelques individus, tels que l'*Ethus* de Fabricius, les secondes ailes ont, de part & d'autre, trois à quatre petits yeux ou points oculaires, & leur dessous est marqué au milieu d'une ou de deux taches blanches.

146. SATYRE *Æthiops* (1).

SATYRUS Æthiops.

Sat. alis integris, fusco-nigris, supra fusciâ ferrugineâ ocellis 3-4 : anticis concolombis : posticis subtus fusciâ repandâ utenti-cinerea punctis ocellaribus.

Papilio N. G. Blandina, alis dentatis, fuscis, fusciâ rufâ, ocellatâ : posticis subtus fuscis, fusciâ cinerea. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 41. n^o. 412.

Papilio S. Blandina. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 256. n^o. 756.

(1) Nous avons pris le nom d'*Æther*, parce que Fabricius a deux papillons *Blandina*, dont l'un se rapporte à l'espèce ici mentionnée, l'autre à une *Blandina* que nous donnons dans le Supplément.

Papilio Æthiops. ESP. *Pap. part. 1. tab. 25. Suppl. 1. fig. 5.* (Le mâle.)

Papilio Æthiops. ESP. *Pap. part. 1. tab. 63. cont. 15. fig. 1.* (La femelle.)

Papilio Æthiops. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 106. n° 46.*

Papilio Æthiops. HERBST, *Pap. tab. 209. fig. 5. 4.* (Le mâle.)

Papilio Medusa. HERBST, *Pap. tab. 209. fig. 1. 2.* (La femelle.)

Man. Medusa. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. p. 175. n° 1504.*

Papilio Medusa. LANG. *Verz. 2. p. 21. n° 153-156.*

Papilio Medusa. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 75 & 255. n° 15. — part. 2. p. 201.*

Papilio Medea. WIEN. *Verz. p. 167. fam. F. n° 7.*

Papilio Medea. HUBN. *Pap. tab. 48. fig. 220.* (Le mâle.) *fig. 221. 222.* (La femelle.)

Papilio Medea. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 179. n° 7.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 198.*

Papilio Medea. OCHSENB. *Pap. Eur. tom. 1. p. 281. n° 55.*

Papilio Ligea. *Var. 2.* SCOP. *Ent. Carn. p. 158. n° 436.*

NATURF. 8. *p. 115. tab. 5. fig. C.*

Le grand Nègre à bandes fauves. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 83. pl. 24. a. b. e. f. g.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 65. Suppl. 11. fig. 45. h. i.* (Var. femelle.)

Il a approchant deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont entières ou à peine finuées, & d'un noir-brun-chaotant. Les supérieures, dont le dessous ressemble au dessus, ont, vers l'extrémité, une bande transverse, ferrugineuse ou d'un rouge-faive, sur laquelle il y a tantôt trois, tantôt quatre yeux, dont les deux antérieurs réunis. Ces yeux sont noirs, avec la prunelle d'un blanc-bleuté.

Le dessus des secondes ailes offre, parallèlement au bord postérieur, une bande ferrugineuse, courbe, maculaire ou continue, avec trois yeux, comme ceux qui viennent d'être mentionnés. A ces yeux correspondent en dessous trois ou quatre petits points blancs oculaires, alignés sur une bande d'un cendré plus ou moins luisant, laquelle s'étend du bord antérieur à l'angle anal & à les côtés finus. Dans les femelles, il y a une autre bande cendrée à la base.

Engramelle donne une variété femelle dont la bande ferrugineuse est très-pâle, & dont le dessous des secondes ailes est d'une teinte verdâtre.

Ce fatyre habite les bois un peu élevés. On le trouve en Allemagne, dans les départemens de l'Est & du centre de la France, &c. Il paroît en juillet.

147. SATYRE Ligéa.

SATYRUS Ligea.

Sat. alis subdentatis, fusco-nigris, utrinque fasciâ ferrugineâ ocellis 5 4 : posticis subtius strigâ albâ, faciei ferrugineæ intus innatâ : alarum omnium sinibus albis.

Papilio N. Ligea, alis subdentatis, fuscis, fasciâ rufâ : utrinque primoribus ocellis quatuor, posticis tribus. LINN. *Syst. Nat. 2. pag. 772. n° 144. — Faun. Suec. edit. 2. p. 275. n° 1050.*

Papilio Alexis. LINN. *Faun. Suec. edit. 1. p. 259. n° 787.*

Papilio N. G. Ligea, alis dentatis, fuscis, fasciâ rufâ : utrinque anticis ocellis quatuor, posticis tribus, subtius albo maculatis. FAB. *Syst. Ent. p. 496. n° 229. — Spec. Inf. tom. 2. p. 78. n° 347. — Mant. Inf. tom. 2. p. 40. n° 409.*

Papilio S. Ligea. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 254. n° 752.*

Papilio Ligea. WIEN. *Verz. p. 167. fam. F. n° 6.*

Papilio Ligea. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 178. n° 6.*

Papilio Ligea. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 197.*

Papilio Ligea. HERBST, *Pap. tab. 208. fig. 5-8.*

Papilio Ligea. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 76 & 255. n° 16. — part. 2. p. 202.*

Papilio Ligea. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 240. n° 21.*

Papilio Ligea. MULLER, *Zool. Dan. p. 114. n° 1522.*

Papilio Ligea. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 29. n° 561.*

Papilio Ligea. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 148. n° 1008.*

Papilio Ligea. OCHSENB. *Pap. Eur. tom. 1. p. 285. n° 56.*

Man. Ligea. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. p. 174. n° 1505.*

Papilio Ligea. HUBN. *tab. 49. fig. 225-227.*

Papilio Alexis. ESP. *Pap. part. 1. tab. 44. Suppl. 20. fig. 1. 2.*

Esp. Pap. part. 1. tab. 54. cont. 4. fig. 2.
(Var.)

Papilio N. G. Philomela, alis denticulatis, fuscis: superioribus fasciâ utrinquè rufâ oculo didymo alterove solitario; posticis suprâ fasciâ rufâ immaculatâ, subtus sericè ocellorum minorum quinque maculâque disci albidâ, oblitteratâ. LSP. Pap. part. 1. p. 118. tab. 16. cont. 71. fig. 4. (Var.)

Papilio Alexis. DE GEER, Mem. Inf. tom. 2. part. 1. p. 210. pl. 2. fig. 7. 8.

Papilio Alexis. SCHNEID. Syst. Besch. p. 103. n^o. 45.

Papilio Alexis. LANG. Verz. 2. p. 20. n^o. 125-130.

Le grand Nègre hongrois. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 82. pl. 25. fig. 42. a. b.

α. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 24. fig. 43. c. d. (Var.)

ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 64. Suppl. 10. fig. 42. c.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses quatre ailes sont légèrement dentées, d'un noir-brun chatoyant, avec les échancrures blanches. Parallèlement au bord postérieur, il y a une bande ferrugineuse, sur laquelle les premières ailes ont de part & d'autre trois ou quatre yeux très-noirs, dont les deux antérieurs réunis.

La bande des secondes ailes n'offre ordinairement que trois yeux, &, en dessous, elle est plus pâle & bordée intérieurement par une ligne blanche, sinuée, plus ou moins longue, continue ou maculaire, & quelquefois par une seule tache placée près du milieu de la surface. Les yeux ont une prunelle bleuâtre, plus apparente dans certains individus que dans d'autres. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont noirâtres en dessus, blanchâtres en dessous.

Dans la femelle, le dessous des ailes supérieures a le milieu roullâtre.

La variété α, figurée dans l'ouvrage d'Engramme, a quatre yeux de part & d'autre aux secondes ailes, & le dessous de ces mêmes ailes présente vers la base une liture d'un cendré-jaunâtre & presqu'en forme d'S.

Le *Philomela* d'Esper, qui paroît devoir être rapporté ici comme variété, a la bande des ailes inférieures sans taches en dessus, & chargée en dessous de cinq points oculaires.

Ce fatyre habite les prairies, & surtout les bois. On le trouve dans plusieurs contrées du nord & de l'est de l'Europe. Nous l'avons pris dans les forêts du Morvan, où il est assez commun au mois d'août.

148. SATYRE Euryale.

SATYRUS Euryale.

Sat. alis subdentatis, fusco-nigris: suprâ fasciâ ferruginèâ ocellis 3-4: posticis subtus fasciâ dentatâ albidâ seu flavescente, punctis ocellaribus: alarum omnium sinibus albis.

Papilio Euryale, alis subdentatis, fuscis, subvo fasciatis sericè ocellorum uigrorum: posticis subtus fasciâ dentatâ luteâ, nigro punctatâ. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 206. n^o. 57.

Papilio Euryale. Esp. Pap. part. 1. tab. 118. cont. 75. fig. 2. (Le mâle.) fig. 3. (La femelle.)

Papilio Philomela. HUBN. Pap. tab. 47. fig. 218. 219.

Le dessus des quatre ailes est comme dans le *Ligéa*, mais les yeux n'ont pas de prunelle.

Le dessous des ailes supérieures est aussi comme dans les deux sexes du *Ligéa*.

Le dessous des ailes inférieures est brun, avec une bande grisâtre ou jaunâtre, ayant au côté interne des dents très-irrégales, & sur le côté externe de deux à cinq points noirs, oculaires. La femelle a en outre vers la base de ces ailes une ligne cendrée, transversale, plus ou moins distincte.

On le trouve dans les forêts montagneuses.

149. SATYRE Mnestra.

SATYRUS Mnestra.

Sat. alis integris, fusco-nigris, suprâ fasciâ ferruginèâ: unicolorum latâ punctis seu ocellis duobus: posticis subtus apice cinerascensibus, immaculatis.

Papilio Mnestra, alis rotundatis, nigro-fuscis: anticis suprâ fasciâ latâ rufâ punctis duobus nigris (sem. utrinquè ocellis), subtus disco rufâ absque punctis; posticis suprâ fasciâ abbreviatâ rufâ (sem. ocellis tribus minutis), subtus immaculatis, fasciâ oblitteratâ antè marginem exterorem. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 204. n^o. 43.

Papilio Mnestra. Esp. Pap. part. 1. tab. 120. cont. 75. fig. 5. 6.

Papilio Mnestra. HUBN. Pap. tab. 106. fig. 540. 541. (Mas.) fig. 542. 543. (Fem.)

Papilio Mnestra. ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 199. — tom. 5. p. 180.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec une bande postérieure ferrugineuse. La bande des premières ailes est large & marquée vis-à-vis du sommet de deux points noirs dans le mâle, de deux yeux à prunelle blanche dans la femelle. La bande des secondes ailes est courte, sans taches dans le mâle, chargée de trois petits yeux dans la femelle.

Le dessous des ailes supérieures est d'un rouge-fauve dans les deux sexes, avec les bords bruns, & des points on des yeux comme du côté opposé.

Le dessous des ailes inférieures est de la couleur du dessus, avec le bout légèrement cendré & sans taches.

De la Suisse.

150. SATYRE Stygné.

SATYRUS Stygne.

Sat. alis integris, fusco-nigris, supra fusciâ ferruginâ: anticis utrinquè ocello didymo alteroque minori remoto, posticis tribus.

Papilio Stygne, alis integris, nigro-fuscis, ferrugineo-fuscis: anticis ocello didymo alteroque minori solitario: posticis subtilis, fuscis oblitteratâ versus marginem anteriorem, ocellis utrinquè tribus. OCHSENB. *Pap. Eur. tom. 1. p. 276. n.º. 52.*

Papilio Stygne. HUBN. *Pap. tab. 125. fig. 659. 640. (Fem.)*

Papilio Pyrene. HUBN. *Pap. tab. 48. fig. 255. 254. (Mas.)*

Papilio Pyrene. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 201. — tom. 5. p. 181.*

Papilio N. G. Pyrene, alis atris, fulvo-fuscis: superioribus utrinquè ocello didymo majori alterove minori solitario; inferioribus ocellis quatuor, subtilis minoribus fasciâ crenatâ griseâ infertis. ESP. *Pap. part. 1. p. 117. tab. 116. cont. 71. fig. 3.*

Il est de la taille & de la couleur du *Mæstra*, & en outre un peu glacé de violet. Le dessus de ses ailes a, parallèlement au bord terminal, une bande ferrugineuse, courbe, & allant toujours en diminuant de largeur jusque vers l'angle interne. Sur cette bande les ailes supérieures ont trois yeux, dont deux réunis en face du sommet, le troisième plus petit & placé beaucoup plus bas. Les ailes inférieures ont aussi trois yeux, mais ils sont également éloignés l'un de l'autre. Ces yeux sont noirs, avec une prunelle blanche.

Le dessous des premières ailes ne diffère pas du dessus dans le mâle; dans la femelle il a, de plus, le disque d'un ferrugineux-foncé.

Le dessous des secondes ailes offre trois petits yeux, correspondans à ceux du dessus; mais dans la femelle ils reposent sur une apparence de bande cendrée dont le côté interne est denté, tandis que dans le mâle ils sont immédiatement sur le fond qui est partout d'un noir-brun.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit quatre yeux aux premières ailes, mais seulement en dessus.

Des montagnes du Tyrol, de la Suisse & du Piémont.

151. SATYRE Mélas.

SATYRUS Melas.

Sat. alis integris, fusco-nigris: anticis utrinquè fusciâ ferruginâ (maris oblitteratâ) ocello didymo alterove minori remoto; posticis tribus, sed supra fusciâ nullâ.

Papilio Melas, alis integris, atris, cæruleo micantibus, anticis apice ocello didymo; posticis punctis ocellaribus nigris pupillâ albâ. OCHSENB. *Pap. Eur. tom. 1. p. 277. n.º. 55.*

Papilio Melas. HERBST. *Pap. tab. 210. fig. 4. 5. (Mas.) fig. 6. 7. (Fem.)*

Papilio N. G. Maurus, alis superioribus rotundatis, aterrimis, cæruleo micantibus, concoloribus, ocellis duobus approximatis; inferioribus tribus marginalibus minutis. ESP. *Pap. part. 1. p. 75. tab. 107. cont. 62. fig. 5. 4. (Mas.) — p. 95. tab. 110. cont. 65. fig. 4. (Fem.)*

Papilio Nelo. HUBN. *Pap. tab. 45. fig. 105. 106. (Mas.)*

ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 199.*

Il ressemble beaucoup au *Stygné*. Néanmoins il s'en distingue, en ce que le dessus de ses ailes inférieures n'offre point de bande, mais seulement trois yeux; en ce que la bande ferrugineuse des premières ailes est moins prononcée ou presque nulle dans les mâles; & en ce que le petit oeil solitaire des mêmes ailes n'est pas constant comme dans le *Stygné*.

De la Hongrie.

152. SATYRE Aleçon.

SATYRUS Aleçon.

Sat. alis integris, fusco-nigris: anticis utrinquè fusciâ ferruginâ, oblitteratâ; in mare ocellis nullis ut duobus, in feminâ quatuor: posticis subtilis atris, cæcis.

Papilio Aleçon, alis integris, fusco-atris, cæruleo micantibus: anticis utrinquè fusciâ oblitteratâ ferruginâ ocellis duobus albo pupillatis: posticis subtilis aterrimis, unmaculatis. OCHSENB. *Pap. Eur. tom. 1. p. 279. n.º. 54.*

Papilio Aleçon. HUBN. *Pap. tab. 101. fig. 515. 516. (Fem.)*

Papilio Aleçon. HUBN. *Pap. tab. 104. fig. 528. 529. (Mas.)*

Papilio D. F. Atratus, alis integerrimis, fusco-atris: superioribus utrinquè fusciâ maculari oblitteratâ fulvescente. ESP. *Pap. part. 1. p. 60. tab. 104. cont. 59. fig. 1.*

Papilio N. G. Glacialis, alis fusco-nigris: anticis, viridi nitentibus unmaculatis: omnibus

fufciâ latâ obfoletâ rufâ : inferioribus subtus faturationibus fufciâ tenuiori grifeâ. ESP. PAP. part. 1. p. 116. cont. 71. fig. 2.

Papilio Pluto. ESP. PAP. part. 1. tab. 121. cont. 16. fig. 1. (Var.)

Papilio Tifiphone. ESP. PAP. part. 1. tab. 122. cont. 77. fig. 5.

ILLIG. MAGAZ. tom. 5. p. 183.

Il a le port, la taille, la couleur & le glacé des deux précédens. Ses premières ailes ont de part & d'autre une bande ferrugineuse, postérieure, large, plus ou moins apparente, sans taches ou avec un groupe de deux petits yeux noirs à prunelle blanche dans le mâle, avec quatre yeux semblables dans la femelle. Les secondes ailes du mâle sont absolument sans taches, mais leur dessous est d'un noir plus décidé que leur dessus. Les secondes ailes de la femelle ont en dessus une bande ferrugineuse, oblitérée, & en dessous une apparence de bande griffâtre, dépourvue d'yeux.

Du Tyrol & de la Suisse.

153. SATYRE Machabée (1).

SATYRUS Machabæus.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè fufciâ ferrugineâ punctis duobus atris approximatis : posticis subtus maculis duabus bafois fufciâque posticâ lutescentibus.

Papilio S. Pyrrha, alis integris, fufcis, fufciâ rubra : anticarum nigro punctatâ, posticarum maculari. FAB. MANT. Inf. tom. 2. p. 42. n°. 416. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 257. n°. 741.

Papilio Pyrrha. WIEN. VERZ. p. 167. fam. F. n°. 9.

Papilio Pyrrha. OCHSENH. PAP. EUR. tom. 1. p. 267. n°. 46.

Papilio Pyrrha. ILLIG. N. AUSG. DEFF. tom. 2. p. 185. n°. 9.

Papilio Pyrrha. ILLIG. MAGAZ. tom. 5. p. 205. — tom. 4. p. 28. n°. 54.

Papilio Cæcilia. ILLIG. MAGAZ. tom. 3. p. 188.

Papilio Pyrrha. HUBN. PAP. tab. 50. fig. 255. 256. (Mas.)

Papilio Pyrrha. HUBN. PAP. tab. 120. fig. 616. (Fem.)

Papilio Cæcilia. HUBN. PAP. tab. 46. fig. 215. 214. (Var.)

Papilio Pyrrha. BORKH. PAP. EUR. part. 2. p. 205. n°. 16.

Papilio Manto. BORKH. PAP. EUR. part. 1. p. 100 & 245. n°. 40.

Papilio Manto. SCHNEID. SYST. BESEHR. p. 111. n°. 52.

Papilio Manto. LANG. VERZ. 2. p. 21. n°. 141. 142.

Papilio Manto. ESP. PAP. part. 1. tab. 70. cont. 20. fig. 2. 5.

Papilio Manto, var. ESP. PAP. part. 1. tab. 119. cont. 74. fig. 6. (Var. fem.)

Papilio Ceme. ESP. PAP. part. 1. tab. 120. cont. 75. fig. 1. ?

Papilio Manto. HERBST, PAP. tab. 210. fig. 8. 9. — tab. 211. fig. 1. 2.

Papilio Maccabæus. HERBST, PAP. tab. 209. fig. 5. 6. (Var.)

Le petit Nègre hongrois. ENGRAM. PAP. d'Europe, tom. 1. p. 81. pl. 25. fig. 41. a-d.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un noir-brun. Celles de devant ont de part & d'autre une bande ferrugineuse, sur laquelle sont deux points noirs faisant face au sommet.

Les ailes de derrière ont en dessus, vers le bout de la côte, une rangée de trois ou quatre taches ferrugineuses ; & en dessous, sur la partie qui correspond à ces taches, une bande maculaire jaunâtre, indépendamment de laquelle il y a près de la base, deux taches qui sont également jaunâtres dans la femelle, & d'un ferrugineux plus ou moins prononcé dans le mâle.

De la Hongrie, de l'Allemagne méridionale, de la Suisse.

154. SATYRE Cassiope.

SATYRUS Cassiope.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè fufciâ ferrugineâ punctis tribus atris : posticis supra maculis 2-4 ferrugineis nigro pupillatis ; subtus fufcis ut cineriscentibus, punctis folis.

Papilio S. Cassiope, alis integris, fufcis, fufciâ rufâ punctis tribus ocellaribus nigris : posticis subtus punctis folis. FAB. MANT. Inf. tom. 2. p. 42. n°. 147. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 258. n°. 742.

Papilio Cassiope, alis integris, fufcis, fufciâ rufâ punctis tribus nigris ; posticis supra maculis rufis nigro punctatis, subtus femina cineriscentibus punctis folis. OCHSENH. PAP. tom. 1. p. 261. n°. 44.

(1) Nous avons pris le nom adopté par Herbst, parce que le nom de *Pyrra* est appliqué à une PÉRIODE, & celui de *Pyrrhus*, à une NYMPHÉE.

Papilio Cassiope. HUBN. *Pap. tab. 125. fig. 626. 627.* (Mas.) *fig. 628. 629.* (Fem.)

Papilio Melampus. HERBST, *Pap. tab. 209. fig. 7. 8.*

Papilio Melampus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 78. cont. 28. fig. 2.*

Papilio Melampus. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 110. n^o. 51.*

Papilio Alcyone. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 96 & 244. n^o. 55. b.*

Papilio N. G. Æthiops minor, obscurè fuscus, fasciâ subâ sæpius obliteratâ ocellis cæcis. De VILLERS, *Ent. Linn. tom. 2. p. 57. n^o. 57.*

Le petit Nègre à bandes fauves. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 83. pl. 24. fig. 45. a. b.*

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Sa couleur est la même que celle des précédens. Les premières ailes ont de part & d'autre une bande ferrugineuse, postérieure, presque maculaire, sur laquelle sont trois points d'un noir-foncé.

Le dessus des secondes ailes offre, vers l'extrémité, un rang de deux à quatre taches ferrugineuses, chargées chacune d'un point noir. Leur dessous est brun dans le mâle, cendré dans la femelle, avec des points noirs seulement.

De la Stirie, de la Suisse, du Languedoc, &c.

N. B. La description qu'en donne Fabricius dans son Entomologie systématique, porte, en parlant de la bande ferrugineuse : *in posticis imprimis maculari, nigri & in hac punctu tria rufa*. C'est une faute d'impression. Il faut transférer *rufa* à la place de *nigri* & réciproquement.

155. SATYRE Melampus.

SATYRUS Melampus.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris fasciâ ferrugineâ maculari : anticarum punctis duobus atris approximatis, posticarum tribus diffusis.

Papilio Melampus, alis rotundatis, fuscis fasciâ utrinquè ferrugineâ, posticarum maculari punctis minutissimis nigris. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 266. n^o. 45.*

Papilio Melampus. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 51. n^o. 604. tab. adj. fig. 6.*

Papilio Melampus. FUESSL. *Alt. Magaz. tom. 2. p. 282.*

Papilio Melampus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 51. Suppl. 7. fig. 2.*

Papilio Melampus, var. ESP. Pap. part. 1. tab. 103. cont. 58. fig. 1.

Papilio Melampus, BERGSTR. *Nomencl. tab. 50. fig. 7. 8.*

Papilio Melampus. BERGSTR. *Nomencl. tab. 71. fig. 5. 6.*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 128. fig. 6. 7.*

BERGSTR. *Icon. Pap. diurn. dec. 5. tab. 5. fig. 5. 6.*

Papilio Alcyone. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 96 & 244. n^o. 55. c.*

Papilio Janthe. HUBN. *Pap. tab. 122. fig. 624. 625.* (Mas.)

Le Montagnard. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 504. pl. 81. 2^e. Suppl. pl. 2. fig. 41. a. b. bis.*

Il a le port, la taille & la couleur du précédent. Ses ailes ont, parallèlement au bord terminal, une bande ferrugineuse, maculaire, sur laquelle les supérieures offrent ordinairement de part & d'autre deux points noirs, rapprochés, en regard du fommel; & les inférieures trois semblables, également distans l'un de l'autre.

Des montagnes de la Carinthie, du Tyrol & de la Suisse.

N. B. Les taches de la bande des premières ailes sont à peu près quadrangulaires & longitudinales, du moins le plus souvent; celles de la bande des secondes ailes sont toujours arrondies & plus petites.

156. SATYRE Pharte.

SATYRUS Pharte.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris, fasciâ ferrugineâ maculari punctis nullis.

Papilio Melampus, alis integris, nigricantibus : anticis fasciâ, posticis serie macularum fulvarum : utrinquè absque ocellis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 259. n^o. 42.*

Papilio Pharte. ESP. *Pap. part. 1. tab. 120. cont. 73. fig. 5.* (Mas.) *fig. 4.* (Fem.)

Papilio Pharte. HUBN. *Pap. tab. 97. fig. 491. 492.* (Mas.) *fig. 495. 494.* (Fem.)

Papilio Pharte. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 200. — tom. 5. p. 180.*

Il ressemble au *Melampus*, mais la bande ferrugineuse de ses ailes est sans points noirs en dessus & en dessous.

Du Tyrol & du midi de la Suisse.

157. SATYRE Epiphron.

SATYRUS Epiphron.

Sat. alis integris, fusco-nigris, virescenti nitidis, fasciâ ferrugineâ maculari : anticarum utrinquè ocellis 2-4, posticarum subtus 5-5.

Papilio S. Epiphron, alis integris, nigris fasciâ

ciâ rubrà : anticis suprà ocellis duobus, subtis tribus ; posticis suprà tribus, subtis quinque. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 40. n^o. 411. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 255. n^o. 755.

Papilio Epiphron, alis integris, fuscis, viridi nitenibus, fuscâ rufâ utrinquè ocellis nigris pro indivisâ numero diversis. OCHSEH. Pap. Eur. tom. 1. p. 258. n^o. 41.

Papilio Epiphron. KNOCH, Beytr. 5. tab. 6. fig. 7.

Papilio Epiphron. HERBST, Pap. tab. 210. fig. 5.

Papilio Junthe. HUBN. Pap. tab. 44. fig. 202.

Papilio Egea. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 77 & part. 2. p. 202. n^o. 16.

ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 195.

Man. Egea ? SCHRANK, Faun. Boïc. tom. 2. p. 176. n^o. 1506.

Il a le port, la taille & la couleur des trois précédens ; mais il est un peu glacé de verdâtre. Ses ailes ont une bande ferrugineuse, postérieure, plus ou moins longue & légèrement divisée aux premières ailes ; maculaire aux secondes. La bande des supérieures offre de part & d'autre de deux à quatre yeux noirs à prunelle blanche ; celle des inférieures en a ordinairement trois en dessus, de trois à cinq en dessous.

Des parties montagneuses de l'Allemagne.

158. SATYRE Œmé.

SATYRUS Œme.

Sat. alis integris, fusco-nigris : anticis utrinquè maculâ apicis ferrugineâ ocellis duobus minutis : posticis maculis ocellaribus ferrugineis, suprà 3, subtis 4-5.

Papilio Œme, alis integris, nigris : anticis utrinquè maculâ apicis fulvâ punctis duobus ocellaribus : posticis fulvo maculatis punctatisque. OCHSEH. Pap. Eur. tom. 1. p. 270. n^o. 47.

Papilio Œme. HUBN. Pap. tab. 104. fig. 550. 551. (Mas.) fig. 552. 553. (Fem.)

ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 199.

Papilio Œme. ESP. Pap. part. 1. tab. 120. cont. 75. fig. 2.

Papilio Cæcilia. ESP. Pap. part. 1. tab. 121. cont. 76. fig. 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont entières & d'un noir-brun. Les supérieures ont de part & d'autre, vis-à-vis du sommet, une tache ferrugineuse, plus ou moins foncée, sur laquelle sont deux petits yeux noirs à prunelle blanche.

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

Les ailes inférieures ont en dessus trois taches ferrugineuses, chargées chacune d'un œil comme ceux dont il vient d'être question ; & en dessous quatre taches semblables dans le mâle, cinq dans la femelle.

De la Suisse & du Tyrol.

159. SATYRE Pfodea.

SATYRUS Pfodea.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris, fuscâ ferrugineâ maculari : anticarum oculo gemino aliisque minoribus ; posticarum (mas) 4, (fem.) 6.

Papilio Pfodea, alis rotundatis, fuscis : anticis utrinquè fuscâ fulvâ oculo apicis gemino ; posticis fuscâ maculari fulvâ ocellisque nigris albo pupillatis. OCHSEH. Pap. Eur. tom. 1. p. 271. n^o. 48.

Papilio Pfodea. HUBN. Pap. tab. 98. fig. 497. (Mas.) fig. 498. 499. (Fem.)

Papilio Pfodea. ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 203.

Il est de la taille & de la couleur du précédent. Ses ailes, dont le dessous ressemble au dessus, ont une bande ferrugineuse, tantôt plus, tantôt moins foncée. La bande des ailes supérieures est légèrement divisée, & elle présente, vis-à-vis du sommet, un double œil noir à prunelle blanche, à la suite duquel il y en a de un à trois autres plus petits.

La bande des ailes inférieures est maculaire & chargée de quatre yeux dans le mâle, de six dans la femelle.

De la Stirie & de la Hongrie.

160. SATYRE Ceto.

SATYRUS Ceto.

Sat. alis integris, concoloribus, fusco-nigris, strigâ ferrugineâ sex ferrugineis puncto ocellari sextis.

Papilio Ceto, alis integris, atro-fuscis, utrinquè serie macularum fulvarum punctis nigris albo pupillatis. OCHSEH. Pap. Eur. tom. 1. p. 272. n^o. 49.

Papilio Ceto. HUBN. Pap. tab. 112. fig. 578. 579. (Le mâle.)

Il est à peu près de la taille de l'Œmé. Ses ailes, dont le fond est d'un noir-brun & le bord postérieur entier, ont, parallèlement à ce même bord, en dessous, comme en dessus, une rangée de six taches ferrugineuses, chargées chacune d'un petit œil noir à prunelle blanche.

Quelquefois l'œil de la première & de la sixième tache des ailes de devant est nul ou à peine distinct.

Du midi de la Suisse & du Piémont.

Y y

161. SATYRE Méduse.

SATYRUS Medusa.

Sat. alis integris aut subdentatis, fusco-nigris, fuscâ maculari ferrugineâ seu lutescente: anticarum utrinquè ocellis 3-5, posticuum subtus 4-7.

Papilio S. Medusa, alis subdentatis, concoloribus, fuscis: omnium fuscâ maculari flavâ ocellis subquatuor. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 40. n. 410.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 255. n. 754.*

Papilio Medusa. WIEN. *Verz. p. 167. sum. F. n. 10.*

Papilio Medusa. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 184. n. 10.*

Papilio Medusa. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 198.*

Papilio Medusa. HUBN. *Pap. tab. 45. fig. 105. 104. (Mas.)*

Papilio Medusa. SCHÆFF. *Icon. tab. 185. fig. 2. 5.*

Papilio Medusa. BRAHM. *Inf. Calend. p. 458. n. 522.*

Papilio Medusa. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 275. n. 50.*

Papilio Medea. HERBST, *Pap. tab. 208. fig. 5. 4.*

Papilio Medea. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 47 & 255. n. 14.* — *part. 2. p. 201.*

Papilio Medea. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 259. n. 20.*

Mant. Medea. SCHRANK, *Faun. Boïc. tom. 2. p. 175. n. 1502.*

Papilio Ligea. ESP. *Pap. part. 1. tab. 7. fig. 2.*

Papilio Ligea. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 105. n. 45.*

Papilio Ligea. LANG. *Verz. 2. p. 20. n. 119-124.*

Papilio Ligea, var. 4. SECP. *Ent. Carn. p. 158. n. 456.*

Le moyen Nègre à bandes fauves. ENGRAM. *Pap. d'Eur., tom. 1. p. 85. pl. 24. fig. 44. a. b.*

Le Franconien. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 114. pl. 25. fig. 47. a. b.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 65. Suppl. 11. fig. 44. c. d.*

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes sont entières ou légèrement dentées, suivant le sexe, d'un noir-brun, avec une bande postérieure & maculaire d'un rouge-fauve dans le mâle, d'un jaune-roussâtre dans la femelle. Sur cette bande

font des yeux noirs à prunelle blanche, yeux dont le nombre varie. En effet, les premières ailes en ont de trois à cinq de part & d'autre; les secondes trois ou quatre en dessus, & de quatre à sept en dessous. Le corps & les antennes sont aussi d'un noir-brun.

La chenille, d'après Hubner, est pubescente ou un peu velue, d'un vert-tendre, avec des raies longitudinales, les unes blanchâtres, les autres d'un vert-foncé. Elle vit, selon les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères des environs de Vienne, sur le *panic sanguin* (*panicum sanguinale*).

Le papillon est commun en mai & en juin dans les bois élevés de plusieurs parties de l'Europe.

162. SATYRE Hypéranthus.

SATYRUS Hyperanthus.

Sat. alis integris, supra fusco-nigris: subtus dilatoribus; posticis ocellis duobus tribusque.

Papilio D. F. Hyperanthus, alis integerrimis, fuscis: subtus primoribus ocellis tribus, posticis duobus tribusque. LAMN. *Syst. Nat. 2. p. 768. n. 127.* — *Fauna Succ. edit. 2. p. 275. n. 1045.*

Papilio S. Hyperanthus. FAB. *Syst. Entom. p. 486. n. 192.* — *Spec. Inf. tom. 2. p. 64. n. 289.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n. 354.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 216. n. 677.*

Papilio media tota pulla, pronâ alium parte ocellis alioquâ è puncto albo, duplici circulo nigro & forâde luteo cincto compositis illustrata. RAT, *Inf. 129. n. 7.*

Papilio medius, omninò fuscus, plurimis ocellis nigris in circulis luteis subtus ornatus. PETIV. *Mus. p. 54. n. 513.*

JAC. L'AMIR. *Inf. tab. 30.*

SEPP. *Niederl. Inf. tom. 1. tab. 4. fig. 1-8.*

Papilio Hyperanthus. WIEN. *Verz. p. 168. sum. F. n. 11.*

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 185. n. 11.*

Papilio Hyperanthus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 5. fig. 1.*

Papilio Hyperanthus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 57. fig. 2-4. (Var.)*

Papilio Hyperanthus. HERBST, *Pap. tab. 197. fig. 3-6. 7. 8.*

Papilio Hyperanthus. HERBST, *Pap. tab. 193. fig. 1. 2. (Var.)*

Papilio Hyperanthus. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 29. n. 556.*

Papilio Hyperanthus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 225. n. 29.*

- LANG. *Verz.* 2. p. 21. n^o. 157-140.
 SCHWARZ, *Raup. Calend.* p. 345.
 NATURF. 8. tab. 5. fig. D.
Papilio Hyperanthus. De VILLIERS, *Ent. Linn.*
tom. 2. p. 18. n^o. 25. tab. 4. fig. 7.
Papilio Hyperanthus. SCHNEID. *Syfl. Befchr.*
 p. 101. n^o. 41.
Papilio Arete. SCHNEID. *Syfl. Befchr.* p. 102.
 n^o. 42.
Papilio Hyperanthus. BORKH. *Rhein. Magaz.*
tom. 1. p. 245. n^o. 50.
Papilio Arete. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1.
 p. 244. n^o. 29.
Papilio Polymeda. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1.
 p. 84 & 240. n^o. 25.
Papilio Hyperanthus. MULLER, *Zool. Dan.*
 p. 114. n^o. 1518.
Papilio Arete. MULLER, *Faun. Fried.* p. 56.
 n^o. 550.
Papilio Vidua. MULLER, *Faun. Fried.* n^o.
 551.
Papilio Hyperanthus. BERGSTR. *Nomencl. tab.*
 16. fig. 7. 8. & tab. 17. fig. 5-8.
Papilio Vidua. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 50.
 fig. 6. 7. & tab. 65. fig. 3. 4.
Papilio Polymeda. HUBN. *Pap. tab.* 38. fig.
 172. 175. 175*.
Papilio Polymeda. SCOP. *Ent. Carn.* p. 157.
 n^o. 454.
 Triflan. De GEER. *Men. Inf. tom.* 2. part. 1. p.
 150. tab. 2. fig. 9. 10.
 Triflan. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 47.
 n^o. 14.
 Le Triflan. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1.
 p. 122. pl. 27. fig. 52. a-f.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont entières, d'un noir-brun en dessus, avec une petite frange blanchâtre au bord postérieur.

Le dessous est plus clair que le dessus, avec des yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Les secondes ailes en ont couffamment cinq, dont deux groupés transversalement près du bord antérieur, les trois autres alignés dans le même sens vers l'angle de l'anus. Les premières ailes en ont tantôt deux, tantôt trois, dont le troisième ou le postérieur plus petit. Dans certains individus on voit en dessus l'empreinte de quelques-uns de ces yeux. Les deux surfaces du corps sont colorées comme celles des ailes. Les antennes sont noires, annelées de gris, avec le dessous de la massue ferrugineux.

Quelquefois les yeux du dessous des ailes sont remplacés par des points jaunâtres.

Très-commun, aux mois de juillet, d'août & de septembre, dans les bois & dans les prairies de l'Europe.

La chenille est d'un gris-blanchâtre, avec une ligne noirâtre, dorsale. Elle vit solitairement sur le millet épars (*miliun effusum*), le paturin annuel (*pou annua*).

La chrysalide est courte, presque rouge, à peu près de la couleur de la chenille.

163. SATYRE JANIRA.

SATYRUS JANIRA.

Sat. alis dentatis, supra fuscis : anticis utrinquè ocello apicis unico : posticis subtus stavefcenti-cinereis, fasciâ diluore punctis ocellaribus nigris 1-5.

Papilio N. Janira, alis dentatis, fuscis : primoribus subtus luteis, ocello unico : posterioribus subtus punctis tribus vel duobus. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 774. n^o. 156. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 276. n^o. 1055. (Mas.)

Papilio N. Jurtina, alis dentatis, fuscis : primoribus supra luteis flavis, ocello utrinquè unico : posterioribus cæcis. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 774. n^o. 155. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 276. n^o. 1052. (Fem.)

Papilio Coridon. LINN. *Faun. Suec. edit.* 1. p. 259. n^o. 786. (Fem.)

Papilio N. Janira. FAB. *Syfl. Entom.* p. 497. n^o. 255. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 81. n^o. 558.

Papilio N. Jurtina. FAB. *Syfl. Entom.* p. 498. n^o. 256. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 81. n^o. 559.

Papilio Janira, & Jurtina. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 44. n^o. 455. — *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 241. n^o. 752.

PETIV. *Muf.* 54. n^o. 509.

RAI, *Inf.* 124. n^os. 16. 17.

ALBIN. *Inf. tab.* 55.

JAC. L'AMIR. *Inf. tab.* 29.

REAUM. *Inf.* 1. tab. 11. fig. 1.

ROES. *Inf. part.* 5. tab. 54. fig. 7. 8. *cluff.* 1. *Pap. diurn.*

SCHIEFF. *Icon. tab.* 242. fig. 1. 2.

SCHIEFF. *Icon. tab.* 275. fig. 1. 2. 5. 6.

SCHNEID. *Syfl. Befchr.* p. 121. n^o. 60.

FUESSL. *Suiff. Inf.* p. 29. n^o. 567. 568.

LANG. *Verz.* 2. p. 19. n^o. 106-111.

ROSSI, *Faun. Etr. tom.* 2. p. 149. n^os. 1011. 1012.

SCHWARZ, *Raup. Calend.* p. 58. 59. 485. 625.

Yyy 2

- BERGSTR. *Nomencl. tab.* 25. *fig.* 1-9. (Var.)
- BERGSTR. *Nomencl. tab.* 95. *fig.* 5. 6. (Var.)
- SEPP. *Niederl. Inf. tom.* 1. *tab.* 5. *fig.* 1-6.
- LEWIN. *Inf. tab.* 18. *fig.* 1-5.
- SCOP. *Ent. Carn. p.* 157. 158. n°. 455.
- MULLER, *Zool. Dun. p.* 115. n°. 1524.
- MULLER, *Faun. Fried. p.* 34. n°. 516. 517.
- WIEN. *Verz. p.* 167. *fam.* F. n°. 8.
- Papilio Janira.* OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 218. n°. 27.
- Papilio Janira.* ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 10. *fig.* 1. 2.
- Papilio Janira.* ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 82. *cont.* 52. *fig.* 5. (Aberratio.)
- Papilio Hispulla.* ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 119. *cont.* 74. *fig.* 1. (Mas.) *fig.* 2. (Fem.)
- Papilio Erymanthea.* ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 90. *cont.* 40. *fig.* 4. (Var. ?)
- Papilio Jurtina.* ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. p. 181. n°. 8.
- Papilia Hispulla.* ILLIG. *Magaz. tom.* 5. *pag.* 132.
- Papilio Jurtina.* HUBN. *Pap. tab.* 56. *fig.* 161. 162. (Fem.)
- Papilio Janira.* HUBN. *Larv. Lepid.* 1. *Pap.* 1. *Nymph.* F. a. *fig.* 2. a. b.
- Papilio Hispulla.* HUBN. *Pap. tab.* 116. *fig.* 595. 594. (Mas.) *fig.* 595. 596. (Fem.)
- Papilio Janirus.* HERBST, *Pap. tab.* 206. *fig.* 7. 8.
- HERBST, *tab.* 207. *fig.* 1. 2.
- Papilio Erymanthea.* HERBST, *Pap. tab.* 202. *fig.* 5. 4. (Var. ?)
- Papilio Janira.* BORKH. *Rhein. Mag. tom.* 1. p. 245. n°. 52.
- BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 75 & 234. n°. 12.
- Papilio Erymanthea.* BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 104. n°. 46. (Var. ?)
- Papilio Pamphilis.* HUFNAG. *Magaz. tom.* 2. p. 76. n°. 39. & p. 90.
- Papilio Pamphilis.* NATURF. 6. p. 9. n°. 39.
- Maniola Lemur.* SCHRANK, *Faun. Boïc. tom.* 2. p. 175. n°. 1505.
- CORYDON. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 49. n°. 17.
- MYRIL. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 50. n°. 18.

Le Mirtil. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 125. *pl.* 28. *fig.* 54. a-h.

Le Mirtil. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 265. *pl.* 66. *Suppl.* 12. *fig.* 54. l. m. i. k. (Var.)

Le Mirtil. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 265. *pl.* 67. *Suppl.* 13. *fig.* 54. o. p. q. r.

Linnæus a donné le mâle de ce fatyre sous le nom de *Janira*, & la femelle primitivement sous celui de *Coridon*, puis sous celui de *Jurtina*. Plusieurs auteurs ont fait de même.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, légèrement chatoyant. Les premières, dont le bord terminal est entier, ont, vis-à-vis du sommet, un œil noir à punelle blanche. Dans le mâle, cet œil est petit & entouré d'un cercle rouffâtre; dans la femelle au contraire il est grand & placé sur une bande fauve, transverse, un peu bilobé antérieurement, coupée dans toute sa longueur par des nervures du même brun que le fond, & adhérant par son côté interne à un espace discoidal également fauve. Les secondes ailes sont dentées. Leur dessus est sans taches dans le mâle; mais dans la femelle on voit ordinairement un point fauve vers le milieu de la surface.

Le dessous des ailes supérieures est fauve, avec les bords cendrés, & un œil comme du côté opposé.

Le dessous des ailes inférieures est d'un cendré-nuâtre, & traversé obliquement au-delà du milieu par une bande plus claire, large, sinuée intérieurement, sans taches ou avec un seul point noir ocellé dans la femelle, offrant dans le mâle deux points semblables, très-éloignés l'un de l'autre, & parfois un troisième plus petit & moins distinct, situé entre le postérieur & l'angle de l'anus. Les deux surfaces du corps sont de la couleur de celles des ailes. Les antennes sont noires, & grêles en dessous, avec la malles ferrugineuse.

Tel est le *Janira* dans les régions septentrionales & tempérées de l'Europe. A Ténériffe, en Espagne, en Portugal, dans le midi de la France & même quelquefois aux environs de Paris, les femelles ont le dessus des ailes inférieures, traversé en majeure partie par une bande fauve, sinuée; & le dessous des mêmes ailes un peu glacé de violet, avec du jaune sur la bande pâle. Esper a fait de ces femelles une espèce particulière sous le nom de *Hispulla*, quoique leurs mâles soient comme dans les contrées du nord de l'Europe.

Engramelle représente des mâles tout blancs en dessus, & une femelle dans laquelle le fauve est remplacé de part & d'autre par une couleur blanchâtre.

L'individu figuré par Esper, *tab.* 82, est blanc en dessus & en dessous, avec le disque des ailes supérieures fauve.

La chenille à l'anus terminé par une pointe bifide. Son corps est vert, avec une ligne blanche, longitudinale, placée de chaque côté au dessus des pattes. Elle vit sur le *paturin des prés* (pour *pratis*) & sur quelques autres graminées.

La chrysalide est verdâtre, rayée de brun sur l'enveloppe des ailes. Le papillon en fort en juillet. Il est très-commun partout, notamment dans les endroits où il y a des ronces en fleurs.

N. B. L'*Erymantha* d'Elper & de quelques auteurs nous paroît en être une variété mâle, dont les ailes supérieures ont deux yeux en dessus & trois en dessous, & les ailes inférieures une suite de cinq points ocellés en dessous. Elle est de la Hongrie.

164. SATYRE Eudora.

SATYRUS Eudora.

Sat. alis dentatis, supra fuscescentibus : anticis (mas) puncto nigro, (fem.) duobus, subtus ocellis totidem : posticis subtus griseocinereis, fasciâ dilutiore unimaculatâ.

Papilio S. Eudora, alis dentatis, fuscis : anticis utranquâ disco ferrugineo, ocello maris unico, feminae duobus. F. AB. Mant. Inf. tom. 2. p. 44. n°. 435. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 243. n°. 755.

Papilio Eudoras. HERBST, Pap. tab. 205. fig. 5-8.

Papilio Eudora. ESP. Pap. part. 1. tab. 45. Suppl. 21. fig. 1.

Papilio Eudora. ESP. Pap. part. 1. tab. 69. cont. 19. fig. 1. 2.

Papilio N. Janirula, alis dentatis, fuscis : primoribus supra puncto oblitterato nigro, subtus ocello unico : posticis subtus punctis ocellaribus nullis. ESP. Pap. part. 1. tab. 115. cont. 68. fig. 1. (Mas.)

Papilio Eudora. SCHNEFF. Icon. tab. 215. fig. 1. 2.

Papilio Eudora. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 74 & 255. n°. 15. — part. 2. p. 201.

Papilio Eudora. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 258. n°. 18.

SCHNEID. Syst. Besch. p. 123. n°. 61.

LANG. Verz. 2. p. 19. n°. 112-114.

ILLIG. Magaz. tom. 5. p. 192.

Papilio Eudora. BERGSTR. Nomencl. 1. tab. 89. fig. 2. 5.

Papilio Eudora. HUBN. Pap. tab. 56. fig. 160. 163. (Mas.) fig. 164. (Fem.)

Papilio Eudora. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 225. n°. 28.

Papilio Lycaon. NATUREL. 5. tab. 2. fig. d. c. f.

Le Mifis. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 127. pl. 28. fig. 53. a. b.

ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 264. pl. 67. Suppl. 13. fig. 55. c. d. e. f.

Il a de très-grands rapports avec le *Janira* ; mais il est constamment plus petit & d'un brun moins noirâtre ; l'œil du dessus des ailes supérieures est remplacé dans le mâle par une tache noire, orbiculaire ; la femelle a deux taches semblables sur le dessus des mêmes ailes, & deux yeux sur leur dessous ; la surface inférieure des secondes ailes est d'un cendré moins jaunâtre, & la bande qui la traverse est sans points oculaires dans les deux sexes ; cette bande est d'ailleurs moins large & moins apparente.

On le trouve en Saxe, en Au riche, dans le midi de la France. M. Duponchel l'a pris communément dans le département de la Lozère & aux environs de Perpignan.

N. B. Fabricius se trompe en disant que le milieu des premières ailes est fauve en dessous dans chaque sexe. Cela n'est vrai que pour la femelle. Le mâle, comme nous l'avons dit, ne diffère du mâle du *Janira*, que parce qu'il est un peu plus pâle, & parce que la tache noire du sommet de ses premières ailes n'a point de prunelle.

165. SATYRE Clymène.

SATYRUS Clymene.

Sat. alis dentatis, fuscis : anticis utranquâ disco nigro ocelloque apicis ; posticis serie macularum ocellatarum supra 3-4, subtus 7.

Papilio S. Clymene, alis dentatis, fuscis : haurâ ferriginâ : posticis ocellis supra subtribus, subtus septem. F. AB. Mant. Inf. tom. 2. p. 44. n°. 434. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 242. n°. 753.

Papilio N. Clymene, alis dentatis, fuscis : primoribus utranquâ haurâ disci subâ & ocello in apice : posticis supra punctis tribus nigris, subtus serie ocellorum septem cæcorum. ESP. Pap. part. 1. p. 165. tab. 83. cont. 55. fig. 1. 2. (Mas.) fig. 5. (Fem.)

Papilio Clymene. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 102. — part. 2. p. 210. n°. 44.

SCHNEID. Syst. Besch. p. 121. n°. 59.

ILLIG. Magaz. tom. 5. p. 190.

Papilio Clymene. HUBN. Pap. tab. 57. fig. 165. 166. (Fem.)

Papilio Clymene. OCHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p. 215. n°. 29.

Il est un peu plus grand que le *Janira*. Ses

ailes supérieures sont entières, d'un brun-obscur de part & d'autre, avec le milieu d'un roux plus ou moins foncé, & le sommet précédé d'un œil noir à iris fauve, sans prunelle en dessus, pupillé de blanc en dessous.

Les secondes ailes sont dentées. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec une rangée postérieure de trois à quatre taches fauves, orbiculaires, dont deux au moins chargées chacune d'un point noir.

Le dessous des mêmes ailes est d'un cendré-jaunâtre dans le mâle, d'un cendré-grisâtre dans la femelle, avec une suite de sept taches noires, ocellées, dont la seconde & la troisième, à partir d'en haut, plus petites & parfois peu distinctes, les deux postérieures réunies.

Des parties boitées qui avoisinent le Volga. ♂

166. SATYRE TITHONIUS.

SATYRUS Tithonius.

Sat. alis denticulatis, suprâ fulvis, basi orifque fuscis: anticis utrinque ocello bipupillato: posticis subtus nebuloso-flavescentibus, fasciâ sesquialtera diluitorie punctisq; ocellaribus quinque.

Papilio P. R. Tithonius, alis subdentatis, concoloribus, disco luteis: primoribus ocello bipupillato, posticis punctis duobus albis. LINN. *Mant.* 1. 557.

Papilio S. Pilosellæ, alis dentatis, fuscis, disco fulvo: anticis utrinque ocello nigro pupillâ geminâ: posticis subtus punctis ocellaribus niveis. FAB. *Sylf. Entom.* p. 497. n°. 253. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 80. n°. 553. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 45. n°. 428. — *Entom. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 240. n°. 748.

Papilio Tithonius. HERBST, *Pap. tab.* 189. fig. 5-8.

Papilio Tithonius. FUESSL. *Suiff. Inf. p.* 31. n°. 605.

Papilio Tithonius. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 18. fig. 5-9.

Papilio Tithonius. LEWIN. *Inf. tab.* 22. fig. 1-5.

Papilio Tithonius. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 210. n°. 22.

SEPP. *Niederl. Inf. tom.* 1. tab. 5. fig. 1-8.

NATURF. 3. tab. 2. fig. a. b. c.

Papilio Pilosellæ. CYRILL. *Ent. Neap.* 1. tab. 3.

Papilio Phœbra. ESE. *Pap. part.* 1. tab. 9. fig. 1.

Papilio Phœdra. ESP. *Pap. part.* 1. tab. 28. *Suppl.* 4. fig. 5.

Papilio Phœdra. SCHNEID. *Sylf. Besch. p.* 124 n°. 62.

Papilio Herfe. WIEN. *Verz. p.* 320. *Sam. F.* n°. 8. g.

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom.* 2. p. 182. n°. 8. g.

ILLIG. *Magaz. tom.* 5. p. 195.

Papilio Herfe. LANG. *Verz.* 2. p. 19. n°. 115-118.

Papilio Herfe. HUBN. *Pap. tab.* 35. fig. 156. 157. (Fem.)

Papilio Herfe. HUBN. *Pap. tab.* 119. fig. 612. (Mas.)

Papilio Herfe. BORRH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 244. n°. 28.

Papilio Amaryllis. BORRH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 80 & 258. n°. 19. — *part.* 2. p. 205.

Amaryllis. GEOFFR. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 52. n°. 20.

L'Amarillis. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 125. pl. 27. fig. 55. a-e.

L'Amarillis. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 262. pl. 66. *Suppl.* 12. fig. 55 f. g. (Var.)

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Les quatre ailes sont légèrement dentées, fauves en dessus, avec la base & le pourtour d'un brun-obscur. Les premières, dont le dessus ne diffère du dessous que parce qu'il est traversé au milieu dans les mâles par une bande brune un peu oblique, ont de part & d'autre, vis-à-vis du sommet, un œil noir à double prunelle blanche.

Le dessus des secondes ailes est sans taches dans les mâles. Dans les femelles, il offre à l'extrémité inférieure de la partie fauve deux yeux semblables à celui dont il vient d'être question, mais très-petits, surtout l'antérieur, & à prunelle simple.

Le dessous des mêmes ailes est d'un jaunâtre-obscur, avec deux bandes transverses plus claires, dont l'antérieure très-courte, appuyée sur le milieu du bord d'en haut & précédée en dehors de deux points blancs ocellés; la postérieure en zig-zag, atteignant les deux bords, & précédée aussi en dehors, mais vers l'angle anal, de trois points blancs ocellés. Ces points font entourés de brun-ferrugineux, couleur qui domine sur le bord terminal de l'aile & que font encore ressortir les cils gris de ce même bord. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont noires, annelées de gris, avec le bout de la massue ferrugineux.

Il est des femelles dont les deux surfaces des ailes supérieures ont un second œil très-petit, situé à égale distance du premier & de l'angle interne.

On rencontre quelquefois une variété dans la-

quelle le fanve est remplacé par du blanc-fîle. Engramme la figurée pl. 66, *Suppl.* 12. *fig.* 55. f. g.

La chenille est d'un vert plus ou moins foncé, avec une ligne rougeâtre, longitudinale, sur chacun des côtés. Sa tête est à peu près de cette dernière couleur. Elle vit sur le *paturin annuel* (*poa annua*), & se métamorphose à la fin de mai ou au commencement de juin.

La chrysalide est griseâtre, avec quelques taches noires. Elle est suspendue par la queue. Le papillon en sort en juillet. Il fréquente les bois de l'Europe & se repose sur la bruyère commune. Très-abondant au bois de Boulogne.

167. SATYRE Ida.

SATYRUS Ida.

Sat. alis denticulatis, suprâ fulvis, basi orifque fuscis: anticis utrinque ocello bipupillato: posticis subtus nebuloso-griseocentibus, fuscis duabus dilutioribus punctisque ocellaribus nullis.

Papilio S. Ida, alis subdentatis, fuscis, disco fulvo: anticis utrinque ocello nigro bipupillato: posticis subtus griseo-varius. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 45. n°. 429. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 240. n°. 749.

Papilio Ida. Esp. Pap. part. 1. tab. 92. cont. 42. fig. 2. (Fem.)

Papilio Ida. Esp. Pap. part. 1. tab. 102. cont. 57. fig. 5. (Mas.)

Papilio Ida. HERBST, Pap. tab. 190. fig. 1-4.

Papilio Ida. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 105. n°. 47. — part. 2. p. 210.

Papilio Ida. ROSSI, Mant. tom. 2. p. 10. n°. 348.

ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 195.

Papilio Ida. HUBN. Pap. tab. 55. fig. 153. (Mas.) fig. 159. (Fem.)

Papilio Ida. OCHSENB. Pap. Eur. tom. 1. p. 212. n°. 25.

Papilio Aëta. LANG. Verz. 2. p. 25. n°. 165.

ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 524. 3°. Suppl. pl. 5. fig. 53. h.

Le mâle & la femelle de ce satyre ressemblent aux deux sexes du *Tithonius*, par le dessus des quatre ailes & par le dessous des supérieures.

Mais le dessous des inférieures offre des différences qui consistent en ce que le fond est d'un gris-obscur, au lieu d'être jaunâtre; en ce que les deux bandes plus claires sont blanchâtres & atteignent l'une & l'autre le bord d'en haut & le bord interne; en ce que la bande postérieure, qui est plus distincte, a la partie supérieure bilobée;

enfin, en ce qu'il n'y a aucun point ocellé sur le côté externe de ces bandes.

Il habite l'Italie, le Portugal, l'Espagne & le midi de la France. — Fabricius le trouve en Allemagne.

N. B. Quelquefois le dessus des secondes ailes de la femelle est tout-à-fait dépourvu d'yeux.

168. SATYRE Bathseba.

SATYRUS Bathseba.

Sat. alis denticulatis, suprâ fulvis basi orifque fuscis: anticis utrinque ocello bipupillato: posticis subtus nigricantibus, fuscis flavescente, medio, extus unidentatâ ocellisque quinque marginatâ.

Papilio S. Bathseba, alis repandis, fuscis, disco ferrugineo: anticis utrinque ocello bipupillato: posticis subtus fuscis, fuscis alba. FAB. *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 255. n°. 750.*

Papilio S. Salome, alis anticis fuscis, fuscis rufâ ocello unico: posticis tribus, subtus singis dentatâ albâ ocellisque quinque. FAB. *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 258. n°. 744.*

Papilio Pasiphæ. Esp. Pap. part. 1. tab. 67. cont. 17. fig. 4.

Papilio Pasiphæ. Esp. Pap. part. 1. tab. 97. cont. 52. fig. 1.

Papilio Pasiphæ. HERBST, Pap. tab. 190. fig. 5-8.

Papilio Pasiphæ. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 97. n°. 56. — part. 2. p. 208.

SCHNEID. Syst. Besch. p. 113. n°. 53.

ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 200.

Papilio Pasiphæ. HUBN. Pap. p. 37. fig. 167. (Mas.) fig. 168. 169. (Fem.)

Papilio Pasiphæ. OCHSENB. Pap. Eur. tom. 1. p. 214. n. 24.

Le Tithire. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 262. pl. 67. Suppl. 12. fig. 55. a. b. bis.

Le *Salome* & le *Bathseba* de Fabricius ne sont qu'une seule espèce, dont le premier est le mâle & le second la femelle.

Elle a le poil & à peu près la taille du *Tithonius*. Elle est aussi de la même couleur en dessus, mais le brun-obscur domine davantage à la base des ailes, surtout dans les mâles. Celles de devant, dont le dessous est fanve, avec les bords noirs, ont de part & d'autre, vis-à-vis du sommet, un œil noir à double prunelle blanche.

Le dessus des secondes ailes a une rangée courbe & postérieure de trois à quatre yeux plus petits & à prunelle simple. Le dessous des mêmes ailes est d'un brun-noirâtre-clair, avec une bande jaune, pâle, transverse & arquée, dont le côté externe est unidenté dans son milieu, & précédé

dans toute sa longueur par une rangée de cinq yeux noirs à prunelle blanche & à iris rouillâtre. Il arrive que quelques-uns de ces yeux sont effacés ; c'est ce qui fait dire à Fabricius, en décrivant son *Bathysba*, qu'il y en a tantôt quatre, tantôt moins. Le corps est brun. Les antennes sont noirâtres, annelées de gris, avec le dessous de la massue ferrugineux.

Quelquefois la femelle a un point noirâtre vers le milieu du bord interne des ailes supérieures.

On trouve cette espèce dans le midi de la France, en Espagne, &c. M. le chevalier Desfontaines l'a rapportée de la Barbarie où elle est très-commune.

169. SATYRE Œdipe.

SATYRUS Œdipus.

Sat. alis integris, supra fusco-nigris: subtus fuscescenti-luteis; posticis ocellis sex serie digestis extusque lineâ argenteâ marginatis, anteriori remoto.

Papilio S. Œdipus, alis integerrimis, supra nigris, immaculatis: subtus fuscis; anticis ocellis subtribus, posticis quinque. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 218. n.º. 681. (Mas.)*

Papilio S. Miris, alis integerrimis, fuscis: posticis supra ocellis duobus minutis, subtus sex, exteriori remoto. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 429. n.º. 695. 4. (Fem.)*

Papilio Œdipus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 315. n.º. 71.*

Papilio Œdippe. BORKH. *Pap. Eur. part. 2. p. 205. n.ºs. 23. 24.*

Papilio Œdipus. HUBN. *Pap. tab. 138. fig. 702. 703. (Fem.)*

Papilio Pylarge. HUBN. *Pap. tab. 52. fig. 245. 246.*

Papilio Pylarge. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 202.*

Papilio Geticus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 107. cont. 62. fig. 5. (Mas.)*

Papilio Geticus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 102. cont. 57. fig. 2. (Fem.)*

Papilio Iphigenus. HERBST, *Pap. tab. 198. fig. 5.-8.*

L'*Œdipus* & le *Miris* de Fabricius ne sont qu'une seule espèce, dont le premier est le mâle & le second la femelle.

Elle est un peu plus petite que l'*Hypéranthus*, auquel elle ressemble en dessus.

Le dessous de ses ailes est d'un jaune-rouillâtre, mais un peu plus bleu en dessous du mâle, avec des yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaunepâle. Les premières ailes en ont tantôt cinq, dont

les deux extrêmes fort petits; tantôt trois; quelquefois un seul, & quelquefois pas du tout. Les secondes ailes en ont le plus souvent six, dont l'anterieur isolé, les cinq autres contigus & inégaux. Ces yeux sont précédés en dehors sur les quatre ailes d'une ligne argentée, courbe en arrière & parallèle au bord postérieur dont elle suit le contour.

Dans quelques individus femelles, les yeux des ailes inférieures sont précédés intérieurement par un trait blanchâtre, interrompu, & plus rarement par une bande argentée. Le corps est d'un brun-obscur. Les antennes sont annelées de blanc & de noir; elles ont le dessous de la massue ferrugineux.

On le trouve, dans le courant de juin, en Russie, en Hongrie & en Piémont.

N. B. Dans les femelles, ou du moins dans la plupart d'entr'elles, l'impression des yeux des secondes ailes est sensible en dessus.

170. SATYRE Héro.

SATYRUS Hero.

Sat. alis integris, supra nigricanti-fuscis: subtus pallidioribus; posticis ocellis sex serie digestis intusque vittâ albi angulatâ, extus lineâ argenteâ, marginatis.

Papilio P. R. Hero, alis integerrimis, fuscis: subtus anterioribus ocello, posterioribus fenis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 795. n.º. 255. — Faun. Suec. edit. 2. p. 274. n.º. 1047.*

Papilio S. Sabæus, alis integerrimis, fuscis: posticis supra ocellis quatuor cæcis, subtus sex pupillatis. FAB. *Syst. Ent. p. 530. n.º. 571. — Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n.º. 502. — Mant. Inf. tom. 2. p. 53. n.º. 351. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 221. n.º. 694.*

Papilio Hero. ESP. *Pap. part. 1. tab. 22. fig. 4.*

Papilio Hero. HERBST, *Pap. tab. 198. fig. 3. 4.*

Papilio Hero. WIEN. *Verz. p. 321. n.º. 13.*

ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 186. n.º. 15.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 195. — tom. 4. p. 31.*

NATURF. 8. *tab. 3. fig. E. F.*

Papilio Hero. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 89 & 245. n.º. 26. — part. 2. p. 207.*

BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 240. n.º. 22.*

SCHNEID. *Syst. Besch. p. 128. n.º. 65.*

LANG. *Verz. 2. p. 25. n.º. 157-160.*

Maniola Hero. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. p. 179. n.º. 1310.*

Papilio Hero. HUBN. *Pap. tab. 53. fig. 252. 253.*

Papilio

Papilio Hero. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 315. n^o. 70.*

Le Mœlibée. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 152. pl. 29. fig. 59. a. b.*

Le fatyre dont il est ici question est le véritable pap. *Hero* de LINNÆUS ou le *Sabæus* de Fabricius.

Il est petit. Ses quatre ailes sont entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une frange blanchâtre. Les supérieures n'ont pas de taches dans le mâle, mais dans la femelle elles ont au sommet un œil noir, à iris fauve & sans prunelle. Les ailes inférieures ont, vers le bout, une rangée de quatre yeux semblables, dont les deux extrêmes sont beaucoup plus petits, & même manquant dans beaucoup de mâles; il y a en outre un arc fauve à l'extrémité du bord interne.

Le dessous des quatre ailes est un peu moins foncé que le dessus. Celui des inférieures a un cordon de six yeux, dont le quatrième & le cinquième, à partir d'en haut, plus grands: ces yeux, qui ont le fond noir, avec la prunelle d'un blanc-vif, & l'iris d'un fauve-rougeâtre, sont précédés en dehors par une ligne argentée, courbe en arrière, s'appuyant sur une ligne fauve, marginale, pareillement courbe, & en dedans par une bande blanche, étroite, dentée extérieurement. Le dessous des ailes supérieures a, vis-à-vis du sommet, un petit œil plus ou moins distinct, placé parfois sur une bande blanchâtre, interrompue, peu apparente, laquelle est séparée du bord terminal par une ligne argentée, presque toujours moins brillante que celle des ailes inférieures. Les deux surfaces du corps sont du même brun que celles des ailes. Les antennes sont annelées de noir & de blanc, avec le dessous de la massue légèrement rouffâtre.

Il habite plusieurs contrées de l'Allemagne & les départemens septentrionaux de la France. On le prend, au mois de juin, dans la forêt de Bondi & dans celle de Meudon près de Paris.

N. B. Dans la femelle, le dernier œil du dessous des ailes inférieures est quelquefois double.

171. SATYRE Iphis.

SATYRUS Iphis.

Sat. alis integris: anticis utrinquè rufescentibus: posticis supra fuscis, subtus virentibus-cinereis; ocellis sex serie digestis intusque fasciâ albâ interruptâ, extus lineâ plumbeâ, marginatis.

Papilio S. Hero, alis integerrimis, fulvis: subtus anticis ocello, posticis fenis. FAB. *Syll. Ent. p. 550. n^o. 372. — Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n^o. 505. — Mant. Inf. tom. 2. p. 33. n^o. 352. — Entom. Syst. ent. tom. 3. pars 1. p. 222. n^o. 693.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 208. fig. 5. 4.*

Papilio Iphis. WIEN. *Verz. p. 521. n^o. 23. (15-24:)*

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

ILLIG. *N. Aufz. Dess. tom. 2. p. 188. n^os. 15. 14.*

ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. 4. p. 51.*

Papilio Iphis. HUBN. *Pap. tab. 53. fig. 249. (Mas.) fig. 250. 251. (Fem.)*

Papilio Iphis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 310. n^o. 69.*

Papilio Tiphon, alis integerrimis, supra rufescentibus margine paullo saturatiore; inferioribus fuscis, subtus griseis fasciâ serpius interruptâ ocellisque fenis minoribus oblitteratis. ESP. *Pap. part. 1. p. 341. tab. 35. Suppl. 11. fig. 3. 4.*

Papilio Tiphon. DE PRUNER, *Lepid. Pedem. p. 22. n^o. 44.*

Papilio Tiphon. HERBST, *Pap. tab. 189. fig. 1-4.*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 125. fig. 5. 6.*

Papilio Tiphon. SCHEID. *Syll. Besch. p. 126. n^o. 65.*

Papilio Tiphon. LANG. *Verz. 2. p. 22. n^os. 147-150.*

Papilio Tiphon. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 245. n^o. 26.*

Papilio Glycerion. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 90 & 245. n^o. 27. — part. 2. p. 207.*

Papilio Anyntas. PODA, *Mus. Græc. p. 79. n^o. 52.*

Maniola Manto. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. p. 180. n^o. 1513.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 29. fig. 56. c. d.*

ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 265. pl. 68. Suppl. 14. fig. 56. e. f.*

C'est le fatyre que Fabricius a donné sous le nom de *Hero*, le prenant, mais à tort, pour l'espèce que LINNÆUS avoit nommée de la même manière.

Le dessous des premières ailes est d'un rouffâtre plus ou moins nébuleux, suivant le sexe. Leur dessous est fauve, avec le bout verdâtre & marqué parfois au sommet d'un petit œil noir, à prunelle blanche & à iris jaunâtre. Cet œil, lorsqu'il existe, est précédé dans les femelles d'une petite bande blanchâtre, placée transversalement du côté de la base.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-obscure, avec une ligne fauve, terminale, plus ou moins distincte, tantôt seule, tantôt surmontée vers l'angle anal d'une à trois taches oculaires. Le dessous des mêmes ailes est d'un cendré-verdâtre, avec une suite de six petits yeux noirs à prunelle blanche & à iris jaunâtre, lesquels sont ren-

fermés en dedans par une bande blanche, irrégulière, très-souvent interrompue dans son milieu, & en dehors par une ligne arquée couleur de mine de plomb & s'appuyant sur une ligne fauve correspondante à celle de la surface opposée. Le bord de chaque aile a une légère frange grise. Le corps est brun. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

On le trouve, en juin & en juillet, dans les bois de plusieurs parties de l'Allemagne & des départements de l'est de la France.

172. SATYRE Arcanius.

SATYRUS Arcanius.

Sat. alis integris : anticis utrinque fulvis, externo, fusco : posticis supra fuscis ; subtis cinereo-nufescentibus, fusca albâ angulatâ ocellis 5-6, anteriori remoto, cæteris lineâ argenteâ extus marginatis.

Papilio P. R. Arcanius, alis integerrimis, ferrugineis : subtis primoribus ocello unico ; posticis quinis, primo, fusca remoto. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 791. n^o. 242.

Papilio Arcania. LINN. *Faun. Suec. edit.* 2. p. 273. n^o. 1045.

Papilio S. Arcanius. FAB. *Syst. Ent.* p. 550. n^o. 369. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 67. n^o. 501. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 55. n^o. 549. — *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 22. n^o. 692.

SCHÆFF. *Elem. tab.* 94. fig. 5.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 127. fig. 4. 5.

Papilio Arcanius. WIEN. *Verz.* p. 168. *fam.* F. n^o. 12.

ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 186. n^o. 12.

Papilio Arcanius. DE GEER, *Mem. Inf. tom.* 2. part. 1. p. 148. *tab.* 2. fig. 5. 6.

Papilio Arcanius. ESP. *Pap. part.* 1. *tab.* 21. fig. 4.

Papilio Arcanius. HERBST, *Pap. tab.* 188. fig. 1. 2.

Papilio Arcania. OCHSENB. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 517. n^o. 72.

Papilio Arcanius. BOBKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 242. n^o. 25.

Papilio Arcania. BOBKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 23 § 242. n^o. 25. — *part.* 2. p. 206.

SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 150. n^o. 67.

LANG. *Verz.* 2. p. 22. n^o. 153-156.

FUSSL. *Suff. Inf.* p. 51. n^o. 605.

ROSSI, *Faun. Etr.* tom. 2. p. 146. n^o. 1001.

Papilio Arcania. HUFNAG. *Magaz. tom.* 2. p. 72. n^o. 51.

NATURF. 6. p. 7. n^o. 51. — 8. p. 121.

Papilio Arcania. HUBN. *Pap. tab.* 51. fig. 240-242.

Papilio Anyntas. SCOP. *Ent. Carn.* p. 174. n^o. 457.

Papilio Tullius. MULLER, *Faun. Fried.* p. 36. n^o. 332.

Céphale. GEOFF. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 55. n^o. 22.

Le Céphale. ENGRAM. *Pap. d'Eur. tom.* 1. p. 129. pl. 29. fig. 57. a. b. c. d.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes supérieures sont fauves de part & d'autre, avec le bord terminal d'un brun-noirâtre en dessus, moins foncé en dessous, où l'on voit souvent, vis-à-vis du sommet, un petit œil noir à prunelle blanche & à iris jaunâtre.

Le dessus des ailes inférieures est d'un brun-obscur, avec une petite tache jaunâtre, anale, surmontant un arc fauve. Leur dessous est roussâtre, avec la base d'une teinte cendrée-verdâtre, & le milieu traversé obliquement par une bande blanche, anguleuse, laquelle offre à l'origine de son côté interne un œil noir à prunelle d'un blanc vif, & sur son côté externe quatre ou cinq yeux semblables. Sont les deux antérieurs, & l'anale, lorsqu'il existe, plus petits. Il y a en outre une ligne argentée, courbe, tout le long du bord postérieur, lequel est, ainsi que celui des ailes de devant, garni de cils grâtres. Le corps est brunâtre. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, avec le bout de la massue ferrugineux.

Dans quelques femelles, le dessus des ailes inférieures offre deux petits yeux sans prunelle.

Très-commun, en mai & en juillet, aux environs de Paris & dans les départements voisins.

La chenille est verte avec des lignes dorsales plus foncées, & des lignes latérales jaunes. Elle vit sur la mélisse ciliée (*melica ciliata*).

La chrysalide est obtuse, ramassée, noirâtre.

173. SATYRE Corinus (1).

SATYRUS Corinus.

Sat. alis integris, fulvis : anticis ocello, supra cæco : posticis subtis cinereo-nufescentibus, fusca alba interruptâ ocellis quinque, anteriori remoto, cæteris lineâ argenteâ extus marginatis.

Papilio Corinna. HUBN. *Pap. tab.* 105. fig. 556. 557.

Papilio Corinna. ILLIG. *Magaz. tom.* 3. p. 190.

(1) Nous n'avons pas pris le nom des auteurs, parce que nous avons une Vaucluse appelée Corinne.

Papilio Corinna. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 223. n.º. 75.*

Il est un peu plus petit que l'*Arcanius*. Ses quatre ailes sont fauves en dessus, sans taches aux supérieures, avec un œil noir dépourvu de prunelle au sommet des supérieures.

Le dessous de ces dernières ailes est également fauve, avec un œil correspondant à celui de la surface opposée, mais ayant une prunelle blanche.

Le dessous des secondes ailes est rouffâtre, avec la base cendrée; le milieu traversé par une bande blanche, interrompue, sur laquelle sont cinq yeux, dont l'antérieur isolé, les quatre autres précédés en dehors d'une ligne argentée, courbe. Ces yeux sont semblables à celui des premières ailes, lesquelles ont aussi une ligne argentée sur leur bord terminal.

De la Sicile.

174. SATYRE Philéus.

SATYRUS Phileus.

Set. alis integris, suprâ fuscis : anticis utrinquâ disco fulvo : posticis subtus virefcenti-nebulosis, fasciâ albâ recurvâ ocellis sex lineâ argentâ exiis marginatis.

Papilio Philea. HUBN. *Pap. tab. 53. fig. 254. 255. (Mas.)*

Papilio Philea. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 201.*

Papilio Satyrion. ESP. *Pap. part. 1. tab. 122. cont. 77. fig. 2.*

Papilio Satyrion, alis integerrimis, ochraceis, suprâ immaculatis : subtus posticis viridi-fuscis fasciâ albâ ocellisque senis albo pupillatis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 322. n.º. 74.*

Il est un peu plus petit que l'*Arcanius*. Ses ailes sont entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le milieu des premières, & une ligne courbe sur le limbe postérieur des secondes, fauves.

Le dessous des ailes supérieures ne diffère du dessus que parce que les bords sont d'un brun plus clair, & parce qu'il y a quelquefois au sommet un point noir oculaire.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-verdâtre, avec une bande blanche, postérieure, courbe en dehors, sinuée en dedans, chargée sur son milieu d'un rang de six yeux contigus, noirs & à prunelle très-blanche. Derrière cette bande, il y a une ligne fauve, arquée, que divise dans le sens de sa longueur une ligne argentée, plus étroite. Le bord terminal de chaque aile est garni de part & d'autre d'une petite frange blanchâtre. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

Des montagnes du Tyrol, de la Suisse & du Piémont.

N.º B. On trouve des individus mâles qui n'ont

pas ou presque pas de fauve aux ailes supérieures en dessus.

175. SATYRE Dorus.

SATYRUS Dorus.

Set. alis integris : anticis suprâ (mas) fuscescentibus, (fem.) luteis ocello cæco : posticis luteis, subtus fasciâ albâ exiis argenteo marginatâ ocellis sex, anteriori remoto.

Papilio P. R. Dorus, alis integerrimis : superioribus fuscescentibus ocello unico (esp. 2-5) ; inferioribus utrinquâ flavis, ocellis suprâ quatuor cæcis, subtus senis pupillatis. ESP. *Pap. part. 1. tab. 78. cont. 28. fig. 1.*

Papilio Dorus. HERBST, *Pap. tab. 188. fig. 3-8.*

Papilio Dorus. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 129. n.º. 66.*

Papilio Dorus. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem. p. 74. n.º. 152.*

Papilio Dorus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 320. n.º. 75.*

Papilio Dorion. HUBN. *Pap. tab. 52. fig. 247. 248. (Mas.)*

BERGSTR. *Nomencl. tab. 123. fig. 3. 4.*

Papilio Dorion. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 192.*

Papilio Dorilis. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 95. n.º. 51.*

Papilio Lizetta. CRAM. *Pap. pl. 325. fig. F. G.*

Palémon. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 267. pl. 68. Suppl. 14. fig. 57. a. b. bis.*

Il est petit, & il a les ailes entières. Les supérieures ont le dessus d'un brun-jaunâtre dans le mâle, avec un petit œil noir à iris fauve vis-à-vis du sommet; elles sont d'un jaune-fauve dans la femelle, avec les bords obscurs & un gros point noir, suivi parfois de deux autres plus petits.

Le dessus des secondes ailes est d'un jaune-fauve dans les deux sexes, avec la base, la côte, le bord postérieur, obscurs, & une ligne arquée de trois à quatre points noirs. Le bord postérieur est en outre longé par une ligne fauve, & garni, ainsi que celui des premières ailes, de cils grisâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-fauve, dans le mâle comme dans la femelle, avec un œil noir à prunelle blanche au sommet des supérieures; avec une bande blanchâtre, large, sinuée, vers l'extrémité des inférieures. Cette bande, que borde en dehors une ligne argentée, courbe, offre six yeux, dont l'antérieur isolé, le suivant & l'anal plus petits que tous les autres

Les ailes supérieures ont aussi une ligne marginale argentée, & l'œil de leur sommet est précédé du côté de la base par une ligne transverse plus pâle que le fond. Le corps est cendré. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & le bout de leur massue est ferrugineux.

Il se trouve, en juillet, dans le midi de la France, en Espagne & en Portugal.

176. SATYRE Léandre.

SATYRUS Leander.

Sat. alis integris : anticis fulvis, margine fusco; posticis fuscis, fascia fulva supra serie punctorum nigrorum, subtus ocellorum lineaque argentea marginali.

Papilio S. Leander, alis integerrimis, fuscescentibus : posticis subtus cinereis, apice fulvis ocellis fer. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n. 550. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 222. n. 695.*

Papilio Leander. ESP. *Pap. part. 1. tab. 89. cont. 59. fig. 5. (Mas.)*

Papilio Leander. OCHSEH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 509. n. 68.*

Papilio Leander. HERBST, *Pap. tab. 187. fig. 7. 8.*

Papilio Amaryllis. HERBST, *Pap. tab. 186. fig. 1. 2.*

Papilio Amaryllis. CRAM. *Pap. pl. 591. fig. A. B.*

Papilio Clite. HUBN. *Pap. tab. 105. fig. 526. 527. (Fem.)*

Papilio Clite. ILLIO. *Magaz. tom. 3. p. 190.*

Papilio Philadithis. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 95. n. 52. — part. 2. p. 208.*

Il est de la taille de l'*Arcanius*. Les premières ailes sont brunes en dessus dans le mâle, avec le milieu fauve; elles sont fauves dans la femelle, avec le bord postérieur obscur & précédé d'un rang de deux à quatre points noirs. Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur dans les deux sexes, avec une bande fauve, courbe, postérieure & maculaire, sur laquelle sont alignés de quatre à sept points noirs.

Le dessous des ailes supérieures est constamment fauve, avec un seul œil dans le mâle; avec deux ou quatre dans la femelle, suivant le nombre qu'il y a du côté opposé.

Le dessous des ailes inférieures est d'un cendré-obscur, avec six ou sept yeux noirs, à prunelle blanche & à iris jaunâtre, disposés sur le côté interne d'une bande fauve que borde en dehors une ligne argentée, courbe. Il y a aussi une ligne semblable, mais moins distincte, sur le bord terminal des ailes de devant.

De la Russie.

N. B. D'après Cramer, le dessus des ailes inférieures est fauve. Cet auteur a-t-il représenté une variété, ou sa figure est-elle inexacte?

177. SATYRE Irius.

SATYRUS Irius.

Sat. alis integris, supra fulvis, margine exteriori fusco : posticis subtus cinerascens, fascia terminali latescente, ocellis duobus punctoquo intermedio intus lineâ ferrugineâ, extus argenteâ, marginatis.

Papilio N. Irius, atis integerrimis, disco fulvo : posticis supra ocello, subtus duobus. FAB. *Syst. Ent. p. 487. n. 196. — Spec. Inf. tom. 2. p. 65. n. 295. — Mant. Inf. tom. 2. p. 52. n. 540. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 158. n. 487.*

Papilio Irius. DONOV. *Gen. Illustr. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New Holl. pl. 28. fig. 1.*

Il est petit, fauve en dessus, avec tout le contour extérieur d'un brun-obscur, & un œil noir à prunelle blanche près de l'angle anal des secondes ailes.

Le dessous des ailes supérieures est généralement plus pâle que le dessus.

Le dessous des inférieures est d'un cendré-clair, avec une bande jaunâtre, terminale, large, sur laquelle sont deux yeux noirs à prunelle blanche & à iris fauve, entourés chacun d'un large cercle argenté, & séparés l'un de l'autre par un gros point de cette dernière couleur. Il y a en outre sur le côté interne de la bande fusite une ligne ferrugineuse en zig-zag, & sur son côté externe une ligne argentée courbe. Le corps est noirâtre en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

De la Nouvelle-Hollande.

Il y a, dans la collection du Jardin des Plantes, une variété qui se distingue du commun des individus, en ce que ses ailes supérieures sont entièrement brunes de part & d'autre, & avec un petit œil vis-à-vis du sommet en dessous; en ce que le dessous des inférieures est également brun, avec une bande jaunâtre, correspondante à celle du dessous, mais moins large & atteignant à peine l'œil de l'angle de l'anus.

De la Nouvelle-Hollande.

178. SATYRE Lyllus.

SATYRUS Lyllus.

Sat. alis integris, supra dilute fulvis, limbo posteriori fusco : subtus anticis ocello unico & lineâ argenteâ subterminali, abbreviatâ; pos-

ticis flavescenti-griseis, fasciâ albidâ oblitteratâ punctisq; 5-4 niveis nigro cinctis.

Papilio Lyllus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 122. cont. 77. fig. 1.* (Mas.)

Papilio Lyllus. alis integris pallidè ochraceis: anticis suprâ oculo cæco, subtus albo pupillato strigatâ emarginatâ ad marginem anteriorem argenteâ: posticis subtus ocellis minutis albo pupillatis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 307. n. 67.*

Papilio Pamphila. HUBN. *Pap. tab. 109. fig. 557. 558.* (Fem.)

Papilio Pamphile. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 200.*

Il ressemble extrêmement au *Pamphile* (voyez n. 179, ci-après). Les seules différences qui l'en séparent consistent, en ce que le limbe postérieur du dessus des quatre ailes est plus largement & plus fortement obscur; en ce que le dessous des supérieures offre, du moins dans les femelles, une ligne argentée, presque terminale, n'atteignant ni le bord d'en haut, ni le bord opposé; en ce que les points blancs du dessous des ailes inférieures sont entourés de noir & non de brun-roussâtre, & en ce que la base des mêmes ailes est d'un gris-jaunâtre, au lieu d'être d'un cendré-verdâtre.

Il habite l'Espagne, le Portugal & le midi de la France. On nous a dit qu'il avoit été trouvé près de Paris. M. Dupouchel l'a pris, en juillet & en août, aux environs de Nîmes, où il n'a pas vu le *Pamphile*, qui paroît cependant à la même époque.

179. SATYRE Pamphile.

SATYRUS Pamphilus.

Sat. alis integris, suprâ pallidè fulvis, limbo postico fuscescente: subtus anticis oculo unico; posticis vivescenti-griseis, fasciâ albidâ sinuatâ punctisq; 5-4 ferrugineo cinctis.

Papilio P. R. Pamphilus, alis integerrimis, flavis: subtus primoribus oculo; posticis emereis. fasciâ ocellisq; quatuor oblitteratis. LINS. *Syst. Nat. 2. p. 791. n. 259. — Faun. Suec. edit. 2. p. 273. n. 1044.*

Papilio Tithyrus. LINS. *Faun. Suec. edit. 1. n. 789.*

Papilio D. F. Pamphilus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 66.*

Papilio S. Pamphilus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 221. n. 691.*

Papilio Pamphilus. ESP. *Pap. part. 1. tab. 21. fig. 3. — tab. 73. cont. 28. fig. 4.* (Var.)

Papilio Pamphilus. HEREST, *Pap. tab. 166. fig. 78. — tab. 167. fig. 1-4.*

Papilio Pamphilus. WIEN. *Verz. p. 168. fam. F. n. 14.*

Papilio Pamphilus. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 243. n. 27.*

Papilio Pamphilus. SCHNEID. *Syst. Befchr. p. 151. n. 68.*

Papilio Pamphilus. PETAGNA, *Infl. Entom. tom. 2. p. 450. n. 25.*

Papilio Pamphilus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. p. 305. n. 66.*

Papilio Pamphilus. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 51. n. 601.*

Papilio Pamphilus. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 146. n. 1000.*

Papilio Pamphilus. LANG. *Verz. 2. p. 22. n. 145-146.*

Papilio Pamphilus. BRAHM. *Inf. Kalend. p. 358. n. 259.*

Maniola Pamphilus. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. part. 1. p. 180. n. 1512.*

Papilio Pamphilus. SCHWARZ, *Raup. Kalend. p. 42.*

Papilio Pamphilus. BERGSTR. *Nomencl. tab. 88. fig. 56.*

Papilio Pamphilus. LEWIN, *Inf. tab. 25. fig. 1-4.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 164. fig. 2. 3.*

ROES. *Inf. 5. tab. 54. fig. 7. 8.*

DE GEER. *Mem. Inf. tom. 2. part. 1. tab. 2. fig. 3.*

Papilio Nephela. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 87 & 241. n. 24. — part. 2. p. 206.*

Papilio Nephela. HUFNAG. *tab. imp. Berl. Magaz. tom. 2. p. 78. n. 45.*

Papilio Nephela. NATURF. 4. p. 10. n. 43.

Papilio Nephela. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 189. n. 14.*

Papilio Nephela. HUBN. *Pap. tab. 51. fig. 237. (Mas.) fig. 258. 259. (Fem.)*

Papilio Menalca. PODA, *Mus. Græc. p. 78. n. 50.*

Papilio Menalca. SCOP. *Ent. Carn. p. 175. n. 438.*

Papillon Procris. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 55. n. 21.*

LE PROCRIS. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 123. pl. 29. fig. 56. a. b. — pl. 63. Suppl. 14. fig. 56. g. b. (Var.)*

Linnæus avoit d'abord fait de ce Lépidoptère une *Danaïde bigarrée*, mais il l'a mis en dernier lieu parmi les *Plébéiens ruraux*.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un fauve-pâle ou jauvâtre, avec le bord postérieur légèrement obscur & garni d'une frange blanchâtre.

Le dessous des premières ailes est de la même couleur que le dessus, avec un petit œil noir à prunelle blanche & à iris pâle. Cet œil fait face au sommet, & dans les femelles, il est pour l'ordinaire précédé intérieurement d'une ligne ferrugineuse transversale. On le voit quelquefois en dessus, mais il n'y forme qu'un simple point noirâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré-verdâtre à la base; traversé au milieu par une bande blanchâtre, obliquée, étroite, presque en forme d'accolade; ensuite grisâtre jusqu'au bout, avec une rangée de trois à quatre points très-blancs, cerclés de ferrugineux-pâle. Geoffroy & De Geer disent que ces ailes sont sans yeux. Il faut qu'ils ne les aient pas bien examinées, ou qu'ils n'aient vu que des sujets passés; car les points blancs dont nous venons de parler existent toujours. On en voit même quelquefois jusqu'à six. Les antennes sont brunes & annelées de blanchâtre. Le corps est grisâtre.

Le Parnassien est commun dans toute l'Europe. Il habite les bois, les prairies, les berges des chemins. On le trouve, pour la première fois, au mois de mai, & pour la seconde, vers la fin de juillet.

Sa chenille est rase, verte, avec le dos obscur, une ligne blanche le long de chaque côté, & l'anus fourchu. Elle vit sur la *crételle de prés* (*cynofurus cristatus*).

La chrysalide est anguleuse, verdâtre, & suspendue par la queue.

Nota. Geoffroy s'est trompé en prenant la chenille de l'Argonne *Cinzia* (page 281.) pour celle de ce papillon.

180. SATTRE DAVUS.

SATTREUS Davus.

Sat. alis integris, fuscescentibus; anticis supra punctis duobus aut uno nigris, subtis ocellis totidem; posticarum paginâ inferiori virescenti-rufâ, fasciâ alââ interruptâ ocellisque sex nigris.

Papilio Tetropus, alis rotundatis, fulvis; subtis cinerascensibus, fasciâ alââ ocellisque quinque. LINS. *Faun. Succ. edit.* 1. p. 240. n°. 790.

Papilio D. F. Davus, alis integerrimis, fulvis; anticis ocellis; subtis albo fasciatis, posticis ocellis sex. FAB. *Abant. Inf. tom.* 2. p. 33. n°. 347.

Papilio S. Davus. FAB. *Ent. Syst. om. tom.* 5. *part.* 1. p. 221. n. (6).

Papilio Davus. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 302. n°. 63.

Papilio Davus. HERBST, *Pap. part.* 8. p. 36. *tab.* 186. *fig.* 3-6.

Papilio Laidion. HERBST, *Pap. part.* 8. *pag.* 36. *tab.* 187. *fig.* 5. 6.

Papilio Laidion, alis integerrimis, fulvis; anticis subtis oculo unico, posticis subtis marginalibus maculisque duabus sublanaribus obsoletis, albis. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 241. n°. 24. (Var.)

Papilio Iphis. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. n°. 25. (Var.)

Papilio Philoxenus. ESP. *Pap. tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 3. — *tab.* 78. *cont.* 28. *fig.* 3.

Papilio Philoxenus. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 172. n°. 64.

Papilio Philoxenus. LANG. *Verz.* 2. p. 22. n°. 151. 152.

Papilio Tiphon. NATURF. 6. p. 15. n°. 1.

Maniola Tiphon. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 179. n°. 1511.

Papilio Tullia. ILLIG. *Magaz. tom.* 3. p. 205.

Papilio Tullia. HUBN. *Pap. tab.* 52. *fig.* 243. 244.

Papilio Tullia, alis subdentatis, flavis; subtis fasciâ dentatâ albâ margineque posteriorum ocellis septem. MULLER, *Faun. Frdr.* p. 36. n°. 336.

Papilio Isis, alis integris, ferrugineis, supra immaculatis; subtis anticis fasciâ alba ocelloque solitario; posticis arcu albo ocellisque sequi-ultero. THUNBERG, *Dissert. Acad. vol.* 3. p. 45. (Var.)

Papillon Héto. DE GEER, *Ment. Inf. tom.* 2. *part.* 1. p. 147. *tab.* 2. *fig.* 4.

Le Daphnis, ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 131. *pl.* 29. *fig.* 58. a. b.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-jauvâtre-obscure, un peu plus foncé dans le mâle que dans la femelle, avec un point noirâtre ocellé au sommet des supérieures.

Le dessous de ces dernières ailes ressemble au dessus, mais le sommet est plus pâle, & le point ocellé est remplacé par un œil noir à prunelle très-blanche. Cet œil est précédé intérieurement, dans la femelle, d'une ligne blanchâtre, transversale.

Le dessous des ailes inférieures est verdâtre à la base; roux au milieu, avec une bande blanche,

transverse, courbe, dentée, souvent interrompue; griffaire à l'extrémité, avec une série de six (quelque fois de sept) petits yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-paille. Les antennes & le corps sont, à une légère nuance près, comme dans l'espèce précédente.

On rencontre des individus qui ont deux yeux au sommet des ailes supérieures.

Borkhausen a décrit, sous le nom de *Laidion*, une variété dont le dessous des ailes inférieures n'offroit que trois taches oculaires.

Thunberg a nommé *Ipsi* une autre variété qui n'avoit à la surface inférieure des secondes ailes que deux yeux, dont un moitié plus petit que l'autre.

De l'est & du nord de l'Europe.

181. SATYRE Narcisse.

SATYRUS Narcissus.

Sat. alis integris, supra fuscis, areâ fulvâ; subtis rufescentibus, undis brunneis: utrinquè anticis ocello unico, posticis duobus minutis.

Papilio S. Narcissus, alis integerrimis, fuscis, areâ rufâ: anticis utrinquè ocello, posticis duobus minutis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 428. n.º. 672-5.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec un espace fauve, presque discoidal. L'espace des premières ailes offre un œil noir à prunelle blanche, devant lequel il y a une liture brune, transversale. L'espace des secondes ailes est terminé en arrière par deux yeux semblables, mais plus petits.

Le dessous des quatre ailes est rouffâtre & finement ondé de brun, avec la répétition des yeux du dessus. Les antennes sont brunes & annelées de blanchâtre depuis la base jusqu'à la massue. Le corps est de la couleur des ailes.

De l'Île-de-France. — Selon Fabricius, il se trouveroit aussi au Cap de Bonne-Espérance.

182. SATYRE Magus.

SATYRUS Magus.

Sat. alis integerrimis, obscurè fulvis: anticis utrinquè ocello pupillâ geminâ; posticis supra duobus, subtis tribus. FAB.

Papilio S. Magus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 225. n.º. 700.

Pop. Magus. JON. Fig. piç. 4. tab. 55. fig. 1.

Le corps est petit, brun. Les premières ailes, dont les deux surfaces se ressemblent à peu près, sont fauves, avec le bord postérieur obscur & pré-

cedé d'un grand œil noir à double prunelle blanche. Les secondes ailes ont le dessus d'un fauve-obscur, avec deux petits yeux; le dessous panaché, avec trois.

Il habite....

(Traduction de Fabricius.)

183. SATYRE Aphiuius.

SATYRUS Aphiuius.

Sat. alis integris, fuscis: anticis ocello maximo pupillâ geminâ: posticis supra fuscâ, subvâ ocellis quatuor minutis; subtis albo cinereoque undatis, punctis totidem ocellaribus.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Les premières ailes sont d'un brun-obscur de part & d'autre, avec un grand œil noir à iris fauve & à double prunelle d'un bleu-luisant.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-obscur, avec une bande fauve, large & postérieure, sur laquelle sont alignés quatre petits yeux noirs à simple prunelle bleuâtre. Le dessous est ondé de blanc & de cendré, & l'on y voit quatre points noirs oculaires, correspondant aux yeux de dessus.

De l'Île-de-France.

184. SATYRE Baldus.

SATYRUS Baldus.

Sat. alis integris, supra fuscis: anticis utrinquè ocello bipupillato: posticis subtis ocellis sex geminatis.

Papilio D. F. Baldus, alis integerrimis, fuscis: anticis utrinquè ocello pupillâ geminâ; posticis supra ocellis quatuor, subtis sex. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 34. n.º. 556.

Papilio S. Baldus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 323. n.º. 699.

Papilio Lyxundra. CRAM. Pap. pl. 293. fig. G. H.

Il est de la taille du précédent. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un œil noir à iris jaune & à double prunelle bleue aux supérieures, & trois ou quatre yeux semblables, mais plus petits & à prunelle simple, aux inférieures.

Le dessous diffère du dessus en ce qu'il est finement ondé de blanchâtre, & que les yeux des ailes inférieures sont au nombre de six & groupés deux à deux. Ces yeux sont plus apparens dans les femelles que dans les mâles.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit qu'un seul œil sur le dessus des secondes ailes.

Des Indes orientales.

185. SATYRE Arctous.

SATYRUS Arctous.

Sat. alis integris, suprâ fuscis, subtus dilutionibus cinerâscentique griseo undulatis : omnium utrinquè ocello unico, anticarum bipupillato majoraque.

Papilio D. F. Arctous, alis integerrimis, fuscis : anticis utrinquè ocello bipupillato, posticis suprâ subcæcis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 33. n^o. 555.*

Papilio S. Arctous. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 222. n^o. 696.*

Papilio Arctous. DONOV. *Gen. Illustr. of Entom. an Epitome of the Inf. of Asia, pl. 24. fig. 2.*

Il est de la taille des deux précédens. Ses ailes sont brunes en dessus, plus pâles & ondées de gris-cendré en dessous, & elles ont chacune de part & d'autre un œil noir à iris jaune & à prunelle bleue. L'œil des ailes supérieures est plus grand, & sa prunelle est double.

De la Nouvelle-Hollande.



OBSERVATION. Ici commence la division des Chenilles ovales ou en forme de cloportes, et dont les chrysalides sont courtes, contractées, obtuses aux deux bouts.

L'insecte parfait a le dernier article des palpes inférieurs, ou le troisième, presque nu; les crochets des tarsi très-petits, à peine saillans; la cellule discoidale des secondes ailes ouverte en arrière et non rétrécie vers son milieu.

GENRE ÉRYCINE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Les deux pattes antérieures notablement plus courtes et très-velues, au moins dans les mâles.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius (*Syst. Glossat.*):

Genre ÉRYCINA. (Pap. *Lysippus*, *Melibœus*, etc., FAB.)

Genre NYMPHIDIUM. (Pap. *Caricæ*, *Phareus*, *Manthus*, *Telephus*, etc., FAB.)

Genre EMESIS. (Pap. *Ovidius*, *Arminius*, FAB., ou *Fatima*, *Mandana*, CRAM.)

Genre HELICOPIS. (Pap. *Gnidus*, *Cupido*, etc., FAB.)

Genre DANIS. (Établi, d'après l'indication d'Illiger, sur des espèces nouvelles, qui nous sont inconnues.)

Nota. Nous avons senti la nécessité de former plusieurs genres de notre genre ÉRYCINE; mais il nous a été impossible d'y parvenir, parce que nous n'avions qu'un petit nombre d'espèces, souvent mal conservées, ou dont l'un des sexes nous manquait. En attendant que nous nous en tenons aux divisions et subdivisions que fournissent les différentes formes des ailes.

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes convexe et entier. Bord analogue des secondes avec six queues linéaires, dont la troisième, à compter de celle de l'angle de l'aune, beaucoup plus large que les autres.

Nota. Dans cette division, les deux sexes ont les pattes antérieures plus courtes et velues.

1. ÉRYCINE Gnidus.

Ailes blanches, avec le limbe postérieur noir: dessous des supérieures avec une ligne blanchâtre; dessous des inférieures avec des gouttes argentées à l'extrémité.

2. ÉRYCINE Cupidon.

Ailes blanches, avec le limbe postérieur noir: les deux surfaces des inférieures avec des gouttes à l'extrémité, le dessous des supérieures avec une ligne marginale, argentées.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures allongées dans le sens de la longueur du corps, largement tronquées vers leur angle anal, et ayant l'angle extérieur de la troncation prolongé en une queue oblique, tantôt longue et plus ou moins aiguë, tantôt courte et obtuse.

α. Queue des ailes inférieures très-longue et aiguë.

ERYCINE. (Insecte.)

Nota. Les espèces de la subdivision α sont remarquables en ce que leurs ailes sont entièrement vitées, ou en ce qu'elles ont des bandes un peu transparentes. Le *Licarsis*, placé en tête de cette subdivision, se distingue de ses congénères par la longueur extraordinaire de ses palpes inférieurs. Ce caractère nous auroit déterminés à former un genre particulier, s'il avoit été commun à d'autres espèces.

3. ERYCINE LICARSIS.

Ailes semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes d'un blanc-bleuâtre : les supérieures avec un point basilaire, les inférieures avec une tache anale, d'un rouge-écarlate.

4. ERYCINE DORILLIS.

Ailes semblables de part et d'autre, noires : milieu des supérieures avec une tache arrondie, milieu des inférieures avec une bande oblique, d'un blanc-transparent.

5. ERYCINE CURIUS.

Ailes en queue, semblables de part et d'autre, très-noires : supérieures avec deux bandes transparentes, inférieures avec une seule blanche. FAB.

6. ERYCINE OCTAVIUS.

Ailes transparentes, avec les nervures, une bande commune, et les bords, noirs : les inférieures ayant l'angle anal largement écarlate.

β . Queue des ailes inférieures courte et obtuse.

7. ERYCINE IPHIHOÉ.

Dessous des ailes d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches : supérieures avec une ligne à l'origine de la côte, inférieures avec trois taches à l'angle de l'aube, d'un rouge-écarlate.

8. ERYCINE AULÉTÉS.

Ailes semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes fauves.

9. ERYCINE MÉLIBÉE.

Ailes d'un noir-brun, ayant en dessus deux lignes rouges, dont une plus courte; et en dessous deux bandes d'un bleu-luisant.

10. ERYCINE ARISTOTE.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes transverses, dont l'une orangée ou blanche, l'autre pâle.

11. ERYCINE LYSIPPE.

Ailes d'un noir-brun, avec une bande orangée sur chaque : leur dessous ponctué de fauve vers la base.

12. ERYCINE ECHÉRIUS.

Ailes un peu dentées, couleur de terre d'ombre, avec une ligne plus foncée sur le milieu : dessous des inférieures avec trois et deux points noirs cerclés de blanc.

13. ERYCINE ALLICA.

Ailes dentelées, presque semblables de part et d'autre, couleur de terre d'ombre, avec des points noirs, nombreux et chargés chacun d'un point blanc.

14. ERYCINE LABDACIUS.

Ailes dentées, fauves en dessus, avec les bords noirs : leur dessous d'un blanc-bleuâtre, avec trois lignes transverses ferrugineuses sur les supérieures, et deux sur les inférieures.

15. ERYCINE GÉMELLUS.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le disque roux : leur dessous d'un blanc-satiné, avec une ligne commune d'un jaune-souci.

ERYCINE. (Insecte.)

16. ERYCINE Midas.

Ailes entières, d'un brun-obscur : leur dessous blanc ou plus pâle à la base, et offrant à l'extrémité deux lignes rousses, transversales, dont l'extérieure des inférieures ponctuée de noir.

C. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures plus ou moins allongées dans le sens de la longueur du corps.

17. ERYCINE Salimba.

Ailes entières, ayant le dessous d'un violet-luisant, avec le sommet d'un noir-brun : leur dessous plus pâle, avec une ligne ferrugineuse postérieure.

18. ERYCINE Eurilcus.

Ailes entières, noires en dessus, avec une bande bleue luisante : leur dessous blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineuses.

19. ERYCINE Gélon.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous d'un jaune-pâle, avec trois lignes brunes à l'extrémité.

20. ERYCINE Sabinus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus, avec le bord antérieur des supérieures incarnat : dessous des quatre pâle, avec trois lignes blanches à l'extrémité.

21. ERYCINE Hyginus.

Ailes entières, d'un brun-obscur et sans taches en dessus : leur dessous d'un violet-pâle, avec deux lignes rousses aux supérieures, et des taches noires triangulaires aux inférieures.

22. ERYCINE Orfita.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet violet : leur dessous avec deux raies ferrugineuses et une rangée postérieure de taches en fer de flèche.

23. ERYCINE Gélanor.

Ailes un peu dentées, ayant le dessus d'un brun-noirâtre à reflet violet : leur dessous orangé, avec une ligne ferrugineuse et une rangée marginale de points oculaires aux inférieures.

D. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures arrondies.

24. ERYCINE Arbas.

Ailes entières, d'un brun à reflet bleuâtre : leur dessous avec une ligne discoïdale et le bord postérieur fauves ; un point noir près du milieu de ce bord, aux inférieures.

25. ERYCINE Arcas.

Ailes entières, d'un bleu-violet-luisant en dessus : supérieures avec quelques points blancs sur le milieu ; inférieures avec un espace noir sur la côte.

26. ERYCINE Priolas.

Ailes entières, noires et glacées de violet en dessus, avec des veines bronzées au sommet des supérieures : dessous des inférieures tacheté de blanc.

27. ERYCINE Préma.

Ailes entières, noires en dessus, avec des bandes maculaires d'un vert-doré : leur dessous d'un brun-clair, avec des bandes blanchâtres et une rangée terminale de points noirs.

28. ERYCINE Prétus.

Ailes entières, noires en dessus, avec des taches vertes : leur dessous d'un brun-tanné, avec des taches blanchâtres.

29. ERYCINE Pétrone.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus, avec des lignes transverses et le sommet noirs : leur dessous cendré et ponctué de brun.

ERYCINE. (Insecte.)

30. ERYCINE Hébrus.

Ailes entières, ayant le dessus noir et varié de bleu, avec le bord interne des inférieures blanc; dessous des quatre d'un bleu-pâle, avec des points noirs.

31. ERYCINE Méris.

Ailes un peu dentées, et parsemées de points noirs: leur dessus bronzé; leur dessous panaché de brun et de gris.

32. ERYCINE Lucinde.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, rousses en dessous, ayant de part et d'autre cinq lignes ondulées et des points marginaux d'un brun-noirâtre.

33. ERYCINE Dyndima.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, ayant de part et d'autre cinq lignes ondulées et des points marginaux d'un brun-noirâtre.

34. ERYCINE Arhimius.

Ailes entières, fauves, avec quatre lignes ondulées et des points marginaux, obscurs en dessus, ferrugineux en dessous.

35. ERYCINE Ovide.

Ailes entières, fauves en dessus, d'un jaune-pâle en dessous, ayant de part et d'autre des lignes ondées, noires dans la femelle, sablées d'or dans le mâle.

36. ERYCINE Zéanger.

Ailes entières, fauves en dessus, avec le sommet des supérieures noir et marqué de taches bleuâtres: dessous des quatre blanchâtre, avec une multitude de taches noires.

37. ERYCINE Eupolémie.

Ailes entières, rousses en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, ayant de part et d'autre des lignes transverses de points noirs.

38. ERYCINE Ptolémée.

Ailes entières, ferrugineuses en dessus, avec des taches noires, et l'extrémité des nervures mine de plomb: leur dessous violet dans le mâle, roux dans la femelle, avec la base d'un bleu-pâle.

39. ERYCINE Azofa.

Ailes entières, fauves, ponctuées de noir de part et d'autre: leur bord antérieur obscur en dessus, leur bord postérieur avec deux lignes mine de plomb.

40. ERYCINE Gyuéa.

Ailes entières, brunes en dessus, ferrugineuses en dessous, ayant de part et d'autre des lignes noires ponctuées, et deux lignes terminales mine de plomb.

41. ERYCINE Avius.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un brun-noirâtre, avec des lignes transverses plus foncées, et deux lignes terminales bleues.

42. ERYCINE Cléone.

Ailes entières, noires, ayant en dessus deux lignes marginales mine de plomb, et une seule en dessous.

43. ERYCINE Cléodora.

Ailes entières, noires, ayant en dessus deux lignes marginales mine de plomb, et en dessous des points noirs.

ERYCINE. (Insecte.)

44. ERYCINE Argiopé.

Ailes entières, noires, sablées de vert-doré en dessus : dessous des supérieures offrant à la base une tache d'un rouge cire d'Espagne.

45. ERYCINE Domitien.

Ailes entières, obscures : supérieures avec une tache, inférieures avec une raie transverse, vertes : leur dessous brun, avec des points et une ligne marginale argentés. FAB.

46. ERYCINE Gémiius.

Ailes arrondies, bleues, ayant le limbe postérieur noir et longé par une ligne bleue : dessous des inférieures légèrement fascié de brun. FAB.

47. ERYCINE Stîlbé.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, fauves, avec des points noirs, et une ligne terminale argentée.

48. ERYCINE Hisbon.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre trois bandes d'un jaune d'ocre : dessus des quatre avec une ligne terminale mine de plomb.

49. ERYCINE Ouranus.

Ailes entières, noires, ayant de part et d'autre une bande blanche avec les extrémités rousses : dessus des supérieures avec une ligne terminale mine de plomb.

50. ERYCINE Phillone.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches séparées par une ligne fauve : base des quatre annelée.

51. ERYCINE Lysinou.

Ailes sinuées, brunes, avec une bande blanche, commune, discoïdale : limbe postérieur des quatre avec une ligne fauve et des anneaux bleuâtres.

52. ERYCINE Lamis.

Ailes sinuées, d'un beau blanc, avec tout le pourtour extérieur brun et annelé de bleuâtre : limbe postérieur avec une bande fauve.

53. ERYCINE du figuier.

Ailes sinuées, d'un beau blanc, avec tout le pourtour extérieur brun et annelé de bleuâtre : limbe antérieur avec des taches, limbe postérieur avec une bande, fauves.

54. ERYCINE Péllops.

Ailes sinuées, d'une jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur brun et chargé d'une bande fauve sur laquelle il y a une série de points noirs.

55. ERYCINE Cachrys.

Ailes sinuées, d'un jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur noir : limbe postérieur avec une ligne bleuâtre, anguleuse.

56. ERYCINE Ménéalcus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un jaune-pâle, avec tout le pourtour extérieur noir : limbe postérieur cilié de roux.

57. ERYCINE Anapis.

Ailes entières, d'un brun-pâle, traversées de part et d'autre par une ligne obscure, discoïdale : limbe postérieur des inférieures longé en dessus par une ligne jaunâtre en feston.

58. ERYCINE Oditès.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, couleur de terre d'ombre, avec des anneaux à la base, une bande au milieu, une ligne transverse à l'extrémité, blancs.

ERYCINE. (Insecte.)

59. ERYCINE Tytius.

Ailes entières, ferrugineuses ou d'un brun-obscur en dessus, plus pâles en dessous, avec la base des quatre et le limbe postérieur des inférieures chargés de points noirs oculaires.

60. ERYCINE Tutana.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes, avec l'extrémité plus claire : inférieures avec une rangée marginale de points noirs oculaires.

61. ERYCINE Soporius.

Nous l'avons décrite comme Nymphale (page 426, n^o. 241) ; mais elle doit être rapportée ici.

62. ERYCINE Phylaxis.

Nous l'avons donnée comme Nymphale (page 426, n^o. 242) ; mais c'est ici qu'il faut la mettre.

63. ERYCINE Epigia.

Nous l'avons mise parmi les Nymphales (page 426, n^o. 243) ; mais c'est ici qu'elle doit être.

64. ERYCINE Emylius.

Ailes entières, brunes en dessus : supérieures avec une bande discoïdale d'un roux-blanchâtre, inférieures avec des points marginaux ocellés : dessous des quatre d'un jaune-pâle et ponctué de noir.

65. ERYCINE Manthus.

Ailes entières, noires, avec une bande discoïdale blanche, des annelets et des atomes marginaux d'un bleu-d'azur.

66. ERYCINE Damis.

Ailes entières, noires, avec un espace blanc commun et discoïdal : les deux surfaces des supérieures et le dessous des inférieures avec une bande marginale d'un bleu-azuré-luisant.

67. ERYCINE Bélië.

Ailes entières, noires, avec une bande commune, blanche, environnée de bleu en dessus, renfermée dans un cercle jaune en dessous.

68. ERYCINE Arthémon.

Ailes entières, blanches : supérieures avec le pourtour extérieur noir, tacheté de bleu et de blanc.

69. ERYCINE Icafe.

Ailes entières, blanches en dessus, avec cinq lignes brunes, transversales : leur dessous brun, avec des bandes blanches, dont la postérieure ponctuée de noir.

70. ERYCINE Thasus.

Ailes entières, brunes, ayant de part et d'autre des lignes transverses plus pâles et le bord postérieur ponctué de blanc.

71. ERYCINE Actoris.

Ailes entières, brunes, ayant de part et d'autre une multitude de taches blanches ocellées.

72. ERYCINE Isala.

Ailes entières, brunes en dessus, blanches en dessous, ayant de part et d'autre des points noirs ocellés.

73. ERYCINE Thersandra.

Ailes entières, brunes, saupoudrées de bleu dans le mâle, de gris dans la femelle : leurs deux surfaces avec des taches ferrugineuses ocellées.

74. ERYCINE Cénéus.

Ailes entières, noires en dessus, avec des ondes bleues : leur dessous cendré, avec des taches blanches bordées de noir.

ERYCINE. (Insecte.)

75. ERYCINE Æmulus.

Ailes entières, cendrées, avec des taches brunes et des taches blanches : dessus des inférieures pâle : dessous des quatre ponctué de brun. FAB.

76. ERYCINE Eponé.

Ailes entières, brunes, avec des points blancs et des points jaunes : les deux surfaces des inférieures avec un espace blanc, discoïdal.

77. ERYCINE Tarquin.

Ailes entières, noires : supérieures avec une tache oblongue et sinuée à la base ; inférieures avec l'angle anal jaune et tacheté de noir. FAB.

78. ERYCINE Penthéc.

Ailes entières, ferrugineuses, avec des taches noires, simples en dessus, ocellées en dessous : inférieures (mâle) ayant la moitié postérieure blanche.

79. ERYCINE Ariste.

Ailes entières, brunes, annelées de bleu-pâle en dessus et en dessous : inférieures (mâle) ayant la moitié postérieure blanche.

80. ERYCINE Philoclès.

Ailes entières, d'un noir-bleu en dessus : supérieures ayant de part et d'autre un œil tripupillé sur le milieu ; inférieures avec la moitié postérieure blanche et ondulée de brun.

81. ERYCINE Crésus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, bleues, avec des lignes transverses et le bord postérieur noirs : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu.

82. ERYCINE Ephyonès.

Ailes entières, bleues en dessus, jaunâtres en dessous, avec des bandes brunes : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu.

83. ERYCINE Euméus.

Ailes entières, moitié brunes et moitié bleues, avec des lignes transverses noires à l'extrémité : supérieures avec un œil tripupillé sur le milieu, inférieures avec un œil sans prunelle à la base.

84. ERYCINE Réné.

Ailes entières, d'un noir-brun, avec une bande blanche commune : milieu des supérieures offrant de part et d'autre un œil tripupillé ; dessous des inférieures avec un œil sans prunelle à la base.

85. ERYCINE Osini.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes, avec des ondes pâles à la base, puis une bande blanche commune : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

86. ERYCINE Hyphéus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, blanches, avec trois bandes et le bord terminal bruns : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

87. ERYCINE Tullius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur : supérieures brunes au sommet, et ayant de part et d'autre sur leur milieu un œil tripupillé. FAB.

88. ERYCINE Odicé.

Ailes entières, d'un cendré-pâle, avec des lignes ondulées et le sommet obscurs : milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

ERYCINE. (Insecte.)

89. ERYCINE Rhodia.

Ailes entières, noirâtres en dessus, avec l'extrémité plus claire; cendrées en dessous, avec trois lignes brunes: milieu des supérieures avec un œil tripupillé.

90. ERYCINE Tisis.

Ailes entières, couleur d'acier en dessus: leur dessous brun, avec trois lignes terre d'ombre; celui des supérieures offrant sur le milieu un œil tripupillé.

91. ERYCINE Utric.

Ailes entières, d'un bleu-luisant en dessus: leur dessous terre d'ombre, avec un œil tripupillé sur le milieu des supérieures.

92. ERYCINE Iysidice.

Ailes entières, bleues, ayant en dessus le limbe postérieur, et en dessous cinq bandes, noirs: troisième bande des inférieures marquée de trois points argentés.

93. ERYCINE Archimède.

Ailes entières, noires, avec le disque bleu: leur dessous brun et sans taches. FAB.

94. ERYCINE Virgile.

Ailes entières, noires, avec le bord interne bleu: leur dessous gris, avec trois lunules blanchâtres, chargées d'un point noir aux inférieures. FAB.

95. ERYCINE Iiria.

Ailes entières, d'un noir-bleu en dessus, cendrées et ponctuées de brun en dessous: les quatre ayant de part et d'autre trois taches blanches, transparentes.

96. ERYCINE Misène.

Ailes entières, brunes en dessus, avec un point blanc sur la côte des supérieures: leur dessous d'un bleu-pâle, avec des taches brunes.

97. ERYCINE Abais.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, brunes et ponctuées de noir, avec le limbe postérieur roux: supérieures avec trois taches jaunes.

98. ERYCINE Amésis.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre, brunes: extrémité des supérieures avec des rayons, extrémité des inférieures avec des anneaux, jaunes.

99. ERYCINE Epulus.

Ailes entières, brunes, avec une multitude de taches, jaunes en dessus, blanches en dessous.

100. ERYCINE Timandra.

Ailes entières, d'un jaune-jauve taché de noir en dessus, avec le sommet des supérieures brun et ponctué de blanc: dessous des quatre brun, avec des taches noires cerclees de blanc.

101. ERYCINE Zachia.

Ailes entières, jaunes, avec des taches noires: dessous des inférieures varié de brun et de blanc. FAB.

102. ERYCINE Polyménus.

Ailes entières, ponctuées de ferrugineux, de brun et de noir: leur dessous jaunâtre, avec des ondes brunes. FAB.

103. ERYCINE Acanthus.

Ailes entières, brunes et sans taches en dessus: leur dessous ferrugineux, avec des bandes bleues et tout le pourtour extérieur d'un jaune-jauve.

ERYCINE. (Insecte.)

104. ERYCINE GYAS.

Ailes entières, brunes et sans taches en dessus : leur dessous roux, avec des lignes transverses et interrompues d'un vert-doré.

105. ERYCINE AMPYX.

Ailes entières, brunes en dessus, avec deux taches jaunes aux supérieures : dessous des quatre jaune, avec des taches ferrugineuses à prunelle d'or.

106. ERYCINE PYRAMIS.

Ailes entières, brunes et glacées de violet, avec une tache fauve : dessous des inférieures gris. FAB.

107. ERYCINE LUCANUS.

Ailes entières, noires, avec le disque jaune : dessous des inférieures rouge, avec des taches carrées brunes. FAB.

108. ERYCINE ? ALPHONSE.

Ailes entières, d'un noir-foncé : supérieures avec deux taches, inférieures avec une seule à la base, jaunes. FAB.

109. ERYCINE PROCAS.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-foncé, avec le disque des quatre, et une tache au sommet des supérieures, jaunes. FAB.

110. ERYCINE NUMITOR.

Ailes entières, brunes : inférieures jaunes en dessus au milieu, entièrement jaunes et sans taches en dessous. FAB.

111. ERYCINE ÆDON.

Ailes entières, brunes, avec plusieurs bandes de taches jaunes. FAB.

112. ERYCINE TÉLÈPHE.

Ailes entières, noires en dessus, avec un espace d'un rouge-fauve : leur dessous d'un blanc-bleuâtre, avec des points noirs.

113. ERYCINE LUCICH.

Ailes entières, ponctuées de noir, ayant le dessus roux, le dessous d'un blanc-cendré.

114. ERYCINE PHARÉUS.

Ailes entières, cramoisies, avec tout le pourtour extérieur noir : noir de la côte des supérieures formant des dents en dessus, très-large en dessous.

115. ERYCINE TACITE.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, cramoisies, avec tout le pourtour extérieur noir : noir de la côte des supérieures très-large et tacheté de jaune.

116. ERYCINE EPALIA.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un rouge-fauve, avec tout le pourtour extérieur noir.

117. ERYCINE CINGULUS.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec une bande rouge, commune, discoïdale.

118. ERYCINE TALUS.

Ailes entières, cendrées, fasciées de noir de part et d'autre : leur dessus avec une bande rouge, commune, courte.

119. ERYCINE NICON.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes courtes et des points marginaux jaunes.

ERYCINE. (Insecte.)

120. ERYCINE Régulus.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux bandes blanches ou jaunâtres: bande postérieure des supérieures interrompue.

121. ERYCINE ? Thucydide.

Ailes entières, noires, avec une tache jaune sur le disque: leur dessous cendré et ondulé de roux.

122. ERYCINE Arius.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, brunes et tachetées de noir: supérieures avec une ligne blanche, transverse, courte, discoïdale.

123. ERYCINE Sagaris.

Ailes entières, noires, ayant en dessus une bande fauve, courte: dessous des supérieures blanchâtre au bord interne.

E. Ailes un peu oblongues ou allongées dans le sens du diamètre du corps.

124. ERYCINE ? Hélius.

Ailes entières, brunes: inférieures fauves au bord. d'en haut.

125. ERYCINE Probétor.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus: extrémité des supérieures avec des veines cendrées; bord antérieur des inférieures d'un rouge-sanguin.

126. ERYCINE Agyrtus.

Ailes entières, d'un noir-brun: supérieures ayant de part et d'autre une bande rousse, courte: dessous des quatre avec une bande jaune, commune.

127. ERYCINE Perditus.

Ailes entières, d'un noir-foncé à reflet bleu, ayant chacune de part et d'autre une bande souci, transverse, discoïdale.

128. ERYCINE Phéréclus.

Ailes entières, d'un noir-bleu: supérieures ayant de part et d'autre une bande fauve, atteignant les bords: dessous des inférieures sans taches au limbe postérieur.

129. ERYCINE Phéréphatte.

Ailes entières, d'un noir-bleu: supérieures ayant de part et d'autre une bande fauve, courte: dessous des inférieures (femelle) avec une rangée marginale de points blancs.

130. ERYCINE Electron.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-foncé, avec un point rouge à la base: supérieures avec une bande courte, fauve ou blanche.

131. ERYCINE Ménéria.

Ailes entières, noires, avec une bande commune, et une petite ligne à la base des supérieures, d'un rouge-vermillon: disque des quatre ponctué de blanc en dessus.



A. Bord postérieur des premières ailes convexe & entier. Bord analogue des secondes avec six queues linéaires, dont la troisième, à compter de celle de l'angle de l'anus, beaucoup plus longue que les autres.

Nota. Dans cette division, les deux sexes ont les pattes antérieures plus courtes & velues.

1. ERYCINE Gnidus.

ERYCINA Gnidus.

Eryc. alis albis, limbo nigro : subtus anticis flngâ marginali albidâ, posticis guttis apicalibus argenteis.

Hesperia R. Gnidus, *alis sexdentato-caudatis, limbo atro : posticis subtus marginalibus argenteis.* FAB. *Spec. Inf. append.* 504. — *Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n^o. 607.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 258. n^o. 2.*

Papilio Endymion. CRAM. *pl. 244. fig. C. D.* (Le mâle.) *fig. E. F.* (La femelle.)

STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 4. fig. 5. A.* (La chenille.) *fig. 5. B.* (La chrysalide.)

La Goutte argentée. (*Nom vulgaire.*)

Le mâle a environ un pouce trois quarts d'envergure. Ses ailes sont blanches de part & d'autre, avec la base fauve & l'extrémité noire. L'extrémité des inférieures est en dessus une suite de petits traits blancs, dont les deux extrêmes doubles.

En dessous, les ailes supérieures ont sur le bord terminal une ligne blanchâtre qui ne monte pas jusqu'au sommet. Les ailes inférieures ont vers ce même bord vingt-une gouttes argentées, dont les trois de chaque bout allongées & placées sur un fond blanc, les autres rondes & se détachant sur un fond ferrugineux. Toutes ces gouttes sont bordées de noir.

La femelle, dont l'envergure est de deux pouces, présente les mêmes caractères que le mâle; mais le fauve de la base & le noir de l'extrémité des quatre ailes ont beaucoup plus d'étendue, & tous les traits blancs marginaux du dessus des inférieures sont simples.

Le corps est blanc, avec le corselet jaunâtre. Les antennes sont noires, & annelées de blanc depuis leur base jusqu'à leur masse.

La chenille, selon Stoll, est blanche, avec des poils latéraux de cette couleur. Sa tête est entièrement jaune, & son cou offre un bouquet de poils d'un rouge-incarnat. Elle vit sur la *grenadille* ou *steur de la passion*.

La chrysalide est brune & couverte d'un duvet jaunâtre, avec une touffe de poils rouges à chaque extrémité. Elle est attachée par la queue & par le milieu du corps.

De Surinam.

2. ERYCINE Cupido.

ERYCINA Cupido.

Eryc. alis albis, limbo nigro : posticis utrinque guttis apicalibus, anticis subtus flngâ marginali, argenteis.

Papilio P. R. Cupido, *alis posticis sexdentato-caudatis : subtus albidis, maculis argenteis.* LINS. *Syst. Nat. 2. p. 787. n^o. 217.* — *Mus. Lud. Ulr. p. 515.*

Papilio P. R. Cupido. FAB. *Syst. Ent. p. 518. n^o. 520.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 64. n^o. 606.*

Hesperia R. Cupido. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 258. n^o. 1.*

PETIV. *Gazoph. tab. 10. fig. 9.*

MERIAN, *Surin. Inf. tab. 10.*

ROES. *Inf. 4. tab. 5. fig. 7.*

SEBA, *Mus. 4. tab. 35. fig. 5-8.*

DAUBENTON, *pl. enl. 18. fig. 4. 3.*

Papilio Cupido. CRAM. *pl. 114. fig. D. E.* (Le mâle.) *fig. F. G.* (La femelle.)

STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 4. fig. 6. A.* (La chenille.) *fig. 6. B.* (La chrysalide.)

La Goutte dorée. (*Nom vulgaire.*)

Ce qui distingue surtout cette espèce de la précédente, c'est qu'elle est constamment plus petite; qu'elle a des gouttes d'argent sur chaque surface des secondes ailes, mais moins en dessus qu'en dessous, & que ces gouttes ne sont pas bordées de noir. C'est qu'enfin le dessous des ailes supérieures a tout le bord terminal longé par une ligne argentée.

La chenille ressemble beaucoup à celle du *gnidus*; mais sa tête est rouge, avec les mandibules jaunes; & son corps, qui est entièrement garni de poils blancs, offre trois lignes blenâtres longitudinales. Outre cela, l'anus est rouge. Elle se nourrit des feuilles du *citronnier* & de celles du *co-tonnier*.

La chrysalide est brune, avec de longs poils blancs, & une touffe rouge sur la tête seulement. Elle est aussi attachée par la queue & par le milieu du corps.

De Surinam. — Plus commune que le *Gnidus*, & se trouvant dans la saison des pluies.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures allongées dans le sens de la longueur du corps, largement tronquées vers leur angle acut, & ayant l'angle extérieur de la troncation prolongé en une queue oblique, tantôt longue & plus ou moins aiguë, tantôt courte & obtuse.

a. Queue des ailes inférieures très-longue & aiguë.

Nota. Les espèces de la subdivision α sont remarquables en ce que leurs ailes sont entièrement vitrées, ou en ce qu'elles ont des bandes un peu transparentes. Le *Licarfis*, placé en tête de cette subdivision, se distingue de ses congénères par la longueur extraordinaire de ses palpes. Ce caractère nous auroit déterminés à former un genre particulier, s'il avoit été commun à d'autres espèces.

5. ERYCINE Licarfis.

ERYCINA Licarfis.

Eryc. alis concoloribus, nigris, fasciis duabus cæruleo-anti-albis: anticis puncto basæos, posticis maculâ angulî ani, coccineis.

Papilio E. A. Licarfis, alis caudatis, atris, fasciis duabus albis, angulo ani rubro bimaculato. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n. 75.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 28. n. 85.*

Papilio Licarfis. HERBST, *Pap. tab. 58. fig. 4.*

Papilio Rhetus. CRAM. *pl. 63. fig. C.*

Papilio Butes. CLERCK, *Icon. tab. 46. fig. 6.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Toutes ses ailes sont noires de part & d'autre, avec deux bandes d'un blanc-bleuâtre, communes & un peu transparentes. L'origine de la côte des premières ailes offre un point écarlate; & il y a, avant l'angle anal des secondes, une tache rouge, glacée de bleu, & surmontant une liture blanche qui est maculaire ou continue. La queue de ces dernières ailes a le dessus d'un violet-luifaut, le dessous noir, avec l'extrémité tout-à-fait blanche.

Dans la femelle, la tache rouge des secondes ailes est double.

De la Guyane & du Brésil.

4. ERYCINE Dorillis (1).

ERYCINA Dorillis.

Eryc. alis concoloribus, nigris: disco antica-rum maculâ rotandâ, posticarum fasciâ obliquâ, hyalino-albis.

Papilio Dorilas. CRAM. *pl. 48. fig. C.* (Le mâle.)

Papilio Dorilas. HERBST, *Pap. tab. 60. fig. 3.*

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes ses ailes sont noires de part & d'autre, avec une bande blanche, oblique & un peu transparente, vers la base des inférieures; & une tache ronde, également blanche & un peu transparente,

(1) Comme il y a un polyommate qui porte le nom de *Dorilas*, nous avons été obligés de changer le nom de Cramer.

sur le milieu des supérieures. Ces dernières ailes ont un gros point rouge, s'alignant avec la bande blanche dont il vient d'être question.

Dans le mâle, cette bande est d'un ton jaunâtre.

De la Guyane & du Brésil.

5. ERYCINE Curius.

ERYCINA Curius.

Eryc. alis caudatis, concoloribus, atris: anticis fasciis duabus hyalinis, posticis unicâ albâ. FAB.

Papilio E. A. Curius. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n. 71.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n. 81.*

Suivant Fabricius, que nous traduisons ici, ce lépidoptère seroit de Siam; mais il paroît se rapprocher trop de ceux de cette subdivision pour ne pas être aulli de l'Amérique méridionale.

Le corps est petit, brun en dessus, blanchâtre en dessous, avec des points noirs sur les côtés de l'abdomen. Les ailes supérieures sont noires de part & d'autre, avec deux bandes transparentes, dont la postérieure plus large & coupée par des nervures de la couleur du fond de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un noir foncé, avec une bande blanche, courte. Leur queue est très-longue, avec le côté externe & le bout blanc.

6. ERYCINE Oclavius.

ERYCINA Oclavius.

Eryc. alis hyalinis, nervis, strigâ communi margineque nigris: inferis utranquâ angulo ani latè coccineo.

Papilio E. A. Oclavius, alis caudatis, hyalinis, margine strigâque rubris (nigris). FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n. 72.* — *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 28. n. 82.*

Papilio Faanus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 16. n. 65.*

Papilio Oclavius. HERBST, *Pap. tab. 60. fig. 2.*

Papilio Chorineus. CRAM. *pl. 59. fig. A.*

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Les premières ailes & la moitié antérieure des secondes sont transparentes, avec les nervures, les bords & une bande très-étroite sur le milieu, noirs. La moitié postérieure des secondes ailes est opaque, avec un point blanc près de l'extrémité de la bande sus-mentionnée, puis une grande tache écarlate s'étendant de l'angle anal à l'origine de la queue. Celle-ci est noire, avec le côté externe & le bout blanc.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus,

mais la tache rouge des inférieures est marquée de deux points blancs.

Le mâle ne nous a pas paru différer de la femelle.

De Surinam.

Nota. Il y a une faute dans la phrase spécifique de Fabricius. Au lieu de *marginè strigatè rubris*, il faut lire : *marginè strigatè nigris*.

8. Queue des ailes inférieures courte & obtuse.

7. ERYCINE Iphinoé (1).

ERYCINA Iphinoe.

Eryc. alis subtus fuscis, fuscis duabus albis : anticis lineâ costali, posticis maculis tribus annulibus coccineis. (Mas supra cæruleo nitidus.)

Papilio Periander. GRAM. pl. 188. fig. C. (La femelle.)

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Le dessus du mâle est noir, avec un reflet d'un bleu-violet-vif sur le milieu de toutes les ailes, & trois gros points écarlates près de l'angle anal des inférieures.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanches, dont l'antérieure plus large, & trois points rouges correspondant à ceux du mâle. Il y a en outre une liture blanche à l'origine de la queue.

Le dessous des deux sexes est comme le dessus de la femelle; mais la moitié antérieure de la côte des premières ailes est rouge, & il y a trois petits points de cette couleur à la base des secondes ailes. On voit encore quelques points rouges sur le milieu du ventre.

De la Guyane & du Brésil.

8. ERYCINE Aulètes.

ERYCINA Auletes.

Eryc. alis concoloribus, nigris, fuscis duabus fulvis.

Papilio Auletes. GRAM. pl. 128. fig. G.

Papilio Thedea. GRAM. pl. 102. fig. A. (Le mâle.)

Papilio Auletes. HERBST, *Pap. tab. 60. fig. 1.*

Papilio Tedeo. HERBST, *Pap. tab. 59. fig. 6.* (Le mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont noires, avec deux bandes fauves,

(1) Nous n'avons pas adopté le nom de Cramer, 1^o. parce que cet iconographe n'a connu que la femelle, 2^o. parce qu'il y a une NYMPHEALE qui porte le nom de *Périandre*.

partant de la côte des supérieures, & formant chacune un coude vers l'extrémité des inférieures.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est un peu plus pâle, & il a la bande extérieure plus prononcée.

Le papillon *Thedea* de Cramer est le mâle, ou du moins une variété mâle, car il ne diffère de la femelle que parce qu'il a les deux paires antérieures plus courtes & parce qu'il est plus petit.

De Surinam.

9. ERYCINE Mélibée.

ERYCINA Melibæus.

Eryc. alis fusco-nigris, supra strigâ sesquialterâ sanguineâ, subtus fuscis duabus nitidè cyaneis.

Papilio E. A. Melibæus, alis caudatis, fuscis : anticis strigâ, posticis duabus, sanguineis : subtus cyaneo-nitidissimis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n^o. 75. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 29. n^o. 84.*

Papilio Melibæus. HERBST, *Pap. tab. 59. fig. 4. 5.*

Papilio Pyretus. GRAM. pl. 144. fig. A. B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec deux lignes communes, dont l'intérieure rouge & discoïdale, l'extérieure obscure, surtout aux premières ailes. Il y a en outre une liture rouge vers l'origine de la queue.

Le dessous des quatre ailes est du même noir que le dessus, avec deux bandes bleues, obliques & très-luisantes, dont l'intérieure terminée aux secondes ailes par un point blanc, au dessus duquel il y a un point écarlate.

De Surinam & du Brésil.

10. ERYCINE Aristote.

ERYCINA Aristoteles.

Eryc. alis integris, subconcoloribus, nigris, fuscis duabus transversis, alterâ aurantiacâ aut albâ, alterâ pallidâ.

Erycina Aristoteles, antennis clavâ obovatâ, elongatâ; palpis brevissimis; alis quatuor trigonis; anticis integris; posticis elongatis, subsinuatis, ad apicem obtusis aut veluti truncatis; his & illis utroque nigris, fuscis duabus transversis, rectis; priori in medio positâ, aurantiacurâ, continuâ; posteriori limbam posticam versus supra nervis valdè divisâ, supra obsoletâ & dilutè fuscâ, infra albicanti; alis posticis ex utroque parte ad marginem posticum albo maculatis, angulumque analem supra maculâ aurantiaco-rufâ, transversâ, emarginatâ notatis. Recueil d'Observ. de zool. & d'anat. comp., par

Al. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. p. 247. pl. 24. fig. 5. 6.

Erycina Pallas. *Aniennis clavâ obovatâ, elongatâ; palpis brevissimis; alis quatuor trigonis; anticis integris; posticis elongatis, subfinuatis, ad apicem obtusis aut veluti truncatis; his & illis utrinquè nigricantibus, fuscis duabus transversis, rectis; priori in medio positi, albâ, ad apicem angulato-acuminatâ; posteriori limbicâ posticum versus nervis valdè divisâ, supra minùs conspicuâ & diluto-fuscâ, infra albidâ; alis posticis ex utraq. parte ad marginem posticum albo maculatis, angulâque analem supra maculâ aurantiaco-rufâ, bipartitâ, transversâ, notatis.* Recueil d'Observ. de zool. &c. vol. 1. p. 244. pl. 24. fig. 7. 8.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes font noires de part & d'autre & traversées par deux bandes dont l'antérieure orangée, discordiale & continue; la postérieure d'un noirâtre-clair en dessus, blanchâtre en dessous, & très-divisée par les nervures. Les secondes ailes offrent en outre, près de l'angle de l'anus, une tache fauve, bilobée, & leur bord postérieur est entrecoupé de blanc. Le corps est noir, avec une bande rouffâtre le long de chaque côté du ventre.

L'*Erycina Pallas* a le fond des ailes plus clair, la bande antérieure d'un blanc-jannâtre, & la tache anale partagée en deux. Du reste, elle ressemble parfaitement à l'*Erycina Aristote*, dont elle n'est qu'une variété.

Des bords de la rivière de la Madelaine, Amérique méridionale.

11. ERYCINE Lyfippe.

ERYCINA Lyfippus.

Eryc. alis fusco-nigris, singularum utrinquè fuscâ aurantiacâ: subtus ad basin flavido punctatis.

Papilio P. R. *Lyfippus, alis subangulatis, utrinquè atris: omnibus fuscâ lineari rubri.* Linn. *Syst. Nat.* 2. p. 795. n. 250. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 332.

Papilio P. R. *Lyfippus, alis angulatis, fuscis: omnibus strigâ rubri: subtus cinereo-punctatis.* Fab. *Syst. Ent.* p. 530. n. 365. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 85. n. 755.

Hesperia R. *Lyfippus.* Fab. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 521. n. 218.

Papilio Lyfippus. Clerck, *Icon. tab.* 22. fig. 5. 4.

Papilio Lyfippus. Drury, *Inf.* tom. 1. pl. 2. fig. 2.

Papilio Lyfippus, Cram. pl. 380. fig. A.

Papilio Lyfippus. Herbst, *Pap. tab.* 284. fig. 7. 8.

Elle est de la même taille que les précédentes, mais ses queues sont plus courtes.

Le dessus des ailes est noir, avec une bande orangée, plus ou moins étroite. La bande des premières ailes descend obliquement du milieu de la côte à l'angle interne, où elle forme un peu le coude. La bande des secondes ailes est arquée en dehors, & elle s'étend du sommet à l'angle anal, angle près duquel il y a un point orangé.

Le dessous diffère du dessus, en ce qu'il est moins noir; en ce que l'espace compris entre la base & la base des quatre ailes offre une multitude de petits points d'un jaune-d'ocre-pâle; enfin, en ce que l'origine de la côte des ailes supérieures & tout le bord interne des inférieures sont longés par une ligne fauve.

Le corps est noir, avec une ligne rouffâtre sur le milieu du ventre. Les antennes sont brunes, avec le dessous annelé de blanchâtre.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

12. ERYCINE Echerius.

ERYCINA Echerius.

Eryc. alis subdentatis, umbrinis, strigâ mediâ saturatiore: posticis subtus punctis tribus duobusque nigris albo cinctis.

Papilio Echerius. Stoll, *Pap. Suppl.* à *Cram. pl.* 31. fig. 1. A. B.

Son envergure est d'un pouce & demi. Le dessus des ailes est couleur de terre d'ombre & traversé au milieu par une ligne obscure qui est légèrement finuée.

En dessous, où le fond est chatoyant & un peu plus clair vers l'extrémité, cette ligne est bordée de blanchâtre en dehors, & les secondes ailes offrent parallèlement à leur bord postérieur cinq points noirs cerclés de blanc: il y en a trois près du sommet, & deux près de l'angle de l'anus. Ces points sont quelquefois visibles en dessus, notamment dans la femelle. Le corps est du même ton que les ailes. Les antennes sont brunes, annelées de blanc, & terminées de rouffâtre.

De la Chine.

Nota. On voit par cette espèce & par la suivante que les *ERYCINES* ne sont pas exclusivement propres à l'Amérique.

13. ERYCINE Allica.

ERYCINA Allica.

Eryc. alis denticulatis, subconcoloribus, umbrinis, punctis nigris, numerosis alboque fectis.

Papilio S. Allica, alis dentatis, subconcoloribus, obscurè fulvis, punctis numerosis albo fatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 244. n^o. 761.*

Papilio Flegyas. CRAM. *pl. 280. fig. E. F.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est couleur de terre d'ombre, avec une multitude de points noirs, chargés chacun d'un point blanc.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il est un peu plus clair. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le bout de la massue jaune ou rouffâtre.

Chine, Bengale, île de Java.

14. ERYCINE Labdacus.

ERYCINA Labdacus.

Eryc. alis dentatis, supra fulvis, oris nigris: subtus cœrulescenti-albis, anticarum strigis tribus, posticarum duabus, ferrugineis.

Papilio Labdacus. CRAM. *pl. 336. fig. G. H.*

Nous n'avons vu que le mâle de cette espèce. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un fauve-luisant, avec tous les bords noirs.

Le dessous est blanc, mais un peu bleuâtre vers les bords, avec deux lignes ferrugineuses, communes & sinuées. Il y a en outre quelques taches & une ligne plus obscure à l'extrémité des premières ailes, & une ligne noire en zig-zag sur le bord postérieur des secondes. Ce bord est denté & marqué d'un point ferrugineux à chaque échancrure. Le corps est fauve en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont noirâtres.

De la Guyane & du Brésil.

15. ERYCINE Gemellus.

ERYCINA Gemellus.

Eryc. alis integerrimis, supra fuscis, disco rufo: subtus holosericeo-niveis, strigâ communi cultibacèâ.

Hesperia R. Gemellus, alis integerrimis, stavescentibus, limbo fusco: subtus albis strigâ mediâ lunulique marginalibus sanguineis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 319. n^o. 208. (Le mâle.)*

Papilio Gemellus. JON. *Fig. piçâ. 6. tab. 36. fig. 2.*

Papilio Teleclus. STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 5. fig. 4 & 4 E. (La femelle.)*

Fabricius a décrit le mâle de cette espèce sous le nom de *Gemellus*, & Stoll a figuré la femelle sous celui de *Teleclus*.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec une tache rousse, oblongue & descendante.

Le dessous est d'un blanc-fâiné, avec une bande d'un jaune-fouci sur le milieu de toutes les ailes, & un rang de petites lunules noires sur le bord terminal des inférieures.

Dans la femelle, la bande fouci est précédée en dehors d'une ligne cendrée, & le bout des premières ailes est également cendré.

De Surinam & de Cayenne.

Nota. Fabricius a probablement décrit le mâle d'après la figure de Jones; car s'il l'avoit vu en nature, il ne le seroit pas servi du mot *sanguineus* pour désigner la couleur de la bande du dessous des ailes. Cette bande est toujours fouci, & non d'un rouge de saug.

16. ERYCINE Midas.

ERYCINA Midas.

Eryc. alis integris, fuscis: subtus basi albis aut pallidioribus, apice strigis duabus rufis, externâ posticarum nigro punctatâ.

Papilio P. R. Midas, alis subangulatis, fuscis, maculâ albida: subtus basi albis strigâque rufâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n^o. 718. (Le mâle.)*

Hesperia R. Midas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 306. n^o. 162. (Le mâle.)*

Papilio Crotopus. CRAM. *pl. 390. fig. G. H. (Le mâle.)*

Papilio Crotopus. CRAM. *pl. 356. fig. E. F. (La femelle.)*

STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 6. fig. 7. (La chenille.) fig. 7. F. (La chrysalide.)*

Papilio Crotopus. HERBST, *Pap. tab. 522. fig. 8-11.*

Le *Midas* de Fabricius répond, selon nous, au mâle du papillon *Crotopus* de Cramer.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-cendré, avec deux taches d'un blanc-fâle au milieu des supérieures, & une semblable près du sommet des inférieures. — Le dessous est blanc depuis la base jusqu'au-delà du milieu; ensuite brunâtre jusqu'au bout, avec deux lignes roullées, transverses & arquées, dont la postérieure des secondes ailes chargée d'une suite de points noirs.

La femelle a le dessus d'un brun-noirâtre, avec un espace ruiffâtre vis-à-vis du sommet des ailes supérieures. En dessous, elle ressemble au mâle, mais la base des quatre ailes est d'un brun-clair & chatoyant, & les points noirs placés sur la ligne postérieure des secondes ailes sont bordés de blanc-châtre en dehors. Ces dernières ailes sont d'aileurs plus allongées que dans le mâle.

Nous avons vu une variété femelle dont le dessus des secondes ailes étoit fauve à la région du bord interne.

La chenille, suivant Stoll, est pubescente, d'un

noir-brun, avec une rangée longitudinale de points blancs sur chaque côté du dos, & une petite frange blanchâtre aux bords du ventre. Elle a derrière la tête deux épines blanches, droites, longues, & garnies à leur base d'une touffe de poils rouges. On la trouve dans l'herbe.

La chrysalide est ovale, un peu velue, d'un fauve-verdâtre.

De la Guyane.

C. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures plus ou moins allongées dans le sens de la longueur du corps.

17. ERYCINE Salimba.

ERYCINA Salimba.

Eryc. alis integris, supra violaceis, nitidis, apice fusco: subtus pallidioribus, strigâ posticâ ferrugineâ.

Papilio Lijtas. CRAM. pl. 152. fig. F. G.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-luisant, avec la côte des supérieures & le sommet des quatre d'un noir-brun.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec une ligne ferrugineuse avoisinant le bord postérieur dont la tranche est blanche.

Nous n'avons vu que le mâle.

De Surinam.

18. ERYCINE Euriteus.

ERYCINA Euriteus.

Eryc. alis integris, supra nigris, fuscis cœruleâ, nitidâ: subtus medio albis, fuscis duabus ferrugineis.

Papilio P. R. Euriteus, alis integris, atris, maculâ cœruleâ: subtus medio rufis, fuscis albis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 751.

Hesperia R. Euriteus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 321. n°. 216.

Papilio Euriteus. CRAM. pl. 152. fig. D. E.

Papilio Euriteus. HERBST, Pap. tab. 521. fig. 3. 4.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande bleue, luisante, partant de la base des supérieures, se courbant vers leur centre, & allant aboutir au milieu du bord terminal des inférieures.

Le dessous est jaune à la base & à l'extrémité; blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineuses, communes. Le jaune de l'extrémité des secondes ailes offre une tache, partie noire, partie blanche.

De Surinam.

19. ERYCINE Gélou.

ERYCINA Gélou.

Eryc. alis integris, supra fuscis: subtus flavescens, apice strigis tribus brunneis.

Papilio Gélou. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 5. fig. 2 & 2 B.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec la région de l'angle anal des inférieures fauve.

Le dessous est d'un jaune-pâle, avec trois lignes brunes, postérieures & parallèles. Outre cela, le bord terminal des secondes ailes est fauve.

Nous n'avons vu qu'un seul individu, que nous croyons femelle.

De Surinam.

20. ERYCINE Sabinus.

ERYCINA Sabinus.

Eryc. alis integris, supra fuscis, anticarum marginis antico carneo: subtus omnibus pallidis, strigis tribus apicalibus albis.

Papilio Sabinus. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 9. fig. 3 & 3 A.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-violet & chatoyant, avec le bord antérieur des premières incarnat.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec trois lignes blanches, communes & postérieures. Outre cela, le bord terminal des secondes ailes prend une teinte fauve vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pu reconnoître le sexe de l'individu que nous décrivons.

De Surinam.

21. ERYCINE Hyginus.

ERYCINA Hyginus.

Eryc. alis integris, supra fuscis, immaculatis: subtus pallidè violaceis, anticis strigis duabus rufis, posticis maculis nigris trigonis.

Papilio Hyginus. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 9. fig. 2 & 2 A.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, sans taches.

Le dessous est d'un violet-pâle; avec deux lignes discoïdales, & la tranche du bord postérieur, rouffâtes. Derrière la seconde ligne, les ailes inférieures ont une suite de cinq ou six taches noires, triangulaires & bordées de blanc.

De Surinam.

22. ERYCINE Orfila.

ERYCINA Orfila.

Eryc. alis integris, fuscis, violaceo micantibus : subtus strigis duabus ferrugineis sericeae posticâ & maculis sagittatis.

Papilio Orfila. GRAM. pl. 112. fig. D. E. F.

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre à reflet violet & sans taches.

Le dessous est plus pâle & moins chatoyant que le dessus, avec deux raies ferrugineuses, obliques & discoidales, bordées de blanc en dehors dans la femelle, & de bleuâtre dans le mâle. Entre ces raies & le bord postérieur, il y a une rangée transverse de taches blanchâtres en fer de flèche, & parmi lesquelles on voit à chaque aile un œil bleuâtre.

Du Bengale, selon Cramer. — Est-ce bien là qu'elle le trouve ?

23. ERYCINE Gélonor.

ERYCINA Gelnor.

Eryc. alis subdentatis, supra fuscis, violaceo micantibus : subtus aurantiis, posticis strigâ ferrugineâ sericeae marginali & punctis ocellatis.

Papilio Gelnor. GRAM. pl. 336. fig. C. D.

Papilio Gelnor. HERBST, *Pap. tab.* 323. fig. 1. 2.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec un reflet violet.

Le dessous est d'une couleur orangée chatoyante, sans taches aux ailes supérieures; avec une ligne ferrugineuse transverse, & une rangée marginale de points noirs oculaires, aux inférieures.

De la Guyane & du Brésil.

D. Ailes supérieures triangulaires. Ailes inférieures arrondies.

24. ERYCINE Arbas.

ERYCINA Arbas.

Eryc. alis integris, fuscis, caeruleiscenti nitidis : subtus strigâ mediâ margineque sulvis, interneâ posticarum puncto nigro.

Papilio Arbas. GRAM. pl. 379. fig. L. M.

Papilio Arbas. HERBST, *Pap. tab.* 526. fig. 9. 10.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre à reflet violet & sans taches.

Le dessous est d'un brun-clair à reflet purpurin, *Hist. Nat. Inf. Tom. IX.*

avec une ligne discoidale & le bord postérieur fauves. La ligne des secondes ailes forme un coude, derrière lequel il y a un gros point noir accompagné de petites veines jaunâtres.

Nous n'avons vu qu'un seul sujet, qui paroît être femelle.

De Surinam.

25. ERYCINE Arcas.

ERYCINA Arcus.

Eryc. alis integris, supra violaceo-caeruleis, nitidis : anticis punctis aliquot albis mediis, posticis areâ nigrâ costatis.

Papilio N. Arcas, alis integerrimis, caeruleis : anticis albo maculatis, posticis maculâ atrâ albâque marginali. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 157. n.º 483.*

Papilio Arcas. GRAM. pl. 179. fig. E. F.

Papilio Arcas. HERBST, *Pap. tab.* 301. fig. 9. 10.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec quatre à cinq points blancs vers le milieu des supérieures, & un espace noir au milieu du bord antérieur des inférieures.

Le dessous est d'un gris-de-perle, avec quelques points blancs sur le milieu des premières ailes, & quelques points obscurs sur le milieu des secondes.

De Surinam.

26. ERYCINE Priolas.

ERYCINA Priolas.

Eryc. alis integris, supra nigris, violaceo micantibus : anticis apice aeneo venosis : posticis subtus albo maculatis.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec un reflet violet au bord postérieur des quatre, & des veines d'un vert-bronzé vis-à-vis du sommet des supérieures.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-pâle, avec l'extrémité veinée de blanchâtre. Le dessous des secondes ailes est également d'un brun-pâle, avec des taches blanchâtres, dont les antérieures marquées d'un point obscur, & les postérieures d'un point noir. Le corps a le dessus noir, le dessous gris. Les antennes sont noirâtres, avec la massue blanche.

● Nous n'avons vu que des mâles.

Du Brésil.

27. ERYCINE Préma.

ERYCINA Prema.

Eryc. alis integris, supra nigris, fuscis macu-

laribus aurato-viridibus : subtis fuscescentibus, fuscis albidis seneque terminali è punctis nigris.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec trois bandes transverses & maculées d'un vert-doré.

Le dessous est d'un brun-clair & chatoyant, avec trois bandes blanchâtres continues, & une rangée terminale de points noirs ocellés, dont le deuxième, à compter du bord antérieur, sablé de vert aux secondes ailes.

Décrite d'après un individu unique, dont la patrie nous est inconnue.

28. ERYCINE Prétus.

ERYCINA Pretus.

Eryc. alis integris, supra nigris, viridi maculatis : subtis corticinis, albido maculatis.

Papilio P. U. Pretus, alis subcaudatis, atris, viridi maculatis : subtis subferragineis, flavo maculatis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 86. n^o. 785.

Hesperia U. Pretus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 355. n^o. 266.

Papilio Pretus. GRAM. pl. 182. fig. C. D.

Fabricius place cette espèce parmi les *Plébéiens ruraux*; & Cramer parmi les *Plébéiens ruraux*; mais, comme elle nous paroît avoir tous les caractères des *ERYCINES*, nous l'agrégeons provisoirement à ces dernières.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une multitude de taches vertes, formant cinq bandes transversales.

Le dessous est d'un brun-tanné, avec beaucoup de taches blanchâtres ou jaunâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance, selon Fabricius & Cramer. Mais est-ce bien là qu'elle se trouve?

Nota. L'angle anal des secondes ailes est un peu prolongé.

29. ERYCINE Pétrone.

ERYCINA Petronius.

Eryc. alis integris, supra nitide caeruleis, strigis apiceque nigris : subtis cinereis, fusco punctatis.

Hesperia R. Petronius, alis integerrimis, caeruleis, nigro strigosis : subtis fusco-cinereis, nigro punctatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 324. n^o. 227. (Le mâle.)

Papilio Menander. GRAM. pl. 334. fig. C. D. (La femelle.)

Papilio Menander. HERBST, tab. 327. fig. 5. 4. (La femelle.)

Fabricius a décrit le mâle sous le nom de *Pétroneus*, & Cramer a figuré la femelle sous celui de *Menander*.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant & changeant, avec des lignes flexueuses & le sommet noir. Les lignes traversent entièrement les quatre ailes de la femelle, mais elles ne descendent pas jusqu'au milieu des ailes inférieures du mâle.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-cendré, avec une multitude de points bruns, dont les postérieurs plus gros & séparés les uns des autres par une ligne ondulée, également brune. La frange des quatre ailes est noire & entre coupée de blanc. Le corps est brun en dessus, gris en dessous.

De la Guyane & du Brésil.

30. ERYCINE Hébrus.

ERYCINA Hebrus.

Eryc. alis integris, supra nigris caeruleoque variis, posticarum margine interiori albo : omnibus subtis caeruleis, nigro punctatis.

Papilio H. R. Hebrus, alis integris, fuscis, caeruleo variis : posticis caeruleis, margine interiori albo. FAB. Mant. Inf. tom. 2. pag. 77. n^o. 700. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 301. n^o. 141.

Papilio Hebrus. GRAM. Pap. pl. 50. fig. E. F.

Elle a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec des atomes azurés, disposés par bandes transverses aux supérieures, très-denses au milieu & à l'angle anal des inférieures. Ces dernières ailes ont le bord interne largement blanc de part & d'autre, ou en dessus seulement.

Le dessous des quatre ailes est d'un bleu-pâle, avec des points noirs à la base & le long du bord postérieur.

De la Guyane & du Brésil.

31. ERYCINE Méris.

ERYCINA Meris.

Eryc. alis subdentatis, nigro multipunctatis, supra aeneis, subtis brunneo griseoque variegatis.

Papilio Meris. GRAM. pl. 366. fig. B. C.

Papilio Meris. HERBST, Pap. tab. 327. fig. 7. 8.

Erycina Agestilas. *Antennarum capitulo parvo, fusiformi; palpis mediocribus, parum pilosis, articulo ultimo brevi, cylindrico conico; alis trigonis, ad marginem posticum breviter unguulatis, nigro aut fusco utraque confertissime punctatis; posticis ecaudatis; his & illis supra chalybeo-aeneis, infra brunneo griseo variegatis; marginis postici incisuris albo sinuatis.* Rec. d'Osterv. de zool. & d'anat. comp. par Al. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, vol. 1. pag. 251. pl. 25. fig. 7. 8.

Elle a entre un pouce & un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bronzé-bleuâtre, mais qui varie selon les individus, avec une multitude de petites taches noires, inégales, & dont les postérieures sont plus ocellées.

Le dessous est d'un brun-chaoyant & plus ou moins parsemé de grisâtre, avec des taches noires, semblables à celles du dessus. Le bord postérieur est en outre frangé de blanc aux échancrures. Le corps a le dessus d'un noir-bronzé, le dessous grisâtre. Les palpes & le contour de la tête sont blancs. Les antennes sont noires, avec des anneaux & la sommité de la massue blanchâtres.

De l'Amérique équinoxiale.

Nota. Cramer a représenté les antennes un peu crochues par le bout, ce qui pourroit faire croire que cette espèce est une *Hesperie*, tandis que c'est véritablement une *Erycine* par la conformation des pattes de devant.

32. ERYCINE Lucinda.

ERYCINA Lucinda.

Eryc. alis integris, supra chalybdineis, subtus rufis, utrinque strigis quinque undulatis punctisque marginalibus fuscis.

Papilio D. F. Lucindus, alis integerrimis, nigro fuscatis, supra caeruleis, subtus fulvis. FAB. *Man. Inf. tom. 2. p. 30. n. 319.*

Papilio N. Lucindus. FAB. *Ent. Syst. cm. tom. 5. pars 1. p. 154. n. 476.*

Papilio Lucinda. CRAM. *pl. 1. fig. E. F.*

Papilio Lucinda. HERBST, *Pap. tab. 324. fig. 1. 2.*

SÉBA, *Mus. 4. tab. 13. fig. 25. 26.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes font couleur d'acier en dessus, d'un roux-rougé en dessous, & elles ont de part & d'autre cinq lignes ondulées & transverses, plus une rangée de points marginaux, d'un brun-noirâtre. La ligne qui précède les points est plus large que les quatre autres.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Dans beaucoup d'individus, il y a, vis-à-vis du sommet, un espace qui est de part & d'autre plus clair que le fond.

53. ERYCINE Dyndima.

ERYCINA Dyndima.

Eryc. alis integris, supra chalybdineis, subtus caeruleo-albis, utrinque strigis quinque undulatis punctisque marginalibus fuscis.

Papilio Dyndima. CRAM. *pl. 171. fig. E. F.*

Nous avons placé ce lépidoptère parmi les Nymphales (p. 407, n. 186); mais, comme nous

l'avons revu depuis en meilleur état, nous le décrivons de nouveau en le rapportant au genre auquel il appartient.

Il ne diffère du précédent que parce qu'il a le dessous des quatre ailes d'un blanc-bleuâtre, au lieu de l'avoir d'un roux-foncé, & parce que l'espace qui précède le sommet des ailes supérieures est blanc en dessous.

Ne seroit-ce pas une variété de l'*Erycine lucinda*?

De Surinam.

54. ERYCINE Arminius.

ERYCINA Arminius.

Eryc. alis integris, fulvis, strigis quatuor undatis punctisque marginalibus, supra fuscis, subtus ferrugineis.

Papilio N. Arminius, alis integris, concoloribus, fulvis, lunulis punctisque rufescentibus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 155. n. 478.*

Papilio Arminius. JOX. *Fig. pict. 6. tab. 32. fig. 4.*

Erycina Ops. Antennis in capitulum gracile, parvum, cylindrico-obconicum, abrupte acuminatum desinentibus; palpis brevibus articulo ultimo minuto, conico: alis integris, trigonis, supra saturato-ferrugineis, lineolis fuscis; usque aurantio-luteis, lineolis punctisque in seriem ad limbum posticum ordinatis, rubido-rufis. Recueil d'Obs. de zool. & d'anat. comp. par Al. de HUMBOLDT & A. BONPLAND, *vol. 2. p. 89. pl. 27. fig. 3. 4.* (Le mâle.)

Papilio Mandana. CRAM. *pl. 271. fig. E. F.* (Var. mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de toutes les ailes est d'un fauve-rougâtre-obscur, avec quatre lignes brunes, transverses, ondulées, & une rangée marginale de points noirâtres, plus ou moins distincts.

Le dessous est d'un jaune-foncé-chaoyant dans le mâle, d'un jaune-faive dans la femelle, avec des lignes ferrugineuses correspondant aux lignes brunes de dessus. Les points du bord postérieur sont tantôt noirâtres, tantôt rouillâtres, & les ailes inférieures en ont deux ou trois plus gros que les autres.

Quelquefois le dessous des ailes du mâle est d'un jaune moins gai, comme dans la variété que Cramer a donnée sous le nom de *Mandana*.

Nous avons vu une autre variété mâle qui étoit d'un fauve-tanné en dessus & en dessous.

De l'Amérique méridionale.

55. ERYCINE Ovide.

ERYCINA Ovidius.

Eryc. alis integris, supra fulvis, subtus flavis.

centibus, utrinque strigis undatis, femine nigris, maris auro pulverulentis.

Hesperia R. Ovidius, *alis integerrimis, auro punctatis, supra fulvis, subtus flavescens.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 520. n°. 212. (Le mâle.)

Papilio Ovidius. JON. Fig. piçt. 6. tab. 59. fig. 4.

Papilio Fatima. GRAM. pl. 271. fig. A. B. (Le mâle.) fig. C. D. (La femelle.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'envergure. Ses ailes sont fauves en dessus, d'un jaune-pâle en dessous, & elles ont de part & d'autre six lignes noires, transverses, dont les cinq antérieures flexueuses & interrompues, la sixième marginale & formée par des points.

Dans le mâle, ces lignes sont couvertes d'atomes dorés.

Des Indes occidentales.

56. ERYCINE Zéanger.

ERYCINA Zeaenger.

Eryc. alis integris, supra fulvis, anticarum apicâ nigro lituris cœruleiscentibus: subtus omnibus albis, nigro multumaculatis.

Papilio Zeaenger. STOLL, Suppl. à GRAM. pl. 57. fig. 2 & 2 B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec un rang de points noirs sur le limbe terminal des secondes, & quelques lignes transverses de cette couleur à la base des premières. Celles-ci ont en outre le sommet noir, avec deux litures bleuâtres.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-bleuâtre, avec des points & des traits noirs. Le corps est jaune de part & d'autre, avec la poitrine blanche. Les antennes sont noires.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le bord postérieur des secondes ailes noir en dessous.

De Surinam.

57. ERYCINE Eupolémie.

ERYCINA Eupolemia.

Eryc. alis integris, supra rufis, subtus cœruleiscentibus, utrinque strigis nigris punctato-interratis.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu défectueux. Il n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un roux-vif en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, & elles ont de part & d'autre six lignes transverses de points noirs, dont les extérieurs arrondis, les autres plus ou moins allongés.

De l'Amérique.

58. ERYCINE Ptolomée.

ERYCINA Ptolomæus.

Eryc. alis integris, supra ferrugineis, nigro maculatis, nervorum extimo plumbeo: subtus (mas) violaceis, (fem.) rufis, basi cœruleiscentibus.

Hesperia R. Ptolomæus, *alis integerrimis, ferrugineis, fusco strigosis: subtus cœruleis, basi pallidioribus.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 519. n°. 209. (Le mâle.)

Papilio Ptolomæus. JON. Fig. piçt. 6. tab. 56. fig. 3.

Hesperia R. Lucius, *alis integerrimis, subconcoloribus, fulvis, nigro undatis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 520. n°. 211. (La femelle.)

Papilio Lucius. JON. Fig. piçt. 6. tab. 59. fig. 1.

Fabricius a donné le mâle sous le nom de *Ptolomæus*, & la femelle sous celui de *Lucius*. Mais on aura souvent occasion de remarquer qu'il s'appare presque toujours les deux sexes lorsqu'ils différencient l'un de l'autre.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un ferrugineux-pourpre dans le mâle, d'un ferrugineux-faive dans la femelle, avec des taches noires, dont les postérieures marginales & en forme de points. Outre cela (ce que ne dit pas Fabricius), l'extrémité des nervures est couleur de mine de plomb.

Le dessous du mâle est d'un violet-luisant, le dessous de la femelle ferrugineux, avec des taches noires comme en dessus, & la base des quatre ailes d'un bleu-cendré-pâle.

Du Brésil.

59. ERYCINE Azora.

ERYCINA Azora.

Eryc. alis integris, fulvis, utrinque nigro punctatis: omnium supra margine anteriori fusco, posteriori strigis duabus plumbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il est petit. Ses ailes ont le dessus fauve, ponctué de noir, avec la côte d'un brun-obscur & le bord postérieur longé par deux lignes mine de plomb. Le brun de la côte des premières ailes se courbe vis-à-vis du sommet & descend en manière de bande jusqu'à l'angle interne.

Le dessous des quatre ailes est d'un fauve à reflet purpurin, avec des points noirs correspondant à ceux du dessus, mais cependant peu prononcés à l'extrémité des ailes supérieures. Les antennes sont brunes & annelées de blanc.

Du Brésil.

40. ERYCINE GYNCA.

ERYCINA GYNCA.

Eryc. alis integris, supra fuscis, subtus ferrugineis: utriusque strigis nigris, punctato interruptis, duabusque limbi postici plumbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il est petit. Ses ailes sont brunes en dessus, ferrugineuses en dessous, & elles ont de part & d'autre quatre lignes transverses de points noirs, plus deux lignes marginales couleur de mine de plomb. La frange du bord postérieur est entrecoupée de gris, & ce bord est ferrugineux en dessus.

Du Brésil.

41. ERYCINE AVIUS.

ERYCINA AVIUS.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuscis, strigis obscurioribus duabusque limbi posticis cæruleis.

Papilio P. R. AVIUS, alis integris, concoloribus, fuscis, strigis duabus apicis cæruleis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n. 701.*

Hesperia R. AVIUS. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 301. n. 142.*

Papilio Avius. HERBST, *Pap. tab. 317. fig. 9.*

Papilio Anius. CRAM. *pl. 92. fig. B.*

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec cinq lignes transverses plus foncées. Il y a en outre le long du bord postérieur deux lignes d'un bleu-verdâtre.

Le dessous ne diffère du dessus que parce qu'il a un reflet pourpré.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Des Indes occidentales.

42. ERYCINE CLÉONE.

ERYCINA CLEONUS.

Eryc. alis integris, nigris, supra strigis duabus marginalibus, subtus univâ, plumbeis.

Papilio Cleonus. CRAM. *pl. 380. fig. H. 1.*

Papilio Cleonus. HERBST, *Pap. tab. 318. fig. 3.*

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec deux lignes mine de plomb, parallèles au bord postérieur, & renfermant une bande brune sur laquelle il y a une série de points noirs. Outre cela, la frange est blanche, mais entrecoupée de noir vers le sommet des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est d'un noir à reflet bleu, & longé parallèlement au bord postérieur par une ligne mine de plomb, laquelle est beau-

coup plus large aux premières ailes qu'aux secondes. Les antennes sont annelées de blanc & de noir.

Nous avons vu un individu un peu plus grand & que nous soupçonnons être la femelle ou une variété de la femelle. Il se distingue des mâles que nous venons de décrire en ce que la bande brune du dessus est plus claire vis-à-vis du sommet des ailes supérieures, & ensuite nulle jusqu'à l'angle anal des inférieures. Une autre différence que nous devons aussi mentionner, c'est que la ligne mine de plomb du dessous n'est pas plus large aux premières ailes qu'aux secondes.

De la Guyane & du Brésil.

43. ERYCINE CLÉODORA.

ERYCINA CLEODORA.

Eryc. alis integris, nigris, supra strigis duabus marginalibus plumbeis, subtus nigro punctatis.

Elle a un demi-pouce de plus que l'Erycine Cléone, à laquelle elle ressemble en dessus.

Le dessous de ses ailes est glacé de bleu & punctué de noir. Les points de l'extrémité sont presque oculaires.

La femelle nous est inconnue.

Du Brésil.

44. ERYCINE ARGIOPE.

ERYCINA ARGIOPE.

Eryc. alis integris, nigris, supra aurato-viridi pulverulentis: subtus anticis maculâ bascos niaceâ.

Son envergure n'est guère que d'un pouce. Le dessus des ailes est noir & parsemé d'atomes d'un vert-doré, derrière lesquels les premières ailes offrent parallèlement à leur bord postérieur une ligne mine de plomb.

Le dessous est d'un noir-brun, avec une tache longitudinale d'un rouge cire d'Espagne près de la base des premières ailes. Le corps est sablé de vert comme le dessus des ailes.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Brésil.

45. ERYCINE DOMITIEN.

ERYCINA DOMITIANUS.

Eryc. alis integris, fuscis: anticis maculâ, posticis strigâ, viridibus: subtus brunneis, punctis strigâque marginali argenteis. FAB.

Hesperia R. Domitianus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 315. n. 193.*

Elle est petite. Toutes ses ailes sont obscures, avec le bord postérieur un peu brun. Les ailes supérieures ont sur le milieu une grande tache d'un vert-luisant, avant le brun du bord une rangée de

points noirs, & sur le bord même une ligne arquée. Les ailes inférieures ont avant le bord de derrière une ligne verte, & le long de ce bord une ligne argentée.

Le dessous des quatre ailes est brun, avec une multitude de points, & une ligne terminale, argentée.

De la Guadeloupe.

(Traduction de Fabricius.)

46. ERYCINE GÉMINUS.

ERYCINA Geminus.

Eryc. alis rotundatis, caeruleis, limbo atro strigâ caeruleâ: posticis subtus fusco-subfasciatis. FAB.

Hesperia R. Geminus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 322. n°. 220.

Papilio Geminus. JON. Fig. piç. 6. tab. 55. fig. 2.

Elle est de moyenne taille. Toutes les ailes sont arrondies, bleues, avec le limbe postérieur noir & longé par une ligne bleue. Outre cela, il y a au sommet des ailes supérieures une bande, & à la base des inférieures une tache, noires.

Le dessous des quatre ailes est bleu, avec une ligne sur les premières & leur extrémité, & plusieurs bandes sur les secondes, d'un brun-obscur.

De l'Amérique.

(Traduction de Fabricius.)

47. ERYCINE STILBÉ.

ERYCINA Stilbe.

Eryc. alis integris, concoloribus, fulvis, nigro punctatis, strigâ terminali argenteâ.

Elle est petite. Ses ailes sont fauves de part & d'autre, avec une multitude de points noirs, & une ligne argentée presque terminale. Cette ligne est continue en dessus, maculaire en dessous.

Du Brésil.

48. ERYCINE HISBON.

ERYCINA Hisbon.

Eryc. alis integris, fusco-nigris, utrinquè fasciis tribus ochraceis: omnibus supra lineâ terminali plumbeâ.

Papilio P. R. Hisbon, alis integerrimis, atris, fasciis tribus stavefcntibus: posticâ abbreviatâ. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 83. n°. 748.

Hesperia R. Hisbon. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 318. n°. 206.

Papilio Hisbon. CRAM. pl. 83. fig. C.

Papilio Hisbon. HERBST, Pap. tab. 521. fig. I.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun de part & d'autre, avec trois bandes communes d'un jaune d'ocre. Outre cela, le bord postérieur est longé en dessus par une ligne couleur de plomb.

Quelquefois les deux bandes extrêmes sont moins apparentes en dessus qu'en dessous, notamment dans les mâles.

Du Brésil.

49. ERYCINE OURANUS.

ERYCINA Ouranus.

Eryc. alis integerrimis, utrinquè fasciâ albâ apicibus raris: posticis supra lineâ terminali plumbeâ.

Hesperia R. Ouranus, alis integerrimis, concoloribus, atris, fasciâ communi albâ, maculâ sanguineâ terminatâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 317. n°. 290.

Papilio Ouranus. CRAM. pl. 355. fig. C.

Papilio Ouranus. HERBST, Pap. tab. 319. fig. 10.

Papilio Ouranus. JON. Fig. piç. 6. tab. 55. fig. 4.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, & elles ont le milieu traversé par une bande blanche ou jaunâtre dont les extrémités sont fauves. Cette bande est coudeé & dilatée aux premières ailes, tandis qu'elle est presque droite & linéaire aux secondes. Outre cela, le dessus des secondes ailes offre, avant la frange, une ligne couleur de mine de plomb.

De la Guyane & du Brésil.

50. ERYCINE PHILLONE.

ERYCINA Phillone.

Eryc. alis integris, fulvis, fasciis duabus albis strigâque intermediâ fulvâ: omnibus basi annulatis.

Papilio Philiasus. CRAM. pl. 192. fig. A. B.

CLERCK, Icon. tab. 41. fig. 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec deux bandes blanches, communes, dont l'antérieure discoïdale, plus large, & séparée de la postérieure par une ligne fauve arquée. Le bord terminal, dont la frange est entrecoupée de blanc, offre une ligne blanche finuée, & il y a près de la base de chaque aile quelques anneaux cendrés parmi lesquels on distingue quelques taches fauves.

Le dessous ressemble au dessus, mais la bande blanche de l'extrémité des secondes ailes se cou-

fond avec la ligne marginale, & elle est chargée d'un rang de points noirs, dont le second & l'aual beaucoup plus gros.

De la Guyane & du Brésil.

51. ERYCINE Lyfimon.

ERYCINA Lyfimon.

Eryc. alis repandis, fuscis, fasciâ albâ, communi, mediâ: omnium limbo postico strigâ fulvâ annulifque cœrulefcentibus.

Papilio Lyfimon. STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAM. pl. 39. fig. 1 & 1 A.

Elle n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes sont brunes, avec une bande blanche, discoidale, étroite, se terminant en pointe vers le sommet des supérieures. Parallèlement à cette bande, le limbe postérieur de toutes les ailes offre une ligne fauve, puis un rang d'anneaux bleuâtres. Il y a aussi de pareils anneaux sur la côte des ailes de devant.

Le dessous ressemble au dessus, seulement la ligne fauve est plus pâle, & les anneaux du limbe renferment chacun un point noir.

Cette description, faite d'après plusieurs individus, prouve que le Lyfimon a tous les caractères du *Lamis*, mais qu'il est toujours plus petit, & que le brun domine sur ses ailes de manière à n'y laisser qu'une bande blanche étroite.

De Surinam.

52. ERYCINE *Lamis*.

ERYCINA Lamis.

Eryc. alis repandis, niveis, margine omni exteriori fusco cœrulefcentique annulato: postico fasciâ fulvâ.

Papilio P. R. Lamis, alis integris, fuscis, fasciâ communi abbreviatâ albâ fulvâque. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 78. n. 714.*

Hesperia R. Lamis. FAB. *Ent. Syst. em. toni. 3. pars 1. p. 305. n. 157.*

Papilio Lamis. CRAM. pl. 355. fig. F. G.

Papilio Lamis. HERBST, *Pap. tab. 319. fig. 4. 5.*

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Ses ailes sont très-blanches, avec la côte des premières & le limbe postérieur des quatre bruns & annelés de bleu-cendré. Le limbe postérieur offre en outre une bande fauve, placée avant les anneaux, & il a la frange entrecoupée de blanc.

Le dessous ressemble au dessus, mais les anneaux sont blancs, & ceux du limbe postérieur renferment chacun un point noir. L'abdomen est tout blanc dans le mâle, brun en dessous dans la femelle.

De la Guyane & du Brésil.

55. ERYCINE du Figuier.

ERYCINA Caricæ.

Eryc. alis repandis, niveis, margine omni exteriori fusco cœrulefcentique annulato: antico maculis, postico fusciâ fulvis.

Papilio P. R. Caricæ, alis integerrimis, fulvis, disco communi albo, limbo cinereo ocellato. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 792. n. 244.* — *Mus. Lud. Ultr. 524.*

CLERCK, *Icon. tab. 20. fig. 2.*

MERTAN, *Surin. Inf. tab. 40.*

Papilio Caricæ. CRAM. pl. 170. fig. E.

Papilio Caricæ. HERBST, *Pap. 319. fig. 1.*

Papilio P. R. Caricæ, alis integerrimis, fuscis, disco communi albo, limbo cinereo subocellato. FAB. *Syst. Ent. p. 526. n. 352.* — *Mant. Inf. toni. 2. p. 78. n. 712.*

Hesperia R. Caricæ. FAB. *Ent. Syst. em. toni. 3. pars 1. p. 305. n. 155.*

Elle a de très-grands rapports avec l'Erycine *Lamis*; mais elle est constamment plus petite, & la côte de ses premières ailes offre de part & d'autre un rang de quatre taches fauves.

On la trouve dans l'Amérique méridionale, sur le figuier.

54. ERYCINE Péllops.

ERYCINA Pelops.

Eryc. alis repandis, flavescensibus, margine omni exteriori fusco fusciâ fulvâ nigro punctatâ.

Papilio Pelops. CRAM. pl. 170. fig. F.

Papilio Pelops. HERBST, *Pap. tab. 319. fig. 2.*

Papilio P. R. Pelops, alis integris albis, limbo communi fusco maculis strigâque postica fulvis. FAB. *Mant. Inf. toni. 2. p. 78. n. 713.*

Hesperia R. Pelops. FAB. *Ent. Syst. em. toni. 3. pars 1. p. 305. n. 156.*

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un jaune-pâle, avec tout le contour extérieur brun, & chargé d'une bande fauve sur laquelle il y a une rangée de points noirs. La frange est outre cela entrecoupée de blanc.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que la bande fauve du limbe est moins apparente. L'abdomen a le dessus blanc dans le mâle, brun dans la femelle.

De la Guyane.

55. ERYCINE Cachrys.

ERYCINA Cachrys.

Eryc. alis repandis, flavescensibus, margine

omni exteriore nigro : postico frigida cœrulescente, angulati.

Papilio P. R. Cachrus, alis integris, flavescens, limbo communi fusco, albo maculato. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 78. n. 715.*

Hesperia R. Cachrys. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 306. n. 158.*

Papilio Damon. STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 59. fig. 5 & 5 D.*

L'*Hespérie Cachrys* de Fabricius se rapporte incontestablement au *Papillon Damon* de Stoll.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un jaune-pâle, avec la côte des premières, & le limbe postérieur des quatre, d'un noir-brun. Le limbe postérieur est entièrement divisé par deux lignes bleuâtres, dont l'intérieure est feston, l'extérieure arquée. Outre cela, la frange des premières ailes est entrecoupée de blanc.

Le dessous ressemble au dessus; mais le limbe postérieur de toutes les ailes offre trois taches blanches entre les deux lignes dont nous venons de parler, & il y a quelques anneaux blanchâtres sur la côte des ailes de devant.

Nous avons vu une variété qui n'avoit pas de noir au milieu de la côte des premières ailes, & dont le limbe terminal des quatre étoit tacheté de blanc en dessus comme en dessous.

De la Guyane & du Brésil.

56. ERYCINE Ménalcus.

ERYCINA Menalcus.

Eryc. alis integris, concoloribus, flavescens, margine omni exteriore nigro : postico fimbriatâ nigâ.

Papilio Menalcus. CRAM. *pl. 590. fig. K.*

Papilio Menalcus. HERBST, *Pap. tab. 319. fig. 3.*

Elle a de grands rapports avec l'*Erycine Cachrys*; mais ses ailes sont très-entières, semblables de part & d'autre, & leur bord postérieur a une frange rouille.

De Surinam.

Nota. Il faudroit avoir vu plusieurs individus, & connoître la chenille, pour décider si c'est une espèce distincte ou bien simplement une variété de l'*Erycine Cachrys*.

57. ERYCINE Anapis.

ERYCINA Anapis.

Eryc. alis integris, fuscescentibus, utrinque frigida mediâ saturatorâ : posticarum limbo postico supra lineâ angulatâ flavida.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes sont d'un brun-pâle de part & d'autre, & traversées un peu au-delà de leur milieu par une ligne obscure, légèrement flexueuse. Outre cela, le bord postérieur des secondes ailes est précédé en dessus d'une ligne jaunâtre en feston. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes & annelées de blanchâtre.

La femelle nous est inconnue.

Du Brésil.

58. ERYCINE Odites.

ERYCINA Odites.

Eryc. alis integris, subconcoloribus, umbrinis, annulis baseos, fascia mediâ strigata posticâ albis.

Papilio Odites. CRAM. *pl. 11. fig. E. F.*

Papilio Odites. HERBST, *Pap. tab. 325. fig. 8. 9.*

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est couleur de terre d'ombre, avec une bande blanche, discoïdale, anguleuse, s'élargissant sur les inférieures, & suivie d'une ligne blanchâtre parallèle au bord postérieur, lequel a une frange entrecoupée de blanc-vif. Outre cela, la base des premières ailes a quelques anneaux blanchâtres.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que la base des quatre ailes est d'un ton verdâtre.

Le mâle nous est inconnu, & nous n'avons vu qu'une seule femelle.

De Surinam.

59. ERYCINE Tytius.

ERYCINA Tytius.

Eryc. alis integris, supra ferrugineis aut fuscis, subtus pallidioribus, omnium basi posticarumque limbo punctis ocellaribus nigris.

Papilio F. Tytius, alis integerrimis, fuscis, albo maculatis : anticis punctis ocellaribus atris. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 54. n. 240. — Mant. Inf. tom. 2. p. 27. n. 278. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 48. n. 127. (La femelle.)*

Papilio Tytia. CRAM. *Pl. 121. fig. C. D.*

Papilio Tytia. HERBST, *Pap. 145. fig. 5. 6.*

Nous avons, mais à tort, placé cette espèce parmi les *Nymphales* (p. 426, n. 240); & comme la description que nous en avons donnée est inexacte, nous en oisons ici une nouvelle.

Son envergure est d'un peu plus d'un pouce & demi. Le dessus du mâle est ferrugineux, le dessus de la femelle d'un brun-obscur, avec des points noirs presqu'oculaires à la base des quatre ailes & le long du bord terminal des inférieures.

Le-dessous des deux sexes est plus pâle que le dessus.

dessus, & les points oculaires dont nous venons de parler ont l'iris blanchâtre.

Dans les femelles, le dessus de toutes les ailes offre sur le milieu une bande blanchâtre, interrompue & plus ou moins apparente.

On voit des individus de l'un & de l'autre sexe qui ont, entre les points de la base & du bord postérieur des secondes ailes, une double ligne maculaire, tantôt brune, tantôt blanchâtre.

De Surinam.

60. ERYCINE Tutana.

ERYCINA Tutana.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuscis, apice dilatate; posticis strigâ marginali è punctis ocellaribus nigris.

Nous ne connoissons ce Lépidoptère que par un individu femelle, appartenant à M. le duc de Rivoli.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont la moitié antérieure d'un brun-obscur, la moitié postérieure plus claire, avec une rangée de points noirs ocellés le long du bord terminal des inférieures.

Le dessous est, à une légère nuance près, semblable au dessus.

Du Brésil.

61. ERYCINE Soronus.

ERYCINA Soronus.

Nous l'avons décrite comme Nymphale (p. 426, n. 241); mais elle doit être rapportée ici.

62. ERYCINE Phylacis.

ERYCINA Phylacis.

Nous l'avons donnée comme Nymphale (p. 426, n. 242); mais c'est ici qu'il faut la mettre.

63. ERYCINE Epigia.

ERYCINA Epigia.

Nous l'avons mise parmi les Nymphales (p. 426, n. 245); mais c'est ici qu'elle doit être.

64. ERYCINE Emylius.

ERYCINA Emylius.

Eryc. alis integris, supra fuscis; anticis fusciâ mediâ ex albedo-nigâ, posticis punctis marginalibus ocellatis; subtus omnibus flavescens, nigro punctatis.

Papilio P. R. Emylius, alis integerrimis, nigris, albo punctatis; anticis fusciâ strigâ: omnibus subtus variegatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 76. n. 711.*

Hist. Nat. Inf. Tom. LX.

Hesperia R. Emylius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 505. n. 154.*

Papilio Emylius. GRAM. *pl. 66. fig. G. II.*

Papilio Emylius. HERBST, *tab. 318. fig. 9. 10.*

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est brun, avec deux taches fauves à la base, & une rangée de points noirs à l'iris cendré le long du bord postérieur. Le milieu des premières ailes offre en outre une bande oblique, d'un jaune-faive dans le mâle, d'un blanc-rouffâtre dans la femelle.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-sale, avec des points noirs à la base & au bord postérieur. Les points de la base sont beaucoup plus petits que les autres, & le sommet des ailes de devant est brun.

De la Guyane & du Brésil.

65. ERYCINE Manthus.

ERYCINA Manthus.

Eryc. alis integris, nigris, fusciâ mediâ albâ, annulis atomisque marginalibus cyaneis.

Papilio P. R. Mantus, alis oblongis, integerrimis, caeruleo fuscoque variis, fusciâ communi albâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 78. n. 717.*

Hesperia R. Mantus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 506. n. 161.*

Papilio Manthus. GRAM. *pl. 47. fig. F. G.*

Papilio Mantus. HERBST, *tab. 317. fig. 1. 2.*

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec des anneaux & des atomes d'un bleu-azuré-luisant sur tout le pourtour extérieur des premières & sur le bord terminal des secondes. Le milieu des quatre ailes est traversé par une bande blanche, derrière laquelle les inférieures ont deux points fauves avoisinant le bord interne.

Le dessous offre le même dessin que le dessus, mais le fond & toutes les parties bleues sont beaucoup plus pâles.

De la Guyane & du Brésil, & non de l'Afrique équinoxiale, comme le dit Fabricius.

66. ERYCINE Damis.

ERYCINA Damis.

Eryc. alis integris, nigris, disco communi albo; anticis utrinque, posticis subtus fusciâ marginali nitidâ cyaneâ.

Papilio Damis. GRAM. *pl. 70. fig. E. F.* (Le mâle.)

Papilio Damis. HERBST, *Pap. tab. 321. fig. 10. 11.*

SÉBA, *Mus. tom. 4. tab. 25. fig. 5. 6. 12. 13.*

Dddd

SÉBA, *Muf. tom. 4. tab. 37. fig. 5. 6.*

Nous ne connoissons que le mâle. Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de toutes ses ailes est noir, avec un espace blanc, commun & difcoïdal. Outre cela, les premières ailes ont une bande bleue, luisante, suivant tout le contour extérieur depuis la base jusqu'à l'angle interne.

Le dessous des premières ailes ressemble tout-à-fait au dessus.

Le dessous des secondes ailes est aussi semblable au dessus; mais on y voit deux bandes bleues, luisantes & transverses, dont l'antérieure basilaire, la postérieure marginale, divisée par les nervures & chargée d'un rang de six gros points noirs. La frange de chaque aile est entrecoupée de blanc.

Pris dans l'île Rawak (terre des Papous), par MM. Quoy & Gaimard, médecins de l'expédition de M. le capitaine Freycinet.

Nota. Cramer avoit d'abord dit que ce papillon étoit des Indes occidentales; mais il ajoute ensuite par correction qu'il se trouve dans l'île d'Amboine; ce qui est très-probable, car il n'y a que cent lieues d'Amboine à l'île Rawak. Il résulte de là que l'Amérique n'est pas, comme on le croyoit, la seule partie du Globe qui possède des *Erycines*. La forme de la cellule difcoïdale des ailes inférieures & celle des deux pattes antérieures ne nous permettent pas du moins de douter que le *DAMIS* ne soit une *Erycine*.

67. ERYCINE BÉLISE.

ERYCINA Belise.

Eryc. alis integris, nigris, fuscis communi albâ, suprâ caruleo innatâ, subtis annulo fulvo cinctâ.

Papilio Belise. CRAM. *pl. 376. fig. E. F.*

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande blanche, largement environnée de bleu-pâle. Cette bande traverse entièrement les secondes ailes, & elle va en se rétrécissant expirer au milieu des premières, non loin d'une liture blanche, plus ou moins prononcée.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec une bande semblable à celle du dessus, mais renfermée dans un anneau fauve que borde extérieurement une double ligne blanche, maculaire. Outre cela, la base des premières ailes offre deux lignes longitudinales, dont la supérieure blanche, l'inférieure fauve. Le corps est blanc, avec tout le corselet & la base de l'abdomen noirs.

De la Guyane & du Brésil.

68. ERYCINE ARTHÉMON.

ERYCINA Arthemion.

Eryc. alis integris, albis: anticis margine

exteriori nigro, caruleo alboque maculato.

Papilio P. R. Arthemion, alis integerrimis, subsuscis, disco communi albo, fuscis dimidiatâ fuscâ. LAMN. *Syst. 2. p. 792. n. 245. — Mus. Lud. Ulr. 325.*

Papilio P. R. Arthemion. FAB. *Syst. Ent. p. 523. n. 562. — Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 747.*

Hesperia R. Arthemion. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 318. n. 204.*

Papilio Arthemion. CLERCK, *Icon. tab. 37. fig. 2.*

Papilio Arthemion, var. CLERCK, *Icon. tab. 46. fig. 3.*

SÉBA, *Muf. 4. tab. 27. fig. 25. 26.*

Hesperia R. Coenus, alis integerrimis, albis: anticis margine exteriori fusco, albo maculato. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 308. n. 169.*

Papilio Coenus. JOS. *Fig. piâ. 6. tab. 55. fig. 2.*

Le papillon *Coenus* de Fabricius & le papillon *Arthemion* de Linné ne forment qu'une seule espèce, dont le premier est le mâle, le second la femelle.

Elle a depuis un pouce jusqu'à un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont blanches en dessus, avec tout le pourtour extérieur des premières d'un noir-brun, & marqué de trois taches blanches qu'accompagne une tache bleu-luisante, placée longitudinalement à l'origine de la côte. Dans la femelle, les secondes ailes sont en outre terminées par une bande noire, & l'on voit près de leur base une ligne oblique de cette couleur. Les secondes ailes du mâle ont quelquefois un liséré noir, mais il ne descend pas jusqu'à l'angle de l'anus.

Le dessous des deux sexes ne diffère du dessus que parce que la bordure noire est variée de ferrugineux & de bleu-luisant, & parce qu'il y a une ligne ferrugineuse à la base des secondes ailes. Cette ligne est ordinairement double dans les femelles, attendu qu'elles ont en dessus une ligne noire oblique.

Du Brésil.

69. ERYCINE ICARE.

ERYCINA Icarus.

Eryc. alis integris, suprâ albis, strigis quinque fuscis: subtis fuscis, fuscis albis, posticâ nigro punctatâ.

Papilio P. R. Icarus, alis integris, suprâ albis, fuscis fuscis: subtis fuscis albis nigrisque alternis. FAB. *Mant. inf. tom. 2. p. 77. n. 705.*

Hesperia R. Icarus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 502. n°. 146.

Papilio Philemon. CRAM. pl. 22. fig. G. H.

Papilio Philemon. HERBST, Pap. tab. 518. fig. 5. 6.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est blanc, avec cinq lignes brunes, transverses, dont une tout-à-fait terminale.

Le dessous est brun, avec quatre bandes blanches communes, dont la postérieure adossée à un rang de points noirs. Entre la première & la deuxième bande, chaque aile a en outre un point noir, qui se reproduit quelquefois en dessus, surtout dans le mâle.

De la Guyane & du Brésil.

70. ERYCINE Thafus.

ERYCINA Thafus.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, utrinque strigis pallidioribus margineque postico albo punctato.

Papilio Thafus. CRAM. pl. 555. fig. 1.

Papilio Thafus. HERBST, Pap. tab. 522. fig. 7.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec six lignes transverses plus claires, & une rangée terminale de points blancs.

Le dessous est comme le dessus, excepté que les points blancs y sont plus petits.

De Surinam.

71. ERYCINE Aëtoris.

ERYCINA Aëtoris.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, utrinque maculis ocellaribus albis, numerosis.

Papilio P. R. Aëtoris, alis integerrimis, concoloribus, fuscis, albo punctatis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n°. 742.

Hesperia R. Aëtoris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 316. n°. 196.

Papilio Aëtoris. CRAM. pl. 95. fig. D.

Papilio Aëtoris. HERBST, Pap. tab. 520. fig. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un brun-sombre, avec une multitude de petites taches blanches, bordées de noir.

Le dessous ressemble au dessus, mais le fond est plus clair, & les taches blanches sont plus grandes.

De Surinam.

72. ERYCINE Ifala.

ERYCINA Ifala.

Eryc. alis integris, supra fuscis, subtus albis, utrinque punctis ocellaribus nigris.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est brun, avec des points noirs, plus ou moins cerclés de ferrugineux, à la base & le long du bord postérieur. Le sommet des premières ailes est en outre ferrugineux.

Le dessous des quatre ailes est blanc, avec des points noirs correspondans à ceux du dessus & cerclés de bleuâtre. Les points de la base sont séparés de ceux du bord postérieur par deux lignes brunes, transverses & un peu flexueuses.

De l'Amérique méridionale.

75. ERYCINE Therfandra.

ERYCINA Therfandra.

Eryc. alis integris, fuscis, maris caeruleo, feminae griseo pulverulentis: omnibus utrinque maculis ocellaribus ferrugineis.

Papilio Therfander. CRAM. pl. 555. fig. A. B. (Le mâle.)

Papilio Therfander. HERBST, Pap. tab. 519. fig. 8. 9. (Le mâle.)

Cramer n'a connu que le mâle de cette espèce.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est brun, saupoudré de bleu dans le mâle, de gris dans la femelle, avec trois rangées transverses de taches ferrugineuses dont le milieu est noir. Les taches de la rangée postérieure sont en outre bordées de bleuâtre ou de blanchâtre à leur côté interne, & l'on voit quelques points blancs vis-à-vis du sommet des premières ailes.

Le dessous des deux sexes ressemble au dessus, mais il est plus pâle. Le corps est brun & les antennes font annelées de blanc.

De la Guyane & du Brésil.

74. ERYCINE Cénéus.

ERYCINA Ceneus.

Eryc. alis integris, supra nigris, undis caeruleis: subtus cineris, maculis albis nigro marginatis.

Papilio P. R. Ceneus, alis integris, atris, caeruleo undatis, margine albo punctato. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n°. 705.

Hesperia R. Ceneus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 502. n°. 144.

Papilio Ceneus. CRAM. pl. 156. fig. F.

Papilio Ceneus. HERBST, Pap. tab. 518. fig. 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun, avec des ondes d'un bleu-luisant. Il y a en outre quelques

points blancs vis-à-vis du sommet des ailes supérieures.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches blanches, bordées de noir. La frange est inégalement entrecoupée de blanc de part & d'autre.

De la Guyane & du Brésil.

75. ERYCINE *Æmulius*.

ERYCINA Æmulius.

Eryc. alis integerrimis, cinereis, fusco alboque maculatis: posticis supra pallidis: subtis omnibus fusco punctatis. FAB.

Hefferia R. *Æmulus*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 522. n^o. 19.*

Papilio Æmulius. JON. *Fig. pict. 6. tab. 40. fig. 4.*

Elle est de moyenne taille. Les ailes supérieures ont le dessus cendré, avec quelques petites lignes blanches, transversales, & des taches brunes, oblongues. Leur dessous est plus obscur que le dessus, avec des taches brunes, dont quelques-unes entourées d'un anneau blanc.

Les ailes inférieures sont pâles, avec la base cendrée, & des lignes blanches. Leur dessous est très-blanc, avec plusieurs points bruns à la base, & deux semblables à l'extrémité.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

76. ERYCINE *Epone*.

ERYCINA Epone.

Eryc. alis integris, fuscis, albo fulvoque punctatis: posticis utrinque areâ difci albâ.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessous des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une multitude de points blancs épars, & quelques poils fauves postérieurs. Le milieu des secondes ailes offre en outre un espace blanc, en forme de bande transverse dans la femelle, mais descendant dans le mâle jusqu'à l'angle de l'aube où il y a trois points noirs visibles de part & d'autre.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-pâle, tacheté de blanc & d'un peu de fauve.

Du Brésil.

77. ERYCINE *Tarquinus*.

ERYCINA Tarquinus.

Eryc. alis integerrimis, nigris: anticis maculâ oblongâ bascos sinuato; posticis angulâ ani flavo, nigro maculato. FAB.

Hefferia R. *Tarquinus*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 519. n^o. 207.*

Papilio Tarquinus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 45. fig. 4.*

Ses ailes supérieures sont noires, & elles présentent à la base une tache jaune, oblongue, trilobée en arrière, divisée en avant par une ligne noire.

Les ailes inférieures sont noires, avec l'angle anal largement jaune & marqué de cinq points noirs.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec une multitude de taches roussâtres, cerclées de blanc. Outre cela, le disque des ailes supérieures est jaune & tacheté de noir.

Des Indes occidentales.

(Traduction de Fabricius.)

78. ERYCINE *Pentheus*.

ERYCINA Pentheus.

Eryc. alis integris, ferrugineis, maculis nigris supra simplicibus, subtis ocellatis: posticis (mas) dimidio apicali albo.

Papilio P. R. *Pentheus, alis integris, fulvis, nigro maculatis: posticis apice albis nigro punctatis.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n^o. 754.* (Le mâle.)

Hefferia R. *Pentheus*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 514. n^o. 186.* (Le mâle.)

Papilio Penthea. CRAM. *pl. 145. fig. E.* (Le mâle.)

Papilio Penthea. HERBST, *tab. 327. fig. 9.* (Le mâle.)

Son envergure est d'environ un pouce & demi. La femelle, que les auteurs n'ont point connue, est entièrement ferrugineuse en dessus, avec une multitude de petites taches noires vers la base des quatre ailes, & une suite d'anneaux d'un blanc-bleuâtre le long du bord postérieur. En dessous, l'on retrouve les mêmes caractères qu'en dessus, mais les taches noires y sont pour la plupart cerclées de blanchâtre, & tout le bord interne des secondes ailes est de cette dernière couleur.

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il a la moitié postérieure des secondes ailes blanche de part & d'autre, avec quelques points noirs marginaux. Son abdomen est d'ailleurs blanchâtre, tandis que celui de la femelle est ferrugineux.

De la Guyane & du Brésil.

79. ERYCINE *Aristus*.

ERYCINA Aristus.

Eryc. alis integris, fuscis, utrinque carulefcenti annulatis: posticis (mas) dimidio apicali albo.

Papilio Ariflus. STOLL, *Pap. Suppl.* à GRAM. pl. 39. fig. 4 & 4 C. (La femelle.)

Son envergure est à peu près d'un pouce & demi. Le mâle a les premières ailes & la moitié antérieure des secondes brunes, avec des taches noires, encadrées de violet en dessus, de bleu-pâle en dessous. La moitié postérieure de ses secondes ailes est blanche de part & d'autre, avec cinq à six points marginaux. Son abdomen est blanc.

Dans la femelle, l'abdomen est brun, & la moitié postérieure des secondes ailes n'est blanche qu'en dessous, encore est-elle traversée par une bande brune qui précède les points marginaux.

De la Guyane & du Brésil.

80. ERYCINE Philocles.

ERYCINA Philocles.

Eryc. alis integris, supra cœruleo-nigris : anticis utrinque ocello disci tripupillato, posticis dimidio apicali albo undatis.

Papilio P. R. Philocles, alis integerrimis, supra fuscis : subtis primoribus ocello, posticis lineis transversis undatis. FAB. *Syst. Nat.* 2. p. 791. n°. 240. — *Mus. Lud. Ultr.* p. 521.

CLERCK, *Icon. tab.* 45. fig. 5. 6.

Papilio D. F. Philocles, alis integerrimis, fuscis : anticis ocello tripupillato, posticis lineis transversis undatis. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 64. n°. 285. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 31. n°. 329.

Papilio S. Philocles. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 215. n°. 674.

Papilio Philocles. GRAM. pl. 184. fig. D. E. F.

Papilio Philocles. HERBST, *Pap. tab.* 232. fig. 2. 3. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un noir-bleu, avec un oeil central à triple prunelle blanche, & séparé du sommet par une bande transverse d'un bleu-cendré.

Le dessus des secondes ailes a la moitié antérieure d'un noir-bleu & sans taches; la moitié postérieure blanche, avec des ovides & deux lignes marginales noires. Les deux lignes marginales sont ordinairement plus prononcées dans la femelle que dans le mâle.

Le dessous des deux sexes est brun, avec des lignes blanchâtres, transverses & ondulées. A l'œil du dessus des premières ailes correspond un oeil tripupillé & l'on en voit un à prunelle simple vers la base des secondes ailes.

Quelquefois les ailes supérieures ont un autre oeil plus petit, placé entre le premier & le bord interne.

De la Guyane & du Brésil.

81. ERYCINE Cræfus.

ERYCINA Cræfus.

Eryc. alis integris, concoloribus, cyaneis, strigis margineque nigris : anticis ocello disci tripupillato.

Papilio D. F. Cræfus, alis integerrimis, cyaneis, strigis atris, numerosis : anticis supra macula ocellari tripupillato. FAB. *Gen. Inf. Mant.* 259. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 64. n°. 286. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 31. n°. 331.

Papilio S. Cræfus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 216. n°. 676.

Papilio Capanea. GRAM. pl. 256. fig. D.

Papilio Capanea. HERBST, *Pap. tab.* 255. fig. 5. 4.

Quoique Fabricius ne rapporte ce lépidoptère à aucune figure, il n'y a pas de doute que ce ne soit le même que le papillon *Capanea* de Cramer & de Herbst.

Son envergure est d'environ deux pouces. Le dessus des ailes supérieures est d'un bleu-chatoyant, avec la base, quelques lignes transverses & le bord postérieur, noirs. Il y a en outre sur leur milieu un grand oeil noir à triple prunelle blanche ou bleuâtre.

Le dessus des secondes ailes est d'un bleu-chatoyant, avec plusieurs lignes transverses & le bord postérieur noirs.

Le dessous des quatre ailes est tantôt comme le dessus, & tantôt sans oeil central aux supérieures. De Surinam.

Nota. Nous n'avons vu que le mâle.

82. ERYCINE Ephynes.

ERYCINA Ephynes.

Eryc. alis integris, supra cœruleis, subtis flavidis, fuscis brunneis : anticis ocello disci tripupillato.

Papilio S. Ephynes, alis integerrimis, cœruleis, purpureo fuscatis : anticis utrinque ocello, inferiori tripupillato. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 68. n°. 508. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 54. n°. 538. — *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 224. n°. 703.

Papilio Ephyne. GRAM. pl. 39. fig. E. F.

Papilio Ephyne. HERBST, *Pap. tab.* 231. fig. 2. 3.

Nous ne connoissons que le mâle. Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est bleu, avec quatre lignes communes d'un brun-pourpre à l'exirmité.

Le dessous est jaunâtre, avec une multitude de lignes couleur de terre d'ombre. Outre cela, le milieu des premières ailes offre de part & d'autre un

grand œil noir ayant trois prunelles blanches, mais plus distinctes en dessous qu'en dessus.

De Surinam.

85. ERYCINE Euménus.

ERYCINA Eumenus.

Eryc. alis integris, dimidiato fuscis & cœruleis, apice strigis nigricantibus : anticis ocello disci tripupillato, posticis basæo cæco.

Papilio S. Eumenus, alis integerrimis, dimidiato fuscis : anticis utrinquè ocello tripupillato. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 68. n^o. 507. — Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n^o. 357. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 224. n^o. 702. (Le mâle.)

Papilio Eumene. CRAM. pl. 92. fig. F. G.

Papilio Eumene. HERBST, Pap. tab. 251. fig. 4. 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est brun vers la côte, bleu au bord interne, avec un œil noir tripupillé de blanc sur le milieu, & quatre lignes noirâtres transversales à l'extrémité.

Le dessus des secondes ailes est brun à la base, avec un œil noir sans prunelle; ensuite bleu jusqu'au bout, avec des lignes noirâtres faisant suite à celles des premières ailes.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, excepté qu'il est un peu plus pâle, & que le bleu des ailes supérieures s'étend jusqu'au sommet.

La femelle nous est inconnue.

Des Indes occidentales.

84. ERYCINE René.

ERYCINA Renatus.

Eryc. alis integris, fusco-nigris, fuscis communi albâ : anticis utrinquè ocello disci tripupillato, posticis subtus basæo cæco.

Papilio S. Renatus, alis integerrimis, concoloribus, nigris, fuscis communi albâ : anticis ocello tripupillato. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n^o. 350. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 216. n^o. 675.

Papilio Rosina. CRAM. pl. 526. fig. B.

Papilio Rosina. HERBST, Pap. tab. 252. fig. 6.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a au moins un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont obscures à la base, noires à l'extrémité, & traversées un peu au-delà du milieu par une bande blanche commune. Entre cette bande & leur origine, les premières ailes ont un œil noir à triple prunelle blanche.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que

les secondes ailes ont près de la base un petit œil noir sans prunelle.

De Surinam.

85. ERYCINE Ofinia.

ERYCINA Ofinia.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuscis, undis basæo pallidis, tunc fuscis communi albâ : anticis ocello disci tripupillato.

Papilio Ofinia. CRAM. pl. 115. fig. F.

Papilio Ofinia. HERBST, Pap. 252. fig. 1.

Papilio Thymetus. CRAM. pl. 184. fig. G. (Var. ?)

Papilio Thymetus. HERBST, Pap. tab. 252. fig. 5. (Var. ?)

Nous ne connoissons point la femelle de ce lépidoptère.

Le mâle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un brun-obscur de part & d'autre, avec des ondes pâles à la base, & une bande blanche commune sur le milieu. Outre cela, le disque des ailes supérieures offre un œil noir à triple prunelle blanche & à iris jaunâtre.

De Surinam.

Nota. Le papillon *Thymetus* de Cramer n'en seroit-il pas une variété? Il ne s'en distingue que parce qu'il a la bande blanche plus large. On le trouve aussi à Surinam.

86. ERYCINE Hyphéus.

ERYCINA Hypheus.

Eryc. alis integris, concoloribus, albis, fuscis tribus margineque fuscis : anticis ocello disci tripupillato.

Papilio S. Hypheus, alis integerrimis, concoloribus, albis, fusco fuscis : anticis ocello atro, posticis cæcis. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n^o. 505. — Mant. Inf. tom. 2. p. 54. n^o. 355. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 225. n^o. 698.

Papilio Hyphea. CRAM. pl. 92. fig. C.

Papilio Hyphea. HERBST, Pap. tab. 251. fig. 1.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes ses ailes sont blanches de part & d'autre, & elles ont entre le milieu & l'extrémité quatre bandes brunes, dont la dernière tout-à-fait terminale. Le centre des ailes supérieures offre en outre un œil noir à triple prunelle bleuâtre & à iris jaunâtre.

La femelle nous est inconnue.

Des Indes occidentales.

87. ERYCINE Tullius.

ERYCINA Tullius.

Eryc. alis integerrimis, obscurâ-cineris : an-

ticis apice fuscis, utrinque ocello tripupillato.
FAB.

Papilio D. F. Tullius. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 34. n° 359.*

Papilio S. Tullius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 224. n° 704.*

Elle est petite. Les premières ailes, dont l'une des deux ressemble au dessus, font d'un cendré-obscur, avec l'extrémité encore plus obscure & onnée de jaunâtre. Leur milieu offre un grand œil noir à triple prunelle bleuâtre.

Les secondes ailes sont obscures, avec des lignes d'un fauve-jaunâtre vers la base, & des lignes brunes transversales vers le bord postérieur.

De Cayenne.

(Traduction de Fabricius.)

88. ERYCINE Odice.

ERYCINA Odice.

Eryc. alis integris, cinerascens, strigis undatis apiceque fuscis: anticis utrinque ocello disci tripupillato.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont cendrées en dessus, avec une multitude de lignes brunes, transverses & ondulées. Les premières ailes, dont le sommet est largement obscur, ont sur le milieu un grand œil noir à triple prunelle blanche.

Le dessous ressemble au dessus, mais le fond est plus clair, & il y a un gros point noir vers le milieu du bord postérieur de chaque aile.

Du Brésil.

Nota. La femelle a le milieu du bord postérieur des secondes ailes un peu anguleux. Le mâle nous est inconnu.

89. ERYCINE Rhodia.

ERYCINA Rhodia.

Eryc. alis integris, supra nigricantibus apice diluore, subtus cinerascens, strigis tribus fuscis: anticis ocello disci tripupillato.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus des ailes est noirâtre, avec presque la moitié postérieure des premières & le bord terminal des secondes plus clairs.

Le dessous est d'un brun-cendré, avec trois lignes obscures, dont les deux antérieures ondulées, la postérieure courbe & plus large. Outre cela, le bord postérieur des quatre ailes est longé par une série de points noirâtres, & le milieu des premières offre un œil noir à triple prunelle blanche. Cet œil se voit aussi en dessus, mais il y est moins distinct, attendu l'intensité du fond.

Du Brésil.

Nota. Le milieu du bord postérieur des secondes ailes est un peu anguleux.

90. ERYCINE Tifis (1).

ERYCINA Tifis.

Eryc. alis integris, supra chalybdineis: subtus fuscis, strigis tribus umbrinis; anticis ocello disci tripupillato.

Papilio Titea. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 5. fig. 6 & 6 G.*

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est entièrement d'un bleu d'acier-foncé.

Leur dessous est d'un brun-obscur, avec trois lignes communes, couleur de terre d'ombre. Ces lignes sont précédées aux premières ailes d'un œil central, noir & tripupillé de blanc.

De Surinaam.

91. ERYCINE Ultric.

ERYCINA Ultricus.

Eryc. alis integris, supra caruleis, nitidis: subtus umbrinis, disci anticarum ocello tripupillato.

Papilio P. R. Ulicens, alis integris, caruleo nitidis: subtus basi brunneis; anticis ocello tripupillato. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n° 755.* (Le mâle.)

Hesperia R. Ultricus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 514. n° 187.* (Le mâle.)

Papilio Ultrica. CRAM. *pl. 100. fig. E. F.* (Le mâle.)

Papilio Ultricella. HERBST, *Pap. tab. 251. fig. 6. 7.*

Nous ne connoissons que le mâle, dont l'envergure est approchant d'un pouce & demi. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-chatoyant, sans taches.

Le dessous est couleur de terre d'ombre, avec l'extrémité plus pâle & traversée par une bande du même ton que se relie de la surface. Il y a en outre, au centre des ailes supérieures, un œil noir à triple prunelle blanche.

De Surinaam.

92. ERYCINE Lyfidice.

ERYCINA Lyfidice.

Eryc. alis integris, caruleis, supra limbo, subtus fuscis quinque atris: posticarum fuscis tercia punctis tribus argenteis.

Papilio N. Lyfidice, alis integerrimis, caruleis,

(1) Nous n'avons point adopté le nom de Stoll, parce qu'il y a une pierre appelée *Tuez*.

suprà limbo, subtùs fuscis atris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 156 n°. 480. (Le mâle.)

Papilio Lyfidice. GRAM. pl. 169. fig. C. D.

Papilio Lyfidice. HERBST, Pap. tab. 524. fig. 4. 5.

Nous ne connoissons que le mâle de cette espèce. Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-azuré, avec les nervures des supérieures & le bord terminal des quatre noirs.

Le dessous est à peu près du même bleu que le dessus, avec cinq bandes communes & le bord postérieur noirs. La troisième bande, à compter de la base, offre quatre points d'un blanc-argenté, savoir : un aux premières ailes, & trois aux secondes.

De Surinam.

95. ERYCINE Archimède.

ERYCINA Archimedes.

Eryc. alis integerrimis, nigris, disco cæruleo : subtùs fuscis, immaculatis. FAB.

Hesperia R. Archimedes. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 520. n°. 210.

Papilio Archimedes. JON. Fig. piél. 6. tab. 56. fig. 4.

Elle a le port du *Ptolomée*. Le dessus de ses quatre ailes est noir, avec le milieu bleu. Leur dessous est d'un brun-obscur & sans taches.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

94. ERYCINE Virgile.

ERYCINA Virgilius.

Eryc. alis integerrimis, nigris, margine tenuiori cæruleo : subtùs griseis, posticis lunulis tribus albidis puncto atro. FAB.

Hesperia R. Virgilius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 525. n°. 226.

Papilio Virgilius. JON. Fig. piél. 6. tab. 57. fig. 5.

Elle est de moyenne taille. Le dessus de ses quatre ailes est d'un noir-brun, avec le bord interne bleu, & marqué d'une tache noire aux premières, de plusieurs points de cette couleur aux secondes.

Le dessous des ailes supérieures est gris, sans taches. Le dessous des ailes inférieures est également gris, avec trois points noirs, embrassés par une lunule blanche & situés vers le bord postérieur.

Des Indes occidentales.

(Traduction de Fabricius.)

95. ERYCINE Hiriá.

ERYCINA Hiriá.

Eryc. alis integris, suprà cæruleo-nigris, subtùs cinerulentibus fuscoque punctatis : omnibus utrinquè maculis tribus hyalino-albis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un noir-bleu-luisant, le dessous cendré & ponctué de noir, avec la frange entrecoupée de blanc. Il y a en outre vers le milieu de chaque aile trois taches blanches, inégales & transparentes. Les taches des ailes supérieures sont éparfes, celles des ailes inférieures sont contiguës. Les antennes sont noires, & annelées de blanc depuis la base jusqu'à la massue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du Brésil.

96. ERYCINE Mifène.

ERYCINA Mifenes.

Eryc. alis integris, suprà fuscis, anticarum puncto costali albo : subtùs cærulefcentibus, fusco maculatis.

Papilio Mifenes. GRAM. pl. 117. fig. D.

Papilio Mifenes. HERBST, Pap. tab. 520. fig. 5.

Elle est petite. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec un point blanc près de la côte des supérieures. Le dessous est d'un bleu-pâle, avec des taches brunes.

De la Guyane.

97. ERYCINE Abaris.

ERYCINA Abaris.

Eryc. alis integris, subconcoloribus, fuscis nigro punctatis, limbo postico rufo : anticis maculis tribus flavis.

Papilio Abaris. GRAM. pl. 93. fig. C.

Papilio Abaris. HERBST, Pap. tab. 520. fig. 5.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est brun & ponctué de noir, avec le limbe postérieur roux. Outre cela, les premières ailes ont trois petites taches jaunes, & les points postérieurs des secondes sont cerclés de jaunâtre.

Le dessous ressemble au dessus, mais il est plus clair.

De la Guyane.

98. ERYCINE Améfis.

ERYCINA Amefis.

Eryc. alis integris, subconcoloribus, fuscis : anticis apice sulco radiatis, posticis subocellatis.

Papilio Amefis. GRAM. pl. 104. fig. F.

Papilio Amefis. HERBST, Pap. tab. 527. fig. 6.

Elle

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec des rayons fauves à l'extrémité des premières, & des anneaux de cette couleur à l'extrémité des secondes. Outre cela, la base des quatre ailes a quelques taches fauves transversales.

Le dessous diffère peu du dessus.
Nous n'avons vu que la femelle.

De la Guyane.

99. ERYCINE Epulus.

ERYCINA Epulus.

Eryc. alis integris, fuscis, maculis numerosis supra fulvis, subtis albis.

Papilio P. R. Epulus, alis integerrimis, fuscis, fulvo maculatis; subtis variegatis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 71. n°. 680.

Hesperia R. Epulus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 292. n°. 117.*

Papilio Epulus. CRAM. *pl. 50. fig. C. D.*

Papilio Epulus. HERBST, *Pap. tab. 517. fig. 3. 4.*

Elle a à peine un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec beaucoup de taches fauves, dont les postérieures ocellées, & celles du disque ayant le milieu blanchâtre, surtout aux ailes supérieures.

Le dessous offre à peu près le même dessin que le dessus, mais presque toutes les taches sont blanches, & les ailes de devant ont la base rouillâtre. La frange du bord postérieur est entrecoupée de blanchâtre.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. La figure de Cramer est grossière & sensiblement trop grande.

100. ERYCINE Timandra.

ERYCINA Timandra.

Eryc. alis integris, supra luteis, nigro maculatis, anticarum apice fusco albo punctato: subtis omnibus fuscis, maculis nigris albo cinctis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un jaune-fauve, avec une multitude de taches noires. Indépendamment de cela, le sommet des ailes supérieures est brun, avec plusieurs points blancs épars.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec des points noirs cerclés de blanc. Le corps est jaune en dessus, d'un brun-grisâtre en dessous. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

Nous n'avons vu que la femelle.

Du Brésil.

Hist. Nat. Inf. Tom. IX.

101. ERYCINE Zachea (1).

ERYCINA Zachea.

Eryc. alis integerrimis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtis fusco alboque varis. FAB.

Hesperia R. Zacheus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 451. n°. 251-2.*

Elle est petite. Ses quatre ailes ont le dessus fauve, avec des taches noires.

Le dessous des ailes supérieures offre à la base une tache fauve, sur le milieu une bande flexueuse, & à l'extrémité des luvées, blanches. Le dessous des ailes inférieures est varié de blanc & de brun.

De Cayenne.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Ne seroit-ce pas le mâle de l'Eryciue

Timandra?

102. ERYCINE Polyménus.

ERYCINA Polymenus.

Eryc. alis integerrimis, ferrugineo-fuscis, nigro punctatis: subtis flavescens, fusco undatis. FAB.

Papilio. F. Polymenus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 54. n°. 166.*

Papilio Polymenus. JON. *Fig. pict. 5. tab. 15. fig. 2.*

Elle est petite. Le corps est obscur. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-ferrugineux, avec des points & des ondes noirs. Leur dessous est jaunâtre & ondulé de fauve.

De Surinam.

(Traduction de Fabricius.)

103. ERYCINE Acanthus.

ERYCINA Acanthus.

Eryc. alis integris, supra fuscis, immaculatis: subtis ferrugineis, fuscis caeruleis limboque omni luteo.

Papilio B. R. Acanthus, alis integerrimis, fuscis, immaculatis: subtis brunneis, caeruleo fuscis, limbo flavo. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n°. 702.*

Hesperia R. Acanthus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 502. n°. 145.*

Papilio Acanthus. CRAM. *pl. 580. fig. K. L.*

Papilio Acanthus. HERBST, *Pap. tab. 518. fig. 1. 2.*

Elle est petite. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches. Leur dessous est ferrugineux, avec quatre bandes bleues, communes, dont les deux intermédiaires plus courtes, l'anté-

(1) Nous avons changé la terminaison du nom imposé par Fabricius, parce qu'il y a un Satyre qui s'appelle *Zacheus*.

rière bifide & se réunissant à la postérieure en face du sommet. Outre cela, le pourtour extérieur des quatre ailes est d'un jaune-fauve. Les antennes sont brunes & annulées de blanc depuis leur base jusqu'à la masse. Le corps est de part & d'autre du même ton que les ailes.

De Surinam.

104. ERYCINE Gyas.

ERYCINA Gyas.

Eryc. alis integris, supra fuscis, immaculatis: subtus rufis, strigis aurato-viridibus, interruptis.

Papilio P. R. Gyas, alis integerrimis, fuscis: subtus fulvis, strigis punctatis aureis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 758.

Hesperia R. Gyas. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 324. n. 250.

Papilio Gyas. CRAM. pl. 28. fig. F. G.

Papilio Gyas. HERBST, Pap. tab. 521. fig. 8. 9.

Elle est très-petite, d'un brun-noirâtre & sans taches en dessus; d'un fauve-foncé en dessous, avec plusieurs lignes transverses d'un vert-doré.

De Surinam.

105. ERYCINE Ampyx.

ERYCINA Ampyx.

Eryc. alis subintegris, supra fuscis, anticarum maculis duabus flavis: subtus omnibus flavis, maculis ferrugineis auro pupillatis.

Papilio Ampyx. DRURY, Inf. tom. 3. pl. 9. fig. 2. 3.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, avec deux taches ovales sur le milieu des supérieures, & le bord antérieur des inférieures, d'un jaune-paille.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune-paille, avec des taches ferrugineuses, dont le milieu est brillant & comme doré. L'empreinte de ces taches est un peu sensible en dessus.

Du Brésil.

106. ERYCINE Pyramis.

ERYCINA Pyramis.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, caeruleo nican-tibus, maculâ fuvâ: posticis subtus griseis. FAB.

Papilio P. R. Pyramis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 755.

Hesperia R. Pyramis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 325. n. 223.

Ses quatre ailes ont le dessus brun & glacé de violet, avec une grande tache fauve sur le milieu de chacune.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au

dessus. Le dessous des inférieures est gris, ou varié de brun & de cendré.

De Cayenne.

(Traduction de Fabricius.)

107. ERYCINE Lucanus.

ERYCINA Lucanus.

Eryc. alis integerrimis, nigris, disco flavo: posticis subtus rubris, maculis quadratis fuscis. FAB.

Hesperia R. Lucanus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 322. n. 221.

Papilio Lucanus. JON. Fig. piç. 6. tab. 56. fig. 3.

Elle est petite. Le dessous des premières ailes est jaune, avec une tache sur le milieu des supérieures, & le disque des quatre, noirs.

Le dessous des premières ailes est jaunâtre, avec des taches carrées sur le milieu, & le bord postérieur, bruns. Le dessous des secondes ailes est rouge, avec des taches brunes, carrées, éparées.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

108. ERYCINE? Alphonse.

ERYCINA Alphonfus.

Eryc. alis integerrimis, atris: anticis maculis duabus, posticis unicâ baseos flavis. FAB.

Hesperia R. Alphonfus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 308. n. 171.

Papilio Alphonfus. JON. Fig. piç. 6. tab. 55. fig. 5.

Toutes ses ailes sont d'un noir-foncé. Les premières ont en dessus une ligne basilaire & deux taches, en dessous une grande tache basilaire & une postérieure, jaunes. Les secondes ailes offrent à leur base une tache jaune, qui est dentée en dessus, plus grande en dessous.

De Surinam.

(Traduction de Fabricius.)

109. ERYCINE? Procas.

ERYCINA Procas.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, atris, disco maculâque anticarum flavis. FAB.

Hesperia R. Procas. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 308. n. 170.

Papilio Procas. JON. Fig. piç. 6. tab. 55. fig. 1.

Ses ailes, dont le dessous ressemble au dessus, sont noires, avec le disque jaune. Il y a en outre

une tache dentée de cette couleur au sommet des premières.

De Surinam.

(Traduction de Fabricius.)

110. ERYCINE Numitor.

ERYCINA Numitor.

Eryc. alis integerrimis, fuscis : posticis supra discoflavo, subtis totis flavis, immaculatis. FAB.

Hesperia R. Numitor. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 324. n. 228.*

Papilio Numitor. JON. *Fig. pict. 6. tab. 40. fig. 2.*

Elle est petite. Le dessus de ses ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache aux supérieures, avec un espace jaune au milieu des inférieures.

Le dessous des premières ailes est brun, avec le limbe jaune. Le dessous des secondes ailes est entièrement jaune & sans taches.

Des Indes occidentales.

(Traduction de Fabricius.)

111. ERYCINE Aëdon.

ERYCINA Aëdon.

Eryc. alis integerrimis, fuscis, fasciis plurimis macularibus fulvis. FAB.

Papilio P. R. Aëgon. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 83. n. 759.*

Hesperia R. Aëgon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 324. n. 231.*

Elle est très-petite, & elle a le dessus des quatre ailes d'un brun-obscur, avec plusieurs bandes fauves, maculaires & inégales. Le dessous de ses ailes inférieures tire sur le cendré.

De la Jamaïque.

(Traduction de Fabricius.)

112. ERYCINE Téléphus.

ERYCINA Telephus.

Eryc. alis integris, supra nigris, arcâ miniatâ : subtis cæruleiscenti-ulis, nigro punctatis.

Papilio P. R. Telephus, alis integerrimis, nigris : anticis albo punctatis; posticis supra basirufis, subtis cæruleis nigro variis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 78. n. 710.*

Hesperia R. Telephus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 304. n. 153.*

Papilio Telephus. CRAM. *pl. 66. fig. E. F.*

Papilio Telephus. HERBST, *Pap. tab. 318. fig. 7. 8.*

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes supérieures est noir, avec un espace longitudinal d'un rouge-fauve au milieu du

bord interne, & quelques petits points blancs au sommet.

Le dessus des ailes inférieures est d'un rouge-fauve, avec deux ou trois points & tout le pourtour noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-bleuâtre, avec une multitude de points & les bords obscurs. Le corps est fauve en dessus, blanc en dessous.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique méridionale.

113. ERYCINE Lucien.

ERYCINA Lucianus.

Eryc. alis integris, nigro punctatis, supra rufis, subtis cineriscenti-ulis.

Hesperia R. Lucianus, alis integerrimis, nigro punctatis, supra fulvis, subtis cinereis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 315. n. 185.*

Papilio Crispus. CRAM. *pl. 118. fig. D. E. (La femelle.) fig. F. (Le mâle.)*

Papilio Crispus. HERBST, *Pap. tab. 322. fig. 1. 2. 3.*

L'*Hespérie Lucianus* de Fabricius nous paroît bien se rapporter au mâle du papillon *Crispus* de Cramer.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un roux-chatoyant, avec une multitude de petites taches noires, dont les postérieures en forme de points, les autres lunulées. Ces taches se retrouvent en dessous, où le fond des ailes supérieures est cendré, & le fond des inférieures d'un blanc-bleuâtre. Le corps est fauve en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & elles ont la masse brune.

La femelle a le sommet des ailes supérieures plus obscur & marqué de quelques points blancs en dessus.

De la Guyane & des Antilles.

114. ERYCINE Phareus.

ERYCINA Phareus.

Eryc. alis integris, chermesinis, limbo onni nigro : anticarum anteriorum supra dentes exserente, subtis latissimo.

Papilio P. R. Phareus, alis integerrimis, subconcoloribus, rubris, limbo nigro. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n. 722. (Le mâle.)*

Hesperia R. Phareus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 308. n. 161.*

Papilio Phareus. CRAM. *pl. 170. fig. C. (Le mâle.)*

Papilio Bomilcar. STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 59. fig. 3. (La femelle.)*

Elle n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Ses ailes font d'un rouge-carmain-luisant, avec le limbe terminal des quatre, & la côte des supérieures, noirs. Le noir de la côte des ailes supérieures jette en dessus trois dents inégales, & il s'étend en dessous jusqu'au-delà du milieu de la surface. Les ailes inférieures ont souvent à leur centre une petite lunule noire. Le corps est rouge en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont brunes & annelées de blanc.

La femelle ne diffère du mâle que parce que le noir domine davantage sur le dessus de ses premières ailes. Stoll l'a représentée sous le nom de *Bomilcar*. Quant au mâle, il est bien *tétrapode*, & non *hexapode*, comme le dit Cramer.

De la Guyane & du Brésil.

115. ERYCINE Tacitus.

ERYCINA Tacitus.

Eryc. alis integris, concoloribus, chernesinis, limbo omni nigro: anticarum anteriori lato flavoque maculato.

Hesperia R. Tacitus, *alis integerrimis, fulvis: anticis margine exteriori atro, flavo maculato.* FAB. Ent. Syst. tom. 3. pars 1. p. 308. n°. 168.

Papilio Tacitus. JON. Fig. pict. 6. tab. 46. fig. 3.

Papilio Menetes. DRURY, Inf. tom. 3. pl. 8. fig. 5.

Papilio Menetes. STOLL, Pap. Suppl. à CRAM. pl. 3. fig. 4.

Nous rapportons ici le papillon *Menetes* de Drury & de Stoll, parce qu'il nous paroît offrir absolument les mêmes caractères que le *Tacitus* de Fabricius.

Son envergure n'est guère que d'un pouce. Ses ailes supérieures ont la moitié qui avoisine le bord interne d'un rouge-carmain, l'autre moitié noire & tachetée de jaune. Ses ailes inférieures sont d'un rouge-carmain, avec le limbe terminal noir.

Le dessous est à très-peu de chose près comme le dessus.

De la Guyane & du Brésil.

116. ERYCINE Epalia.

ERYCINA Epalia.

Eryc. alis integris, concoloribus, miniaceis, limbo omni nigro.

Papilio Epaphus CRAM. pl. 535. fig. D. E.

Papilio Epaphus. HERBST, Pap. tab. 319. fig. 6. 7.

Elle n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un fauve-ponceau de part & d'autre, avec la

côte des supérieures, & le limbe terminal des quatre, légèrement noirs.

Cramer a figuré une variété femelle, dans laquelle le dessous des premières ailes a plus de noir au sommet, avec deux taches rougeâtres.

De la Guyane & du Brésil.

117. ERYCINE Cingulus.

ERYCINA Cingulus.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, fasciâ rubrâ, communi, mediâ.

Papilio Cingulus. STOLL, Pap. Suppl. à CRAM. pl. 15. fig. 4.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun de part & d'autre, avec une bande rouge, discordale, courbe, plus large aux supérieures qu'aux inférieures.

De Surinam.

118. ERYCINE Talus.

ERYCINA Talus.

Eryc. alis integerrimis, cinereis, utrinquè nigro fasciatis: suprà fasciâ sanguineâ, communi, abbreviatâ.

Papilio P. R. Talus, *alis integerrimis, fusco caruleoque fasciatis: subtis (suprà) fasciâ sanguineâ abbreviatâ.* FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 745.

Hesperia R. Talus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars. 1. p. 318. n°. 202.

Papilio Pygmaea. CRAM. pl. 7. fig. C. D.

Papilio Talus. HERBST, tab. 320. fig. 10. 11.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses ailes sont cendrées & fasciées de noir de part & d'autre. Leur dessous offre en outre une bande vermillon, commune, discordale, n'atteignant ni la côte des supérieures, ni l'angle anal des inférieures.

De Surinam.

Nota. Fabricius se trompe en disant que la bande rouge est en dessous.

119. ERYCINE Nicon.

ERYCINA Nicon.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, fasciis duabus abbreviatis punctisque marginalibus flavis.

Papilio Nicias. STOLL, Pap. Suppl. à CRAM. pl. 15. fig. 5.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, avec deux bandes transverses, & une rangée de petits points

marginaux, jaunes. Les deux bandes sont courtes, & l'antérieure est plus large que la postérieure.

De Surinam.

120. ERYCINE Régulus.

ERYCINA Regulus.

Eryc. alis integerrimis, concoloribus, nigris, fuscis duabus albis aut flavescensibus: posticâ anticarum interruptâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 318. n^o. 205.

Hesperia R. Regulus, alis integerrimis, nigris, fuscis duabus flavis: posticâ anticarum interruptâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 318. n^o. 205.

Papilio Regulus. JON. Fig. pict. 6. tab. 86. fig. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Toutes ses ailes sont noires, avec deux bandes communes, & la frange, blanches ou d'un jaunepâle. La bande postérieure est moins large que l'autre, & outre cela fortement interrompue aux premières ailes.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que les premières ailes ont l'origine de la côte blanche. Le corps est noir en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont noires & annelées de blanc.

Du Brésil.

121. ERYCINE Thucydide.

ERYCINA Thucydes.

Eryc. alis integerrimis, nigris, maculâ disci fulvâ: subtus cinereis, rufo undatis. FAB.

Hesperia R. Thucydes. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 323. n^o. 225.

Papilio Thucydes. JON. Fig. pict. 6. tab. 6. fig. 4.

Elle est de moyenne taille. Le dessus de ses quatre ailes est noir, avec une grande tache jaune sur le milieu. Leur dessous est cendré, avec des ondes rouille.

Des Indes occidentales.

(Traduction de Fabricius.)

122. ERYCINE Arius.

ERYCINA Arius.

Eryc. alis integris, concoloribus, fuscis, nigro maculatis: anticis strigâ albâ, mediâ, abbreviatâ.

Papilio Arius. CRAM. pl. 51. fig. E.

Papilio Arius. HERBST, Pap. tab. 322. fig. 4.

Elle est petite. Ses ailes sont d'un brun-cendré de part & d'autre, avec une multitude de taches noires, & la frange entrecoupée de blanc. Outre cela, les premières ailes ont sur le milieu une li-

gne blanche, transversale & n'atteignant pas les bords.

De Surinam.

123. ERYCINE Sagaris.

ERYCINA Sagaris.

Eryc. alis integris, nigris, suprâ fuscâ fulvâ abbreviatâ: anticis subtus margine tenuiori albâ.

Papilio P. R. Sagaris, alis integerrimis, atris, maculâ communi transversali fulvâ. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 83. n^o. 750.

Hesperia R. Sagaris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 321. n^o. 215.

Papilio Sagaris. CRAM. pl. 83. fig. D.

Papilio Sagaris. HERBST, Pap. tab. 321. fig. 2.

SÉBA, Mus. 4. tab. 42. fig. 23. 24.

Nous ne connoissons que le mâle. Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-foncé, avec une bande orangée, ne montant pas au-delà du disque des supérieures, mais traversant le milieu de l'abdomen.

Le dessous est moins noir que le dessus, sans taches, mais avec le bord interne des ailes supérieures blanchâtre.

De la Guyane & du Brésil.

E. Ailes un peu oblongues, ou allongées dans le sens du diamètre du corps.

124. ERYCINE ? Hélius.

ERYCINA Helius.

Eryc. alis integerrimis, fuscis: posticis margine anteriori fulvo.

Papilio P. U. Helius, alis subdivaricatis, fuscis: posticis margine anteriori (anteriori) fulvis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n^o. 771.

Hesperia U. Helius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 329. n^o. 248.

Papilio Helius. CRAM. pl. 198. fig. B.

Fabricius met ce lépidoptère dans la division de ses *Hespéries urbicoles*; mais comme Cramer dit que c'est un *Tétrapode*, & comme il y a d'ailleurs des érycines qui ont le même port, nous la plaçons conditionnellement parmi ces dernières.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Ses ailes sont d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec le bord antérieur des secondes largement fauve.

La femelle n'est point figurée, du moins à notre connoissance.

Des Indes occidentales.

125. ERYCINE Probétor.

ERYCINA Probetor.

Eryc. alis integris, supra fuscis : anticis apice cinereo venosis, posticis margine anteriori sanguineis.

Papilio Probetor. CRAM. pl. 590. fig. I.

Son envergure n'est guère que d'un pouce. Ses ailes ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité des supérieures veinée de cendré, & le bord antérieur des secondes d'un rouge-sanguin.

Le dessous est entièrement d'un brun-rougeâtre. De Surinam.

126. ERYCINE Agyrtus.

ERYCINA Agyrtus.

Eryc. alis integerrimis, fusco-nigris : anticis utrinque fusciâ abbreviatâ rufâ : omnibus subtus fusciâ coninuni flavâ.

Papilio Agyrtus. CRAM. pl. 185. fig. B. C.

Papilio Agyrtus. HERBST, Pap. tab. 321. fig. 6. 7.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun, avec une bande fauve, courte & transversale, sur le milieu des supérieures. Cette bande se reproduit en dessous, & l'on y voit en outre une bande jaune, presque basilair, & commune aux quatre ailes.

De Surinam.

127. ERYCINE Perditus.

ERYCINA Perditus.

Eryc. alis integerrimis, atris, cœruleo micantibus : singulis utrinque fusciâ calthaceâ, transversali, mediâ.

Hesperia R. Perditus, alis integerrimis, atris, concoloribus, fusciâ fulvâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 323. n°. 222.

Papilio Jarbas. DAVRY, Inf. tom. 3. pl. 8. fig. 2.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-foncé, avec un reflet bleu, & une bande fonce. La bande des supérieures se dirige obliquement du milieu de la côte vers l'angle interne. La bande des inférieures va du sommet au milieu du bord abdominal.

Le dessous ressemble au dessus, mais le reflet bleu y est plus sensible.

Nous n'avons pas vu la femelle, De la Guyane & du Brésil.

128. ERYCINE Phéréclus.

ERYCINA Phereclus,

Eryc. alis integerrimis, cœruleo-atris : anticis utrinque fusciâ fulvâ, margines attengente : posticis subtus limbo immaculato.

Papilio P. R. Phereclus, alis integerrimis, utrinque atris : primoribus, fusciâ lineari rubrâ. LINN. Syst. Nat. 2. p. 792. n°. 248. — *Muf. Lud. Ulr.* 326.

Papilio P. R. Phereclus, alis integerrimis, concoloribus, atris : anticis, fusciâ lineari rubrâ. FAB. Syst. Ent. p. 529. n°. 564. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 83. n°. 752.

Hesperia R. Phereclus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 321. n°. 217.

CLERCK, Icon. tab. 45. fig. 4.

Papilio Phereclus. CRAM. pl. 178. fig. D.

Papilio Phereclus. HERBST, Pap. tab. 321. fig. 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un noir-bleu-chatoyant, avec une bande fauve aux ailes supérieures. Cette bande descend obliquement du milieu de la côte à l'angle anal, où elle se termine par un petit crochet qui regarde le corps.

Le dessous ressemble au dessus; mais, dans le mâle, les quatre ailes ont des veines cendrées, & les ailes supérieures ont l'origine de la côte fauve & le bord du sommet blanc. Il est même des individus mâles qui offrent un point fauve à l'angle anal des secondes ailes.

Nous avons vu une femelle qui avoit à peine un pouce d'envergure.

De la Guyane & du Brésil.

129. ERYCINE Phéréphatte.

ERYCINA Pherephatte.

Eryc. alis integerrimis, cœruleo-atris : anticis utrinque fusciâ fulvâ, abbreviatâ : posticis subtus (sem.) serie marginali punctorum alborum.

Ce n'est peut-être qu'une variété du *Phéréclus*. Cependant elle a toujours la bande fauve des premières ailes plus courte; & dans la femelle, le dessous des secondes ailes offre une rangée terminale de taches blanches.

Du Brésil.

130. ERYCINE Électron.

ERYCINA Electron.

Eryc. alis integris, concoloribus, atris, puncto bascos sanguineo : anticis fusciâ abbreviatâ fulvâ aut albâ.

Hesperia R. Electron, alis integerrimis, concoloribus, atris : fusciâ flavâ punctoque apicis (bascos) sanguineo.

Papilio Melander. CRAM. pl. 336. fig. A. B.

Papilio Melander. HERBST, Pap. tab. 323. fig. 5. 4.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Les deux sexes font d'un noir-foncé, avec un point d'un rouge-vermillon à la base de chaque aile. Les ailes supérieures ont une bande, tantôt fauve, tantôt blanche, se dirigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle interne, mais n'atteignant pas les bords.

Le dessous ressemble au dessus, seulement les nervures font d'un ton presque cendré.

Il est des individus, mâles ou femelles, qui ont le bord terminal des secondes ailes coloré comme la bande des ailes supérieures.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Dans la phrase spécifique de Fabricius, on lit : *punctoque apicis*, au lieu de *puncto baejos* qu'indique la description.

131. ERYCINE Ménéria (1).

ERYCINA Meneria.

(1) Nous avons adopté le nom de Cramer, parce que le nom primitif de Fabricius & celui qu'il donne ensuite par correction font appliqués l'un à une espèce de *Polyommata*, l'autre à un *Papillon* proprement dit.

Eryc. alis integris, nigris, fasciâ communi lineolâque anticarum baejos sanguineis : omnium disco supra albo punctato.

Hesperia R. Mæcenas (Dimas), *alis oblongis, concoloribus, nigris, fasciâ communi lineolâque anticarum sanguineis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 506. n°. 160. (Var.)

Papilio Meneria. CRAM. pl. 94. fig. D. E. (Le mâle.)

Papilio Micalia. CRAM. pl. 94. fig. F. (Var. mâle.)

Papilio Meneria. HERBST, Pap. tab. 323. fig. 5. 6.

Papilio Micalia. HERBST, Pap. tab. 323. fig. 7.

Elle a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande postérieure & commune, plus une ligne longitudinale & interrompue à la base des supérieures, d'un rouge-vermillon. Il y a en outre sur le milieu de chaque aile des points blancs plus ou moins prononcés, & manquant même quelquefois comme dans la variété décrite par Fabricius.

Le dessous diffère du dessus, en ce qu'il jette un reflet violet & que l'on n'y voit pas de points blancs.

La femelle nous est inconnue.

De Surinam & de la Guadeloupe.



Toutes les pattes ambulatoires et de forme semblable dans les deux sexes.

GENRE MYRINE.

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES très-longs, leur second article dépassant notablement le clipeon. Antennes terminées insensiblement par une massue allongée.

Le genre MYRINA de Fabricius. (Pap. *Alcides*, Fab. Cram. — *Helius*, Fab. ou *Euriscus* Cram.

N. B. L'*Helius* n'est point pour nous une Myrine.

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant deux queues linéaires et voisines, dont l'extérieure très-longue, l'inférieure beaucoup plus courte et placée à l'angle de l'anus.

1. MYRINE Jafra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre ; dessous blanc avec deux lignes ondulées, transverses et postérieures ; cinq taches noires, saupoudrées de bleu-azuré-luisant, à l'angle anal des ailes inférieures.

B. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant une queue linéaire et assez longue, placée entre deux dents plus grandes que les autres.

2. MYRINE Lisias.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec une tache fauve aux supérieures ; dessous des inférieures blanc, avec plusieurs taches éparses.

3. MYRINE Evagoras.

Dessus des ailes d'une couleur argentée verdâtre, avec le pourtour extérieur noir ; dessous d'un cendré-jaunâtre, avec des traits et une raie ondulée transverses d'un noir-brun ; angle anal des ailes inférieures offrant de part et d'autre deux taches rouges.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à l'angle de l'anus une queue longue, oblique et linéaire.

4. MYRINE Alcide.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu-violet-luisant ; dessous d'une couleur tannée, avec une ligne jaunâtre, transverse et centrale.

5. MYRINE Atymnus.

Dessus des ailes d'un fauve-ponceau, avec l'extrémité noire ; dessous d'un jaune d'ocre, avec une ligne brunâtre, transverse et commune.



A. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant deux queues linéaires & voisines, dont l'extérieure très-longue, l'intérieure beaucoup plus courte & placée à l'angle de l'anus.

1. MYRINE Jafra.

MYRINA Jafra.

Myr. alis suprà fuscis : subtus albis strigâ duplîcî posticâ undatâ ; inferioribus maculis quinque analibus nigris nitidâque cyaneo pulverulentis.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures, avec quatre lunules blanches, dont trois consécutives à l'angle anal des inférieures. Ces dernières ailes ont en outre les queues & environ la moitié du bord postérieur frangées de blanc.

Le dessous des premières ailes est blanc, avec la côte, le limbe terminal, deux lignes transverses, postérieures & ondulées, roullâtes.

Le dessous des secondes ailes est entièrement blanc, avec deux lignes noires anguleuses, faisant suite aux lignes rouffes des ailes de devant. Entre ces lignes & les queues, font cinq taches noires saupoudrées de bleu-azuré-luisant, & dont la première longeant toute l'échancrure anale, l'avant-dernière sensiblement plus grosse que les trois autres.

La femelle nous est inconnue.

De l'île de Java.

Nota. Ce lépidoptère paroît avoir beaucoup de ressemblance avec l'Espérie rurale *Freja* de Fabricius ; mais, si le texte de cet auteur est exact, la queue antérieure de son Espérie est très-longue & la postérieure très-courte, tandis que c'est le contraire dans le *Jafra*. Fabricius parle d'ailleurs de lignes fauves marginales que nous n'avons point vues sur le dessous des ailes inférieures de notre Myrine.

B. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées, ayant une queue linéaire & assez longue, placée entre deux dents plus grandes que les autres.

2. MYRINE Lifas.

MYRINA Lifas.

Myr. alis suprà fuscis, anticarum maculâ fulvâ : posticis subtus albis, maculis plurimis nigris sparfis.

Papilio P. R. Lifas, alis tricauclatis : anticis fuscis maculâ fulvâ : posticis subtus albis nigro maculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n. 615.*

Hesperia R. Lifas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 261. n. 12.*

Hist. nat. Inf. Tome IX.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une grande tache fauve aux supérieures, & des taches marginales bleues aux inférieures. Les ailes inférieures ont un rellet bleu plus ou moins sensible, & leur queue est noire, avec les bords blancs.

Le dessous des premières ailes est d'un jaunepâle, avec des lignes transverses fauves, & une ligne postérieure obscure. Le dessous des secondes ailes est blanc, avec plusieurs taches noires éparfes.

De la presqu'île en deçà du Gange.

3. MYRINE Evagoras.

MYRINA Evagoras.

Myr. alis suprà virefcenti-argenteis, margine exteriori nigro : subtus flavescenti-cinereis, lineolis strigâque undulatâ atris : posticis utrinquë maculis duabus angulî ani rubris.

Papilio Evagoras, alis bicauclatis, nigris, difco cyaneis nitidis : subtus cinereis nigro fuscicatis : posticis apice rubro bimaculatis. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epitome of the Inf. of New-Holl. pl. 5. fig. 1. 2.*

Elle est à peu près de la taille de la précédente. Le dessus de ses ailes est d'une couleur argentée luisante & verdâtre, avec tout le pourtour extérieur largement noir. Il y a en outre derrière la cellule discoidale des premières ailes un point oblong, & derrière celle des secondes une ligne transversée flexueuse, noirs. Vers l'angle anal des secondes ailes font deux taches d'un rouge-faive, assez grandes & séparées par un groupe d'atomes d'un bleu-pâle.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-jaunâtre, avec une raie noire ondulée, partant de la côte des supérieures & allant aboutir au milieu du bord interne des inférieures, après avoir décrit un W au dessus de deux taches rouges anales qui répondent à celles de la surface opposée. Entre cette raie & la base, les ailes supérieures ont trois taches noires, transversées & consécutives, & les inférieures trois points, puis une ligne inégalement coupée en deux, pareillement noirs. Le bord postérieur est noir, & précédé dans toute sa longueur d'une double ligne roullâtre. La queue est de la couleur de ce bord, avec le bout blanc. Les antennes font noirâtres & annelées de gris. Le corps est cendré en dessus, jaunâtre en dessous.

La femelle est d'un bleu plus pâle.

De la Nouvelle-Hollande.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à l'angle de l'anus une queue longue, oblique & linéaire.

FFFF

4. MYRINE Alcide.

MYRINA Alcides.

Myr. alis suprà fuscis, basi violaceo nitide pulverulentis: subtus corticinis, strigâ mediâ flavescente. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n^o. 661.

Papilio P. R. Alcides, alis caudatis, nigris cœruleo nitidis: subtus ferrugineis strigâ flavescente. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n^o. 661.

Hesperia R. Alcides. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n^o. 86.

Papilio P. U. Silenus, alis caudatis, fuscis: subtus brunneis, strigâ flavescente. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n^o. 775.

Hesperia U. Silenus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 350. n^o. 255.

Papilio Alcides. CRAM. pl. 96. fig. D. E.

Papilio Corax. CRAM. pl. 579. fig. D. E. (Varietas au femina?)

Papilio Corax. HERBST, Pap. tab. 286. fig. 1. 2.

Fabricius a donné cette espèce comme Hespérie rurale sous le nom d'*Alcides*, puis comme Hespérie urticole sous celui de *Silenus*.

Elle a environ un pouce trois quarts d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec des atomes d'un bleu-violet-luisant à la base des quatre, des atomes d'un bleu-cendré sur le limbe terminal des inférieures & sur leur queue. Les ailes supérieures offrent en outre à l'extrémité une bande transversale roussâtre & peu prononcée.

Le dessous est d'une couleur tannée, avec une ligne jaunâtre, transversale, centrale, courte aux ailes supérieures, & se perdant aux inférieures dans une poussière grise qui couvre la majeure partie du bord interne.

Le corps est brun, avec des poils bleuâtres sur le corselet. Les antennes sont noirâtres & annelées de blanchâtre en dessous.

Le Papillon *Corax* de Cramer paroît être la femelle ou une variété de cette espèce, car il lui ressemble tout-à-fait en dessous, & il n'en diffère en dessus que par l'absence de la bande roussâtre de l'extrémité des premières ailes, & le manque d'atomes violets à la base des secondes.

De la côte de Guinée, selon Cramer & Fabricius.

5. MYRINE Atymnus.

MYRINA Atymnus.

Myr. alis suprà subpapurinis, apice nigro: subtus ochraceis, strigâ communi fuscâ.

Papilio P. R. Atymnus, alis caudatis, fulvis: anticis apice nigris. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n^o. 662.

Hesperia R. Atymnus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n^o. 88.

Papilio Atymnus. CRAM. pl. 551. fig. D. E.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau, avec une bordure noire terminale, large & arquée aux supérieures, étroite aux inférieures (du moins chez les mâles). Les ailes inférieures ont à l'extrémité du bord interne un petit groupe d'atomes bleuâtres, & le bout de leur queue est blanc.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune d'ocre foncé, avec une ligne brunâtre, commune, postérieure, légèrement sinuée, moins distincte aux ailes supérieures qu'aux inférieures.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Nota. Il paroît que l'individu figuré par Cramer avoit perdu ses palpes, car ils ne sont pas du tout représentés, quoique très-longs.



Toutes les pattes propres à la marche dans les deux sexes.

GENRE POLYOMMATE.

Plébéiens ruraux. LINN.

Hespéries rurales. FAB. *Ent. Syst.*

CARACTÈRES DU GENRE.

PALPES inférieurs de longueur moyenne ou courts.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius (*Syst. Glossat.*) :

Genre THECLA. (Pap. *Betule*, *Pruni*, *Lynceus*, etc.)

Genre HESPERIA. (Pap. *Boeticus*, *Telicanus*, *Amyntas*, etc.)

Genre LYCENA. (Pap. *Gordius*, *Phleas*, *Furgaureæ*, *Alexis*, *Adonis*, *Corydon*, etc.)

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec trois queues plus ou moins longues. (1)

1. POLYOMMATE FAUNUS.

Dessus des ailes d'un violet-obscur, avec l'extrémité d'un noir-mat : dessous blanc, avec une ligne fauve transverse sur le milieu, et une ligne noirâtre parallèlement au bord postérieur.

2. POLYOMMATE HÉSIODE.

Ailes à trois queues, d'un noir-mat, avec le milieu bleu : leur dessous blanc, avec une ligne commune verdâtre, et deux points noirs argentés à l'angle de l'aue.
FAB.

3. POLYOMMATE HÉLIUS.

Dessus des ailes bleu, avec le sommet des supérieures très-largement noir :

dessous cendré, avec trois lignes brunes, transverses et continues; celui des inférieures offrant vers l'angle anal deux yeux à iris roux. (Mâle.)

4. POLYOMMATE MONCHUS.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous très-blanc, presque fascié de noir; celui des inférieures avec deux yeux dorés. FAB.

5. POLYOMMATE PYTHAGORE.

Ailes d'un noir-mat, avec le disque des quatre fauve : leur dessous offrant trois bandes transverses, et une double ligne marginale, blanches; celui des inférieures avec deux yeux argentés vers l'angle de l'aue.

6. POLYOMMATE LARYDAS.

Dessus des ailes d'un violet-obscur chez le mâle, d'un bleu-blanchâtre chez la femelle : dessous d'un brun-obscur, avec une multitude d'anneaux blancs; celui des inférieures offrant vers l'angle interne deux yeux argentés.

(1) Le mode de divisions d'après la présence ou l'absence des queues n'est pas le plus naturel, mais c'est le plus commode pour la détermination, surtout quand les genres sont nombreux en espèces.

POLYOMMATE. (Insecte.)

7. POLYOMMATE Hymen.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous tacheté de blanc : dessus des inférieures blanc. FAB.

8. POLYOMMATE AMOHR.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous varié sur le milieu, et offrant à l'extrémité une ligne dorée. FAB.

9. POLYOMMATE Agrippa.

Ailes à trois queues, bleues, avec le limbe noir : leur dessous cendré, avec une ligne blanche transverse, et deux taches anales rousses. FAB.

10. POLYOMMATE Timon.

Ailes à trois queues, ayant la base verdâtre : leur dessous blanc ; celui des inférieures avec une bande courte d'un rouge-sanguin. FAB.

B. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec deux queues, dont une ordinairement plus longue.

a. Bord postérieur des premières ailes un peu concave, surtout chez le mâle.

11. POLYOMMATE Marsyas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le sommet noir : leur dessous lilas, avec des points oculaires noirs sur le disque ; celui des inférieures fuscifié de blanc et de bleu-verdâtre vers l'angle de l'anus.

12. POLYOMMATE Ortygnus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : leur dessous d'un incarnat-pâle, avec quelques points noirs sur le disque ; celui des inférieures offrant vers l'angle de l'anus une raie flexueuse et deux yeux d'un bleu-verdâtre. (Mâle?)

13. POLYOMMATE Rustan.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle et luisant, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un incarnat-obscur, avec une double bande terminale olivâtre ; celui des inférieures avec deux points noirs à iris blanc à la base et deux à l'angle de l'anus. (Femelle.)

14. POLYOMMATE Vénulius.

Dessus des ailes bleu : leur dessous d'un bleu-pâle, avec trois bandes noires postérieures ; celui des inférieures ayant à l'angle de l'anus un œil à iris sauve. (Mâle.)

15. POLYOMMATE Liger.

Dessus des ailes blanc, avec le limbe postérieur noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec des lignes ondulées et des croissans blancs ; celui des inférieures ayant une tache bleue sur le milieu et deux à l'angle de l'anus. (Femelle?)

16. POLYOMMATE Périclès.

Ailes à deux queues, noires : leur dessous d'un brun-noirâtre et ondulé de blanc ; une double tache argentée à l'angle de l'anus. FAB.

17. POLYOMMATE Eudymion.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire : dessous des inférieures avec une ligne médiane noire et une bande ferrugineuse.

18. POLYOMMATE Gabriel.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire : dessous des inférieures ferrugineux vers l'extrémité, avec trois lignes transverses et une ligne marginale blanches.

POLYOMMATE. (Insecte.)

8. Milieu des ailes supérieures du mâle offrant une tache orbiculaire, plus ou moins connoise, et parfois enfoncée.

19. POLYOMMATE Ganyméde.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le bord noir : leur dessous moitié doré, moitié brun, avec deux lignes transverses d'un blanc-bleuâtre sur le milieu. (Mâle.)

20. POLYOMMATE Véhus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet noir : leur dessous d'un vert-doré ; celui des inférieures aspergé de noir. (Mâle.)

21. POLYOMMATE Eimathéon.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir : leur dessous noir et aspergé de bleu-pâle. (Mâle.)

22. POLYOMMATE Arogéus.

Ailes d'un vert-luisant de part et d'autre : dessous des inférieures avec quatre lignes noires transversales, dont l'inférieure oblique et plus courte, la pénultième bordée de bleuâtre.

23. POLYOMMATE Acmon.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : dessous des inférieures d'un brun-noirâtre, avec des lignes vertes transversales près de l'angle de l'anus.

24. POLYOMMATE Polibetes.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur noir : leur dessous d'un brun-incarnat ; celui des inférieures avec deux lignes ondulées bleuâtres et sept points noirs. (Mâle.)

25. POLYOMMATE Hémon.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des supérieures sans taches : dessous des quatre avec des bandes plus obscures à l'ex-

trémité ; celui des inférieures avec quatre lignes ondulées verdâtres, dont l'antérieure plus longue et terminée près de la côte par un point oculaire.

26. POLYOMMATE Lisus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant : leur dessous d'un vert-obscur, fascié de brun vers l'extrémité ; celui des inférieures offrant sur le milieu une ligne de points d'un blanc-bleuâtre. (Mâle.)

27. POLYOMMATE Sihhis.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un cendré-verdâtre, avec deux lignes blanches ondulées ; celui des inférieures offrant à l'angle de l'anus une bande courte d'un vert-doré et marquée d'une tache et d'une lunule jaunes. (Mâle.)

28. POLYOMMATE Thalès.

Ailes d'un noir-brun de part et d'autre : leur dessous ondulé de bleu ; celui des supérieures grisâtre au sommet ; celui des inférieures offrant à l'angle anal une bande courte d'un vert-doré.

29. POLYOMMATE Nautés.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau, avec les nervures et le limbe noirs : dessous des inférieures d'un noir-obscur, offrant sur son milieu une bandelette longitudinale jaune, et derrière cette bandelette beaucoup d'anneaux bleuâtres. (Mâle.)

30. POLYOMMATE Elis.

Ailes d'un brun-verdâtre de part et d'autre : dessous des inférieures avec une bandelette longitudinale fauve, suivie de trois lignes transverses d'un vert-doré.

POLYOMMATE. (Insecte.)

31. POLYOMMATE Polybe.

Dessus des ailes d'un vert-bleuâtre, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un jaune-verdâtre et veiné de noir, avec des taches rouges à la base.

32. POLYOMMATE Halésus.

Ailes d'un bleu-verdâtre en dessus, avec une bordure noire ; d'un brun-noirâtre en dessous, avec l'origine de la côte rouge : angle anal des inférieures ayant des taches dorées de part et d'autre.

33. POLYOMMATE Syncelle.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur noir : leur dessous brun, celui des supérieures avec l'origine de la côte rouge, celui des inférieures avec deux lignes ondulées verdâtres et deux points anals noirs. (Mâle.)

34. POLYOMMATE Nérhal.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec l'origine de la côte rouge ; celui des inférieures offrant une ligne blanche ondulée, et deux points noirs ocellés, dont l'un basilaire, l'autre anal. (Mâle.)

35. POLYOMMATE Inachus.

Dessus des ailes bleu, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte rouge, et une ligne médiane blanche, transversale ; ligne des secondes ailes terminée antérieurement par un point oculaire. (Mâle.)

36. POLYOMMATE Pétus.

Ailes presque à trois queues, bleues, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec la base rousse et ponctuée de blanc. FAB.

37. POLYOMMATE Céradius.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle : leur dessous brun, avec des taches blanches à la base. FAB.

38. POLYOMMATE Didymaon.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous rouge à la base, avec des points blancs ocellés. FAB.

39. POLYOMMATE Éole.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure noire : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec trois bandes blanchâtres ; ailes supérieures avec l'origine de la côte, inférieures avec un point anal, d'un rouge-sanguin.

40. POLYOMMATE Bathis.

Dessus du mâle d'un bleu-luisant, dessus de la femelle blanc, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : dessous noir, avec des bandes blanches transverses ; ailes supérieures avec un point basilaire, ailes inférieures avec l'angle anal, fauves.

41. POLYOMMATE Phaléros.

Dessus du mâle d'un bleu-violet-luisant, dessus de la femelle blanchâtre, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : dessous blanc, avec des bandes transverses et le bord noirs ; ailes inférieures avec deux points d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

42. POLYOMMATE Moelibée.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un jaune-pâle, avec cinq lignes noires transverses, dont l'intermédiaire double.

43. POLYOMMATE Pélagon.^o

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé, avec le limbe obscur : dessous d'un brun-

POLYOMMATE. (Insecte.)

incarnat-pâle, avec quatre lignes ondulées plus obscures, bordées de blanc, et le limbe postérieur jaunâtre.

44. POLYOMMATE ANACRÉON.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous ondulé de blanc, et offrant vers l'extrémité une ligne fauve maculaire. FAB.

45. POLYOMMATE MÉTON.

Dessus des ailes d'un blanc-bleutéreluisant, avec le sommet d'un noir-brun ; leur dessous varié de jaunâtre, de brun et de ferrugineux ; celui des inférieures avec un double point noir à la base.

46. POLYOMMATE AUGUSTE.

Ailes à queue, blanches, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous varié de ferrugineux et de jaune ; celui des inférieures avec deux lignes cendrées transversales. FAB.

47. POLYOMMATE DOLILUS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le sommet noir et la frange d'un jaune-fauve : leur dessous d'un roux-obscur, avec des bandes blanches transverses ; bande antérieure des secondes ailes bifide.

48. POLYOMMATE IARUSUS.

Dessus du mâle d'un bleu-barbeau-luisant ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle ; dessous d'un violet-pâle, avec trois lignes ondulées et l'angle interne de chaque aile blancs.

49. POLYOMMATE SOPHOCLE.

Ailes à deux queues, noires, avec le disque bleu : leur dessous blanc, avec des lignes ondulées jaunâtres ; un point fauve à l'extrémité des inférieures. FAB.

50. POLYOMMATE ISMARUS.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant, avec le limbe noir : leur dessous d'un brun-noirâtre ; celui des inférieures avec quatre lignes blanches ondulées et deux taches rouges anales.

51. POLYOMMATE EURIPIDE.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le disque bleu : leur dessous d'un brun-noirâtre ; celui des inférieures avec des lignes blanches anguleuses et une tache rousse oculaire. FAB.

52. POLYOMMATE CUPENTIS.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur ; celui des inférieures avec trois lignes blanches ondulées et un œil anal à iris fauve, ligne antérieure ayant le milieu dilaté en un anneau. (Mâle.)

53. POLYOMMATE SYCHÉE.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet d'un noir-brun : leur dessous d'un cendré-incarnat ; celui des inférieures avec deux lignes blanches ondulées et deux taches anales rouges, ligne postérieure se dilatant en plusieurs anneaux. (Mâle.)

54. POLYOMMATE STRÉPHON.

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur ; celui des inférieures avec deux lignes flexueuses de lunules blanches, et deux taches anales rouges marquées d'un point noir en arrière.

55. POLYOMMATE STROPHIUS.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec une ligne flexueuse de

POLYOMMATE. (Insecte.)

petits traits blancs, et deux taches ana-
les rouges marquées d'un point noir en
arrière.

56. POLYOMMATE Sphinx.

Dessus du mâle d'un bleu-violet-luisant, dessus de la femelle plus pâle, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-clair; celui des ailes inférieures avec deux lignes blanches ondulées, bordées de brun, et deux points oculaires roux à l'angle de l'anus.

57. POLYOMMATE Cithonius.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-luisant, avec le sommet d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-violetâtre; celui des inférieures avec des anneaux blancs sur le disque, et deux yeux à iris rouge près de l'angle de l'anus. (Mâle.)

58. POLYOMMATE Falacer.

Ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous avec deux traits discoïdaux et deux lignes postérieures ondulées d'un bleu-pâle : celui des inférieures ayant à l'angle interne trois lunules rousses.

59. POLYOMMATE Isocrate.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet bleu chez le mâle) : dessous cendré, avec une double liture et une double ligne très-ondulée noirâtres et bordées de blanc de chaque côté; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve.

60. POLYOMMATE Éryllis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet-changeant chez le mâle) : dessous d'un gris-satiné, avec une double liture et une ligne ondulée roussâtres et bordée de blanc de chaque côté; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve.

61. POLYOMMATE Cléobis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré chez le mâle, d'un bleu plus pâle chez la femelle, avec le sommet d'un noir-brun : dessous d'un gris-brunâtre, avec une ligne ondulée roussâtre et bordée de blanchâtre en arrière; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux à iris fauve.

62. POLYOMMATE Cippus.

Ailes à deux queues, bleues, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous cendré; celui des inférieures avec deux points noirs à l'angle interne. FAB.

63. POLYOMMATE Lougii.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant chez le mâle, d'un bleu plus pâle chez la femelle, avec le sommet d'un noir-brun : dessous d'un gris-satiné-blanchâtre, avec une ligne transverse et non bordée de lunules noires; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux à iris fauve.

64. POLYOMMATE Nédymond.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe d'un noir-brun : dessous d'un blanc-satiné, avec une double bande terminale obscure; inférieures ayant à l'angle anal deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris fauve, l'intérieur à iris d'un bleu-argenté.

65. POLYOMMATE Favorius.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des taches fauves sur le disque des supérieures et à l'extrémité des inférieures : dessous cendré, avec deux lignes blanches ondulées; inférieures ayant une bande rousse presque marginale et l'angle de l'anus bleu.

66. POLYOMMATE Mars.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous plus pâle; celui des infé-

POLYOMMATE. (Insecte.)

rières avec deux points basilaires, et une ligne bifide, blanches : la ligne bifide embrassant une tache rousse.

67. POLYOMMATE Ergéus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré ; celui des inférieures ayant une ligne ondulée d'un rouge-sanguin et bordée de blanc en arrière, puis une bande anale briquetée très-dilatée dans son milieu et marquée postérieurement de trois points noirs.

68. POLYOMMATE Nébis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré et offrant derrière le milieu deux lignes ondulées transversales, dont l'antérieure formée par des taches d'un rouge-brique, la postérieure par des anneaux blancs ; deux yeux roux à l'angle interne des ailes inférieures. (La femelle.)

69. POLYOMMATE Cléon.

Ailes à queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une ligne transverse aux supérieures, et une bande dentée aux inférieures, d'un rouge-sanguin ; deux yeux roux à l'angle interne des ailes inférieures. FAB.

70. POLYOMMATE Béon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-pâle : leur dessous d'un cendré-luisant ; celui des inférieures avec une bande médiane d'un rouge-sanguin et des lunules marginales noires : une ligne blanche anguleuse coupant la bande à sa partie inférieure.

71. POLYOMMATE Cécrops.

Ailes à deux queues, noires : leur dessous avec une bande d'un rouge-sanguin. FAB.

72. POLYOMMATE Tyrtée.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre : leur dessous avec une ligne blanche ondulée, et des lunules marginales noires, dont les intermédiaires rousses. FAB.

73. POLYOMMATE Échion.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (bord interne d'un bleu-ardoisé-luisant chez le mâle) : dessous blanchâtre, avec des points oculaires d'un rouge-brique sur le milieu, une ligne noirâtre ondulée et deux yeux roux à l'extrémité.

74. POLYOMMATE Columelle.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-ardoisé-pâle : dessous brunâtre, avec une ligne flexueuse de points oculaires noirs, puis des lunules et des anneaux blancs ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris roux.

75. POLYOMMATE Mégaclys.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-ardoisé : dessous des inférieures cendré à la base, blanchâtre à l'extrémité, avec trois bandes ondulées et un point central ferrugineux. (Mâle.)

76. POLYOMMATE Mégafus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle : dessous des inférieures blanchâtre, avec trois lignes flexueuses de taches brunes, et deux yeux à iris roux.

77. POLYOMMATE Étolus.

Ailes à deux queues : supérieures noires ; inférieures d'un bleu-pâle en dessus, blanchâtres en dessous avec un point basilaire et deux marginaux noirs. FAB.

POLYOMMATE. (Insecte.)

78. POLYOMMATE Dindus.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le bord interne bleu : dessous cendré, avec des taches blanches et une double tache anale rousse. FAB.

79. POLYOMMATE Gabélus.

Dessus des ailes d'un bleu-obscur, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous d'un blanc-grisâtre, avec deux lignes noires ondulées aux supérieures, et trois aux inférieures; un oeil à iris roux près de l'angle interne des ailes inférieures. (Femelle.)

80. POLYOMMATE Jébus.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous brunâtre, avec le sommet des supérieures, et toute la surface des inférieures, panachés de blanchâtre; deux points noirs, dont l'intérieur oblong, à l'angle anal des ailes inférieures. (Femelle.)

81. POLYOMMATE Mécène.

Ailes à deux queues, d'un noir-brun, avec le disque bleu : dessous nué de brun. FAB.

82. POLYOMMATE Céthégus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant, avec le limbe d'un noir-brun : dessous cendré; celui des inférieures avec deux lignes ondées, et une série marginale de points, d'un brun-noirâtre; point de l'angle anal cerclé de fauve.

83. POLYOMMATE Calus.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté très-brillant, avec le limbe noir : dessous cendré; celui des supérieures avec une grande tache médiane, celui des inférieures avec une ligne ondulée, d'un brun-noir.

84. POLYOMMATE Hugon.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve : dessous d'un brun-pâle, avec une ligne ondulée d'un rouge-brique et bordée de blanc en arrière; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris roux.

85. POLYOMMATE Xénophon.

Ailes à deux queues, d'un brun-noirâtre, avec le disque jaune : leur dessous cendré, avec une ligne médiane blanche, contiguë à une ligne obscure. FAB.

86. POLYOMMATE Damastus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve : leur dessous vert; celui des inférieures avec trois lignes flexueuses, et trois yeux marginaux, noirs et bordés de blanc.

87. POLYOMMATE Télème.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne noire marginale, dilatée près du sommet et très-anguleuse près du bord interne.

88. POLYOMMATE Janias.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec le limbe noir : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne ondulée et un point oculaire noirs.

89. POLYOMMATE Hérodote.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier, avec le limbe noir : leur dessous vert; celui des inférieures avec une ligne transverse de points, noirs en avant, blancs en arrière.

90. POLYOMMATE Ethémion.

Dessus des ailes noir, avec le milieu bleu : leur dessous fauve, avec une li-

POLYOMMATE. (Insecte.)

gne rouge transverse sur le milieu; celui des inférieures offrant vers l'extrémité un cordon de lunules, noires en avant, blanches en arrière. (Feinelle?)

91. POLYOMMATE Lycabas.

Dessus des ailes bleu, avec le bord noir: leur dessous d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité plus pâle; angle interne des inférieures jaune et rayé de noir. (Le mâle.)

7. Dessus des ailes supérieures du mâle n'offrant pas vers le milieu de tache orbitaire distincte.

92. POLYOMMATE Aenus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir: leur dessous d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanchâtres; origine de la côte des supérieures et angle interne des inférieures sans taches. (Mâle.)

93. POLYOMMATE Hyacinthe.

Ailes d'un bleu-verdâtre-luisant, avec une bordure noire en dessus; avec trois bandes noires et une bande centrale blanche en dessous.

94. POLYOMMATE Cyanus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe noir: leur dessous d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc à partir de la base; une rangée marginale de sept yeux d'un bleu-argenté aux inférieures. (Mâle.)

95. POLYOMMATE Pholénus.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-luisant: leur dessous noir, avec des bandes d'un vert-doré. (Mâle.)

96. POLYOMMATE Philaethe.

Ailes d'un brun-noirâtre: dessus des inférieures avec un point blanc au bord interne, leur dessous avec quatre bandes jaunâtres et deux lignes argentées transversales.

97. POLYOMMATE Simæthis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-chatoyant: leur dessous d'un vert-jaunâtre, avec une bandelette transverse argentée; extrémité des inférieures ferrugineuse, avec une série de points nacrés.

98. POLYOMMATE Chrysus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des points blancs vers l'extrémité des supérieures: dessous ferrugineux, avec des taches et des bandes d'un vert-doré et bordées de noir.

99. POLYOMMATE Acheus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des litures jaunes sur toutes les quatre: dessous jaune, avec une multitude de taches dorées, bordées de brun-purpurin.

100. POLYOMMATE Valens.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-chatoyant: dessous d'un jaune-pâle, avec des taches rouges chargées de points d'or.

101. POLYOMMATE Vulcain.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet chez le mâle), avec des bandes jaunes: dessous d'un rouge-foncé, avec des bandes jaunes bordées de noir, et des lignes intermédiaires de taches argentées.

POLYOMMATE. (Insecte.)

102. POLYOMMATE Oycas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre, avec le limbe noir : dessous d'un brun-ferrugineux, avec une multitude de taches argentées.

C. Bord antérieur des premières ailes plus ou moins arqué vers son origine. Bord postérieur des secondes ailes avec une seule queue extérieure, linéaire ou filiforme.

a. Bord postérieur des secondes ailes flexueux ou un peu dentelé, et ayant une queue linéaire.

103. POLYOMMATE Périou.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec des bandes fauves : dessous d'un ferrugineux-jaunâtre, avec une multitude de points oculaires dorés sur les quatre, et une ligne élevée, également dorée, sur le bord terminal des inférieures.

104. POLYOMMATE Harpax.

Ailes à queue, fauves, tachetées de noir : leur dessous cendré, avec des points dorés. FAB.

105. POLYOMMATE Lircus.

Ailes blanches, ayant l'extrémité d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous avec des bandes transverses d'un noir-brun, et le bord postérieur fauve ; angle anal des inférieures noir, avec quatre points blancs.

106. POLYOMMATE Philippe.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre : leur dessous blanc, avec deux lignes transverses fauves ; deux points noirs presque oculaires à l'angle anal des inférieures. FAB.

107. POLYOMMATE Phorbas.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc : leur dessous blanc, avec des lignes cendrées transversales ; deux points noirs à l'angle interne des inférieures. FAB.

108. POLYOMMATE Jarbas.

Dessus des ailes fauve, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous brunâtre, avec une double ligne et une ligne ondulées blanches ; angle anal des inférieures avec deux points noirs, dont l'extérieur surmonté d'une lunule fauve.

109. POLYOMMATE Épiclès.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre (un reflet violet chez le mâle) : supérieures avec le disque, inférieures avec des taches marginales, fauves : dessous jaune, avec une bande terminale d'un rouge-sanguin et ayant le côté interne bordé par des lunules blanches.

110. POLYOMMATE du Rouleau.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : dessous d'un jaune-fauve, avec deux lignes blanches ondulées, dont une plus courte, et le bord postérieur roux.

111. POLYOMMATE du Prunier.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande postérieure fauve, maculaire en dessus, ayant les côtés bordés en dessous par des points noirs.

112. POLYOMMATE W-blanc.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures offrant sur le milieu une ligne blanche, terminée par un W, et sur le bord postérieur une bande flexueuse rousse, bordée de noir.

113. POLYOMMATE Lyncée.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des lunules marginales rousses, précédées d'une ligne transverse de petits traits blancs ; trait inférieur oblique.

POLYOMMATE. (Insecte.)

114. POLYOMMATE du Maronnier.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des lunules marginales d'un roux-foncé, petites et précédées d'une ligne transverse de traits blancs ; trait inférieur représentant un C renversé.

115. POLYOMMATE de l'Acacia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un gris-cendré, avec une ligne blanche, transverse et interrompue ; celui des inférieures avec des lunules marginales rousses, rapprochées. (Anus de la femelle terminé par un bourrelet de poils noirs.)

116. POLYOMMATE du Prunellier.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une ligne blanche transverse et ondulée ; celui des inférieures avec des lunules fauves sur le bord postérieur, et une tache d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

117. POLYOMMATE du Chêne.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, glacé de violet dans le mâle, avec une tache bifide bleue à la base des ailes supérieures dans la femelle : dessous d'un gris-satiné, avec une ligne blanche, transverse et ondulée, puis deux taches fauves, anales.

118. POLYOMMATE Apidanus.

Dessus des ailes violet (une large bordure d'un brun-noirâtre dans la femelle) : dessous d'un brun-noirâtre, varié de gris-de-perle, avec l'origine de la côte d'un rouge-sanguin ; des atomes d'un vert-doré à l'angle anal des inférieures.

119. POLYOMMATE Hélius.

Dessus des ailes d'un violet-velouté (une large bordure d'un brun-noirâtre

dans la femelle) : dessous d'un brun-noirâtre, réticulé de gris ; celui des supérieures avec quelques anneaux sur le disque, celui des inférieures avec des atomes à l'angle interne, d'un vert-doré.

120. POLYOMMATE Eumolphus.

Dessus des ailes d'un vert à reflet doré, avec une bordure noire, plus large aux inférieures : dessous d'un brun-noirâtre, avec quelques anneaux et des lignes ondulées d'un cendré-pâle ; une petite bande d'un bleu-argenté à l'angle anal des inférieures.

121. POLYOMMATE Théocrite.

Ailes à queue, d'un vert-pâle, avec la côte obscure : dessous noir, avec des lignes transverses de points jaunâtres.
FAB.

2. Bord postérieur des secondes ailes entier et ayant une queue filiforme.

122. POLYOMMATE Boëticus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, et ondulé de blanc depuis la base jusqu'à l'extrémité ; celui des inférieures offrant une bande blanche continue, et deux yeux dorés à l'angle de l'anus.

123. POLYOMMATE Élien.

Dessus des ailes d'un blanc de lait, avec le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un brun-pâle, avec plusieurs lignes transverses et une bande bifide blanches ; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés. (Mâle.)

124. POLYOMMATE Célério.

Dessus des ailes d'un blanc de lait, avec le limbe postérieur d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-pâle,

POLYOMMATE. (Insecte.)

avec plusieurs lignes blanches, transverses, continues, ondulées; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés.

125. POLYOMMATE Elpis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-luisant : leur dessous d'un centré-foncé, avec plusieurs lignes blanches, transverses, étroites, interrompues et ondulées; angle anal des inférieures avec deux yeux argentés. (Mâle.)

126. POLYOMMATE Hylais.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-luisant, avec le milieu blanc : leur dessous d'un brun-noirâtre, avec une large bande continue, et quelques ondes, blanches; bord terminal des inférieures avec une rangée de six yeux noirs, dont le pénultième ayant une double prunelle argentée. (Mâle?)

127. POLYOMMATE Platon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, à reflet argentin, avec le sommet des supérieures noir : leur dessous d'un brun-obscur, avec plusieurs lignes blanches, transverses et ondulées; angle anal des inférieures avec trois yeux argentés.

128. POLYOMMATE Tëicarus.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, et offrant des chaînettes blanches depuis la base jusqu'à l'extrémité; celui des inférieures avec une rangée transverse de lunules blanches, et deux yeux dorés à l'angle de l'anus.

129. POLYOMMATE Lybas.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre (une bordure brune dans la femelle) : leur dessous brun, avec des bandes bifides et une chaînette ter-

minale blanches aux supérieures, avec des hiéroglyphes blancs entrelacés aux inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec quatre yeux dorés.

130. POLYOMMATE Lingéus.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre (une bordure brune dans la femelle) : leur dessous brun, avec des anneaux et des bandes sinuées blancs aux supérieures, avec des taches blanches difformes aux inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec deux yeux dorés.

131. POLYOMMATE Éricus.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle : leur dessous varié de blanc et de brun; angle anal des inférieures avec deux points (blancs et cerclés de noir). FAB.

132. POLYOMMATE Démocrite.

Ailes à queue, d'un bleu très-luisant en dessus : leur dessous noir et tacheté de blanc. FAB.

133. POLYOMMATE Émolus.

Dessus des ailes d'un violet-luisant : leur dessous d'un brun-pâle; celui des inférieures entièrement couvert de lignes blanchâtres, transverses, ondulées, interrompues, et offrant deux points oculaires noirs, dont un placé sur le bord interne, l'autre sur le bord postérieur. (Mâle.)

134. POLYOMMATE Strabon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe brun : leur dessous cendré, ayant derrière le milieu des chaînettes blanchâtres, sur la côte des supérieures un point noir, et deux sur celle des inférieures; angle anal de ces dernières ailes avec deux yeux dorés, dont un plus petit.

POLYOMMATE. (Insecte.)

135. POLYOMMATE CHERJUS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous cendré, ayant derrière le milieu des châtinettes blanchâtres ; celui des inférieures offrant à la base quatre points noirs, et à l'angle de l'anus deux yeux dorés.

136. POLYOMMATE PANTHAIUS.

Ailes à queue, bleues (brunes) : leur dessous cendré et strié de blanc ; celui des inférieures avec des (quatre) points marginaux dorés. FAB.

137. POLYOMMATE ASTÉTIS.

Dessus des ailes d'un violet-argenté-luisant, avec le limbe brun : dessous des inférieures d'un cendré-obscur, avec six points noirs oculaires à la base, une bande blanche crénelée sur le milieu, et trois yeux argentés à l'angle de l'anus.

138. POLYOMMATE CENTAURE.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle, avec une bordure brune : leur dessous cendré, avec des taches oculaires à la base. FAB.

139. POLYOMMATE THÉOPHASTE.

Dessus des ailes d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous blanc, avec plusieurs lignes noires, transverses et maculaires ; bord postérieur des inférieures, avec cinq yeux dorés, dont l'anal double.

140. POLYOMMATE PLINE.

Ailes à queue, variées de blanc et de brun : dessous des inférieures avec un double point doré à l'angle de l'anus. FAB.

141. POLYOMMATE ROSIMON.

Ailes blanches de part et d'autre, avec des points épars et tout le pourtour noirs :

dessus des quatre d'un bleu-argenté à la base ; dessous des inférieures avec trois points du même bleu près de l'angle de l'anus.

142. POLYOMMATE ROXUS.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec un espace commun blanc sur le milieu : dessous blanc, avec une bande oblique à la base, et deux bandes maculaires à l'extrémité, d'un noir-brun.

143. POLYOMMATE HIPPOCRATE.

Ailes à queue, d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité blanche : leur dessous blanc, avec des points noirs. FAB.

144. POLYOMMATE GABINUS.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté : leur dessous blanc et ondulé de brunâtre ; celui des inférieures avec deux points noirs à la base et deux à l'angle de l'anus : point anal extérieur surmonté d'une lunule fauve. (Mâle.)

145. POLYOMMATE MICYCHUS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre (une bordure brune chez la femelle) : dessous d'un gris-bleuâtre, avec trois lignes roussâtres, transverses et ondulées, puis une série marginale de points noirs ; pénultième point des secondes ailes ayant une prunelle argentée.

146. POLYOMMATE AMYNTAS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle : leur dessous d'un gris-bleuâtre et ocellé de noir ; celui des inférieures offrant à l'angle anal deux lunules fauves, chargées chacune d'un simple point noir.

POLYOMMATE. (Insecte.)

147. POLYOMMATE Comyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle ; leur dessous d'un gris-bleuâtre et ocellé de noir ; celui des inférieures offrant à l'angle anal deux lunules fauves, chargées chacune d'un œil doré.

148. POLYOMMATE Lacturbus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe brun : leur dessous d'un gris-bleuâtre ; celui des inférieures ocellé de noir vers la base, de brun vers l'extrémité, et offrant à l'angle anal une bande rousse, sinuée et chargée de deux yeux dorés. (Mâle.)

149. POLYOMMATE Phidias.

Ailes à queue, d'un bleu-pâle, avec le limbe brun : leur dessous cendré, avec un point noir à l'angle anal des quatre. F. AB.

150. POLYOMMATE Bochus.

Dessus des ailes bleu, avec une bordure noire : leur dessous d'un cendré-obscur ; celui des supérieures sans taches, celui des inférieures ayant l'angle anal noir et marqué de croissans argentés.

D. Ailes dentées ou entières : les inférieures ayant l'angle interne plus ou moins prolongé dans les mâles.

151. POLYOMMATE Polyclète.

Ailes dentées, d'un bleu-barbeau dans le mâle, d'un brun-noirâtre avec la base d'un bleu-verdâtre pâle dans la femelle : leur dessous d'un brun-obscur, avec des bandes d'un rouge-sanguin, bordées de noir et de vert-doré.

152. POLYOMMATE Narcisse.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-pâle : leur dessous avec des bandes et des taches d'un rouge-sanguin et bordées d'argent. F. AB.

153. POLYOMMATE Apelle.

Ailes dentées, fauves, avec le limbe d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des bandes russes bordées d'argent. F. AB.

154. POLYOMMATE Théro.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec des taches fauves : dessous des inférieures d'un cendré-obscur, avec des taches linéaires d'un blanc-argenté ; tache du disque crochue à chaque bout.

155. POLYOMMATE Alphée.

Ailes dentelées, d'un noir-brun en dessus, avec une bande commune d'un fauve-luisant : dessous des inférieures d'un gris de perle, avec une bande discoidale sinuée, et le limbe postérieur, ferrugineux.

156. POLYOMMATE Thyta.

Ailes d'un noir-brun en dessus, avec le disque fauve : leur dessous d'un ferrugineux-rougeâtre, avec une multitude de taches noires à prunelle argentée et élevée. (Mâle.)

157. POLYOMMATE Thysbé.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec des taches noires (un reflet d'un bleu-argenté à la base) : dessous des inférieures ferrugineux, panaché et strié de jaunâtre, avec des taches dorées.

158. POLYOMMATE Hicré.

Ailes presque entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, fouetté de fauve et tacheté de noir (un reflet violet très-vif dans le mâle) : dessous des inférieures cendré, ocellé de noir, avec la base bleuâtre et une bande marginale fauve.

POLYOMMATE. (Insecte.)

159. POLYOMMATE Gordius.

Ailes presque entières, fauves en dessus (un reflet violet dans le mâle), avec des points et le limbe postérieur noirs : dessous des inférieures d'un cendré-jaunâtre, ocellé de noir, avec la base verdâtre et une bande marginale fauve.

160. POLYOMMATE Thersamon.

Ailes presque entières, fauves, avec un léger reflet violet dans le mâle, avec des taches noires dans la femelle : dessous des inférieures un peu obscur vers le milieu ; leur dessous cendré, avec des points oculaires noirs et une bande marginale fauve.

161. POLYOMMATE Xanthé.

Ailes presque entières, d'un brun-chaoyant en dessus, avec des taches noires ; leur dessous d'un jaune-verdâtre-pâle, avec des points oculaires noirs : une bande marginale fauve sur les deux surfaces.

162. POLYOMMATE Hellé.

Ailes presque entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec un reflet violet, et le disque des supérieures varié de fauve et de noir : dessous des inférieures d'un brun-tanné, avec des points oculaires noirs, une ligne anguleuse blanche et une bande marginale fauve.

163. POLYOMMATE Chryséis.

Ailes presque entières, fauves en dessus, avec les bords glacés de violet et le disque bipoctué dans le mâle avec des taches noires dans la femelle : dessous des inférieures d'un cendré-obscur, avec une multitude de points oculaires et une bande anale rousse.

164. POLYOMMATE Eurydice.

Dessus du mâle fauve, bordé de noir et sans taches sur le disque ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec des taches noires : dessous d'un cendré légèrement jaunâtre, avec une multitude de points oculaires et la base verdâtre.

165. POLYOMMATE Hippothoé.

Dessus des ailes fauve, avec une légère bordure et une lunule centrale noires aux quatre dans le mâle, avec plusieurs taches aux supérieures dans la femelle : dessous cendré, avec la base bleuâtre, une multitude de points oculaires, et une bande marginale fauve.

166. POLYOMMATE de la Verge-d'or.

Dessus des ailes fauve, bordé de noir, sans taches dans le mâle, avec plusieurs taches dans la femelle : dessous des inférieures d'un jaune-faive-pâle, avec des points noirs faiblement ocellés et une ligne transverse de taches blanches.

167. POLYOMMATE Phlébas.

Ailes supérieures d'un fauve-cuivré, avec des taches noires : dessous des inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve crénelée ; leur dessous d'un cendré-brunâtre, avec des points noirâtres et une ligne flexueuse d'un rouge-brique.

168. POLYOMMATE Hylla.

Ailes dentées, fauves, ponctuées de noir : base des inférieures d'un brun-noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous. FAB.

169. POLYOMMATE Saluste.

Ailes entières, fauves, variées de noir : dessous des supérieures ponctuée de noir, dessous des inférieures cendré et tacheté de brun. FAB.

POLYOMMATE. (Insecte.)

170. POLYOMMATE Évadrus.

Ailes dentelées, fauves en dessus, avec tous les bords d'un brun-noirâtre et la frange entre-coupée : dessous des inférieures d'un brun-tanné, avec des taches cendrées.

171. POLYOMMATE Pétalus.

Ailes entières, fauves en dessus, avec des taches discoïdales et le limbe postérieur noirs : dessous des inférieures d'un gris-nébuleux, avec deux bandes transverses blanches.

172. POLYOMMATE Opus.

Ailes entières, fauves en dessus (un léger reflet violet chez le mâle), avec des points et le bord postérieur noirs : dessous des inférieures cendré, avec des taches oculaires peu prononcées et une rangée marginale de lunules brunâtres.

173. POLYOMMATE Zexu.

Ailes sans queue, entières, avec le disque fauve et tacheté de noir : dessous des supérieures avec des taches argentées.
LINN.

174. POLYOMMATE Ballus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus (un espace fauve chez la femelle) : dessous des inférieures vert à la base, avec un ail central peu prononcé ; d'un cendré-incarnat à l'extrémité, avec une rangée de points rouges surmontés chacun d'un point blanc.

175. POLYOMMATE de la Roncée.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus : leur dessous vert, avec un liseré ferrugineux et une rangée transversale de points blancs.

176. POLYOMMATE Roidulus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : leur dessous vert ; celui des inférieures avec une tache rousse. FAB.

177. POLYOMMATE Ithus.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures ferrugineux à la base avec deux lignes ondulées plus obscures, saupoudré de gris à l'extrémité avec un point d'un brun-marron. (Mâle.)

178. POLYOMMATE Philiastus.

Ailes un peu en queue, noires en dessus, tachetées en dessous : extrémité des inférieures offrant deux yeux en dessus et un seul en dessous. LINN.

179. POLYOMMATE Lara.

Dessus des quatre ailes d'un brun un peu briqueté, avec un léger reflet bleuâtre à la base et deux yeux à l'angle de l'anus : leur dessous cendré, celui des supérieures avec deux yeux comme en dessus, celui des inférieures sans yeux.

180. POLYOMMATE Syméthus.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une tache blanche sur le milieu des quatre : dessous des inférieures d'un blanc-sali, avec des hiéroglyphes noirâtres peu prononcés.

181. POLYOMMATE Phœdrus.

Ailes entières, fauves en dessus dans le mâle, avec le pourtour extérieur noir ; d'un brun-noirâtre dans la femelle, avec le disque blanc : leur dessous d'un blanc-satiné, avec une rangée marginale de petits points noirs.

POLYOMMATE. (Insecte.)

182. POLYOMMATE Tétrambus.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus, avec le pourtour extérieur noir : leur dessous d'un brun-tanné-clair, avec une raie commune ferrugineuse ; celui des inférieures ayant un œil blanc à l'angle de l'anus.

183. POLYOMMATE Pétavius.

Ailes entières, noires en dessus : supérieures avec une bande fauve, oblique : dessous des quatre fauve, aspergé de noir, et ayant sur le disque des points oculaires d'un bleu-lilas.

184. POLYOMMATE Évandras.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant de part et d'autre une bande postérieure fauve : leur dessous offrant sur le disque une tache d'un bleu-lilas.

E. Ailes inférieures sans queue extérieure et sans prolongement anal (dentées parfois chez la femelle).

α. Dessous des ailes avec plus ou moins de lignes transversales, maculaires ou continues, et souvent accompagnées de points ocellés.

185. POLYOMMATE Hubner.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre à reflet violet changeant : supérieures avec une tache d'un jaune-fauve sur le disque : dessous des quatre d'un blanc-satiné, avec une série marginale de points noirs. (Mâle.)

186. POLYOMMATE Duponchel.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le disque des quatre blanc : leur dessous d'un blanc-satiné, avec un trait central, deux lignes ondulées et une simple série de points marginaux, d'un brun-noirâtre.

187. POLYOMMATE Duiménil.

Ailes entières, d'un beau blanc en dessus, avec le contour extérieur des supérieures largement brun : dessous d'un blanc-sale, offrant derrière le milieu deux lignes ondulées, et une ligne de points, brunâtres ; inférieures avec une tache marginale très-noire. (Mâle.)

188. POLYOMMATE Héraldus.

Ailes entières, bleues en dessus, avec le limbe noir : leur dessous blanc, avec le bord postérieur ponctué de noir. FAB.

189. POLYOMMATE Ladon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle (extrémité des supérieures brune dans la femelle) : dessous d'un gris-bleuâtre, offrant derrière le milieu une série flexueuse de taches noires, puis une ligne en feston et des points marginaux bruns.

190. POLYOMMATE Argiolus.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle (extrémité des supérieures brune dans la femelle) : dessous d'un blanc de lait, avec de simples points noirs.

191. POLYOMMATE Dion.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre : dessous blanc, avec de simples points et des traits d'un brun-noirâtre ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à prunelle bleue. (Mâle.)

192. POLYOMMATE Cassius.

Dessus du mâle d'un brun-violet-tendre, dessus de la femelle blanc et ayant le contour extérieur des ailes supérieures brun : dessous blanc, tacheté et fascié de noir ; angle anal des inférieures avec deux yeux argentés.

POLYOMMATE. (Insecte.)

193. POLYOMMATE Clyton.

Ailes entières, variées de blanc et de noir en dessus, avec un reflet bleu à la base : leur dessous blanc, avec un très-grand nombre de taches noires ; pas d'yeux à l'angle anal des inférieures.

194. POLYOMMATE Isarchus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, avec une tache sur le milieu des supérieures, et une bande sur le milieu des inférieures, blanches : dessous blanc ; celui des inférieures avec deux bandes noires sinuées, et deux yeux argentés à l'angle de l'anus. (Mâle.)

195. POLYOMMATE Lagus.

Ailes entières, d'un violet-luisant en dessus, avec le sommet noir : leur dessous cendré, avec des veines noires. (Mâle.)

196. POLYOMMATE Érius.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre- chatoyant en dessus : leur dessous cendré ; celui des supérieures avec deux taches noires à l'angle interne, celui des inférieures avec des points oculaires peu prononcés à la base.

197. POLYOMMATE Labradus.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle en dessus : leur dessous cendré ; celui des inférieures avec une multitude d'anneaux blancs et la base bleuâtre. (Mâle.)

198. POLYOMMATE Dermoctès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus : leur dessous avec des ondes cendrées ; celui des inférieures ayant deux yeux dorés. FAB.

199. POLYOMMATE Damæus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre- chatoyant en dessus : leur dessous grisâtre, avec une multitude d'anneaux bruns ecclés de blanc ; angle anal des inférieures offrant deux yeux à iris fauve. (Femelle.)

200. POLYOMMATE Catilina.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet bleu : leur dessous fascié de blanc ; celui des inférieures avec deux yeux bleus à l'angle de l'anus. FAB.

201. POLYOMMATE Céraunus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre à reflet bleu : leur dessous cendré ; celui des inférieures avec des points noirs oculaires à la base, un œil et un point à l'extrémité. FAB.

202. POLYOMMATE Mihérés.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : dessous des inférieures avec des points rouges oculaires, et un œil anal. FAB.

203. POLYOMMATE Bazoche.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec le disque des inférieures bleu : dessous des supérieures ayant à l'extrémité une bande blanchâtre en forme de hachette, dessous des inférieures marbré. (Mâle.)

204. POLYOMMATE Ubaldu.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle : dessous cendré ; celui des inférieures offrant trois points noirs oculaires à la base, puis des anneaux et des taches carrées blanches, et un œil anal doré.

POLYOMMATE. (Insecte.)

205. POLYOMMATE Messapus.

Dessus des ailes violet, avec le limbe brun : leur dessous cendré et offrant depuis le milieu jusqu'à l'extrémité des anneaux blancs séparés ; celui des inférieures avec deux points noirs sur la côte, et un œil surmonté d'une lunule fauve à l'angle de l'anus. (Mâle.)

206. POLYOMMATE Pirithoius.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre (une large bordure brune dans la femelle) : leur dessous brun et offrant depuis la base jusqu'à l'extrémité des chaînes blanches ; celui des inférieures avec une bande sinuée continue, et deux yeux violets à l'angle de l'anus.

207. POLYOMMATE Thespis.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le limbe brun et la frange panachée : leur dessous brun, avec des taches blanches en échiquier ; celui des inférieures offrant vers l'angle anal deux points dorés.

208. POLYOMMATE Ochsenheimer.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec le limbe brun : dessous des supérieures avec le disque fauve et réticulé ; dessous des inférieures brun, avec des anneaux gris, puis une bande flexueuse très-blanche et trois yeux dorés.

209. POLYOMMATE Parisimon.

Ailes entières, d'un brun-obscur en dessus : leur dessous cendré, avec un anneau central, une double ligne arquée et deux rangées de lunules marginales, blancs ; celui des inférieures avec des points oculaires noirs à la base, et un œil argenté à l'angle de l'anus.

210. POLYOMMATE Cistus.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre, avec le limbe brun : leur dessous cendré et ocellé de noir ; celui des inférieures offrant à l'angle de l'anus une petite bande fauve marquée d'un œil doré.

211. POLYOMMATE Éyippus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre, et glacé de violet à la base : leur dessous d'un gris-satiné, avec une série marginale de taches fauves triangulaires, chargées chacune en avant d'un point noir ocellé, et en arrière d'un trait d'un bleu-argenté.

β. Dessous des ailes avec des points ordinairement ocellés, et ayant vers l'extrémité une bande transverse blanche ou blanchâtre, suivie de taches marginales ou d'une bande fauve.

212. POLYOMMATE Argus.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus, avec une large bordure brune et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-blanchâtre et ocellé de noir ; celui des inférieures avec une bande fauve, sinuée, et chargée d'un rang de points argentés. (Plus grand.)

213. POLYOMMATE Ægou.

Ailes entières, d'un bleu-violet en dessus chez le mâle, avec une large bordure brune et une frange blanche ; d'un brun-noirâtre chez la femelle : leur dessous d'un cendré-obscur et ocellé de noir ; celui des inférieures avec une bande fauve, sinuée, et chargée d'un rang de points argentés. (Plus petit.)

214. POLYOMMATE Ophilète.

Ailes entières, d'un violet-argenté en dessus, avec une bordure noire et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-clair et ocellé de noir ; celui des inférieures avec deux lunules fauves et deux points argentés à l'angle de l'anus.

POLYOMMATE. (Insecte.)

215. POLYOMMATE de l'Orpin.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en dessus, avec une frange panachée, la base des quatre, et des annelets marginaux aux inférieurs, violets; dessous blanc, avec une multitude de points noirs non ocellés; celui des inférieures offrant une bande fauve flexueuse.

216. POLYOMMATE Hylas.

Ailes entières, d'un bleu-violet-pâle en dessus (sommet des quatre brun chez la femelle), avec une lunule centrale noire et une frange panachée; dessous d'un cendré-blanchâtre, avec une multitude de points noirs ocellés; celui des inférieures offrant une bande de cinq lunules fauves.

217. POLYOMMATE Orbitulus.

Ailes entières, ayant le dessus d'un cendré-argentin dans le mâle, d'un brun-noirâtre dans la femelle, avec une frange blanche; leur dessous cendré, celui des supérieures avec une multitude de points ocellés, celui des inférieures avec une tache blanche en cœur sur le disque et deux lunules roussâtres à l'angle de l'aube.

218. POLYOMMATE Titus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus; dessous des inférieures ocellé et offrant une série postérieure de taches fauves. F. AB.

219. POLYOMMATE Artaxercès.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre; dessous des supérieures avec un point médian blanc; dessous des quatre avec des taches ainsi que le limbe postérieur blancs, et une série terminale de lunules rousses.

7. Dessous des ailes avec des points ocellés; celui des inférieures offrant au-delà du milieu une tache blanche longitudinale, suivie de taches marginales fauves.

220. POLYOMMATE Agestis.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus; leur dessous cendré, avec une multitude de points noirs ocellés; les quatre ailes ayant de part et d'autre une bande presque terminale de taches rouges et une frange panachée.

221. POLYOMMATE Agestor.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant en dessus; leur dessous d'un cendré-pâle, avec une multitude de points noirs ocellés; yeux voisins de l'angle anal des inférieures argentés; les quatre ailes ayant de part et d'autre une bande presque terminale de taches fauves et une frange panachée. (Femelle.)

222. POLYOMMATE Alexis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-violet chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle, avec une frange blanche; leur dessous cendré, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, et une bande marginale de taches fauves.

223. POLYOMMATE Adonis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-azuré un peu violâtre chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle, avec une frange panachée; leur dessous brunâtre, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, et une bande marginale de lunules fauves.

224. POLYOMMATE Dorylas.

Ailes entières, d'un bleu d'azur chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle, avec une frange blanche; leur dessous brunâtre, avec la base verdâtre, une multitude de points ocellés, une bande de taches fauves en fer de flèche, et le bord postérieur blanchâtre.

POLYOMMATE. (Insecte.)

225. POLYOMMATE Titlionus.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet rougeâtre, avec une bordure noire crénelée et une frange blanche : leur dessous cendré, avec une multitude de points ocellés, et une bande marginale de lunules fauves. (Mâle.)

226. POLYOMMATE Triton.

Ailes très-entières, d'un bleu-pâle en dessus : leur dessous cendré, avec une bande ferrugineuse et une multitude de points noirs. FAB.

227. POLYOMMATE Corydon.

Ailes entières, ayant le dessus argenté et chatoyant en verdâtre, avec une bordure ocellée et une frange panachée : leur dessous cendré, avec une multitude de points oculaires ; celui des inférieures verdâtre à la base, et offrant à l'extrémité une série de lunules fauves.

228. POLYOMMATE Méléagre.

Ailes dentées, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet rougeâtre, avec une bordure noire et une frange blanche : dessous du mâle blanchâtre, dessous de la femelle brunâtre, avec des points noirs ocellés, et un double cordon marginal de lunules blanchâtres.

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures offrant des lunules marginales fauves, mais n'ayant pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

229. POLYOMMATE Agathon.

Ailes un peu dentées, ayant le dessus d'un bleu-argenté à reflet verdâtre, avec une bordure noire et une frange blanche : leur dessous d'un cendré-pâle, avec des points ocellés ; celui des inférieures verdâtre à la base, et marqué de quatre lunules fauves à l'angle de l'aisselle.

230. POLYOMMATE Icarus.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-violet à reflet argentin, avec une bordure brune et une frange blanche : leur dessous cendré, avec une lunule centrale et une rangée de points ocellés ; celui des inférieures offrant une bande fauve, maculaire, et suivie d'un cordon marginal de points noirs.

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures ayant sur le milieu une bandelette longitudinale blanche ou blanchâtre.

231. POLYOMMATE Damon.

Ailes entières, ayant le dessus d'un bleu-argenté chez le mâle, d'un brun-noirâtre chez la femelle : leur dessous d'un cendré-rougeâtre, avec une rangée transverse de points ocellés ; celui des inférieures divisé par une bandelette blanche allant de la base au bord postérieur.

232. POLYOMMATE Lefebvre.

Ailes entières : dessus du mâle d'un bleu-argenté, avec la base des ailes supérieures garnie d'un duvet jaunâtre ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec le bord postérieur noir : dessous cendré ou brunâtre, avec une rangée transverse de points ocellés ; celui des inférieures divisé par une bandelette longitudinale blanchâtre.

233. POLYOMMATE Eumédou.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre-luisant : leur dessous d'un cendré-obscur, avec des points noirs oculaires et des lunules marginales roussâtres ; celui des inférieures verdâtre à la base, et offrant une bandelette blanche longitudinale en forme de marteau.

POLYOMMATE. (Insecte.)

234. POLYOMMATE Admète.

Ailes entières, ayant le dessus d'un brun-noirâtre, avec une frange blanche (des lunules marginales jaunes aux inférieures chez la femelle) : leur dessous d'un cendré-jaunâtre, avec une rangée de points oculaires sur les quatre, et une lunule centrale noire sur les supérieures.

♀. Dessous des ailes n'offrant que des taches ocellées.

235. POLYOMMATE Ariob.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-obscur, avec des taches discoïdales très-noires sur les quatre, et des yeux à l'extrémité des inférieures : leur dessous cendré, avec une lunule centrale et quatre rangées de points oculaires ; celui des inférieures d'un vert-argenté à la base.

236. POLYOMMATE Alcon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-obscur, avec une large bordure d'un brun-noirâtre : leur dessous cendré, avec une lunule centrale, et trois rangées de points oculaires, noirs ; celui des inférieures d'un vert-argenté depuis la base jusqu'au milieu.

237. POLYOMMATE Euphémus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle, sans taches dans le mâle, avec une large bordure brune et des points noirâtres sur le disque des supérieures dans la femelle : dessous cendré, avec une lunule centrale, et deux rangées de points oculaires, noirs.

238. POLYOMMATE Érébus.

Dessus du mâle d'un bleu-violetâtre, avec une ligne transverse de taches et une

bordure noires ; dessus de la femelle d'un brun-noirâtre : leur dessous brun, avec une ligne anguleuse de points oculaires noirs.

239. POLYOMMATE Iolas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une frange blanche (une large bordure brune chez la femelle) : leur dessous d'un cendré-incarnat, avec un arc central, et une rangée courbe de points oculaires, noirs ; trois lunules noires à l'angle anal des inférieures.

240. POLYOMMATE Lysimon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure d'un brun-noirâtre et une frange panachée : leur dessous cendré, avec des points noirs oculaires à la base ainsi que sur le milieu, et deux rangs de lunules obscures à l'extrémité.

241. POLYOMMATE Hylax.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et sans taches en dessus : leur dessous cendré, avec des points noirs. FAB.

242. POLYOMMATE Cajus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-violet : leur dessous varié de blanc et de cendré, avec des points noirs oculaires. FAB.

243. POLYOMMATE Phérètes.

Dessus du mâle d'un bleu-violet, dessus de la femelle d'un brun-noirâtre, avec une frange blanche : leur dessous d'un cendré-verdâtre ; celui des ailes supérieures avec une lunule centrale et une ligne courbe de points noirs oculaires, celui des inférieures avec une double rangée de taches blanches.

POLYOMMATE. (Insecte.)

244. POLYOMMATE Cyllarus.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec une bordure noire : leur dessous d'un cendré-clair, avec une ligne transverse de points noirs oculaires ; celui des inférieures d'un vert-argenté depuis la base jusqu'au-delà du milieu.

245. POLYOMMATE Acis.

Dessus du mâle d'un violet-bleudtre, avec une bordure noire ; dessus de la

femelle d'un brun-noirâtre : leur dessous d'un cendré-obscur, avec une lunule centrale, et une rangée de points oculaires, noirs.

246. POLYOMMATE Alsus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-luisant (saupoudré de bleu chez le mâle) : leur dessous d'un cendré-bleudtre, avec une lunule centrale, et une rangée de points oculaires, noirs.



A. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec trois queues plus ou moins longues.

1. POLYOMMATE FAUNUS.

POLYOMMATUS Faunus.

Pol. alis supra fuscescenti-violeceis, apice atro : subtus albis, strigâ mediâ fulvâ lineâque marginali nigricante.

Papilio P. R. Faunus, alis tricaudatis, fuscis : subtus albis, strigis duabus fulvis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n^o. 615.

Hesperia R. Faunus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 261. n^o. 11.

Papilio Faunus. CRAM. Pap. pl. 59. fig. B. C. (Le mâle.) pl. 96. fig. F. G. (La femelle.)

Papilio Faunus. DRURY, Inf. tom. 2. pl. 1. fig. 4. 5.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le mâle a le dessus des ailes d'un violet-obscur, avec le sommet des supérieures d'un noir-mat, le bord terminal des inférieures garni d'une frange blanche & surmonté vers l'anse de cinq points blancs. Les queues de ces dernières ailes sont en outre totalement blanches.

Le dessous est blanc, avec deux lignes transverses, dont l'antérieure fauve, discoïdale, plus large & bordée de brun; la postérieure noirâtre & située à peu de distance du bord. Ces lignes forment aux secondes ailes un coude, au-dessous duquel il y a deux taches anales noires & faibles de bleu-verdâtre.

La femelle diffère du mâle en ce que le dessus de ses quatre ailes est largement taché de noir-mat, & en ce que la première tache anale du dessous des inférieures est bordé de rouge-sanguin en arrière.

De Sierra-Leone.

Nota. Dans les figures de Cramer, le bord postérieur des premières ailes est trop arrondi, & la queue anale des secondes n'a tout au plus que le tiers de sa longueur; mais ce dernier défaut vient indubitablement de ce que les sujets qui ont servi de modèle étoient mutilés.

2. POLYOMMATE HÉSIODE.

POLYOMMATUS Hesiodus.

Pol. alis tricaudatis, atris, disco cœruleo : subtus albis, strigâ communi virefcente punctiferae duobus anguli ani atro-argenteis. FAB.

Hesperia R. Hesiodus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 260. n^o. 8.

Papilio Hesiodus. JON. Fig. pict. 6. tab. 9. fig. 4.

Fabricius rapporte ce Polyommate à la femelle du *Faunus* de Cramer, mais il paroit appartenir à une autre espèce, à en juger du moins par la différence d'habitat & par la description que voici.

Le dessus des quatre ailes est d'un noir-mat, avec le disque largement bleu. Les ailes inférieures ont l'angle de l'anse marqué d'un point blanc, & le bord terminal garni d'une frange blanche. Leurs trois queues sont blanches & bordées de noir.

Le dessous est blanc, avec une ligne verdâtre, transversale, discoïdale, plus courte aux ailes inférieures, & s'y joignant à un arc qui va de l'angle externe au milieu du bord interne. L'angle anal des premières ailes offre deux points noirs & celui des secondes deux points argentés.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

3. POLYOMMATE HÉLIUS.

POLYOMMATUS Helius.

Pol. alis supra cœruleis, anticarum apice latissimè nigro : subtus cœruleis, strigis tribus continuis fuscis : polycicis ocellisque duobus anguli ani inde nuda. (MUS.)

Papilio P. R. Helius, alis tricaudatis : anticis nigris, posticis cœruleis : subtus cœruleis, strigis tribus brunneis ocellisque duobus anguli ani. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n^o. 606.

Hesperia R. Helius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n^o. 4.

Papilio Helius. HERBST, Pap. tab. 303. fig. 3. 4.

Papilio Eurifus. CRAM. pl. 221. fig. D. E. (Le mâle.)

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, avec le sommet des supérieures très-largement noir. Les ailes inférieures ont les queues noires, avec le bout blanc.

Le dessous des quatre ailes est cendré, avec trois raies brunes, transversales & continues. Outre cela, on voit à l'angle anal des secondes ailes deux yeux noirs à iris roux. L'œil intérieur est bordé en arrière par un croissant d'atomes bleuâtres.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous n'avons vu que le mâle, encore étoit-il défectueux.

4. POLYOMMATE MONCUS.

POLYOMMATUS Moncus.

Pol. alis tricaudatis, fuscis : subtus niveis,

nigro subsufciatis; posticis ocellis duobus auratis. FAB.

Papilio P. R. Moncus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. pag. 65. n^o. 612.*

Hesperia R. Moncus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 261. n^o. 10.*

Ne connoissant point ce lépidoptère, nous sommes obligés de le donner avec le nom qui lui a été imposé par Fabricius.

Il est petit. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans aucune tache aux supérieures, avec quelques lignes blanches sur le bord terminal des inférieures. Les trois queues de ces dernières ailes sont blanches & très-courtes.

Le dessous des quatre ailes est très-blanc. Celui des supérieures a une tache centrale transverse, une bande & l'extrémité, noires. Celui des inférieures a trois points à la base, une bande interrompue sur le milieu, une liture à l'extrémité, pareillement noirs. On voit en outre vers l'angle anal deux yeux noirs, saupoudrés d'or & entourés d'un iris fauve.

De l'Afrique équinoxiale.

(Traduction de Fabricius.)

5. POLYOMMATE Pythagore.

POLYOMMATUS Pythagoras.

Pol. alis atris, singularum supra disco fulvo; subtus fasciis tribus transversis lineaque geminâ marginali albis; posticis ocellis duobus angulâni argentatis.

Hesperia R. Pythagoras; alis tricaudatis, atris, limbo flavo; subtus nigris albo variis fasciâque mediâ albâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n^o. 6.*

Papilio Pythagoras. JON. *Fig. pict. 6. tab. 14. fig. 4.*

Papilio Pythagoras. DOROW. *of an Epitome of the Nat. Hist. Insects of India, cah. 1. pl. 3. fig. 3.*

Papilio P. R. Juba, alis integerrimis, nigris, disco fulvo; subtus fasciâ strigisque abbreviatis albis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. pag. 82. n^o. 758.*

Hesperia R. Juba. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 314. n^o. 190.*

Les papillons *Pythagoras* & *Juba* de Fabricius, quoique placés à 184 numéros l'un de l'autre, appartiennent incontestablement à la même espèce. Le double emploi vient de ce que le *Pythagoras* a été figuré d'après un individu qui avoit ses queues, mais chez lequel les yeux du dessous des ailes inférieures étoient effacés, & de ce que le *Juba* au contraire avoit été antérieurement décrit, dans le cabinet du docteur Pfing, d'après un individu sans queue, mais qui avoit

conservé les taches oculaires des secondes ailes.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessous des ailes est d'un noir-brun, avec le milieu des supérieures & des inférieures fauve. Les ailes inférieures ont en outre quatre ou cinq petits anneaux fauves sur le bord terminal.

Le dessous est à peu près du même noir que le dessus, avec trois bandes transverses, & une double ligne marginale, blanches. La bande intermédiaire est beaucoup plus large que les deux autres. La bande postérieure est bifide aux premières ailes, & fortement interrompue aux secondes. Ces dernières ailes ont, vis-à-vis des queues, deux yeux très-noirs, fablés de bleu-argenté, & bordés antérieurement par un croissant fauve. L'œil anal est double. Les antennes sont noires, annelées de blanc & terminées de fauve.

De l'Afrique occidentale.

6. POLYOMMATE Larydas.

POLYOMMATUS Larydas.

Pol. alis supra maris obscurè violaceis, fæminæ albedo-cœrulecentibus; subtus fasciis, annulis numerosis albis; posticis ocellis duobus angulâni argenteis.

Papilio Larydas. CRAM. *pl. 282. fig. H.*

Papilio Larydas. HERBST, *Pap. tab. 290. fig. 1.*

Papilio Sylvanus. DRURY, *Inf. exot. tom. 2. pl. 5. fig. 2. 5. (Var.)*

Il a environ un ponce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est entièrement d'un violet-foncé. Le dessus de la femelle, selon Cramer, est d'un bleu très-pâle & tirant sur le blanchâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-obscur, avec une multitude d'anneaux blancs, dans l'intérieur de la plupart desquels le fond devient plus intense, ce qui forme en quelque sorte des taches oculaires. Outre cela, l'angle anal des ailes inférieures offre deux yeux noirs, saupoudrés de bleu ou de vert-argenté, & entourés d'un iris roux.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit pas d'anneaux blancs à la partie antérieure du dessous des premières ailes. Il répond à la variété que Drury a figurée sous le nom de *Sylvanus*.

De la côte occidentale d'Afrique, & principalement de Sierra-Leone.

Nota. Cramer ne représente que deux queues, mais il y en a trois chez les individus bien conservés.

7. POLYOMMATE Hymen.

POLYOMMATUS Hymen.

Pol. alis tricaudatis, fuscis: subtus albo maculatis: posticis suprà albis. FAB.

Papilio P. R. Hymen. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n.º. 616.*

Hesperia R. Hymen. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 262. n.º. 13.*

Les ailes supérieures ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec une tache blanchâtre, commune aux ailes inférieures. Leur dessous est brun, avec divers petites lignes blanches, transversales.

Les ailes inférieures ont trois queues. Leur dessus est blanc, avec une tache brune qui s'étend sur les ailes supérieures. Leur dessous est obscur, avec un grand nombre de petites lignes blanchâtres, le bord postérieur pâle & marqué d'une tache & d'une raie noires.

De Sierra-Leone.

(Traduction de Fabricius.)

8. POLYOMMATE AMOR.

POLYOMMATUS Amor.

Pol. alis tricaudatis, fuscis: subtus disco variegato strigà posticà aurèa. FAB.

Papilio P. R. Amor. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n.º. 610.*

Hesperia R. Amor. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 260. n.º. 7.*

Papilio Amor. HERBST, *Pap. tab. 502. fig. 9. 10.*

Papilio Amor. JON. *Fig. pict. 6. tab. 11. fig. 5.*

Papilio Triopas. GRAM. *pl. 520. fig. G. II.*

Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & elles ont le bout de la massue ferrugineux. Le corps est brun. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache blanchêe transversale sur le milieu des supérieures, & une bande rouille à l'extrémité des inférieures. Ces dernières ailes ont trois queues filiformes, dont l'intermédiaire plus longue.

Le dessous des quatre ailes est jaune, varié de blanc & de noir, avec le limbe terminal brun, & chargé aux secondes ailes d'une ligne dorée.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

9. POLYOMMATE Agrippa.

POLYOMMATUS Agrippa.

Pol. alis tricaudatis, cæruleis, limbo atro: subtus cinereis, strigà albâ maculifque duabus angulâ ant. FAB.

Hesperia R. Agrippa. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n.º. 5.*

Papilio Agrippa. JON. *Fig. pict. 6. tab. 3. fig. 5.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, avec une bordure noire, mais très-étroite aux inférieures.

Le dessous est cendré, avec une ligne blanche, transversale. Cette ligne est interrompue aux secondes ailes, lesquelles ont à l'angle de l'aube deux taches rouilles à prunelle noire.

De l'Amérique.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Est-ce bien ici la place de ce lépidoptère? Ne devrait-il pas plutôt être mis dans la division des espèces à deux queues, à côté du polyommate *Sphinx*? Il arrive quelquefois que Fabricius compte la palette anale pour une queue.

10. POLYOMMATE TIMON.

POLYOMMATUS Timon.

Pol. alis tricaudatis, basi rirescentibus: subtus albis; posticis fusciâ abbreviatâ juncuicâ. FAB.

Papilio P. R. Timon. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n.º. 611.*

Hesperia R. Timon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 260. n.º. 9.*

Les ailes supérieures ont le dessus d'un brun-noirâtre, avec la base verdâtre. Leur dessous est blanc, avec l'extrémité plus obscure.

Les ailes inférieures sont verdâtres, avec l'extrémité obscure & tachetée de blanc; elles ont trois queues, dont l'extérieure petite, obtuse, noire & ciliée de blanc; l'intermédiaire plus longue, blanche, mais ayant du noir avant le bout; l'intérieure très-longue & toute blanche. Leur dessous est blanc, avec une ligne brune, courte & transversale à la région de l'aube, & une bande sanguine sur laquelle il y a deux taches d'un noir-mat.

De l'Amérique méridionale.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Ce lépidoptère devrait peut-être aussi appartenir à la division des espèces à deux queues. Les caractères du dessous des ailes sembleroient du moins l'indiquer.

B. Ailes supérieures ayant la côte plus ou moins arquée vers son origine. Ailes inférieures avec deux queues, dont une ordinairement plus longue.

α. Bord postérieur des premières ailes un peu concave, surtout chez le mâle.

11. POLYOMMATE MARFAS.

POLYOMMATUS Marfys.

Pol. alis suprà rirescenti-cæruleis, nitidis, apice nigro: subtus pallidè violaceis, disco punctis ocellaribus atris; posticis ad angulum ani albo cærulefcentique fasciatis.

Papilio P. R. Marfyas, alis bicaudatis, supra cœruleis: subtus cœrulescentibus, punctis nigris.
LINS. *Syl. nat.* 2. pag. 738. n^o. 225. — *Musf. Lud. Utr.* 515.

Papilio P. R. Marfyas. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 67. n^o. 653.

Hesperia R. Marfyas. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. pag. 272. n^o. 48.

CLERCK, *Icon. tab.* 41. fig. 1.

KLEMANN, *Inf.* 1. tab. 5. fig. 1. 2.

EDW. *Av. tab.* 81.

SEBA, *Musf.* 4. tab. 5. fig. 9. 10.

SEBA, *Musf.* 4. tab. 54. fig. 15. 16.

Papilio Marfyas. HERBST, *Pap. tab.* 296. fig. 1. 2.

Papilio Marfyas. CRAM. *pl.* 552. *fig.* A. B. (Le mâle.)

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre, changeant en violet, avec toute la côte & le sommet des supérieures noirs.

Le dessous est lilas ou d'un violet-pâle & luisant, avec sept ou huit points noirs cerclés de blanchâtre, & épars sur le milieu de chaque aile. La région de l'angle anal des secondes ailes est en outre d'un bleu-verdâtre, avec deux bandes blanches, courtes & transverses, derrière lesquelles sont deux taches noires, dont l'extérieure plus ou moins sensible en dessus. Les queues sont noires, avec le bout blanc. Le corps a le dessus bleu, le dessous blanchâtre. Les antennes sont noires & annelées de gris.

La femelle a le dessus plus pâle, avec le sommet des quatre ailes d'un noir-brun.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Les premières ailes ont le bord postérieur un peu concave, surtout chez le mâle.

12. POLYOMMATE ORTYGNUS.

POLYOMMATUS Ortygnus.

Pol. alis supra virecenti-cœruleis, nitidis: subtus pallidis carneis, maculis aliquot disci nigris; posticis ad angulum ani strigâ steruosa ocellisque duobus cœrulescentibus. (Mas?)

Papilio Ortygnus. CRAM. *pl.* 245. *fig.* B.

Papilio Ortygnus. HERBST, *Pap. tab.* 296. *fig.* 7.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant.

Le dessous est d'un incarnat-pâle, avec deux taches noires transverses sur le milieu des ailes supérieures; avec trois points & une ligne on-

dulée noirs sur les inférieures. Ces dernières ailes ont l'extrémité un peu jaunâtre, & elles offrent vers l'angle de l'anus une petite bande flexueuse & deux yeux d'un bleu-verdâtre.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être un mâle.

De Surinam.

15. POLYOMMATE RUSSAN.

POLYOMMATUS Russan.

Pol. alis supra cœrulescentibus, nitidis, apice fusco: subtus fœtidè carneis, fasciâ geminâ marginali olivaceâ; posticis punctis duobus basibus duobusque anguli ani nigris albo cinctis. (Fem.)

Papilio Russan. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl.* 53. *fig.* 1 & 1A.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet, pâle & luisant, avec une bordure brune, large, surtout chez la femelle.

Le dessous est d'un incarnat-obscure, avec une bande brune, transversale, flexueuse, interrompue, sur le milieu de la surface, & une double bande olivâtre, continue, le long du bord postérieur. La bande du milieu est bordée de blanc en arrière, & plus large aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont de plus quatre points noirs à iris blanc, savoir: un près de l'origine de la côte, un plus petit vers le milieu du bord interne, deux, séparés par un groupe d'atomes bleus, à l'angle de l'anus. Il y a en outre des atomes semblables sur la partie la plus intérieure de la bande marginale olivâtre.

Décrit d'après un individu altéré & qui nous a paru être une femelle.

De la Chine, selon Stoll.

Mais ne seroit-il pas plutôt de l'Amérique? Sa ressemblance avec plusieurs espèces de ce continent sembleroit l'indiquer.

14. POLYOMMATE VÉULIUS.

POLYOMMATUS Venulus.

Pol. alis supra cœruleis: subtus cœrulescentibus, apice fasciis tribus nigris transversis; posticis oculo anguli ani tride fasciâ. (Mas.)

Papilio Venulus. CRAM. *pl.* 245. *fig.* G.

Papilio Venulus. HERBST, *Pap. tab.* 296. *fig.* 8.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-clair & sans éclat.

Le dessous est d'un bleu-pâle, avec trois bandes noires, transverses, placées vers le bord terminal, lequel est lui-même bordé de noir. Les deux bandes antérieures des secondes ailes forment

par leur réunion un anneau alongé, & la postérieure est surmontée d'un œil noir à iris sauve & placé vis-à-vis des queues.

La femelle nous est inconnue.
De Surinam.

15. POLYOMMATE Liger.
POLYOMMATUS Liger.

Pol. alis supra albis, limbo postico nigro: subtus fuscis, strigis undulatis & lunatis albis; posticis maculâ dorsi duabusque anguli ani cœruleis. (Fem. ?)

Papilio P. R. Liger, alis bicaudatis, albis, apice nigris: subtus fuscis, strigis lunatisque albis. FAB. *Spec. Insi. App.* n°. 504.

Papilio P. R. Liger. FAB. *Mant. Insi. tom. 2. p. 67. n°. 641.*

Hesperia R. Liger. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 274. n°. 58.*

Papilio Liger. CRAM. *pl. 254. fig. E. F.*

Papilio Liger. HERBST, *Pap. tab. 502. fig. 1. 2.*

L'individu d'après lequel nous donnons cette description nous a paru être une femelle.

Son envergure est à peu près d'un pouce & demi. Le dessus de ses ailes est blanc, avec le limbe postérieur largement noir.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec une multitude de lignes ondulées & de croissans blancs. Les ailes inférieures offrent en sus trois groupes d'atomes bleus, favoir: un sur le ditique, & deux près de l'angle de l'anus.

De Surinam, selon Cramer & Fabricius. Le premier de ces deux auteurs dit qu'on l'a trouvé aussi à Sierra-Leone en Afrique; il fant alors qu'il l'ait confondu avec une espèce voisine ou qu'il ait eu de faux renseignemens sur l'habitat.

16. POLYOMMATE Périclès.
POLYOMMATUS Pericles.

Pol. alis bicaudatis, nigris: subtus fuscis, albo undatis, angulo ani maculâ duplici argentâ. FAB.

Hesperia R. Pericles. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 273. n°. 54.*

Papilio Pericles. JOS. *Fig. pi&. 6. tab. 18. fig. 5.*

Le dessus des quatre ailes est d'un noir-bleu, sans taches.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec des lignes blanches ondées. Les ailes inférieures ont en outre quelques points marginaux, dont les deux plus intérieurs argentés, les autres noirs.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

17. POLYOMMATE Endymion.

POLYOMMATUS Endymion.

Pol. alis supra virescenti-cœruleis, nitidissimis, margine atro: posticis subtus strigâ mediâ nigrâ fuscâque ferrugineâ.

Papilio P. R. Endymion, alis bicaudatis: subtus viridibus auro rufoque irroratis, posticis strigâ atrâ fuscâque sanguineâ. FAB. *Mant. Insi. tom. 2. p. 67. n°. 629.*

Hesperia R. Endymion. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 268. n°. 56.*

Papilio Endymion. HERBST, *Pap. tab. 298. fig. 1. 2.*

Papilio regalis. CRAM. *pl. 72. fig. E. F.* (La femelle.)

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire, large & fincée dans la femelle, étroite dans le mâle. L'angle anal des secondes ailes offre en outre une tache d'un rouge-sanguin.

Le dessous des quatre ailes est sablé de vert-doré, & traversé au milieu par une ligne noire, qui est bordée de bleu-pâle en arrière. Cette ligne est anguleuse aux secondes ailes, & elle y est suivie d'une bande ferrugineuse, dont tout le côté externe est largement saupoudré de bleuâtre. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

De Surinam.

18. POLYOMMATE Gabriel.

POLYOMMATUS Gabriel.

Pol. alis supra virescenti-cœruleis, nitidissimis, margine atro: posticis subtus apice ferrugineis, strigis tribus lineâque marginali albis.

Papilio P. R. Gabrielis, alis subtricaudatis, cœruleis, nitidissimis: posticis subtus antè apicem albo fuscatis. FAB. *Mant. Insi. tom. 2. p. 65. n°. 617.* (Le mâle.)

Hesperia R. Gabrielis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 262. n°. 14.* (Le mâle.)

Papilio Gabrielis. HERBST, *Pap. tab. 305. fig. 1. 2.*

Papilio Gabriela. CRAM. *pl. 6. fig. C. D.* (Le mâle.)

Il a environ deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-verdâtre très-brillant, avec une bordure noire, large dans la femelle, très-étroite dans le mâle.

Le dessous des ailes supérieures est d'un bleu-pâle, sablé de vert-doré, avec deux petites aies ferrugineuses, bordées de blanchâtre &

disposées transversalement en face du sommet. Le dessous des ailes inférieures a la moitié antérieure d'un vert-obscur. L'autre moitié est ferrugineuse, avec quatre lignes blanches, transverses & sinuées, dont l'extérieure marginale & plus étroite. L'angle de l'anus est en outre saupoudré de vert-doré, & l'on y voit deux taches rouges orbiculaires. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

De l'Amérique méridionale.

β. Milieu des ailes supérieures du mâle offre une tache orbiculaire, plus ou moins cotonneuse, & parfois enfoncée.

19. POLYOMMATE Ganymède.

POLYOMMATUS Ganymedes.

Pol. alis supra viriscenti-ceruleis, nitidis, margine atro: subtus dimidiatum auratis fuscescque, strigis duabus disci caeruleiscenti-albis. (Mas.)

Papilio P. R. Ganymedes, alis bicaudatis, caeruleiscentibus, limbo fusco: subtus buji viriscentibus, punctis aureis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n.º 625.* (Le mâle.)

Hesperia R. Ganymedes. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 264. n.º 25.* (Le mâle.)

Papilio Ganymedes. CRAM. *pl. 40. fig. C. D.* (Le mâle.)

Papilio Ganymedes. HERBST, *Pap. tab. 298. n.º 7. 8.*

Nous n'avons vu que le mâle. Il n'a guère qu'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant & changeant en violet, avec tout le pourtour extérieur & la tache centrale des supérieures, noirs.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec la moitié antérieure sablée de vert-doré, & le milieu traversé par deux lignes d'un blanc-bleuâtre, entre lesquelles il y a une bande ferrugineuse. L'angle anal des secondes ailes offre en outre quelques points dorés.

Des Indes occidentales.

20. POLYOMMATE Vénus.

POLYOMMATUS Venus.

Pol. alis supra cyaneis, nitidis, apice nigro: subtus viridi-aureis, posticis nigro irroratis. (Mas.)

Papilio P. R. Venus, alis bicaudatis: subtus anticis viridibus auro irroratis; posticis aureis, viridi auroque maculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n.º 650.* (Le mâle.)

Papilio P. R. Aëdon, alis tricaudatis, caeruleiscentibus, apice nigris: subtus aureis, atomis

nigris. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n.º 614.* (La femelle?)

Hesperia R. Venus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 268. n.º 57.*

Papilio Venus. HERBST, *Pap. tab. 294. fig. 1. 2.*

Papilio imperialis. CRAM. *pl. 76. fig. E. F.*

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet & les queues noirs, & deux points ferrugineux au centre des ailes supérieures du mâle.

Le dessous est d'un vert-doré, avec environ les trois quarts antérieurs des secondes ailes aspergés de noir-obscur.

Le papillon *Aëdon* de la Mantille de Fabricius pourroit être la femelle, car il ne semble différer de son papillon *Venus* que parce qu'il a le dessus des ailes d'un bleu plus pâle.

De Surinam.

21. POLYOMMATE Ématheon.

POLYOMMATUS Ematheon.

Pol. alis supra cyaneis, nitidis, limbo nigro: subtus nigris, caeruleiscenti irroratis. (Mas.)

Papilio P. R. Ematheon, alis bicaudatis, caeruleo nitidis: subtus atris, caeruleo irroratis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n.º 626.*

Hesperia R. Ematheon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 266. n.º 26.*

Papilio Ematheon. CRAM. *pl. 63. fig. F. G.*

Papilio Ematheon. HERBST, *Pap. tab. 295. fig. 5. 6.*

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le pourtour extérieur noir, mais plus largement aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est noir & aspergé de bleu-pâle.

Chez le mâle, le milieu des ailes supérieures offre une grande tache noire. La femelle nous est inconnue.

De Surinam.

22. POLYOMMATE Arogeus.

POLYOMMATUS Arogeus.

Pol. alis utrinque viridibus, nitidis: posticis subtus strigis quatuor nigris, anteriori obliquè abbreviatæque, penultima subcaeruleo marginata.

Papilio Arogeus. CRAM. *pl. 333. fig. A. B.*

Papilio Arogeus. HERBST, *Pap. tab. 292. fig. 8. 9.*

Il a de un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Le dessus des ailes est d'un vert-bleuâtre-luisant, avec le sommet des supérieures légèrement noirâtre. Ces ailes offrent dans le mâle un œil brun, placé vers le milieu de la cote.

Le dessous est à peu près du même ton que le dessus, & l'on voit sur les secondes ailes quatre lignes noires, dont l'antérieure courte & oblique, la suivante ondulée, la pénultième bordée de bleuâtre, la postérieure plus large, & quelquefois moins prononcée que les autres. Les ailes supérieures ont assez souvent une ligne noire, transversée & flexueuse.

Nous avons vu une variété mâle qui avoit le dessous des ailes d'un vert très-obscur.

De la Guyane & du Brésil.

23. POLYOMMATE Acmon.

POLYOMMATUS Acmon.

Pol. alis supra viridis-cæruleis, nitidis; posticis subtilius fuscis, ad angulum ani strigis viridibus.

Papilio P. R. Acmon, alis caudatis, cæruleis; posticis subtilius atris, apice strigis viridibus. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 665.

Hesperia R. Acmon. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 284. n°. 95.

Papilio Acmon. GRAM. pl. 51. fig. C. D.

Papilio Acmon. HERBST, Pap. tab. 295. fig. 5. 4.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le mâle a le dessus des ailes d'un bleu-ardoisé-luisant, avec la frange noire. Le dessous de ses premières ailes est noirâtre vers le bord antérieur, d'un bleu-verdâtre vers le bord interne. Le dessous de ses secondes ailes est d'un brun-noirâtre, avec quatre lignes vertes transversales à la région de l'angle de l'anus, & une ligne arquée de points bleuâtres près de la base. Les queues sont noires de part & d'autre, avec l'extrémité blanche.

La femelle a le dessus des quatre ailes d'un bleu plus terne & largement bordé de brun-noirâtre. Le dessous de ses ailes supérieures est grisâtre près du bord interne.

Quelquefois le mâle a le sommet des ailes supérieures noir en dessus.

De Surinam.

24. POLYOMMATE Polibetes.

POLYOMMATUS Polibetes.

Pol. alis supra violacco-cæruleis, nitidis, limbo postico nigro; subtilius carneofuscis; posticis strigis duabus undulatis cæruleiscentibus punctisque septem nigris. (Mas.)

Papilio Polibetes. GRAM. pl. 541. fig. B. C.

Papilio Polibetes. HERBST, Pap. tab. 287. fig. 5. 4.

Il a un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur des quatre, & un grand œil au milieu des ailes supérieures du mâle, noirs.

Le dessous est d'un brun-incarnat, avec sept points noirs & deux lignes flexueuses d'un bleu-cendré aux ailes inférieures. Cinq de ces points sont disposés sur le côté interne de la ligne antérieure, les deux autres sont à la région de l'angle de l'anus, & il y a entre eux un groupe d'atomes du même bleu que les deux lignes suivantes.

Le dessous des ailes supérieures a une rangée centrale de points noirs.

La femelle nous est inconnue.

De la Guyane & du Brésil.

25. POLYOMMATE Hémon.

POLYOMMATUS Hemon.

Pol. alis fuscis; anticis supra immaculatis; subtilius omnibus apice obscurius fuscatis; posticis strigis quatuor virescentibus undulatis, anticâ longiore punctoque ocellari antrosum terminatâ.

Papilio P. R. Hemon, alis bicaudatis, supra fuscis, immaculatis; posticis subtilius angulo ani fuscis tribus cæruleis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n°. 635.

Hesperia R. Hemon. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 270. n°. 42.

Papilio Hemon. GRAM. pl. 20. fig. D. E.

Papilio Hemon. HERBST, Pap. tab. 294. fig. 8. 9.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, sans taches aux supérieures, avec une ligne noire, surmontée d'un croissant verdâtre, à l'angle anal des inférieures.

Le dessous est un peu plus pâle que le dessus, avec deux ou trois bandes noirâtres à l'extrémité des quatre ailes. Les ailes inférieures ont en outre quatre lignes verdâtres, ondulées, dont les trois postérieures courtes & placées près de l'angle de l'anus sur les bandes fuscites, l'antérieure longue & terminée près de la côte par un gros point noir, qui est bordé de vert-blanchâtre intérieurement.

De la Guyane & du Brésil.

26. POLYOMMATE Lifus.

POLYOMMATUS Lifus.

Pol. alis supra viridis-cæruleis, nitidis; subtilius obscurè viridibus, ad apicem fusco fuscatis; posticis

posticis frigâ mediâ à punctis cœrulefcenti-albis.
(Mas.)

Papilio Lifus. STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAMER, pl. 38. fig. 2 & 2 B.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, mais chatoyant en vert à la côte & au bord interne.

Le dessous est d'un vert-obscur, avec deux bandes postérieures & le bord terminal bruns. Le milieu des ailes inférieures est en outre traversé par une rangée de points d'un blanc-bleuâtre, derrière lesquels il y a un trait du même blanc.

Nous ne connoissons pas la femelle.

De Surinam.

27. POLYOMMATE Sinnis.

POLYOMMATUS Sinnis.

Pol. alis suprâ chalybdineo-cœruleis, nitidis, limbo atro: subtis virefcenti-cinereis, strigis duabus undulatis albis; posticis ad angulum anifuscis abbreviatâ viridi-aureâ, puncto lunulâque luteis notatâ. (Mas.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-d'acier-luisant, avec le pourtour extérieur des premières & le limbe terminal des secondes d'un noir-mat.

Le dessous est d'un cendré-verdâtre, avec deux lignes transverses & ondulées d'un blanc-bleuâtre, & bordées de noir sur un de leurs côtés. Indépendamment de cela, les secondes ailes ont vers la base une petite tache de la couleur des lignes infites, & à la région de l'angle de l'aune une bande d'un vert-doré, bande sur laquelle il y a un chevron & un point jaunes, bordés de noir eu avant & en arrière.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Brésil.

Nota. Le préservatif ne nous a pas permis de distinguer si le dessous des ailes a du rouge à son origine.

28. POLYOMMATE Thalès.

POLYOMMATUS Thales.

Pol. alis utrinquè atris: subtis cœruleo unctis; anticis apice grisefcente, posticis ad angulum anifuscis abbreviatâ viridi-aureâ.

Hesperia R. Thales, *alis bicaudatis, atris: subtis lunulis cœruleis; posticis fuscis abbreviatâ submarginali aureâ.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 263. n° 55.*

Papilio Thales. JON. *Fig. pi. 6. tab. 14. fig. 1.*

Papilio Thales. DONOV. *of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 7. pl. 1. fig. 4. Esj. nat. Inf. Tome LX.*

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une liture bleuâtre à l'angle interne des inférieures, & quelquefois aussi vers l'extrémité des supérieures.

Le dessous est du même noir que le dessus, avec des lignes bleues, ondulées & interrompues, depuis la base jusqu'au-delà du milieu. Outre cela, le sommet des ailes supérieures est gristère, & les inférieures ont à la région de l'angle de l'aune une bande courte d'un vert-doré. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

La femelle ressemble au mâle.

Du Brésil.

Nota. Fabricius ne parle pas des atomes gristères qui sont au sommet des ailes supérieures en dessous. Peut-être a-t-il vu des exemplaires mal conservés, car du reste sa description le rapporte bien avec la nôtre.

29. POLYOMMATE Nautès.

POLYOMMATUS Nautes.

Pol. alis suprâ cyaneis, nervis limboque nigris: posticis subtis atris, disco rittâ longitudinali flavâ & ponè hanc annulis numerosis cœrulefcentibus. (Mas.)

Papilio Nautes. CRAM. pl. 253. fig. F. G.

Papilio Nautes. HERBST, *Pap. tab. 296. fig. 5. 4.*

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-barbeau, avec l'extrémité des nervures & le limbe postérieur noirs.

Le dessous des ailes supérieures est noir, avec le disque d'un bleu-pâle.

Le dessous des ailes inférieures est d'un noir-obscur, avec une bandelette longitudinale jaune, surmontée d'une lunule bleue, & suivie d'une multitude d'anneaux bleuâtres.

Décrit d'après un individu que nous soupçonons mâle, quoique privé de corps.

De Surinam.

30. POLYOMMATE Elis.

POLYOMMATUS Elis.

Pol. alis utrinquè viridi-fuscis: posticis subtis rittâ longitudinali flavâ & ponè hanc singis tribus aurato-viridibus.

Papilio Elis. CRAM. pl. 253. fig. D.

Papilio Elis. HERBST, *Pap. tab. 296. fig. 5.*

Nous donnons ce Polyommate d'après Cramer. Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-verdâtre-chatoyant.

Le dessous est à peu près de la couleur du dessus,

Kkk

avec un arc transversal de trois points bleus sur le milieu des ailes supérieures, & une bandelette longitudinale d'un fauve-obscure sur le milieu des inférieures. Cette bandelette est surmontée de deux points bleus, & suivie de trois lignes ondulées & transverses d'un vert-doré.

De Surinam.

Nota. Ne seroit-ce pas la femelle du *Nautès* ?

31. POLYOMMATE Polybe.

POLYOMMATUS Polybe.

Pol. alis supra cæruleo-viridibus, apice fusco: subtus virescenti-ochraceis, atro venosis, basi rubro maculatis.

Papilio P. R. Polybe, alis posticis dentatis, reliquis integerrimis, fusco-virescentibus: subtus viridi-feniceis, venis atris. LAMM. *Syst. nat.* 2. pag. 787. n^o. 218. — *Atman. Acad.* 6. p. 404. n^o. 58.

Hesperia R. Atys, alis bicaudatis, fuscis, disco cæruleo: subtus cinereis, fusco venosis, basi macula subâ punctisque albis. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 267. n^o. 30.

Papilio Atys. CRAM. *pl.* 259. *fig.* E. F. G. H.

Papilio Atys. HERBST, *Pap.* tab. 297. *fig.* 7-10.

Papilio Atys. JOX. *Fig. pict.* 6. tab. 13. *fig.* 1.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-bleuâtre-luisant, avec les nervures & environ le tiers postérieur de la surface d'un noir-velouté. Le mâle a vers le milieu de la côte des premières ailes une double tache oculaire brune.

Le dessous est d'un jaune-verdâtre, mais oblitéré au milieu des premières ailes, avec des veines d'un noir-mat, & trois taches basilaires d'un rouge-cinabre. Les secondes ailes ont la région anale coupée transversalement de noir & de vert-doré, & la palette du bord interne saupoudrée de bleu. Le corps est bleu en dessus; il est noir en dessous, avec le ventre orangé & la poitrine ponctuée de vert-doré.

De la Guyane & du Brésil.

Nota. Linné a décrit un individu dont les queues étoient en partie cassées & ne représentoient plus que des dents. Il paroît aussi que Fabricius n'a pas vu ce *Polyommate* frais, puisqu'il dit que le dessous des ailes est d'un cendré-obscure, avec les taches de la base fauves.

32. POLYOMMATE Haléfus.

POLYOMMATUS Haléfus.

Pol. alis supra virescenti-cæruleis margine nigro, subtus fuscis costâ basifcos rubrâ: posticis utraq; angulo anî auro maculatis.

Papilio P. R. Haléfus, alis bicaudatis, cæruleis margine nigro: posticis utraq; auro maculatis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 67. n^o. 658.

Hesperia R. Haléfus. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 275. n^o. 52.

Papilio Haléfus. CRAM. *pl.* 98. *fig.* B. C. (Le mâle.)

Papilio Haléfus. HERBST, *Pap.* tab. 295. *fig.* 1. 2.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre changeant en violet, avec une bordure noire, assez large dans le mâle, fincée & occupant la moitié postérieure de la surface dans la femelle.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte rouge & accompagnée de quelques points bleuâtres. L'angle anal des ailes inférieures offre plusieurs groupes d'atomes d'un vert-doré, puis des points d'un bleu-violetâtre. Le corps est bleu en dessus, brun en dessous, avec le ventre orangé.

Dans le mâle, la tache brune du milieu des premières ailes est marquée d'un petit croissant rougeâtre.

De l'Amérique septentrionale, selon Fabricius.

33. POLYOMMATE Syncelle.

POLYOMMATUS Syncellus.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, limbâ communi nigro: subtus fuscis; anticus costâ basifcos rubrâ, posticis sesqui. singâ undulâtâ virescente punctisque duobus analibus nigris. (Mas.)

Papilio Syncellus. CRAM. *pl.* 554. *fig.* A. B.

Papilio Syncellus. HERBST, *Pap.* tab. 287. *fig.* 1. 2.

Papilio Bitias. CRAM. *pl.* 104. *fig.* E. (Var. ?)

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur des quatre, & un petit œil au milieu des supérieures, noirs.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte des supérieures rouge, & deux lignes verdâtres, transverses, ondulées, dont la postérieure plus courte, aux ailes inférieures. Ces dernières ailes ont à la région de l'angle de l'anus deux points noirs séparés par un groupe d'atomes verdâtres.

Le dessous des premières ailes offre parfois une ligne semblable à celle des secondes ailes.

Le papillon *Bitias* de Cramer n'en est peut-être qu'une variété, car il paroît n'en différer que par l'absence des deux points à l'angle anal des ailes inférieures en dessous.

Nous ne connoissons point la femelle.
De Surinam.

34. POLYOMMATE Narbal.

POLYOMMATUS Narbal.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, apice nigro : subtùs fuscis singularum costà basèos rubrà ; posticis frigidà undulatà albà punctisque duobus ocellaribus, altero basilarì, altero anali, nigris. (Mas.)

Papilio Narbal. STOLL, *Suppl. à Gram. pl. 58. fig. 6 & 6 F.*

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet noir. Les ailes supérieures du mâle ont vers le milieu de la côte une tache oculaire grisâtre.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec l'origine de la côte de toutes les ailes rouge. Les premières ailes sont sans taches. Les secondes ont une ligne blanche, transverse, ondulée, interrompue, & bordée de noir à son côté interne; on y voit en outre deux taches ocellées noires, dont l'une vers le milieu du bord antérieur, l'autre à l'échancrure anale. Le corps est de part & d'autre du même ton que les ailes.

La femelle nous est inconnue.
De la Guyane & du Brésil.

55. POLYOMMATE Inachus.

POLYOMMATUS Inachus.

Pol. alis suprà cæruleis, limbo nigro : subtùs fuscis, costà, basèos rubrà strigàque medià albà ; strigà posticorum puncto ocellari antrosum terminatà. (Mas.)

Papilio Inachus. GRAM. *pl. 56. fig. D. I.*

Papilio Inachus. HERBST, *Pap. tab. 299. fig. 1. 2.*

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-changeant, avec le bord postérieur noir.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec l'origine de la côte rouge, & le milieu coupé obliquement par une ligne blanche ondulée. La ligne des secondes ailes est surmontée d'un point oculaire noir, & suivie de deux ou trois traits verdâtres, disposés transversalement vers l'angle de l'anus. La poitrine est en outre ponctuée de blanc-bleuâtre.

Des Indes occidentales.

56. POLYOMMATE Pétus.

POLYOMMATUS Petus.

Pol. alis suprà cæruleis, nitidis, limbo atro : subtùs fuscis, basi rufis albo punctatis.

Hesperia R. *Petus, alis subtricaudatis, cæruleis, limbo atro : subtùs fuscis, basi rufis albo punctatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 264. n.º. 21.*

Papilio P. R. *Getus.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n.º. 621.*

Papilio Pelops. GRAM. *pl. 541. fig. A.*

Papilio Pelopus. HERBST, *Pap. tab. 287. fig. 5. 6.*

Nous ne connoissons ce Polyommate que par la description de Fabricius & par la figure de Cramer.

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le dessus de toutes les ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur noir.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec la base rouge & ponctuée de blanc. L'extrémité des ailes inférieures est en outre coupée transversalement par quelques lignes verdâtres ondulées.

De Surinam.

57. POLYOMMATE Céranus.

POLYOMMATUS Ceranus.

Pol. alis caudatis, cærulescentibus : subtùs brunneis, basi albo maculatis. FAB.

Hesperia R. *Ceranus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 276. n.º. 66.*

Papilio Ceranus. GRAM. *pl. 552. fig. C. D.*

Papilio Ceranus. HERBST, *Pap. tab. 287. fig. 7. 8.*

Papilio Ceranus. JON. *Fig. piñ. 6. tab. 5. fig. 4.*

Voici ce qu'en dit Fabricius : Il est de moyenne taille. Le dessus de toutes les ailes est d'un bleu-pâle, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre.

Le dessous est d'un brun-foncé, avec des points blancs à la base. Il y a en outre quelques traits bleuâtres à l'angle aual des ailes inférieures.

De Surinam.

N. B. Ne seroit-ce pas la femelle ou une variété du *Pétus* ?

58. POLYOMMATE Didymaon.

POLYOMMATUS Didymaon.

Pol. alis tricaudatis, fuscis : subtùs basi rubris punctis ocellaribus albis. FAB.

Papilio P. R. *Didymaon.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n.º. 627.*

Hesperia R. *Didymaon.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 266. n.º. 27.*

Papilio Didymaon. CRAM. pl. 154. fig. A.

Papilio Didymaon. HERBST, *Pap.* tab. 500. fig. 1. 2.

Le dessus des ailes est brun, avec un reflet bleu.

Le dessous est également brun, avec la base rouge & chargée de points blancs ocellés. On voit de plus à l'angle anal des secondes ailes une ligne verdâtre, environnée de noir.

De Surinam.

N. B. Nous serions portés à croire, d'après l'inspection de la figure de Cramer, que c'est une variété femelle du *Pétus*, mais nous grande que les individus de son sexe.

39. POLYOMMATE Eole.

POLYOMMATUS Æolus.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, margine fusco : subtus fuscis, albido trifasciatis ; anticis costâ basæos, posticis puncto anuli sanguineis.

Papilio P. R. Æolus, alis caudatis, cyaneis : anticis maculâ nigra : omnibus subtus fasciâ albâ nigro striatâ. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 70. n°. 664. (Le mâle.)

Hesperia R. Æolus. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 284. n°. 90. (Le mâle.)

Papilio Thallus. CRAM. pl. 259. fig. C. D. (Le mâle.)

Papilio Thallus. HERBST, *Pap.* tab. 297. fig. 5. 6.

DAUBENTON, *Pl. enlum.* 18. fig. 6. 7.

Papilio P. R. Pelion, alis subtricaudatis, cæruleis, auro punctatis, limbo fusco. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 66. n°. 618. (La femelle.)

Hesperia R. Pelion. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 265. n°. 17. (La femelle.)

Papilio Pelion. CRAM. pl. 6. fig. E. F. (La femelle.)

Papilio Pelion. HERBST, *Pap.* tab. 294. fig. 6. 7.

Les Hespéries rurales *Æolus* & *Pelion* de Fabricius ne sont, suivant nous, qu'une seule espèce, dont *Æolus* est le mâle & le *Pelion* la femelle. Il nous semble même que Fabricius a décrit la femelle d'après la figure de Cramer.

Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant & changeant en verdâtre, avec une légère bordure aux quatre ailes, & un œil au milieu des supérieures, noirs.

Le dessous est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une bande blanche, commune, discoïdale, & coupée par les nervures, qui sont du même

brun que le fond. La base est en outre blanchâtre, & il y a à l'extrémité une bande également blanchâtre, plus apparente dans certains individus que dans d'autres. L'origine de la côte des premières ailes est d'un beau rouge-sanguin, & les secondes ailes ont un point de cette couleur avant la plus courte des deux queues.

La femelle a le dessus des ailes d'un bleu plus pâle & largement bordé de brun-noirâtre. Son dessous offre les mêmes caractères que celui du mâle, mais le blanc est plus sensible à la base & à l'extrémité, du moins dans l'individu que nous avons vu.

De la Guyane.

40. POLYOMMATE Bathis.

POLYOMMATUS Bathis.

Pol. alis supra maris nitidæ-cæruleis, fæminæ albis, apice fusco : subtus nigris, fasciis transversis albis ; anticis puncto basæos, posticis angulo ani fulvis.

Papilio P. R. Bathis, alis bicaudatis, cæruleis, ocellis atro : subtus nigris, alio fasciatis, angulo ani rufo. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 67. n°. 655. (Le mâle.)

Hesperia R. Bathis. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 272. n°. 49. (Le mâle.)

Papilio Bathis. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 10. fig. 1.

Papilio Bathis. HERBST, *Pap.* tab. 291. fig. 9. 10.

Papilio Battus. CRAM. pl. 51. fig. F. G. (Le mâle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant, avec le bord postérieur des quatre ailes d'un brun-noirâtre, l'angle anal des inférieures fauve & marqué d'une ligne blanche.

Le dessous est noir, avec trois bandes blanches transverses aux ailes supérieures, & cinq aux inférieures. Ces dernières ailes ont l'angle de l'anus fauve comme en dessus, & il y a un point de cette couleur à la base des ailes de devant.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le dessus d'un blanc-bleuâtre, avec le sommet des premières ailes largement brun.

De Surinam.

41. POLYOMMATE Phaleros.

POLYOMMATUS Phaleros.

Pol. alis supra maris violaceo-cæruleis, nitidis, fæminæ albidis, apice fusco : subtus albis, fasciis transversis margineque nigris ; posticis punctis duobus anguli ani argenteo-cæruleis-centibus.

Papilio P. U. Phaleros, alis caudatis, supra

nigro-cæruleis, cicatrice orbiculari concavâ.
Linn. *Syst. nat.* 2. p. 797. n^o. 272.

Hesperia R. Chiton, *alis tricaudatis, cæruleis, limbo fusco: subtus flavescenti-albis, nigro fusciatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 262. n^o. 16.* (Le mâle.)

Papilio Chiton. JON. *Fig. pict. 6. tab. 2. fig. 1.*

Papilio Chiton. DOXOW. *of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cah. 1. pl. 5. fig. 1.*

Papilio Silenus. CRAM. *pl. 282. fig. E.* (La femelle.)

Papilio Agis. DRURY, *Infl. tom. 3. pl. 26. fig. 3. 4.*

Ce lépidoptère est, selon nous, le Plébéien urbicole *Phaleros* de Linné.

Son envergure est à peu près d'un pouce & demi. Le mâle a le dessus d'un bleu-violet-luisant, avec le sommet des quatre ailes d'un brun-noirâtre, & le milieu des supérieures marqué près de la côte d'un œil brun enfoncé & ayant un iris corné d'un gris de perle.

La femelle a le dessus d'un blanc-bleuâtre-fale, avec le sommet obscur.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec trois bandes transverses, & le bord postérieur, noirs. Les deux bandes intérieures des secondes ailes forment un coude avant l'angle de l'anus, & cet angle offre deux points d'un bleu-argentif, placés l'un au-dessus de l'autre. Il y a en outre un peu de fauve près du bord postérieur de chaque aile.

L'individu mâle décrit par Linné avoit perdu une queue, c'est pourquoi la phrale porte tout simplement *caudatis*.

De Surinam.

42. POLYOMMATE Mœlibæe.

POLYOMMATUS Melibæus.

Pol. alis suprà violaceo-cærulescentibus, apice fusco: subtus flavescens, strigis quinque nigris, mediâ geminatâ.

Hesperia R. *Melibæus, alis bicaudatis, cærulescentibus, limbo fusco: subtus flavescens, anticis fusco, posticis nigro strigosis; angulo ani atro annulis cæruleis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 271. n^o. 44.*

Papilio Melibæus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 2. fig. 2.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec environ la moitié postérieure des premières ailes & le bord terminal des secondes d'un brun-noirâtre. Le bord des secondes ailes est longé par une ligne bleuâtre sinuée, & au-dessus de laquelle l'angle de l'anus offre un point jaunâtre.

Le dessous est d'un jaune-pâle, mais prenant

un ton jaunâtre vers le bout, avec cinq raies noires, transverses, dont la deuxième discordale, divisée par un trait jaune aux premières ailes, & par une ligne blanche aux secondes. Ces dernières ailes ont près du bord interne des veines noires, dont les deux antérieures se croisant en X & aboutissant, ainsi que les suivantes, à la région anale, qui est noire & marquée de deux anneaux bleus. La queue intérieure est noire & saupoudrée de bleuâtre; la queue extérieure est courte, noirâtre en dessus, presqu'entièrement rousse en dessous.

La femelle ressemble au mâle, mais elle est d'un bleu plus terne.

Du Brésil.

43. POLYOMMATE Pélagon.

POLYOMMATUS Pelagon.

Pol. alis suprà ardoisacis, limbo fusco: subtus carneo-fuscescentibus: strigis quatuor obscurioribus undatis albo marginatis limboque postico flavido.

Papilio Pelagon. CRAM. *pl. 282. fig. C. D.* (La femelle.)

Papilio Myrtilus. CRAM. *pl. 380. fig. B. C.* (La femelle.)

Papilio Pelagon. HERBST, *Pap. tab. 292. fig. 3. 4.*

Papilio Myrtilus. HERBST, *Pap. tab. 286. fig. 3. 4.*

D'après Cramer, son *Pelagon* & son *Myrtilus* seroient deux espèces distinctes, dont l'une ayant deux queues & se trouvant à Sierra-Leone en Afrique; l'autre, pourvue d'une seule queue & propre au territoire de Surinam. Mais si l'on examine bien ces deux lépidoptères, on reconnoitra, malgré la grossièreté de l'éclaircissement, que ce sont deux femelles identiques, & que celle qui porte le nom de *Myrtilus* a perdu la plus petite de ses deux queues. Herbst a, selon sa coutume, adopté l'opinion de Cramer.

Le *Pelagon* n'a tout au plus que quatorze lignes d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un bleu-ardoisé-luisant, avec le bord postérieur obscur.

Le dessous est d'un brun-incarnat-pâle, avec quatre raies plus obscures, transverses, ondulées, bordées de blanc, & le limbe postérieur jaunâtre. L'angle interne des secondes ailes est en outre noirâtre & parsemé d'atomes bleuâtres.

Le mâle a une tache centrale brune sur le dessus des premières ailes, & la bordure de ces mêmes ailes est très-large dans la femelle.

Il habite l'Amérique équinoxiale.

44. POLYOMMATE ANACRÉON.

POLYOMMATUS Anacreon.

Pol. alis bicaudatis, fasciis : subtus albo undatis, stigmate posticâ maculâ aurâ. FAB.

Hesperia R. *Anacron*. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 268. n^o. 54.

Papilio Anacron. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 5. fig. 4.

Il est petit. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches.

Le dessous est un peu plus pâle que le dessus, avec plusieurs ondes blanches, & il offre vers le bord postérieur une ligne fauve, transversale, composée de cinq points aux ailes supérieures, & de trois taches rapprochées, dont l'intermédiaire pupillaire de noir, aux ailes inférieures.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

45. POLYOMMATE Méton.

POLYOMMATUS Meton.

Pol. alis supra cærulescenti-albis, nitidis, apice nigro : subtus flavido, fuscâ ferrugineoque variegatis; posticis puncto geminâ basos nigro.

Papilio P. R. *Meton*, *alis bicaudatis, albis, limbo fusco : anticis maculâ ocellari aurâ.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n^o. 640.*

Hesperia R. *Meton*. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 274. n^o. 55.

Papilio Meton. CRAM. *pl.* 201. *fig.* D. E.

Papilio Meton. HERBST, *Pap.* tab. 295. *fig.* 8. 9.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un blanc-violet-ruissant, avec le sommet d'un noir-brun. Chez le mâle, le milieu des ailes supérieures offre une tache oculaire d'un jaune-doré.

Le dessous des quatre ailes est varié de jaunâtre, de brun & de ferrugineux, & l'on voit près de la base des inférieures un double point noir.

De Surinam.

46. POLYOMMATE Auguste.

POLYOMMATUS Augustus.

Pol. alis caudatis, albis, limbo fusco : subtus ferrugineo-flavoque variis; posticis stigmis duabus cæneis. FAB.

Hesperia R. *Augustus*. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 275. n^o. 62.

Papilio Augustus. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 5. fig. 1.

Quoique d'après la description de Fabricius ce *Polyommate* semble n'avoir qu'une queue, nous le plaçons ici à cause de la grande similitude qu'il a avec le *Meton*.

Il est de moyenne taille. Le dessus de toutes ses ailes est blanc, avec le limbe brun, & un point anal d'un noir-mat.

Le dessous est varié de ferrugineux & de jaune. Outre cela, les ailes inférieures ont un point basilaire noir à iris jaune, & deux lignes cendrées courbes.

De l'Amérique.

(Traduction de Fabricius.)

47. POLYOMMATE Dolilus.

POLYOMMATUS Dolilus.

Pol. alis supra violacco-cæruleis, nitidis, apice nigro subtriangule luteâ : subtus fusco-rufescentibus, fasciis transversis albis; posticaram anteriore bifidâ.

Papilio Dolilus. CRAM. *pl.* 111. *fig.* B. C. (Le mâle.)

Papilio Dolilus. HERBST, *Pap.* tab. 295. *fig.* 7. 8.

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-ruissant, avec le sommet d'un noir-brun, & la traîne du bord postérieur fauve.

Le dessous est d'un roux-obscur, avec des bandes blanches, transverses, finies. Les bandes des premières ailes sont au nombre de sept, dont la quatrième beaucoup plus courte que les autres. Les bandes des secondes ailes sont au nombre de deux, dont l'antérieure bifide près de la côte, la postérieure se dilate près du sommet & prenant une teinte grisâtre vers l'angle de l'anus.

Le mâle a sur le milieu des premières ailes une grande tache brune oculaire. La femelle paroît avoir la seconde queue très-courte, à moins qu'elle n'ait été cassée dans l'exemplaire que nous avons vu.

Du Brésil & de Surinam.

48. POLYOMMATE Lausus.

POLYOMMATUS Lausus.

Pol. alis supra maris cyaneis, nitidis, semiorbe fuscis intusque cærulescentibus; subtus violaceo-fuscescentibus, singularum stigmis tribus undatis anguloque ani albis.

Papilio Lausus. CRAM. *pl.* 233. *fig.* E. (Le mâle.)

Papilio Libanius. CRAM. *pl.* 579. *fig.* II. I. (La femelle.)

Papilio Lausus. HERBST, *Pap.* tab. 296. *fig.* 6.

Papilio Libanius. HERBST, *Pap.* tab. 283. *fig.* 5. 4.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus

du mâle est d'un bleu-barbeau-luisant, avec une petite tache noire cotonneuse au milieu des ailes supérieures.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec le bord interne d'un bleu-pâle.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-pâle & chatoyant en violet, avec trois lignes transverses, ondulées, & l'angle anal, blancs. Le blanc de l'angle anal des secondes ailes est marqué d'une tache noire.

De Surinam.

49. POLYOMMATE Sophocles.

POLYOMMATUS Sophocles.

Pol. alis bicaudatis, nigris, disco communi cœruleo: subtus albis, strigis undatis flavescens; posticis puncto apicis fulvo. FAB.

Hesperia R. Sophocles. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 267. n.º 51.*

Papilio Sophocles. JON. *Fig. pict. 6. tab. 15. fig. 2.*

Papilio Sophocles. ДОКОВ. *of an Epitome of the Nat. Hist. Insects of India, cah. 7. pl. 1. fig. 2.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le milieu bleu.

Le dessous est blanc, avec quelques lignes jaunâtres transverses & très-ondulées. Outre cela, les ailes inférieures ont à l'extrémité un point roux dont le milieu est marqué d'un trait noir.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

50. POLYOMMATE Ismarus.

POLYOMMATUS Ismarus.

Pol. alis suprà cœruleis, nitidis, limbo nigro: subtus fuscis; posticis strigis quatuor undulatis albis maculisque duabus anguli uni rubris.

Papilio Ismarus. CRAM. *pl. 176. fig. F. (Le mâle.)*

Papilio Ismarus. HERBST, *Pap. tab. 295. fig. 7. (Le mâle.)*

Papilio Phalanthus. CRAM. *pl. 355. fig. C. D. (La femelle ?)*

Papilio Phalanthus. HERBST, *Pap. tab. 295. fig. 12. (La femelle ?)*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-soncé-luisant, avec le bord des quatre ailes, & une tache arrondie au milieu des supérieures, noirs.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec deux lignes blanches, transverses, ondulées, aux ailes supérieures, & quatre aux ailes inférieures. La

région anale de ces dernières ailes offre deux taches rouges, dont l'extérieure luisante.

Le papillon *Phalanthus* de Cramer nous paroît être la femelle, car il n'en diffère que parce qu'il a le dessus plus pâle & plus largement bordé de noir, & le dessous marqué à l'angle anal des secondes ailes de trois taches rouges, dont l'inférieure plus grande.

De Surinam.

51. POLYOMMATE Euripide.

POLYOMMATUS Euripides.

Pol. alis bicaudatis, atris, disco cœruleo: subtus fuscis; posticis strigis angulatis albis maculique ocellari risâ. FAB.

Hesperia R. Euripides. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 267. n.º 52.*

Papilio Euripides. JON. *Fig. pict. 6. tab. 15. fig. 4.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-brun, avec le milieu bleu.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec une ligne blanche, courte & transversale, aux ailes supérieures; avec deux lignes blanches, anguleuses, & une grande tache rouille à prunelle noire aux ailes inférieures.

Il paroît bien voisin de l'*Ismarus* & du *Cupentus*.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

52. POLYOMMATE Cupentus.

POLYOMMATUS Cupentus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, apice fuscis: subtus obscurè cinereis; posticis strigis tribus undulatis albis ocelloque anuli inde fulvâ: strigâ anteriori in annulum medio dilatata. (MUS.)

Papilio Cupentus. CRAM. *pl. 357. fig. F. G.*

Papilio Cupentus. HERBST, *Pap. tab. 294. fig. 4. 5.*

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le sommet de toutes les ailes d'un brun-noirâtre, & l'ail du milieu des supérieures d'un brun-jaunâtre.

Le dessous est d'un cendré-obscur, avec trois lignes blanches, transverses, presque droites aux premières ailes, ondulées aux secondes. La ligne antérieure des secondes ailes a le milieu dilaté en anneau, & il y a entre les queues de ces mêmes ailes une tache fauve, chargée d'une tache noire. L'échancrure anale est en outre bordée de fauve.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

53. POLYOMMATE Sichéus.

POLYOMMATUS Sicheus.

Pol. alis supra cyaneis, nitidis, apice atro : subtus carneo-cinereis ; postlicis strigis duabus undulatis albis maculisque duabus anguli anti rubris, strigâ posteriori in annulos atrorsum dilatata. (Mas.)

Papilio Sicheus. GRAM. pl. 144. fig. C. D.

Papilio Sicheus. HERBST, *Pap.* tab. 290. fig. 2. 5.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec la moitié postérieure des supérieures & le sommet des inférieures d'un noir-brun.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-luisant & un peu violâtre, avec deux lignes blanches, transverses, ondulées, dont la postérieure moins distincte aux premières ailes. La ligne postérieure des secondes ailes se dilate antérieurement en anneaux chevronnés, & ces mêmes ailes ont à la région de l'anus deux taches d'un rouge-fauve, lesquelles sont quelquefois marquées d'un point noir en arrière. La tache intérieure se répète en dessus à l'échancrure du bord abdominal. Le corps est de la couleur des ailes, & les queues sont noires, avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que des mâles. Cramer a probablement représenté la femelle, car, dans sa figure, le bleu du dessus des ailes est plus pâle & moins étendu que chez les sujets que nous avons décrits.

De Surinam & du Brésil.

54. POLYOMMATE Stréphon,

POLYOMMATUS Strephon.

Pol. alis ardoasiacis, apice fusco : subtus obscurè cinereis ; postlicis strigis duabus flexuosis & lunulis albis, angulo anti maculis duabus testaceis puncto retrorsum factis.

Papilio P. R. Strephon, alis caudatis, fuscis, nigro cærulescentibus : subtus cinereis, fasciâ albâ anguloque anti oculo gemino rufo. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 69. n^o. 659.

Hesperia R. Strephon. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 261. n^o. 81.

Papilio Cyllarus. GRAM. pl. 27. fig. C. D.

Papilio Cyllariffus. HERBST, *Pap.* tab. 291. fig. 5. 4.

Il a près de dix-huit lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoisé-luisant, avec le sommet & la côte d'un brun-noirâtre.

Le dessous est d'un cendré-foncé & un peu chatoyant, avec deux lignes transverses & flexueuses de petites lunules blanches bordées de noirâtre.

Les ailes inférieures ont à la région de l'anus deux taches rondes briquetées, marquées d'un point noir en arrière, & séparées l'une de l'autre par un groupe d'atomes bleuâtres. Ces taches font plus grandes chez la femelle que chez le mâle.

Les lignes du dessous des premières ailes manquent quelquefois.

De Surinam & du Brésil. Fabricius le dit des Indes orientales, mais ne l'auroit-il pas confondu avec une espèce voisine ?

55. POLYOMMATE Strophius.

POLYOMMATUS Strophius.

Pol. alis fuscis : postlicis subtus strigâ flexuosa & lineolis albis, angulo anti lunulis duabus sanguineis puncto nigro retrorsum factis.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-luisant, sans taches.

Le dessous est un peu plus clair que le dessus, avec une ligne transverse & flexueuse de petits traits blancs bordés de brun-obscur. Les secondes ailes ont à l'angle de l'anus deux lunules d'un rouge-sanguin, marquées d'un point noir en arrière, séparées l'une de l'autre par des atomes cendrés, & s'alignant à un double cordon marginal de lunules blanchâtres.

Décrit d'après un individu sans corps.

Du Brésil.

56. POLYOMMATE Sphinx.

POLYOMMATUS Sphinx.

Pol. alis supra maris violaceo-cæruleis, nitidis, hemina pallidioribus, apice fusco : subtus dilutè cinereis ; postlicis strigis duabus undulatis albis fusco marginatis, punctisque duobus anguli anti ocellaribus rufis.

Papilio P. R. Sphinx, alis bicaudatis, cærulescentibus : subtus cinereis, angulo anti maculâ geminâ atrâ. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 67. n^o. 654. (La femelle.)

Hesperia R. Sphinx. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 270. n^o. 43. (La femelle.)

Papilio Dindymus. GRAM. pl. 46. fig. F. G. (Le mâle.)

Papilio Dindymus. HERBST, *Pap.* tab. 291. fig. 1. 2.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant, le dessus de la femelle d'un bleu plus pâle, avec le sommet de toutes les ailes, & surtout celui des supérieures, d'un brun-noirâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un cendré-clair, avec deux lignes blanches, postérieures, ondulées,

lées, bordées de noirâtre, & ordinairement moins distinctes aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont à la région de l'angle anal deux points oculaires roux à prunelle noire. Le point intérieur le répète quelquefois en dessus chez la femelle.

De Surinam & du Brésil, & non des Indes orientales, comme le dit Fabricius.

57. POLYOMMATE Cithonius.

POLYOMMATUS Cithonius.

Pol. alis suprà argenteo-cæruleis, nitidis, apice fusco: subtus violaceo-cinereis; posticis annulis disci albis ocellisque duobus anguli ani iride rubrà. (Mas.)

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le dessus est d'un bleu-argenté-luisant, avec le sommet de toutes les ailes d'un brun-noirâtre, & un double œil d'un brun-marron au milieu des ailes supérieures.

Le dessous est d'un cendré-violâtre, avec deux lignes blanches, courtes & transverses sur les premières ailes, avec des anneaux & une ligne flexueuse de cette couleur sur le disque des secondes. La région anale de ces dernières ailes offre deux points oculaires rouges à prunelle noire.

Nous n'avons vu que le mâle.

De la Guyane.

58. POLYOMMATE Falacer.

POLYOMMATUS Falacer.

Pol. alis fuscis: subtus lineolâ geminâ disci strigisque duabus apicis undulatis cæruleo-cinereis; posticis lunulis tribus anguli ani nigris.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches dans la femelle, avec une tache blanchâtre cotonneuse vers le milieu des ailes supérieures du mâle.

Le dessous est à peu près de la couleur du dessus, avec un double trait central, puis deux lignes transverses & ondulées, d'un bleu-pâle & bordés de brun-foncé sur un de leurs côtés. Les secondes ailes ont en outre près de l'angle de l'anus trois chevrons roux, dont l'intérieur séparé des deux autres par un large groupe d'atomes bleuâtres.

Des environs de Philadelphie, Amérique septentrionale.

59. POLYOMMATE Ifocrate.

POLYOMMATUS Ifocrates.

Pol. alis suprà fuscis (maris cæruleo micantibus): subtus cinereis, liturâ geminâ strigâque duplici rubrâ undulatâ nigricantibus albo utrin-

Hyl. Nat. Inf. Tome LX.

què marginatis; posticis ocellis duobus anguli ani nigris, exteriori iride fulvâ.

Hesperia R. Ifocrates, alis bicaudatis, fuscis: strigis duabus approximatis undatis obscurioribus anguloque ani maculâ geminâ atrâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 266. n^o. 29. (Mâle & femelle.)

Hesperia R. Paun, alis caudatis, fuscis: anticis maculâ fulvâ, posticis atrâ submarginati: subtus cinereis, ocellis duobus anguli ani. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 276. n^o. 67. (La femelle.)

Papilio Pann. HERBST, Pap. tab. 288. fig. 9. 10.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre à reflet d'un bleu-violet, tantôt sans taches, tantôt avec une tache fauve au milieu des ailes supérieures, & un œil noir à iris fauve vers l'angle anal des inférieures. L'œil de ces dernières ailes est accompagné d'atomes d'un bleu-cendré.

Le dessous de la femelle est comme chez le mâle, mais il n'a point de reflet.

Le dessous des quatre ailes, dans les deux sexes, est cendré, avec une double liture diffoïdale, puis une double ligne transversée très-ondulée, noirâtres & bordées de blanc de chaque côté. Les secondes ailes ont en outre des lunules marginales blanchâtres, en alignement desquelles sont deux yeux noirs & un groupe d'atomes argentés. L'œil extérieur est cerclé de fauve, & les queues sont noires, avec le bout blanc.

Nous avons vu plusieurs individus des deux sexes, mais comme ils n'étoient pas frais, il seroit très-possible que notre description laissât quelque chose à désirer.

Du Bengale.

60. POLYOMMATE Erylus.

POLYOMMATUS Erylus.

Pol. alis suprà fuscis (maris violaceo mutabili micantibus): subtus feneceo-griseis, liturâ geminâ strigâque undulatâ nigrescentibus albo utrinquè marginatis; posticis ocellis duobus anguli ani nigris, exteriori iride fulvâ.

Il a de seize à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, avec un reflet violet qui change de place selon les aspects. Ses ailes supérieures ont au milieu une tache d'un noir-obscur, & les inférieures sont longées à l'extrémité par une ligne blanche flexueuse qui aboutit à un petit œil anal rouffâtre.

Le dessous de la femelle est d'un brun-noirâtre un peu chatoyant, sans taches aux ailes supérieures, avec cinq yeux marginaux à iris blanc aux inférieures. Ces yeux sont surmontés d'un rang de trois taches blanches.

Le dessous des quatre ailes, chez les deux sexes, est d'un gris-fatiné, avec une double liture discordale, puis une seule ligue ondulée, roufflâtes & bordées de blanc de chaque côté. Vient ensuite une ligne transverse obscure, laquelle est partagée aux ailes inférieures par une série de croiffans blanchâtes & s'alignant à deux yeux noirs, dont l'extérieur cerclé de fauve. Ces deux yeux sont séparés l'un de l'autre par un groupe d'atomes argentés. Les queues sont noires & ciliées de blanc sur les bords.

De Java.

61. POLYOMMATE Cléobis.

POLYOMMATUS Cleobis.

Pol. alis suprà maris azureis, fœminæ pallidioribus, apice atro: subtus fuscescenti-griseis, strigâ undulatâ rufescente extus albido marginatâ; posticis ocellis duobus anguli ani iride subvâ.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-azuré chez le mâle, d'un bleu plus pâle chez la femelle, avec le sommet, & surtout celui des supérieures, d'un noir-brun.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-brunâtre-luisant, avec une ligue roufflâte postérieure, ondulée, interrompue & bordée de blanchâtre en arrière. L'angle anal des secondes ailes offre deux yeux noirs à iris fauve, & séparés l'un de l'autre par un espace d'un gris-cendré qui s'étend même un peu au-delà de l'œil extérieur. Outre cela, il y a sur l'iris de l'œil intérieur un croiffant d'atomes d'un bleu-violet.

Dans la femelle, le bord postérieur des secondes ailes est noirâtre en dessus & longé par une ligne blanche légèrement flexueuse.

Du Bengale.

62. POLYOMMATE Cippus.

POLYOMMATUS Cippus.

Pol. alis bicaudatis, cœruleis, limbo fusco: subtus cinereis; posticis punctis duobus apicis atris. FAB.

Hesperia R. *Cippus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 429. n.º. 43-4.*

Ce Lépidoptère n'est peut-être qu'une variété mâle de notre *Cléobis*; mais, comme nous ne l'avons pas vu, nous traduisons la description qu'en donne Fabricius.

Il a le port du polyommate *Sphinx*. Ses antennes sont noires. Ses ailes ont le dessus d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe, & surtout celui des supérieures, d'un brun-noirâtre.

Le dessous est d'un cendré-luisant, avec une ligue postérieure plus obscure, & deux gros points

noirs à l'angle interne des inférieures. Les deux queues sont létacées, noires, avec le bout blanc. Des Indes orientales.

63. POLYOMMATE Longin.

POLYOMMATUS Longinus.

Pol. alis suprà maris nitidè cyaneis, fœminæ pallidioribus, apice atro: subtus sericeo-canescensibus, strigâ immarginatâ è lunulis nigris; posticis ocellis duobus anguli ani iride subvâ.

Hesperia R. *Longinus, alis caudatis, cyaneis, limbo atro: subtus cinereis; posticis strigâ lunulari punctisque duobus atris.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 430. n.º. 77-78.*

Fabricius a décrit ce polyommate d'après un individu mâle qui avoit perdu une queue.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant chez le mâle, d'un bleu-violet-pâle chez la femelle, avec le sommet des supérieures & le bord terminal des inférieures d'un noir-brun. Dans la femelle, le bord terminal des ailes inférieures est en outre surmonté d'une ligue maculaire noirâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-fatiné-blanchâtre, avec une ligue ondulée postérieure de petits arcs noirs, mais moins apparente aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Ces dernières ailes ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris fauve, & séparés l'un de l'autre par un groupe d'atomes d'un bleu-argenté. Il arrive cependant quelquefois que l'iris est nul ou peu distinct.

Du Bengale.

64. POLYOMMATE Nédymond.

POLYOMMATUS Nedymond.

Pol. alis suprà violaceo-cœruleis, nitidis, limbo atro: subtus sericeo-albis, fuscâ geminâ terminali, fuscâ; posticis ad angulum ani ocellis duobus nigris, alteris iride nigrâ, alteris argenteo-cœruleâ.

Papilio Nedymond. CRAM. *pl. 299. fig. E. F.*

Papilio Nedymond. HERBST, *Pap. tab. 299. fig. 5. 6.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant, avec le limbe postérieur des quatre ailes d'un noir-brun, & le milieu des supérieures marqué d'une tache orbiculaire d'un bleu-pâle.

Le dessus de la femelle est d'un noir-brun, avec des atomes d'un bleu-violet sur le disque des ailes supérieures, & vers l'extrémité des inférieures.

Le dessous des deux sexes est d'un blanc-fatiné, avec une double bande terminale d'un brun-purpurin. Cette bande offre à la région anale des fe-

condes ailes deux yeux noirs, dont l'extérieur à iris roux, l'intérieur à iris d'un bleu-argenté & séparé du précédent par un groupe d'atomes du même bleu. En avant de ces yeux sont trois traits noirs, dont l'intermédiaire en forme de V ou de chevron renverté. Les deux queues sont égales, noires, avec l'extrémité & les bords blancs.

Du Bengale.

Nota. La figure de Cramer est inexacte : 1°. eu ce que la queue intérieure est trop large & beaucoup trop courte ; 2°. en ce que la région anale du dessous des secondes ailes est rouille, avec trois points bleus oculaires, au lieu d'être comme nous l'indiquons dans notre description.

65. POLYOMMATE Favonius.

POLYOMMATUS Favonius.

Pol. alis suprà fuscis, anticarum disco, posticarum apice maculis fulvis: subtus cinereis, strigis duabus undulatis albis; posticis fasciâ submarginali rufâ anguloque ani cœruleo.

Papilio P. Favonius, alis subcaudatis, fuscis, fulvo maculatis: subtus cinereis utrisque strigis duabus albis; posticis fasciâ submarginali, fulvâ angulo ani cœruleo. SMITH-ABBOT, *The Nat. Hist. of the rarer insects of Georgia, vol. 1. p. 27. tab. 14.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux taches fauves orbiculaires sur le disque des supérieures, & de une à quatre à la région anale des inférieures.

Le dessous est cendré, & traversé aux quatre ailes par deux lignes blanches, ondulées, ayant un des côtés bordé de noirâtre. Outre cela, les ailes inférieures offrent avant leur bord terminal une bande fauve sinuée, & leur angle interne est bleu.

Chez la femelle, les taches anales du dessus des secondes ailes sont plus nombreuses que chez le mâle.

La chenille, selon Abbot, est cloporte, d'un vert-jaunâtre, avec une ligne dorsale & des traits latéraux obliques d'un vert plus foncé. Elle vit sur le chêne écarlate (*quercus rubra*).

La chrysalide est courte, obtuse, grêle, avec des points bruns sur le dos de l'abdomen.

Ce polyommate se trouve en Georgie dans le courant du mois de mai.

66. POLYOMMATE Mars.

POLYOMMATUS Mars.

Pol. alis suprà fuscis: subtus pallidioribus; posticis punctis duobus baseos strigâque bifidâ albis; strigâ maculam rufam amplectente.

Papilio P. R. Mars, alis bicaudatis fuscis:

posticis maculâ rufâ, subtus punctis duobus fasciâque obliquâ albis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 624.*

Hesperia R. Mars. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 265. n°. 24.*

Papilio P. R. Nixon, alis caudatis fuscis: subtus strigâ obliquâ niveâ, posticis fasciâ submarginali rufâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n°. 671. ?*

Papilio Mars. HERBST, *Pap. tab. 289. fig. 1. 2.*

Papilio Acis. GRAM. *pl. 175. fig. C. D.*

Papilio Acis. DRURY, *Inf. tom. 1. tab. 1. fig. 2. 2.*

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache un peu plus foncée vers le milieu de la côte des supérieures, & une lunule fauve vers le milieu du bord terminal des inférieures.

Le dessous est d'un brun-cendré, avec une raie blanche, oblique, bordée de noirâtre intérieurement, courte aux premières ailes, fortement bifide aux secondes, & embrassant dans sa fissure une grande tache rouille. Les secondes ailes ont en outre deux points blancs à la base, & un point rouge à l'angle de l'anus. La frange des quatre ailes est blanche.

La femelle nous est inconnue.

Des Antilles. Cramer le dit, mais à tort, du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Fabricius rapporte ici le papillon *Lxion* de la *Mantissa*; mais on ne peut guère constater l'identité au moyen de sa phrase spécifique.

67. POLYOMMATE Ergéus.

POLYOMMATUS Ergæus.

Pol. alis suprà fuscis: subtus cinereis; posticis strigâ undulatâ sanguinâ extus albo marginatâ, fasciâque angulâ ani testaceâ medio valdè dilatâ & posticè nigro tripunctatâ.

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec le milieu des supérieures un peu plus foncé, & l'extrémité des inférieures chargée d'une série de petits anneaux bleuâtres, parmi lesquels il y a une tache fauve triangulaire & surmontant un point noir. Outre cela, la frange de chaque aile est blanche.

Le dessous est d'un cendré plus ou moins foncé, avec deux lignes postérieures, transverses, ondulées & bordées de blanc en dehors. Les deux lignes des premières ailes sont noirâtres. La ligne antérieure des secondes ailes est d'un rouge-sanguin; leur ligne postérieure est noire, & elle s'appuie vers l'angle de l'anus sur une bande briqueée,

flexueuse, très-dilatée dans son milieu, & marquée en arrière de trois points noirs, dont l'intermédiaire s'apoudré de gris-bleuâtre. Les queues sont noires, avec le bout blanc.

Des Antilles.

68. POLYOMMATE Nébis.

POLYOMMATUS Nebis.

Pol. alis suprà fuscis: subtùs cinereis, ponè medium strigis duabus undatis, alterà è maculis teffaceis, alterà ex annulis albis; posticis ocellis duobus anguli ani rufis. (Fœmina.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches aux supérieures, avec quatre anneaux bleuâtres & un anneau intermédiaire roullâtre à l'extrémité des inférieures.

Le dessous est cendré, & il offre au-delà du milieu deux lignes ondulées transversales, dont l'antérieure formée par des taches d'un rouge-brique & bordées de blanc en arrière, la postérieure composée de petits anneaux blanchâtres & s'appuyant vers l'angle anal des secondes ailes sur deux yeux roux à prunele noire. Les quatre taches supérieures de la ligne rouge des secondes ailes sont presque oculaires.

Décrit d'après un individu femelle rapporté du Brésil par feu Lalande.

69. POLYOMMATE Cléon.

POLYOMMATUS Cleon.

Pol. alis caudatis, fuscis: subtùs cinereis, anticis strigâ, posticis fuscisâ sanguineis; angulo ani ocello gemmo rufo. FAB.

Papilio P. R. Cleon. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 69. n.º. 660.

Hesperia R. Cleon. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 282. n.º. 84.

Ce polyommate paroît tellement voisin du *Nébis* que, quoique Fabricius n'indique qu'une queue, nous avons cru devoir le placer ici.

Les antennes sont annelées de blanc & de noir, & elles ont la massue terminée par un point brun. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-obscur, avec un petit point rouge vers l'angle de l'aube.

Le dessous est cendré, avec des lunules marginales plus claires. Les ailes supérieures ont une ligne transverse d'un rouge-obscur. Les ailes inférieures sont traversées obliquement par une large bande dentée d'un rouge-sanguin, & elles ont près de l'angle de l'aube deux yeux roux à prunele noire. Les jambes sont ponctuées de noir.

Du Brésil.

(Traduction de Fabricius.)

70. POLYOMMATE Béon.

POLYOMMATUS Beon.

Pol. alis suprà fuscis, basi cœrulescente: subtùs cinereis, nitidis; posticis fuscisâ mediâ sanguineâ lunulifque marginalibus nigris: lineâ angulatâ albâ fusciam intus secante.

Papilio Beon. CRAM. pl. 319. fig. B. C.

Papilio Vesulus. CRAM. pl. 340. fig. I. K.

Papilio Beon. HERBST, Pap. tab. 290. fig. 4. 5.

Papilio Vesulus. HERBST, Pap. tab. 292. fig. 1. 2.

Après avoir examiné attentivement un assez grand nombre d'individus, nous sommes restés persuadés que le *Beon* & le *Vesulus* de Cramer appartiennent à la même espèce, & que les figures qui les représentent sont très-grossièrement enluminées.

L'envergure de cette espèce est de onze à treize lignes. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-pâle, qui s'étend même chez certains mâles jusqu'au bord postérieur des inférieures. Ce bord offre assez souvent un petit point rouge, placé à l'angle de l'aube.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-luisant, avec un trait central plus ou moins distinct, puis une bande transverse & maculaire, d'un rouge-sanguin. La bande des premières ailes est courte, presque droite & bordée en arrière par une ligne blanche. La bande des secondes ailes est bordée de même à la moitié supérieure, mais la moitié inférieure est coupée dans le sens de sa longueur par des chevrons blancs, dont le côté interne est doublé de noir. Outre cela, les secondes ailes ont avant le bord postérieur une série de lunules noires, dont les deux intermédiaires aussi que l'anale plus grandes, plus colorées, & chargées chacune d'un chevron rouge, la pénultième surmontant un groupe d'atomes d'un gris-bleuâtre. Les premières ailes ont l'origine de la côte plus ou moins rougeâtre.

Quelquefois, comme dans le *Vesulus* de Cramer, la bande rouge des quatre ailes est plus étroite, tandis qu'au contraire les trois lunules rouges de l'extrémité des inférieures sont beaucoup plus larges & ne laissent qu'un point noir derrière elles. Il arrive même que ces ailes n'ont qu'une seule lunule rouge.

Il se trouve à Surinam, au Brésil & dans plusieurs îles adjacentes.

71. POLYOMMATE Cécrops.

POLYOMMATUS Cecrops.

Pol. alis bicaudatis, nigris: subtùs fuscisâ sanguineâ. FAB.

Hesperia R. Cecrops. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 270. n^o. 41.*

Papilio Cecrops. JON. *Fig. piñ. 6. tab. 21. fig. 2.*

Il est probable que ce polyommate est une variété femelle, & déjà un peu ancienne de notre *Béon*. Mais, dans le doute, nous aimons mieux nous exposer à le donner deux fois que d'encourir le reproche de l'avoir réuni sans l'avoir vu.

Il est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est noir & sans taches.

Le dessous est d'un brun enfumé, avec une tache centrale, puis une ligne courbe & transversale, d'un rouge-sanguin aux ailes supérieures. Les ailes inférieures ont une bande rouge, contiguë à une bande blenâtre, & suivie de lunules noires, parmi lesquelles il y a une tache marginale fauve marquée d'un point noir.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

72 POLYOMMATE Tyrtée.

POLYOMMATUS Tyrtæus.

Pol. alis bicaudatis, fuscis : posticis subtus strigâ undatâ albâ lunulifque marginalibus nigris, intermediis rufis. FAB.

Hesperia R. Tyrtæus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 271. n^o. 46.*

Papilio Tyrtæus. JON. *Fig. piñ. 6. tab. 11. fig. 1.*

Il est petit. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, sans aucune tache aux supérieures, avec une bandelette d'un bleu-pâle aux inférieures. Cette bandelette se divise postérieurement en deux branches qui sont terminées chacune par un point noir.

Le dessous est brun, avec une ligne postérieure blanche & une autre plus obscure aux premières ailes ; avec une ligne blanche, postérieure, très-ondulée, & suivie de lunules noires aux secondes ailes. Les lunules embrassent un point de leur couleur, & les deux plus intermédiaires d'entr'elles sont lavées de roux.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Ne seroit-ce pas un *Béon* chez lequel la bande rouge auroit disparu ?

73. POLYOMMATE Echion.

POLYOMMATUS Echion.

Pol. alis supra fuscis (maris intus ardosiaceis, nitidis) : posticis subtus albidis, disco punctis ocellaribus testaceis, apice strigâ undulatâ nigricante ocellifque duobus rufis.

Papilio P. R. Echion, alis bicaudatis, supra fuscis : subtus pallescentibus, fasciâ rufâ ocelloque terminali rubro. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 788. n^o. 224.* (La femelle.)

Papilio P. R. Echion. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n^o. 631.*

Hesperia R. Echion. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. p. 269. n^o. 38.*

KLEMANN, *Inf. Suppl. à ROESEL, tom. 1. tab. 7. fig. 3. 4.*

Papilio Echion. ESP. *Pap. tom. 1. tab. 20. fig. 1.*

Papillon Echion. ENGRAM. *Pap. Eur. tom. 1. tab. 37. fig. 77.*

Papilio Echion. DEVILLERS, *Ent. Liun. tom. 2. p. 64. n^o. 117.*

Papilio Echion. HERBST, *Pap. tab. 305. f. g. 1. 2.* (La femelle.)

Papilio Celmus. HERBST, *Pap. tab. 289. f. g. 8. 9.* (Var. femelle ?)

Papilio Crotus. HERBST, *Pap. tab. 290. f. g. 8. 9.* (Le mâle.)

Papilio Celmus. CRAM. *Pap. pl. 55. f. g. G. II.* (Var. femelle ?)

Papilio Crotus. CRAM. *Pap. pl. 555. f. g. G. II.* (Le mâle.)

La description que Linné donne de son *Echion* est tellement laconique qu'elle pourroit convenir à plusieurs autres espèces analogues ; mais, comme il cite à l'appui l'excellente figure de Klemann (voyez la synonymie), nous ne doutons point que ce polyommate ne soit la femelle du *Crotus* de Cramer.

L'*Echion* a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne des quatre ailes, & principalement des inférieures, d'un bleu-ardoisé-luisant.

Le dessous de la femelle est tout brun.

Le dessous des premières ailes est cendré chez les deux sexes, avec une bande postérieure d'un rouge-brique, plus ou moins éclairée de blanchâtre en arrière, & suivie d'une ligne flexueuse noirâtre.

Le dessous des secondes ailes du mâle & de la femelle est blanchâtre, mais cendré aux bords antérieur & postérieur, avec une douzaine de points oculaires d'un rouge-briqueté sur le disque, & une ligne ondulée noirâtre vers l'extrémité. A la suite de cette ligne, l'angle anal offre deux yeux rousstrés à prunelle noire, & dont l'extérieur souvent plus distinct que l'intérieur.

Il paroîtroit que Fabricius a connu le mâle, puisqu'il dit que le dessus des ailes a parfois un reflet bleu.

De Surinam & du Brésil. — Plusieurs auteurs ont dit, d'après Fuefky, qu'il se trouvoit en Suisse; mais c'est une erreur.

Nota. Le papillon *Celmus* de Cramer nous semble être une femelle plus petite, dont le dessous des ailes inférieures est moins chargé de points discoïdaux, comme dans les individus figurés par Esper & par Engramelle. Sa patrie est la même que celle de l'*Echion*.

74. POLYOMMATE Columelle.

POLYOMMATUS Columella.

Pol. alis supra fuscis intusque pallide ardofoceis: subtus fuscescentibus, strigâ flexuosa à punctis ocellaribus nigris & ponè hanc lunulis annulisque albis; posticis ocellis duobus anguli ani iride rufâ.

Hesperia R. Columella, *alis caudatis, fuscescentibus: subtus cinereis, posticis strigâ punctorum atrorum alborumque maculisque duabus fulvis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 282. n.º 85.

Papilio Bubastus. CRAM. pl. 552 fig. G. H.

Papilio Bubastus. HERBST, *Pap. tab. 524. fig. 6. 7.*

Fabricius a décrit ce polyommate d'après une femelle altérée qui n'avoit qu'une queue, & Cramer l'a figuré d'après une autre femelle qui n'en avoit pas du tout; en sorte que ce n'est que par des recherches opiniâtres & par la comparaison de plusieurs individus des deux sexes que nous sommes arrivés à nous convaincre que le *Columella* du professeur de Kiel & le *Bubastus* de l'Iconographe d'Amsterdam se rapportoient à la même espèce.

Cette espèce n'a guère qu'un pouce d'envergure. Elle est d'un brun-noirâtre en dessus, avec la région du bord interne des quatre ailes d'un bleu-ardoisé-pâle, & l'extrémité des inférieures marquée vers l'angle interne de deux à trois points noirs oculaires. Dans le mâle où le bleu est plus apparent, il y a une tache obscure près du milieu de la côte des ailes supérieures & un petit arc noir sur le disque des inférieures.

Le dessous est d'un brun-cendré chez les deux sexes, avec une rangée transverse & flexueuse de points noirs bordés de blanc en arrière, & après laquelle on voit une série de lunules, puis un cordon marginal d'anneaux, blancs. Les ailes inférieures ont en outre à la base deux points noirs cercés de blanc, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris roux. L'œil extérieur est plus gros que l'intérieur, & l'on remarque entre l'un & l'autre un petit point noir presque entièrement couvert d'atomes bleuâtres.

Le dessous des quatre ailes offre quelquefois un petit arc central noirâtre avant la rangée de

points oculaires; nous avons même vu un individu chez lequel ces points étoient sablés de ferrugineux.

Des îles de l'Amérique, & non du Cap de Bonne-Espérance, comme le dit Cramer.

75. POLYOMMATE Mégacles.

POLYOMMATUS Megacles.

Pol. alis supra fuscis intusque ardofoceis: posticis subtus basi cinereis, apice albidis, fuscis tribus undulatis punctoque centrali ferrugineis. (Mas.)

Papilio Megacles. CRAM. pl. 555. fig. E. F.

Papilio Megacles. HERBST, *Pap. tab. 290. fig. 6. 7.*

Nous n'avons vu que le mâle. Il a approchant un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne d'un bleu-ardoisé-pâle.

Le dessous des premières ailes est d'un cendré-luisant, avec l'origine de la côte, un point central, deux lignes transverses & la frange, ferrugineux. L'espace compris entre les deux lignes transverses est d'une teinte blanchâtre qui va en se rétrécissant jusqu'à l'angle interne de l'aile.

Le dessous des secondes ailes est cendré vers la base, blanchâtre vers l'extrémité, & traversé par trois bandes ondulées ferrugineuses, dont la postérieure plus large & moins prononcée, les deux antérieures séparées par un point central également ferrugineux. Outre cela, la frange est légèrement entrecoupée de ferrugineux. Le corps est bleuâtre, avec la tête rouille.

De Surinam & du Brésil.

76. POLYOMMATE Mégarus.

POLYOMMATUS Megarus.

Pol. alis supra fuscis intusque cœrulescentibus: posticis subtus albidis, strigis tribus flexuosis à maculis fuscescentibus ocellisque duobus anguli ani iride rufâ.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessous des deux sexes est d'un brun-noirâtre, avec la région du bord interne de toutes les ailes d'un bleu-violet-pâle, & marquée d'un point noir vis-à-vis des queues des inférieures. Chez le mâle, le milieu des ailes supérieures offre une tache d'un noir-obscur.

Le dessous des premières ailes est gris vers la base, blanchâtre vers l'extrémité, avec une tache centrale & deux bandes maculaires postérieures d'un brun-noirâtre-pâle.

Le dessous des secondes ailes est entièrement blanchâtre, avec trois bandes maculaires flexueuses & une liture discoïdale du même brun que les bandés des ailes de devant. Il y a en outre vers

l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris roux.
Du Brésil.

77. POLYOMMATE Etolus.

POLYOMMATUS Etolus.

Pol. alis bicaudatis : anticis nigris : posticis cæruleiscentibus ; subtis albidis puncto baseos duobusque apicis atris. FAB.

* *Papilio P. R. Etolus.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n^o. 620.*

Hesperia R. Etolus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 264. n^o. 20.*

Les ailes supérieures ont le dessus noir, avec le bord interne un peu bleuâtre. Les ailes inférieures sont d'un bleu-pâle & luisant, avec un point noir à l'extrémité & deux longues queues blanches.

Le dessous des ailes supérieures est d'un briqueté-obscur, avec deux lignes transverses plus obscures. Le dessous des ailes inférieures est blancâtre, avec un point noir distinct à la base, deux lignes obscures interrompues avant l'extrémité, & deux gros points noirs à l'angle de l'anus. Les queues sont blanches comme du côté opposé, mais elles ont le milieu divisé longitudinalement par une ligne noire. Les pattes sont annelées de blanc & de noir.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

78. POLYOMMATE Dindus.

POLYOMMATUS Dindus.

Pol. alis bicaudatis , atris , margine tenuiori cæruleo : subtis cinereis , albo maculatis maculæque duplici rufâ anguli ani. FAB.

Hesperia R. Dindus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 269. n^o. 40.*

Papilio Dindus. Jox. *Fig. piç. 6. tab. 4. fig. 4.*

Il est de moyenne taille dans cette famille. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec le bord interne, & principalement celui des inférieures, largement bleu & luisant.

En dessous, le foud est cendré, & les premières ailes offrent sur leur milieu deux traits obscurs, puis une ligne transverse de taches obscures, bordées de blanc, & enfin une série transverse d'anneaux blancs. Les secondes ailes sont parsemées de taches blanches, & elles ont à l'angle de l'anus deux taches écarlates. (*Rouffes* suivant la phrase spécifique.)

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Dans la description de Fabricius, il faut

lire *marginè interiori*, au lieu de *marginè anteriori*.

79. POLYOMMATE Gabelus.

POLYOMMATUS Gabelus.

Pol. alis suprà obscurè cæruleis , limbo fusco : subtis canis , strigis undulatis nigris , anticarum duabus , posticarum tribus ; posticis ad angulum ani oculo inde rufâ. (Fœmina.)

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec une bordure brune, plus large aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est d'un blanc-grisâtre, avec deux lignes ondulées, entièrement noires, à l'extrémité des ailes supérieures, & trois, dont une basilaire, aux inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'angle de l'anus deux points noirs, dont l'extérieur plus gros & entouré d'un iris roux.

Nous n'avons pas vu le mâle.

Du Brésil.

80. POLYOMMATE Jébus.

POLYOMMATUS Jébus.

Pol. alis suprà cærulescentibus , limbo fusco : subtis fuscescentibus , anticarum apice , posticarum paginâ omni albido variegatis ; posticis punctis duobus anguli ani nigris , anteriori oblongo. (Fœmina.)

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu très-pâle, avec une bordure brune plus large aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est brunâtre, avec le sommet des ailes supérieures & toute la surface des inférieures panachés de blancâtre. L'angle anal des ailes inférieures offre deux points noirs, dont l'intérieur oblong & parfois lordé de sauve en arrière.

Décrit d'après des femelles.

Du Brésil.

81. POLYOMMATE Mécène.

POLYOMMATUS Mæcenas.

Pol. alis bicaudatis , atris , disco cæruleo : subtis brunneo nebulosis. FAB.

Hesperia R. Mæcenas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 271. n^o. 45.*

Papilio Mæcenas. Jox. *Fig. piç. 6. tab. 3. fig. 2.*

Le corps est grand, noir. Le dessus des quatre ailes est d'un noir-brun, avec le disque bleu.

Le dessous est nué de brun, avec un trait blanc interrompu à la base des ailes supérieures,

& un petit point noir à l'angle anal des inférieures.

De la Chine.

(*Introduction de Fabricius.*)

Nota. Ce chinois-là se trouve bien dépaycé parmi les américains à deux queues, malgré la grande affinité qu'il paroît avoir avec eux.

82. POLYOMMATE Céthégus.

POLYOMMATUS Cethagus.

Pol. alis suprà cœruleis, nitidis; limbo atro: subtus cinereis; posticis strigis duabus undatis serieque punctorum marginali fuscis; puncto anali iride fulvâ cinctis. (Fœmina.)

Papilio Cethagus. STOLL, *Supplém. à CRAM.* pl. 58. fig. 5 & 5 E.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant, avec une large bordure d'un noir-brun.

Le dessous est cendré, avec deux lignes brunes, transverses & ondulées, à chaque aile. Les ailes inférieures ont en outre une série marginale de points bruns, dont le plus intérieure cercle de fauve.

Nous n'avons vu que la femelle.

De Surinam.

83. POLYOMMATE Calus.

POLYOMMATUS Calus.

Pol. alis suprà argenteo-cœruleis, nitidissimis, limbo nigro: subtus cinereis; anticis maculâ magrâ mediâ, posticis strigâ undulatâ fuscis.

Nous ne connoissons ce lépidoptère que par un individu très-ancien & mal conservé.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argenté très-brillant, avec tout le pourtour extérieure des premières, & simplement la tranche du bord terminal des secondes, noirs.

Le dessous est cendré, avec une grande tache noire, transversale & de forme triangulaire, au milieu des premières ailes, avec une ligne noire, bordée de blanc en arrière & finissant par un W, sur le milieu des secondes. Ces dernières ailes ont l'angle anal largement noir & saupoudré de bleu-pâle. La vétilité de l'individu ne nous a pas permis de voir s'il y a d'autres caractères.

De l'Amérique.

84. POLYOMMATE Hugon.

POLYOMMATUS Hugon.

Pol. alis suprà fuscis, disco fulvo: subtus fuscescentibus, strigâ undulatâ testaceâ extus albo marginatâ; posticis ocellis duobus anguli anti iride rufâ. (Mas.)

Il est petit. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec une ligne bricotée, transversale, ondulée & bordée de blanc en arrière. Les secondes ailes ont en outre près de l'angle de l'anus deux yeux rouges à prunelle noire, & leur bord postérieur est longé par une ligne blanche très-fine.

Décrit d'après un mâle un peu altéré.

Il habite. . . .

85. POLYOMMATE Xénophon.

POLYOMMATUS Xenophon.

Pol. alis bicaudatis fuscis, disco flavo: subtus cinereis, strigâ mediâ albâ fuscae innatâ. FAB.

Hesperia R. Xenophon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 272. n° 47.*

Papilio Xenophon. JON. *Fig. piçâ. 6. tab. 15. fig. 4.*

Fabricius le décrit ainsi: il paroît avoir de l'affinité avec le *Jarbas* (voyez n° 108). Le corps est petit, brun. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une grande tache jaune sur le disque.

Le dessous est cendré, avec une ligne blanche, discoïdale, ondulée, contiguë à une ligne oblique. Les ailes inférieures ont en outre une série marginale de points obscurs.

De l'Inde.

86. POLYOMMATE Damastus.

POLYOMMATUS Damastus.

Pol. alis suprà fuscis, disco fulvo: subtus viridibus; posticis strigis tribus flexuosis ocellisque tribus anguli anti nigris albo marginatis.

Papilio Damon. CRAM. pl. 590. fig. C. D.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque fauve.

Le dessous est vert, avec deux lignes noires, courbes, & bordées de blanc à l'extrémité des ailes supérieures; avec trois lignes semblables, mais flexueuses, sur la surface des ailes inférieures. L'angle anal de ces dernières ailes offre en outre une suite de trois petits yeux noirs à iris blanc.

Décrit d'après un individu unique & un peu altéré.

De la Virginie.

Nota. Nous avons changé le nom de Cramer, parce qu'il y a un autre polyommate qui porte le nom de *Damon*.

87. POLYOMMATE Têlème.

POLYOMMATUS Telemus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis: subtùs viridibus; posticis strigà marginali nigrà, extùs dilatata, intùs valdè angulatà.

Papilio P. R. Telemus, alis bicaudatis, cæruleis, nitidis: posticis subtùs strigà marginali angulatà atrà. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n°.* 652.

Hesperia R. Telemus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 269. n°.* 59.

Papilio Telemus. CRAV. *pl. 4. fig. D. E.*

Papilio Telemus. HERBST, *Pap. tab. 299. fig. 7. 8.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, & les supérieures offrent dans le mâle une tache brune oculaire.

Le dessous est vert, sans aucune tache aux ailes supérieures, avec une ligne noire à l'extrémité des inférieures. Cette ligne est très-anguleuse vers l'angle de l'anus, & dilatée vers l'angle du fomet.

La femelle nous est inconnue.

De l'Amérique équinoxiale.

Nota. Fabricius décrit cette espèce sans parler de la couleur du dessous des ailes, en sorte qu'on ne pourroit jamais la reconnoître s'il ne citoit pas la figure de Cramer.

88. POLYOMMATE Janias.

POLYOMMATUS Janias.

Pol. alis suprà virefcenti-cæruleis, nitidis, limbo atro: subtùs viridibus; posticis strigà undulatà punctoq; ocellari nigris.

Papilio P. R. Janias, alis tricaudatis, cæruleis, limbo atro: subtùs viridibus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n°.* 608.

Hesperia R. Janias. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 259. n°.* 5.

Papilio Janias. CRAM. *pl. 215. fig. D. E.*

Papilio Hassan. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 58. fig. 4 & 4 D.*

Papilio Janias. HERBST, *Pap. tab. 502. fig. 3. 4.*

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-chatoyant en vert, avec tout le pourtour extérieur noir.

Le dessous est vert, sans taches aux ailes supérieures, avec une ligne ondulée & un point noirs aux inférieures. Le point est cerclé de fauve, & placé derrière la ligne, vis-à-vis des queues.

Hyl. Nat. Inf. Tome LX.

De Surinam.

Nota. Le point ocellé est quelquefois flanqué de petits traits noirs. D'autres fois, au contraire, la ligne ondulée qui le surmonte est peu distincte.

89. POLYOMMATE Hérodote.

POLYOMMATUS Herodotus.

Pol. alis suprà chalybdineo-cæruleis, limbo nigro: subtùs viridibus; posticis strigà è punctis intùs nigris, extùs albis.

Hesperia R. Herodotus, alis caudatis, cæruleis: subtùs viridibus, strigà punctorum nigro-alborum. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 286. n°.* 100.

Papilio Herodotus. JOX. *Fig. pict. 6. tab. 18. fig. 1.*

Papilio Herodotus. DONOW. *of. an Epitome of the Nat. Hist. Insects of India, cub. 1. pl. 5. fig. 2.*

Papilio P. R. Eryx, alis caudatis, nigris: subtùs viridibus; posticis margine subdentato maculatogue. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°.* 663.

Hesperia R. Eryx. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n°.* 89.

Papilio Anyntor. CRAM. *pl. 48. fig. E. (Le mâle.)*

Papilio Menalcas. CRAM. *pl. 259. fig. A. B. (La femelle.)*

Papilio Anyntor. HERBST, *Pap. tab. 500. fig. 5. 6.*

Papilio Menalcas. HERBST, *Pap. tab. 298. fig. 5. 6.*

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu d'acier luisant, avec le bord postérieur noir.

Le dessous est d'un vert-pré, sans aucune tache aux ailes supérieures, avec une ligne transverse de points oblongs, noirs en avant, blancs en arrière, aux inférieures. L'angle anal de ces dernières ailes est ferrugineux & précédé d'un ou de deux gros points de la couleur. Le corps est d'un bleu d'acier, avec le front d'un vert-doré.

La femelle se distingue du mâle en ce qu'elle a le dessus d'un blanc beaucoup plus obscur & largement bordé de brun. Elle nous paroît bien répondre à l'*Eryx* de Fabricius, quoique cet auteur le dise de la Chine.

De Surinam.

90. POLYOMMATE Ethémon.

POLYOMMATUS Ethemon.

Pol. alis suprà nigris, discocæruleo: subtùs

M m m m

fulvis, strigâ mediâ rubrâ; posticis ferie posticâ à lunulis intus nigris, extus albis. (Fœmina?)

Papilio Ethemon. CRAM. pl. 48. fig. D.

Papilio Ethemon. HERBST, *Pap. tab.* 300. fig. 7. 8.

Nous ne connoissons ce polyommate que par un individu sans corps, mais qui nous paroît cependant être une femelle.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec le milieu d'un bleu foncé-luisant.

Le dessous est d'un fauve-obscur, avec une ligne commune rouge sur le milieu. Les secondes ailes ont parallèlement au bord postérieur un cordon de petites lunules, noires en avant, blanches en arrière, & surmontées chacune d'une tache coniforme rougeâtre.

Des Indes occidentales.

91. POLYOMMATE Lycabas.

POLYOMMATUS Lycabas.

Pol. alis suprà cœruleis, margine nigro: subtus fuscis, apice pallidioribus; posticis angulo ani flavo nigroque strigoso. (Mas.)

Papilio Lycabas. CRAM. pl. 117. fig. E.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet, avec les bords noirs, & une tache orbiculaire luisante au milieu des supérieures.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec l'extrémité plus pâle & rayée de brunâtre transversalement. Les secondes ailes ont la région anale jaune, avec quelques lignes noires disposées dans le même sens que les raies brunes.

Nous n'avons vu que le mâle, encore étoit il en mauvais état.

De Surinam.

7. Dessus des ailes supérieures du mâle n'offrant point vers le milieu de tache orbiculaire distincte.

92. POLYOMMATE Aunus.

POLYOMMATUS Aunus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, limbo nigro: subtus fuscis, albedo bifusciatis; anticis costâ basæ, posticis angulo ani immaculatis. (Mas.)

Papilio P. R. Aunus, alis subtricaudatis, cœruleis, limbo atro: subtus nigris, albo fusciatis. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 66. n^o. 619. (Le mâle.)

Hesperia R. Aunus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 263. n^o. 18. (Le mâle.)

Papilio Aunus. CRAM. pl. 23. fig. E. F. (Le mâle.)

Papilio Aunus. HERBST, *Pap. tab.* 291. fig. 7. 8.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-barbeau-luisant, avec le limbe extérieur noir.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec deux bandes blanchâtres, transverses, divisées dans le sens de leur longueur par quelques lignes noires.

La femelle nous est inconnue.

De Curaçao.

Nota. Ce polyommate se rapproche beaucoup de l'*Eole* n^o. 59; mais il est plus petit, il n'a que deux bandes blanchâtres en dessous, la côte de ses premières ailes & l'angle anal des secondes sont sans taches. Outre cela, le milieu des ailes supérieures du mâle n'offre pas de tache cotonneuse comme dans l'*Eole*.

93. POLYOMMATE Hyacinthe.

POLYOMMATUS Hyacinthus.

Pol. alis viridi-cœruleis, nitidis, suprà margine nigro, subtus fuscis tribus nigris mediâque albâ.

Papilio P. R. Hyacinthus, alis bicaudatis, cœruleo-nitidis: posticis subtus medio atro, fasciâ albâ. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 67. n^o. 657.

Hesperia R. Hyacinthus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 275. n^o. 51.

Papilio Hyacinthus. CRAM. pl. 36. fig. E.

Papilio Hyacinthus. HERBST, *Pap. tab.* 299. fig. 3. 4.

Il a un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre-luisant, avec une bordure noire, étroite chez le mâle, large & un peu moins foncée chez la femelle.

Le dessous est de la couleur du dessus, avec trois bandes noires transverses & une bande centrale blanche. Ces bandes ne montent pas jusqu'à la côte des ailes supérieures, & la bande blanche est encore plus courte que les autres.

Des Indes occidentales.

94. POLYOMMATE Cyanus.

POLYOMMATUS Cyanus.

Pol. alis suprà cyaneis, nitidis, limbo nigro: subtus fuscis, disco basæ albo; posticis ocellis septem marginalibus argenteo-cœruleis. (Mas.)

Papilio P. R. Cyanus, alis bicaudatis, cœruleis, nitidis: subtus disco albo. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 67. n^o. 656.

Hesperia R. Cyanus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 272. n^o. 50.

Papilio Cyanus. HERBST, *Pap. tab.* 297. n^o. 1. 2.

Papilio Cyanea. CRAM. *pl.* 76. *fig.* C. D.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-barbeau-clair & luisant, avec une légère bordure noire.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec le disque à partir de la base, & une ligne marginale, blancs. La ligne marginale des premières ailes est double; celle des secondes est surmontée d'une série de sept yeux argentés à prunelle noire.

Nous n'avons point vu la femelle.

Des Indes occidentales.

95. POLYOMMATE Pholéus.

POLYOMMATUS Pholeus.

Pol. alis supra virefcenti-cæruleis, nitidis: subtus nigris, inaurato-viridi fuscatis. (Mas.)

Papilio P. R. Pholeus, alis bicaudatis, cæruleis: subtus atris, viridi cæruleoque fuscatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n^o. 628.*

Hesperia R. Pholeus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 267. n^o. 53.*

Papilio Pholeus. CRAM. *pl.* 163 *fig.* D. E.

Papilio Pholeus. HERBST, *Pap. tab.* 295. *fig.* 5. 4.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-luisant & chatoyant en vert.

Le dessous est noir, avec des bandes d'un vert-doré. Les bandes des ailes supérieures sont pour la plupart longitudinales & interrompues. Celles des ailes inférieures sont transverses, & les deux plus intermédiaires sont séparées par quelques points de leur couleur.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

96. POLYOMMATE Philanthe.

POLYOMMATUS Philanthe.

Pol. alis fuscis: posticis supra puncto marginis tenuioris albo, subtus fuscis quatuor flavescitibus transversis singique duabus argenteis.

Papilio Philanthus. STOLL, *Suppl. à CRAM. pl. 5. fig. 5 & 5 C.*

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec un point blanc au milieu du bord interne des inférieures, & deux points bleuâtres près de leur angle anal.

Le dessous est presque du même brun que le dessus, avec deux bandes longitudinales jaunâtres aux inférieures. Ces dernières ailes ont en

contre deux lignes argentées transversales, l'une entre la deuxième & la troisième bandes, l'autre près de l'angle de l'anus.

Décrit d'après un individu sans corps.

De Surinam.

97. POLYOMMATE Simæthis.

POLYOMMATUS Simæthis.

Pol. alis supra fuscis, nitidis: subtus flavo-viridibus, vitâ transversâ argenteâ; posticis apice ferrugineis strigâ à punctis margaritaceis.

Papilio P. R. Simæthis, alis caudatis, fuscis: subtus viridibus, strigâ argenteâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n^o. 668.*

Hesperia R. Simæthis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 286. n^o. 97.*

Papilio Simæthis. DRURY, *Inf. exotic. pl. 1. fig. 5. 3.*

Papilio Simæthis. HERBST, *Pap. tab.* 289. *fig.* 5. 4.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec la queue des inférieures ferrugineuse & terminée de blanc.

Le dessous est d'un vert-jaunâtre, avec une bande argentée, transversale, étroite, bordée de ferrugineux en avant, courbe aux premières ailes, sinuée en arrière aux secondes. Outre cela, les premières ailes ont l'angle interne ferrugineux, avec une ligne argentée courte & transversale. Les secondes ailes ont toute l'extrémité ferrugineuse, mais cependant moins foncée contre le bord interne, avec une série de points nacrés.

Nous ignorons de quel sexe est l'individu que nous décrivons, parce qu'il a un corps rapporté.

De Surinam & de l'île Saint-Christophe.

98. POLYOMMATE Chryfus.

POLYOMMATUS Chryfus.

Pol. alis supra fuscis, anticarum apice albo punctato: subtus ferrugineis, maculis fuscisjque inaurato-viridibus nigro marginatis.

Papilio Chryfus. CRAM. *pl.* 580. *fig.* D. E.

Papilio Chryfus. HERBST, *Pap. tab.* 301. *fig.* 1. 2.

Nous n'avons vu qu'un mauvais échantillon de ce polyommate.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois ou quatre points blancs vers l'extrémité des supérieures.

Le dessous est ferrugineux, avec des taches transversales, puis deux bandes postérieures, & un vert-doré & bordées de noir. Les ailes supérieures

ont des points blancs qui répondent à ceux du dessus, & l'on en voit deux ou trois semblables sur la côte des inférieures. Outre cela, les taches dorées sont entremêlées de quelques litières noires.

De Surinam.

99. POLYOMMATE Achæus.

POLYOMMATUS Achæus.

Pol. alis suprà fuscis, singularum lituris duabus flavis: subtus flavis, maculis numerosis auræis purpurâscenti marginatis.

Hesperia R. Achæus, *alis subbicaudatis, fuscis, maculis flavis: subtus flavis auro maculatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 273. n. 53.*

Papilio Achæus. CRAM. *pl. 552. fig. G. II.*

Papilio Achæus. HERBST, *Pap. tab. 297. fig. 3. 4.*

Papilio Achæus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 4. fig. 1.*

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux taches jaunes sur le milieu des premières, & deux litières transversales de cette couleur sur les secondes.

Le dessous est jaune, avec une multitude de taches dorées, & bordées de brun-pourpre. Nous n'avons vu qu'un seul échantillon, & il nous a été impossible d'en déterminer le sexe.

De Surinam.

100. POLYOMMATE Valens.

POLYOMMATUS Valens.

Pol. alis suprà fuscis, nitidis: subtus flavescens, maculis sanguineis auro punctatis.

Papilio P. R. Valens, alis caudatis, fuscis: subtus flavescens, maculis rubris auro fatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n. 644. (Le mâle.)*

Hesperia R. Valens. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 274. n. 60.*

Papilio P. R. Formosus, alis bicaudatis, fuscis: subtus flavescens, sanguineo auroque punctatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n. 639. (La femelle.)*

Hesperia R. Formosus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 273. n. 55.*

Papilio Formosus. CRAM. *pl. 118. fig. G.*

Papilio Formosus. HERBST, *Pap. tab. 293. fig. 6.*

Le Valens & le Formosus de Fabricius forment

une seule espèce, qui n'a guère qu'un pouce d'envergure.

Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, légèrement chatoyant en bleu.

Le dessous est d'un jaune-pâle, avec de grandes taches d'un rouge-ferrugineux, & sur lesquelles il y a plusieurs points d'un vert-doré. Le bord terminal est en outre totalement longé par une ligne de la couleur de ces points.

Dans le mâle, ou le Valens proprement dit de Fabricius, le milieu des premières ailes offre une tache blanche, transparente & orbiculaire. La femelle, ou le Formosus, n'a probablement point cette tache, puisque Cramer n'en parle point.

De Surinam.

101. POLYOMMATE Vulcain.

POLYOMMATUS Vulcanus.

Pol. alis suprà fuscis (maris violaceo micantibus). fulvo fuscatis: subtus saturato-rufis, fuscis flavis nigro marginatis strigisque intermedis à maculis argenteis.

Papilio P. R. Vulcanus, alis bicaudatis, suprà fuscis, flavo maculatis: subtus strigis flavis, fulvis argenteisque variegatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n. 622. (La femelle.)*

Hesperia R. Vulcanus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 264. n. 22. (La femelle.)*

Papilio Vulcanus. HERBST, *Pap. tab. 301. fig. 5. 6.*

Papilio Etolus. CRAM. *pl. 208. fig. E. F. (La femelle.)*

Hesperia R. Pindarus, *alis subtricaudatis, cæruleis, limbo atro: subtus fuscis, argenteo fulvoque maculatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 262. n. 15. (Variété mâle.)*

Papilio Pindarus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 4. fig. 4.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec trois à quatre bandes fauves, courtes & transverses, vis-à-vis du sommet des supérieures, & une sur le bord terminal des inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus deux petits yeux noirs à iris argenté, & leurs queues sont noires, avec la base fauve & l'extrémité blanche.

Le dessous de toutes les ailes est d'un roux-foncé, avec six bandes communes jaunes, bordées de noir, & séparées les unes des autres par des lignes transverses de taches argentées. Aux deux petits yeux des secondes ailes répondent ici deux yeux parfaitement semblables. Les antennes sont noires, annelées de blanc & terminées de fauve. L'abdomen a le bord des anneaux blanchâtre.

Le mâle a un reflet violet. Il offre parfois une

variété sans bande fauve sur le dessus des premières ailes, & ayant le dessous des quatre ailes d'un brun-obscur au lieu de l'avoir d'un roux-foncé; c'est cette variété que Fabricius a décrite sous le nom de *Pindarus*.

Du Bengale & de Java.

102. POLYOMMATE *Orcas*.

POLYOMMATUS Orcas.

Pol. alis suprà virefcenti-cæruleis, limbo nigro: subtùs ferrugineo-fuscis, maculis numerosis argenteis.

Papilio Orcas. DRURY, *Inf. exot. tom. 3. pl. 34. fig. 2. 5.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-verdâtre, avec tout le pourtour extérieur noir. Le noir de la côte des premières ailes se dilate sur le bleu de manière à y former trois taches, dont les deux antérieures en forme de points, la postérieure lunulée & plus grande. Les secondes ailes ont à l'angle de l'aube un point rouge.

Le dessous est d'un brun-ferrugineux, avec des taches nacrées, éparées, irrégales, au nombre de huit ou neuf sur les premières ailes, au nombre de onze ou douze sur les secondes. Au point anal de ces dernières ailes répond ici un point semblable. Le corps est brun en dessous, avec les pattes & des lignes pectorales blanches.

Les deux individus que nous avons vus paroissent être des mâles.

De Sierra-Leone, suivant Drury: mais est-ce bien la sa patrie?

C. Bord antérieur des premières ailes plus ou moins arqué vers son origine. Bord postérieur des secondes ailes avec une seule queue extérieure, linéaire ou filiforme.

α. Bord postérieur des secondes ailes flexueux ou un peu dentelé & ayant une queue linéaire.

105. POLYOMMATE *Perion*.

POLYOMMATUS Perion.

Pol. alis suprà fuscis, fulvo fasciatis: subtùs flavido ferrugineis, singularum punctis ocellaribus numerosissimis posticarumque lineâ marginali elevatâ aureis.

Papilio P. R. Perion, alis caudatis, fulvis, suprà limbo fascisque fuscis, subtùs auro punctatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n. 645.*

Hesperia R. Perion. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 275. n. 61.*

Papilio Perion. CHAM. *pl. 379. fig. B. C.*

Papilio Perion. HERBST, *Pap. tab. 286. fig. 5. 6.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec des bandes transversales d'un fauve-luisant.

Le dessous est jaunâtre vers la base, ferrugineux vers l'extrémité, avec une multitude de points dorés & cerclés de noir. Les ailes inférieures ont en outre le long du bord terminal une ligne élevée de la couleur des points & bordée de noir en arrière.

L'individu que nous avons vu paroît être une femelle.

De Surinam.

104. POLYOMMATE *Harpax*.

POLYOMMATUS Harpax.

Pol. alis caudatis, fulvis, nigro maculatis: subtùs cinereis, punctis aureis. FAB.

Papilio P. R. Harpax. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n. 643.*

Hesperia R. Harpax. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 274. n. 59.*

Fabricius le décrit ainsi: il est de moyenne taille. Ses antennes sont en massue, noires, avec des points latéraux, & une bande plus large avant la massue, blancs. La massue à la commité ferrugineuse. Le dessus des quatre ailes est fauve, avec des taches noires, épaisses.

Le dessous est d'un cendré-obscur, avec plusieurs taches dorées, relevées en bosse. La queue est ferrugineuse, avec l'extrémité blanche.

De l'Amérique.

105. POLYOMMATE *Lincus*.

POLYOMMATUS Lincus.

Pol. alis albis, suprà apice fusco: subtùs fuscis transversis atris limboque fulvo; posticus angulo ani nigro punctis quatuor albis.

Hesperia R. Lincus, alis caudatis, albis, apice fuscis: subtùs albo atroque fasciatis, angulo ani punctis tribus albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 289. n. 107.*

Papilio Lincus. ROEM. *Inf. tab. 19. fig. 10. 11.*

Papilio Aetolus. GRAM. *pl. 340. fig. F. G. H.*

Papilio Aetolus. HERBST, *Pap. tab. 285. fig. 7. 8. 9.*

Si ce polyommate avoit deux queues, il se placeroit naturellement à côté du *Bathis* (n. 40) dont il se rapproche par le dessin & par les couleurs.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est blanc, avec l'extrémité d'un brun-noirâtre, & divisée aux inférieures par une double raie blanche. Les ailes supérieures ont un point central brun, lequel est suivi, mais chez le

mâle seulement, d'une grande tache noire presque triangulaire & disposée longitudinalement.

Le dessous est d'un blanc-jaunâtre, avec cinq bandes transverses noires, & le limbe postérieur fauve. Les trois bandes intérieures des secondes ailes remontent le long du bord interne en embrassant une raie fauve, & elles forment vis-à-vis de l'angle anal un coude au-dessous duquel sont quatre points blancs. La queue est noire, avec l'extrémité blanche.

Fabricius n'a pas reconnu dans cette espèce le papillon *Atolus* de Cramer.

De Surinam & du Brésil.

106. POLYOMMATE Philippe.

POLYOMMATUS Philippus.

Pol. alis caudatis, fuscis: subtus strigis duabus fulvis punctisque duobus anguli uni atris subocellaribus. FAB.

Hesperia R. *Philippus*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n. 87.*

Papilio Philippus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 20. fig. 1.*

Il est de moyenne taille. Le dessus de toutes les ailes est d'un brun-noirâtre, avec une ligne blanche transversale & deux points noirs un peu ocellés à l'extrémité des inférieures.

Le dessous est blanc, avec deux lignes fauves transverses, qui sont anguleuses aux secondes ailes. Ces ailes ont à l'angle de l'anus deux points noirs à iris fauve.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

107. POLYOMMATE Phorbas.

POLYOMMATUS Phorbas.

Pol. alis caudatis, fuscis, disco albo: subtus albis, cinereo strigosis; punctis duobus anguli uni atris. FAB.

Hesperia R. *Phorbas*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 277. n. 68.*

Papilio Phorbas. JON. *Fig. pict. 6. tab. 2. fig. 4.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc, mais un peu fâi aux inférieures, lesquelles ont en outre le bord postérieur blanc & tacheté de brun.

En dessous, le fond de toutes les ailes est blanc, avec une tache cendrée transversale sur le milieu, & des lignes cendrées également transversales vers l'extrémité. À l'angle de l'anus sont deux taches d'un noir-brun.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

108. POLYOMMATE Jarbas.

POLYOMMATUS Jarbas.

Pol. alis supra fulvis, limbo fusco: subtus fuscescentibus lineola gemina strigisque undulata albis; posticis punctis duobus nigris, exteriori lunule fulvae subiecto.

Papilio P. R. *Jarbas, alis caudatis, fulvis, limbo fusco: subtus cinereis, strigâ albâ; posticis punctis duobus atris.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n. 64b.*

Hesperia R. *Jarbas*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 276. n. 63.*

Papilio Melampus. CRAM. *pl. 562. fig. G. H.*

Papilio Melampus. HERBST, *Pap. tab. 301. fig. 5. 4.*

Papilio Jarbas. DONOW. *of an Epitome of the Nat. Hist. Insects of India, cah. 7. pl. 1. fig. 5.*

Le papillon *Jarbas* de Fabricius nous paroît bien être le même que le *Melampus* de Cramer. Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau, avec une bordure extérieure brune, large aux ailes de devant, très-étroite à celles de derrière.

Le dessous est d'un brun-très-pâle, avec un double trait discordal & une ligne postérieure ondulée d'un blanc sale & bordés intérieurement de brun un peu plus intense que le fond. À l'angle interne des secondes ailes sont deux gros points noirs, dont l'extérieur immédiatement surmonté d'une lunule fauve, & séparé de l'intérieur par un groupe d'atomes bleuâtres. Le corps est brun, mais moins foncé en dessous. La queue est noire de part & d'autre, avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bengale & de l'île de Java.

109. POLYOMMATE Epicles.

POLYOMMATUS Epicles.

Pol. alis supra fuscis (maris violaceo micantibus): anticis disco, posticis maculis marginalibus fulvis; subtus omnibus flavis, fuscâ terminali sanguinea lunulis albis intus marginatâ.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une tache orbiculaire sur le milieu des supérieures, & des lunules à l'extrémité des inférieures, d'un fauve-orangé. Le mâle a un reflet violet, & la femelle offre sur le disque des secondes ailes une petite tache rouffâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un beau jaune, avec une bande terminale d'un rouge-sanguin, laquelle est chargée à son côté interne d'une série de lunules blanches bordées de noir, & à son

côté externe d'une ligne noire entrecoupée de blanc.

De Java.

110. POLYOMMATE du Bouleau.

POLYOMMATUS Betulæ.

Pol. alis suprà fuscis : subtùs luteis , fefquiftrigà undulatè albâ limboque poftico rufo.

Papilio P. R. alis subcaudatis , fuscis , primoribus maculâ reniformi fulvâ : subtùs luteis , fufciâ fulvâ. LINN. *Syfl. Nat.* 2. p. 787. n^o. 220. — *Faun. Succ. edit.* 2. p. 282. n^o. 1070.

Papilio P. R. Betulæ , alis subcaudatis , fuscis : subtùs luteis ; pofticis ftrigis duabus albis. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 118. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 68. n^o. 649.

Hesperia R. Betulæ. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 277. n^o. 60.

Papilio Betulæ. ESP. *Pap. Eur.* p. 256. tab. 19. fig. 1.

Papilio Betulæ. WIEN. *Verz.* p. 186. *Sum. O.* n^o. 2.

Papilio Betulæ. ILLIG. *N. Aufg. Def. tom.* 2. p. 278. n^o. 2.

ROES. *Inf. tab.* 6. fig. 1-4.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 212. fig. 1. 2. (Fæm.) — *tab.* 275. fig. 1. 2. (Mas.)

Papilio Betulæ. HUFNAGEL. *Tabell. imp. Berl. Mag. tom.* 2. p. 68. n^o. 25.

Papilio Betulæ. BERGSTR. *Nomencl. tab.* 56. fig. 1-4. — *tab.* 70. fig. 5. 4.

Papilio Betulæ. BORKH. *Eur. Schmett. part.* 1. p. 154 & 265. n^o. 1.

Papilio Betulæ. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 297. n^o. 107.

Papilio Betulæ. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p.* 217. n^o. 127.

Papilio Betulæ. LANG. *Verz.* 2. p. 45. n^o. 561-564.

Papilio Betulæ. FUESSL. *Suisf. Inf. p.* 51. n^o. 591.

Papilio Betulæ. BRÄHM. *Inf. Kalend. p.* 252. n^o. 128.

Papilio Betulæ. SCHWARZ. *Raupenkal. p.* 52. n^o. 177.

Papilio Betulæ. PANZER. *Faun. Germ.* 21. 20.

Papilio Betulæ. HERBST. *Pap. tab.* 507. fig. 13.

Papilio Betulæ. PETAGNA. *Infl. Ent. p.* 479. n^o. 105.

Papilio Betulæ. OCHSENH. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Betulæ. HUEN. *Pap. tab.* 76. fig. 385-385.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches. GEOFF. *Hijl. Inf. tom.* 2. p. 58. n^o. 27.

Le Porte-queue à bandes fauves. ENGRAM. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 152. pl. 55. fig. 70. 2-1.

Polyommate du Bouleau. LATREILLE. *nouv. Dict. d'Hijl. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 485.

Polyommate du Bouleau. GODART. *Hijl. nat. des lépidoptères de France , tom.* 1. p. 181. pl. 9. fig. 1.

Polyommate du Bouleau. GODART. *Tableau méthodique des lépidoptères de France ,* DIURNES , p. 46. n^o. 128.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre , avec une bande fauve réuniforme sur le milieu des ailes supérieures de la femelle , & quelques taches rouffâtres , plus ou moins prononcées , sur les ailes correspondantes du mâle. Les ailes inférieures ont l'angle anal & l'origine de la queue fauves.

Le dessous est d'un jaune-fauve , avec deux lignes blanches , tranfvèrfes , légèrement ondulées , dont l'antérieure plus courte. Ces lignes font bordées de noirâtre sur un de leurs côtés , & l'espace qui les fépare est d'un roux-vif ainfi que l'extrémité de chaque aile.

La chenille est verte , avec des lignes longitudinales & des traits obliques jaunes sur chaque côté du corps. Elle vit sur le *bouleau commun* , le *prunier domestique* , le *prunellier* , &c. Elle fe métamorphofe vers la mi-juin.

La chryfalide est liffe , brune , avec des raies un peu plus claires.

Cette efpece est commune dans les bois & dans les jardins de l'Europe , depuis la fin de juillet jufqu'à la mi-feptembre.

111. POLYOMMATE du Prunier.

POLYOMMATUS Pruni.

Pol. alis fuscis , fufciâ pofticâ fulvâ , fuprà maculari , subtùs continuâ punctâfque nigris intus & extus marginatâ.

Papilio P. R. Pruni , alis subcaudatis , fuprà fuscis : pofticis subtùs fufciâ marginatâ fulvâ nigro punctatâ. LINN. *Syfl. Nat. tom.* 2. p. 788. n^o. 221. — *Faun. Succ. édit.* 2. p. 285. n^o. 1071.

Papilio P. R. Pruni. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 118. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 68. n^o. 650.

Hesperia R. Pruni. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 5. pars 1. p. 277. n^o. 70.

Papilio Pruni. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 19. fig. 5. — *tab.* 59. *Suppl.* 15. fig. 1.

Papilio Pruni. WIEN. *Verz.* p. 186. *funi*. O.
n^o. 4.

ROES. *Inf. part.* 1. *tab.* 7. *fig.* 1. 5.

NATURF. 6. p. 6. n^o. 24.

SCHÆFF. *Element.* *tab.* 94. *fig.* 5.

Papilio Pruni. ILLIG. *N. Aufg. Defs.* *tom.* 2.
p. 279. n^o. 4.

Papilio Pruni. BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 56.
fig. 5-9.

Papilio Pruni. BORKH. *Eur. Schmett. part.* 1.
p. 155 & 264. n^o. 2.

Papilio Pruni. BORKH. *Rhein. Magaz.* *tom.* 1.
p. 297. n^o. 106.

Papilio Pruni. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 220.
n^o. 129.

Papilio Pruni. LANG. *Verz.* *tom.* 2. p. 46.
n^o. 365-368.

Papilio Pruni. FUESSL. *Suisf. Inf.* p. 51. n^o. 592.

Papilio Pruni. ROSSI, *Faun. Etr.* *tom.* 2. p. 154.
n^o. 1029.

Papilio Pruni. BRAHM, *Inf. Kalend.* p. 254.
n^o. 129 & 553. n^o. 391.

SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 46 & 177.

Papilio Pruni. HUBN. *Pap. tab.* 76. *fig.* 386.
387.

Papilio Profsa. HUFNAG. *Tab. im. Berl. Mag.*
tom. 2. p. 68. n^o. 24.

Papilio Pruni. HERBST, *Pap. tab.* 507.
fig. 4. 5.

Papilio Pruni. PETAGNA, *Inf. Ent.* p. 479.
n^o. 106.

Papilio Pruni. OCHSENH. *Pap. Eur.* *tom.* 1.

Le Porte-queue brun à lignes blanches. EN-
GRAM. *Pap. Eur.* *tom.* 1. p. 157. *pl.* 55. *fig.* 72.
c. d. & *pl.* 36. *fig.* 73. a-f.

Polyommate du Prunier. LATR. *nouv. Dict.*
d'Hist. nat. 2^e. *édit.* *tom.* 27. p. 484.

Polyommate du Prunier. GOD. *Hist. nat. des*
l'Esp. de France, *tom.* 1. p. 184. *pl.* 9. *fig.* 2.

Polyommate du Prunier. GOD. *Tabl. méth. des*
l'Esp. de France, *DIURNES*, p. 47. n^o. 129.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le des-
sus des deux sexes est d'un brun-noirâtre, avec
une bande postérieure de taches fauves. Cette
bande manque assez souvent aux ailes supérieures
du mâle.

Le dessous est d'un brun-jaunâtre, avec une
ligne blanche interrompue, placée transversale-

ment derrière le milieu, & suivie d'une bande
fauve continue, dont les deux côtés sont bordés
par des points noirs. Les points qui bordent le
côté externe de cette bande font lunulés; ceux qui
bordent son côté interne sont arrondis & surmontés
chacun d'un petit arc blanc.

La chenille est verte, rayée longitudinalement
& obliquement de blanchâtre, avec la tête jaune
& marquée de deux points noirs à oculaires. Son dos offre des tubercles à sommité noire.
Elle vit sur le premier sauvage.

La chrysalide est courte, renflée en arrière,
brune, avec la partie antérieure tiquetée de blan-
châtre.

Ce polyommate paroît au commencement de
juin. On le trouve aux environs de Paris, & par-
ticulièrement dans la forêt de Bondy, près de la
manufacture de poudrette.

112. POLYOMMATE W-blanc.

POLYOMMATUS W-album.

Pol. alis fuscis: posticis subtus strigâ mediâ
albâ in W desinente, fuscâque marginali rufâ,
flexuosâ, nigro marginatâ.

Papilio P. R. W-album, alis bicaudatis, su-
prâ fuscis: posticis subtus W-albo notatis, fuscâ
arcuatâ aurantiâ saturatiore. КНОСН, *Beyr.*
part. 2. p. 85. *tab.* 6. *fig.* 1. 2.

BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 71. *fig.* 1. 2.

Papilio W-album. DEVILL. *Ent. Linn.* *tom.* 2.
p. 85. n^o. 175. *tab.* 4. *fig.* 12.

Papilio W-album. BORKH. *Eur. Schmett.*
part. 2. p. 216. n^o. 5. 6.

Papilio W-album. BORKH. *Rhein. Magaz.*
tom. 1. p. 296. n^o. 105.

Papilio W-album. BRAHM, *Inf. Kalend.* p. 372.
n^o. 249.

Papilio W-album. FUESSL. *N. Magaz.* *tom.* 1.
p. 529.

Papilio W-album. HUBN. *Pap. tab.* 75. *fig.* 380.
381.

Papilio W-album. OCHS. *Pap. Eur.* *tom.* 1.

Papilio W-album. HERBST, *Pap. tab.* 508.
fig. 1. 2.

Papilio W-latinum. LANG. *Verz.* 2. p. 46.
n^o. 573. 574.

Variété du Porte-queue brun à deux bandes de
taches fauves. GEOFF. *tom.* 2. p. 62. N. B.

Le Porte-queue brun à une ligne blanche. EN-
GRAM. *Pap. Eur.* *tom.* 1. p. 506. *pl.* 82. — *Suppl.*
2. *pl.* 5. *fig.* 72. a. b. c. bis.

Polyommate W-blanc. LATR. *nouv. Diction.*
d'Hist. nat. 2^e. *édit.* *tom.* 27. p. 484.

Polyommate

Polyommate W-blanc. GOD. *Hist. natur. des pap. de France*, tom. 1. p. 188. pl. 9. fig. 5. & pl. 9 tert. fig. 2.

Polyommate W-blanc. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 47. n° 150.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des deux léxes est d'un brun-noirâtre-chaoyant, sans taches dans la femelle, avec un point grisâtre près du milieu de la côte des ailes supérieures dans le mâle.

Le dessous est de la couleur du dessus, avec une ligne blanche, transverse, légèrement interrompue, postérieure aux premières ailes, médiaire & finissant par un W aux secondes. Le bord terminal de ces dernières ailes est presque entièrement longé par une bande fauve, continue, flexueuse, ayant le côté interne bordé par une ligne noire en feston, & le côté externe par des taches noires triangulaires.

La chenille est verte, avec un double rang de petites pointes le long du dos, & trois taches d'un rouge-foncé à chacun des anneaux postérieurs du ventre. Elle vit sur l'orme, & elle se métamorphose sous l'écorce de cet arbre.

La chrysalide est pubescente, d'un brun-grisâtre, avec l'enveloppe des ailes plus foncée.

Ce polyommate habite l'Europe, & il se trouve le long des routes.

113. POLYOMMATE Lyncée.

Polyommatus Lynceus.

Pol. alis fuscis : posticis subtus lunulis marginibus rufis, & antè has strigâ à lineolis albis; lineolâ inferiori obliquâ.

Papilio P. R. Lynceus, alis caudatis, fuscis, immaculatis : posticis subtus strigâ lunulatâ albâ rufâque. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 69. n° 653.

Hesperia R. Lynceus. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 279. n° 75.

ROES. *Inf. part.* 1. tab. 9. fig. 1-3.

NATURF. *part.* 6. p. 6. n° 24. — *part.* 10. p. 89.

Papilio Ilıcis (sem.). ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 59. *Suppl.* 15. fig. 1.

Papilio Ilıcis. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 158 & 267. n° 5. — *part.* 2. p. 216.

Papilio Ilıcis. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 296. n° 104.

Papilio Ilıcis. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 218. n° 128.

Papilio Ilıcis. BRAHM. *Inf. Kalend.* p. 574. n° 250.

Papilio Ilıcis. SCHWARZ, *Raupenk.* p. 548. *Hyl. Nat. Inf. Tome I A.*

Papilio Ilıcis. HUBN. *Pap. tab.* 75. fig. 578. 579.

Papilio Cerafi. HERBST, *Pap. tab.* 507. fig. 8. 9.

Papilio Ilıcis. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches fauves. GEOFF. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 60. n° 28.

Le Porte-queue brun à taches fauves. ENGRAM. *Pap. d'Eur.* tom. 1. p. 159. pl. 56. fig. 75. a. b.

Polyommate interrompu. LATR. *nouv. Diç.* d'*Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 485.

Polyommate Lyncée. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 185. pl. 9. tert. fig. 1.

Polyommate Lyncée. GOD. *Tabl. méthodique des lépid. de France*, DIURNES, p. 47. n° 151.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des deux léxes est d'un brun-noirâtre-chaoyant, avec une tache fauve orbiculaire sur les ailes supérieures de la femelle. Le mâle a aussi quelquefois une tache sur ces ailes, mais elle est plus petite & moins prononcée.

Le dessous est d'un brun un peu moins foncé que le dessus, avec un ligne blanche, postérieure, transverse, composée de petits traits dont l'inférieur oblique aux secondes ailes. Ces ailes ont en outre une rangée marginale de cinq à six lunules rouffes, bordées de noir en avant, & suivies d'une ligne blanche continue qui va du sommet à l'angle de l'anus.

La chenille est pubescente, d'un vert-pâle, avec la tête & les pattes écailleuses noires, & trois lignes jaunes longitudinales, interrompues. Elle vit sur le chêne & sur l'orme.

La chrysalide est d'un brun-jaunâtre, avec trois rangées de points obscurs à la partie postérieure.

Bois de l'Europe, de la mi-juin à la mi-juillet.

114. POLYOMMATE du Marronnier.

Polyommatus Æsculi.

Pol. alis fuscis : posticis subtus lunulis marginibus intensivè rufis, minutis, & antè has strigâ à lineolis albis; lineolâ inferiori C supinum referente.

Hesperia R. Cerafi, alis caudatis, fuscis, immaculatis : subtus strigâ albâ : posticis lunulis fulvis puncto nigro notatis. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3 pars 1. p. 299. n° 74 ?

Papilio Æsculi. HUBN. *Pap. tab.* 109. fig. 559. 560.

Papilio Æsculi. OCHS. *Pap. Eur.* tom. 1.

Polyommate du Marronnier. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 162. pl. U. XXI. fig. 5. 4.

Polyommate du Marronnier. *God. Tab. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 48. n^o. 152.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chaotant, avec un point fauve à l'angle anal des inférieures.

Le dessous est d'un brun tirant sur le cendré, avec la base un peu bleuâtre, & l'extrémité traversée par une ligne flexueuse de petits traits blancs, dont l'inférieur représentant un C renversé aux secondes ailes. Ces mêmes ailes ont une rangée marginale de six petites taches d'un roux-foncé, bordées de noir antérieurement, & suivies d'une ligne blanche continue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Dans les départemens les plus méridionaux de la France, au printemps & en été.

Nota. Distinguez du polyommate *Lyncée* : 1^o. par sa taille qui est plus petite; 2^o. par le ton un peu grisâtre du dessous de ses quatre ailes, la vivacité & l'exiguité des lunules fauves des inférieures; 3^o. par le C qui termine inférieurement la ligne blanche de ces dernières ailes.

115. POLYOMMATE de l'Acacia.

POLYOMMATUS Acaciæ.

Pol. alis suprà fuscis : subtus cinerascenti-griseis, strigâ interruptâ albâ ; posticis lunulis marginalibus fulvis analibus rufis approximatis. (Fœminæ ano barbato nigro.)

Papilio P. R. Acaciæ, alis caudatis, fuscis : subtus cinerascens, strigâ albâ lunulisque analibus fulvis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 69. n^o. 655.*

= *Hesperia R. Acaciæ.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 299. n^o. 75.*

Papilio Acaciæ. HERBST, *Pap. tab. 508. fig. 5. 4.*

Papilio Acaciæ. OCHS. *Pap. Eur. tom. 1.*

Polyommate de l'Acacia. *God. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 165. pl. U. XXI. fig. 5. 6. 7.*

Polyommate de l'Acacia. *God. Tab. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 48. n^o. 153.*

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chaotant, avec des taches fauves à l'angle interne des inférieures, au nombre de deux chez le mâle, & de quatre chez la femelle.

Le dessous est d'un gris-cendré, avec la base un peu bleuâtre, & l'extrémité traversée par une ligne flexueuse de petits traits blancs. Les secondes ailes ont un cordon marginal de six taches fauves très-rapprochées & bordées de noir antérieurement. Les deux taches extérieures sont plus

petites & moins prononcées que les autres, la quatrième en descendant s'appuie sur un point noir, la cinquième a le milieu noirâtre & saupoudré de blanchâtre, l'anale est presque quadrangulaire. Derrière ces taches, il y a une ligne blanche continue.

La femelle a l'anus terminé par une houppie de poils très-noirs.

Du midi de la Russie, de la Lozère, des Pyrénées orientales, &c.

116. POLYOMMATE du Prunellier.

POLYOMMATUS Spini.

Pol. alis suprà fuscis : subtus cinereis, strigâ undulatâ albâ ; posticis lunulis marginalibus fulvis maculâque anguli ani argenteo-caruleâ.

Papilio P. R. Spini, alis caudatis, fuscis : subtus cinereis, lunulis marginalibus fulvis maculâque anguli carulefcente. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n^o. 651.*

Hesperia R. Spini. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. p. 278. n^o. 71.*

Papilio Spini. WIEN. *Verz. p. 186. sum. O. n^o. 5.*

Papilio Spini. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 280. n^o. 5.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 14. fig. 1. 2.*

Papilio Spini. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 155. n^o. 1050.*

Papilio Spini. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 480. n^o. 107.*

Papilio Spini. HUBN. *Pap. tab. 75. fig. 576. 577.*

Papilio Spini. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Spini. HERBST, *Pap. tab. 507. fig. 6. 7.*

Papilio Lyncæus. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 59. Suppl. 15. fig. 3.*

Papilio Lyncæus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. pag. 140 & 260. n^o. 8. — part. 2. p. 218.*

Papilio Lyncæus. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 222. n^o. 151.*

NATUREF. 6. p. 6. n^o. 24.

Porte-queue brun à taches bleues. ENGRAM. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 158. pl. 36. fig. 74. a. b.*

Porte-queue gris-brun. ENGRAM. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 507. pl. 82. Sup. 2. pl. 3. fig. 74. a-d. bis.*

Polyommate du Prunellier. IATR. *nouv. Diè. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 27. p. 485.*

Polyommate du Prunellier. *God. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 167. pl. U. XXI. fig. 8. 9.*

Polyommate du Prunellier. *God. Tab. méthod. des lépid. de France*, DIERNES, p. 48. n^o. 154.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre-chaoyaut, tantôt sans taches, tantôt avec deux ou trois points fauves près de l'angle anal des ailes inférieures.

Le dessous est cendré, & traversé au-delà du milieu par une raie blanche, ondulée, interrompue par places, & formant un V très-évasé vers le bas du bord interne des secondes ailes. Ces ailes ont une rangée marginale de sept taches, dont la seconde, à partir de l'angle de l'aube, d'un bleu-argenté & presque quadrangulaire, les six autres fauves, lunulées, inégales, & bordées de noir. Après ces taches, il y a une ligne blanche, légèrement brisée vis-à-vis de la queue, & s'effaçant à mesure qu'elle approche du sommet de l'aile.

La chenille, selon Fabricius, est verte, avec la tête noire, & des lignes de taches jaunes le long du dos. Elle vit sur le *prunellier*.

La chrysalide a le dessus brun, le dessous cendré & duveteux.

On trouve ce polyommate en juillet & en août, dans plusieurs départemens du midi de la France, dans quelques contrées de l'Allemagne, &c.

117. POLYOMMATE du Chêne.

Polyommatus Quercus.

Pol. alis fuscis, matris violaceo nitentibus, femina maculâ bifidâ baseos anticarum cœrulea; subtus ferruceo-griseis, strigâ undulatâ albâ maculâsq; duabus anguli ani fulvis.

Papilio P. R. *Quercus*, *alis subcaudatis, supra cœruleis: subtus cinereis, lineâ albâ, puncto ani gemino fulvo.* LINN. *Syst. Nat. tom. 1. part. 2. p. 788. n^o. 222.* — *Faun. Suec. edit. 2. p. 285. n^o. 1072.* — *Mus. Lud. Ulr. p. 515. n^o. 152.*

Papilio P. R. *Quercus*, *alis subcaudatis, cœrulescentibus: subtus cinereis, strigâ albâ punctoque ani gemino fulvo.* FAB. *Spec. Inf. tom. 2. pag. 118.* — *Mant. Inf. tom. 2. p. 69. n^o. 652.*

Hesperia R. *Quercus*, FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 278. n^o. 72.*

ROES. *Inf. part. 1. tab. 9. fig. 4. 5.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 158. fig. 4. 5.*

NATURE. 14. p. 50. tab. 2. fig. 5. 6.

Papilio Quercus, ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 19. fig. 2. a. b. c.*

Papilio Quercus, WIEN. *Verz. p. 186. sam. O. n^o. 5.*

Papilio Quercus, DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 65. n^o. 116.*

Papilio Quercus, LILLIG. *N. Aufg. Desf. tom. 2. p. 279. n^o. 5.*

Papilio Quercus, BERGSTR. *Nomenkl. tab. 57. fig. 1-5.*

Papilio Quercus (mas). PANZER, *Faun. Germ. 21. 21.*

Papilio Quercus, BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 156 & 265. n^o. 5.*

Papilio Quercus, BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 205. n^o. 105.*

Papilio Quercus, SCHNEID. *Syst. Besch. p. 221. n^o. 150.*

Papilio Quercus, LANG. *Verz. 2. p. 47. n^o. 575-579.*

Papilio Quercus, BRAHM. *Inf. Kalend. part. 1. p. 375. n^o. 251.*

Papilio Quercus, SCHWARZ, *Raupenkal. p. 47. 178. 544.*

Papilio Quercus, ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 155. n^o. 1051.*

Papilio Quercus, FUESSL. *Suisf. Inf. p. 51. n^o. 595.*

Papilio Quercus, PETAGNA, *Inf. Ent. tom. 1. p. 480. n^o. 108.*

Papilio Quercus, HERBST, *Pap. tab. 506. fig. 1-4.*

Papilio Quercus, ROEM. *Gen. Inf. tab. 18. fig. 10. (Femina.)*

Papilio Quercus, HUBN. *Pap. tab. 73. fig. 568-570.*

Papilio Quercus, OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Epeus, SULZ. *Inf. tab. 18. fig. 10.*

Le Porte-queue bleu à une bande blanche. GEOFF. *Hysl. Inf. tom. 2. p. 57. n^o. 26.*

ENGRAM. *Pap. Eur. tom. 1. p. 154. pl. 53. fig. 71. a. b. c.* — *pl. 71. Suppl. 17. fig. 71. d. e.* (La chenille & la chrysl.) f. (Var.)

Polyommate du Chêne. LATR. *nouv. Diç. d'Hysl. nat. 2^e. édit. tom. 27. p. 485.*

Polyommate du Chêne. GOD. *Hysl. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 190. pl. 9. secund. fig. 1. & pl. 9. tert. fig. 5.*

Polyommate du Chêne. GOD. *Tab. méthod. des lépid. de France*, DIERNES, p. 48. n^o. 155.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, & glacé de violet changeant depuis la base jusqu'au limbe postérieur des quatre ailes.

Le dessous de la femelle est d'un brun-noirâtre,

avec une grande tache bleue, luisante & fortement biffée, à la base des ailes supérieures.

Le dessus des deux sexes est d'un gris-fatiné, avec une ligne blanche ondulée, placée transversalement au-delà du milieu, & ayant le côté interne bordé de noirâtre. Derrière cette ligne, il y a à chaque aile une double série de petits arcs blanchâtres peu prononcés, & dont les deux inférieurs embrassant chacun une tache fauve. La tache fauve extérieure des secondes ailes a le milieu chargé d'un point noir.

Chez la femelle, la tache bleue du dessus des premières ailes est quelquefois accompagnée de deux ou trois points orangés.

La chenille est pubescente, griffée, avec une ligne de points dorés & les incisions jaunes, & la tête brune. Elle vit sur le *chêne*.

La chrysalide est brune, avec des taches plus claires.

On trouve ce polyommate dans les bois taillis, depuis la mi-juin jusqu'à la fin de juillet, & quelquefois plus tard, suivant les localités. Il est très-commun aux environs de Paris.

113. POLYOMMATE Apidanus.

POLYOMMATUS Apidanus.

Pol. alis suprà violaceis (femine *limbo lato fusco*): *subtus fuscis, margaritaceo varis costaque bascos sanguinea; posticus ad angulum anii atomis inaurato-viridibus.*

Papilio P. R. Apidanus, *alis caudatis, cœruleis: posticus subtus fuscis, cœruleo varis, angulo anti maculâ geminâ auratâ.* FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 69. n^o. 658.

Hesperia R. Apidanus. FAB. Ent. Syst. ent. tom. 3. pars 1. p. 280. n^o. 78. (Le mâle.)

Papilio Apidanus. CRAM. pl. 137. fig. F. G. (Le mâle.)

Papilio Apidanus. HERBST, Pap. tab. 285. fig. 1. 2.

Papilio Dorimond. STOLL, Suppl. à CRAM. pl. 37. fig. 4 & 4 D. (La femelle.)

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & velouté, avec la gouttière des ailes inférieures d'un noir-brun.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec l'origine de la côte d'un rouge-ferrugineux. Les premières ailes ont trois bandes transverses d'un gris-jaunâtre, mais la postérieure est glacée de violâtre en face du sommet. Les secondes ailes sont très-irrégulièrement variées de gris de perle, & leur région anale est parsemée d'atomes d'un vert-doré, parmi lesquels on remarque deux points noirs écartés l'un de l'autre. La queue est courte, linéaire, noire & terminée de blanc.

La femelle a le dessus d'un bleu-violet & largement bordé de brun-noirâtre.

De l'île de Java. D'après Cramer, le mâle est de Surinam; & d'après Stoll, la femelle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

119. POLYOMMATE Hélius.

POLYOMMATUS Helius.

Pol. alis suprà holosericeo-violaceis (femine *limbo lato fusco*): *subtus fuscis, griseo reticulatis; anticis annulis aliquot difcis, posticus atomis anguli anii inaurato-viridibus.*

Papilio Helius. CRAM. pl. 40. fig. 201.

Papilio Helius. HERBST, Pap. tab. 303. fig. 3. 4.

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & velouté, avec la gouttière des ailes inférieures noirâtre.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, réticulé de gris, avec une suite de trois anneaux d'un vert-doré sur le milieu des ailes supérieures, & une petite bande d'atomes du même vert à l'angle anal des inférieures. Cette bande est terminée par un gros point noir, placé contre le bord interne de l'aile. La queue est noire, avec le bout blanc.

La femelle a le dessus des quatre ailes d'un bleu-violet-luisant, avec une large bordure d'un brun-noirâtre.

Nous avons vu un sujet qui n'avoit guère que quinze lignes d'envergure.

Décrit d'après des individus envoyés des Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel, naturalistes voyageurs.

Nota. Cramer a figuré le mâle d'après un individu passé. Il s'est trompé en outre en disant que cette espèce se trouvoit à Surinam.

120. POLYOMMATE Eumolphus.

POLYOMMATUS Eumolphus.

Pol. alis suprà viridibus, auro micantibus, limbo atro, posticarum latiore: subtus fuscis, annulis aliquot strigisque univatis cinerascensibus; posticus fasciâ abbreviatâ anguli anii argenteo-cœruleâ.

Papilio Eumolphus. CRAM. pl. 299. fig. G. H.

Papilio Eumolphus. HERBST, Pap. tab. 298. fig. 3. 4.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert à reflet doré, avec une bordure d'un noir-rot, moins large aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est d'un brun-obscur, avec quelques anneaux basilaire & des lignes postérieures ondulées d'un cendré-violâtre. Les secondes ailes ont

à l'angle de l'anus une petite bande d'un bleu-argenté.

Ne seroit-ce pas une variété de l'Hélus ? Il en diffère à peine par le dessous des ailes.

Du Bengale.

121. POLYOMMATE Théocrite.

POLYOMMATUS Theocritus.

Pol. alis caudatis, virescentibus, costâ obfcuro: subtus nigris, flavo punctatis. FAB.

Hesperia R. *Theocritus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 289. n. 106.*

Papilio Theocritus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 6. fig. 3.*

Il est de moyenne taille. Le dessus des quatre ailes est d'un vert-pâle à reflet doré, avec la côte largement obscure. Le dessous est noir, avec quelques lignes transverses de petits points jaunâtres.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

β. Bord postérieur des secondes ailes entier & ayant une queue filiforme.

122. POLYOMMATE Boeticus.

POLYOMMATUS Boeticus.

Pol. alis suprà cœruleo-violaceis, limbo fusco: subtus cinereis, à basi ad apicem albido undulatis; posticis fasciâ integrâ albâ ocellisque duobus angulî ani auratis.

Papilio P. R. *Boeticus, alis caudatis, fusco-cœrulescentibus: subtus cinerescentibus albido undulatis; angulo ani ocellis duobus.* LINS. *Syst. Nat. 2. p. 789. n. 226.* (La femelle.)

Papilio P. R. *Boeticus, alis caudatis, cœrulescentibus: subtus cinereis, albo undatis; angulo ani ocello gemino aurato.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 69. n. 657.* (Le mâle.)

Hesperia R. *Boetica.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 280. n. 77.*

Papilio Boeticus. ESP. *Pap. tab. 27. Suppl. 3. fig. 3. a. b. — tab. 91. cent. 41. fig. 3.*

Papilio Boeticus. HUBN. *Pap. tab. 74.*

Papilio Boeticus. HERBST, *Pap. tab. 305. fig. 3-6.*

Papilio Boeticus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 159 & 268. n. 7.*

Papilio Boeticus. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 223. n. 152.*

Papilio Boeticus. LANG. *Verz. tom. 2. p. 47. n. 380. 381.*

Papilio Boeticus. PETAGNA, *Inf. Ent. tom. 2. p. 481. n. 110. tab. 7. fig. 7.*

Papilio Boeticus. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Polyommata Boeticus. GODART, *Tableau méthodique des lépidoptères de France, tom. 2. p. 49. n. 157.*

Papilio Coluthææ. FUESSL. *Suiss. Inf. p. 51. n. 594. tab. fig. 2. 2.*

Papilio Coluthææ. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 155. n. 1052.*

Le Porte-queue bleu strié. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 57. n. 25.*

Le Porte-queue bleu strié. ENGRAM. *Pap. Eur. tom. 1. pl. 57. fig. 76. a. b. — pl. 71. Suppl. 17. fig. 76. c.*

Polyommata strié. GOD. *Hist. nat. des lépid. ou pap. de France, tom. 1. p. 192. pl. 10. fig. 2. & pl. 9 tert. fig. 4.*

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuté, avec le limbe postérieur des quatre ailes brun, & l'angle anal des inférieures marqué de deux points noirs oculaires.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violetre-pâle, avec une large bordure brune, & deux points oculaires semblables à ceux du mâle, mais s'alignant avec trois petits cercles blanchâtres, dont les deux extérieurs toujours plus prononcés chez les individus d'Afrique que chez ceux d'Europe.

Le dessous des deux sexes est cendré, & endé de blanchâtre depuis la base jusqu'à l'extrémité. Indépendamment de cela, les secondes ailes sont traversées au-delà du milieu par une bande blanche continue, & elles offrent à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris doré & bordé de fauve antérieurement. La queue de ces ailes à le bout & tout le bord externe blancs.

Le corps est de la couleur des ailes en dessus & en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc & terminées par un point roux.

Ce polyommate le trouve en Barbarie, aux îles de France, de Sainte-Hélène, de Tinor, dans le midi de l'Europe, aux environs de Paris, &c. Il paroît chez nous depuis la mi-acût jusqu'à la fin de septembre. La femelle pond dans les fleurs du *bagnaudier commun* (*colutea arborescens*), & selon toute apparence, dans celles de quelques légumineuses. Elle ne consie qu'un œuf à chaque fleur.

La chenille est d'un vert plus ou moins foncé, avec le dos jaspé de rouge. Elle vit dans la silique où elle est née. Lorsqu'elle en a mangé toute la substance, elle se loge dans une autre silique, & elle a soin de boucher le trou par lequel elle est entrée. A défaut de bagnaudier, on peut lui donner

des pois verts. Elle ne reste que dix à douze jours dans l'état de nymphe.

La chenille est jaunâtre, avec cinq rangées de points noirs, tant sur le dos que sur le ventre.

125. POLYOMMATE Elien.

POLYOMMATUS Aelianus.

Pol. alis supra lacteis, limbo postico fusco: subtus fuscescentibus, strigis plurimis fusciâque bifidiâ albis; posticis ocellis tribus anguli ani argentatis. (Mas.)

Hesperia R. Aelianus, *alis caudatis, albis: subtus cinereis, albo strigosis; angulo ani ocello atro.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 280. n°. 79.

Papilio Alexius. STOLL, *Suppl. à GRAM. pl. 58. fig. 3 & 5 C.*

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un blanc de lait, avec le limbe des supérieures noirâtre, & l'extrémité des inférieures coupée par une série de points noirs plus ou moins prononcés.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec des lignes transverses & une bande bifide blanches. Les lignes des ailes supérieures sont au nombre de cinq, celles des inférieures au nombre de sept. Les ailes inférieures ont en outre près de l'angle de l'aune trois yeux noirs, faibles de bleu-argente. L'œil extérieur est plus grand que les deux autres, & il a, ainsi que l'intermédiaire, un iris roux.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Fabricius le dit des Indes occidentales, & Stoll de Surinam.

124. POLYOMMATE Célério.

POLYOMMATUS Celerio.

Pol. alis supra lacteis, limbo postico fusco: subtus cinerascens, strigis plurimis albis, continuis, undulatis; posticis ocellis duobus anguli ani argentatis.

Papilio P. R. Celerio, *alis bicaudatis, albis: subtus fuscis, fusciâ latâ communi undisque alibique alternis, angulo ani ocello triplici niso.* FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 625.

Hesperia R. Celerio. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 265. n°. 25. (Le mâle.)

Papilio Celeno. GRAM. pl. 51. fig. C. D. (Le mâle.)

Papilio Atratus. GRAM. pl. 565. fig. A. B. (La femelle.)

Papilio Celeno. HERBST, *Pap. tab. 291. fig. 5. 6.*

Papilio Atratus. HERBST, *Pap. tab. 288. fig. 5. 6.*

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un blanc de lait, avec le limbe postérieur noirâtre, & surmonté aux inférieures d'une rangée simple ou double de points également noirs.

Le dessous est d'un cendré-pâle, avec des raies blanches, transverses, continues & ondulées, au nombre de sept, dont la seconde & la quatrième plus courtes, sur les ailes supérieures; au nombre de neuf, dont une quelquefois plus large, sur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'aune deux yeux roux à prunelle noire & faiblée de bleu-argente. L'œil intérieur est moitié plus petit que l'extérieur & accompagné d'un point noir qui touche le bord interne de l'aile.

Dans la femelle, le limbe des secondes ailes est précédé en dessus d'une double série de points noirs.

Des îles de Java, d'Amboine & de Timor. Cramer & Fabricius disent, mais d'après de faux renseignements, qu'il est de Surinam.

125. POLYOMMATE Elpis.

POLYOMMATUS Elpis.

Pol. alis supra azureis, nitidis: subtus saturato-cinereis, strigis plurimis tenuioribus albis, interruptis, undulatis; posticis ocellis duobus anguli ani argentatis. (Mas.)

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-azuré-luisant, avec la frange du bord postérieur noirâtre.

Le dessous est d'un cendré-foncé, avec des lignes blanches, transverses, étroites, interrompues & ondulées, au nombre de sept, dont la troisième & la quatrième plus courtes, sur les ailes supérieures; au nombre de neuf, dont l'antérieure moins longue, sur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'aune deux yeux roux à prunelle noire & tachetée de bleu-argente. L'œil qui avoisine le bord interne est beaucoup plus petit que l'autre.

Nous n'avons point vu la femelle.

De l'île de Java.

126. POLYOMMATE Hylais.

POLYOMMATUS Hylais.

Pol. alis supra azureis, nitidis, disco albo: subtus fuscis, fusciâ latâ communi undisque alibique albis; posticis serie marginali ex ocellis sex nigris, penultimo pupillâ geminâ argenteâ. (Mas?)

Papilio Hylas. GRAM. pl. 565. fig. E. F.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-azuré-luisant, avec une bande blanche discoidale, traversant entièrement les inférieures, & ne montant pas au-delà du milieu des supérieures.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, avec une bande pareille à celle du dessus, mais plus large & suivie de quelques ondes blanches. Outre cela, les premières ailes ont un double trait central blanc, & les secondes offrent une lèrie marginale de six yeux noirs à iris blanc. Ces yeux sont pour la plupart triangulaires, & le pénultième, ou si l'on veut, le cinquième à compter du sommet, a une double prunelle d'un bleu-argenté.

Décrit d'après un individu unique & ayant un corps rapporté, mais qui nous paroît être un mâle.

D'Amboine.

127. POLYOMMATE PLATO.

POLYOMMATUS Plato.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, argenteo micantibus, anticarum apice atro: subtus fuscis, strigis pluribus undulatis albis; posticis ocellis tribus anguli ani argentatis.

Hesperia R. Plato, *alis caudatis, cæruleis, limbo fusco: subtus cinereis, albo undatis; posticis oculo atro pupillâ geminâ.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 288. n^o. 105.

Papilio Plato. JON. Fig. piët. 6. tab. 14. fig. 5.

Papilio Plato. DONOV. of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 7. pl. 5. fig. 2.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant & chatoyant en vert-argenté, avec le sommet des supérieures largement noir, & le bord terminal des inférieures marqué de quelques points noirâtres.

Le dessous est brun, avec des lignes blanches, transverses & ondulées, au nombre de sept, dont l'antérieure & la quatrième plus courtes, sur les ailes supérieures; au nombre de neuf sur les inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de l'anus trois yeux noirs faibles de bleu-argenté. L'œil postérieur est beaucoup plus grand que les deux autres, & il a, ainsi que l'intermédiaire, un iris rouffâtre.

Décrit d'après un individu sans corps.

De l'Inde, selon Fabricius.

128. POLYOMMATE TELICANUS.

POLYOMMATUS Telicanus.

Pol. alis supra cærulescenti-violaceis, limbo fusco: subtus cinereis, à basi ad apicem catenulatis albis; posticis strigâ lunularum albarum ocellisque duobus anguli ani auratis.

Papilio Telicanus. HUNN. Pap. tab. 74. fig. 371. 372. Mas. — tab. 108. fig. 553. 554. Fœm.

Papilio Telicanus. HERBST, Pap. tab. 305. fig. 7-9.

Papilio Telicanus. LANG. Verz. tom. 2. p. 47. n^o. 387-387.

Papilio Telicanus. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Boeticus. ESP. Pap. tab. 91. cont. 41. fig. 2.

Polyommata Telicanis. GOD. Hist. natur. des lépid. de France, tom. 2. p. 172. pl. V-XXII. fig. 5. 4.

Polyommata Telicanus. GOD. Tableau méthod. des lépidoptères de France, p. 49. n^o. 158.

Il a de onze à treize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe postérieur d'un brun-noirâtre.

Le dessous de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-violet, & le milieu plus ou moins marqué de noir.

Le dessous des deux sexes est cendré, avec des chaînettes blanches depuis la base jusqu'à l'extrémité. Les ailes inférieures ont au-delà du milieu une rangée transverse de lunules blanches, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs qui ont l'iris d'un vert-doré & presque entièrement bordé de roux. A ces yeux répondent en dessus deux points noirâtres oculaires, mais plus prononcés chez la femelle que chez le mâle.

Le corps, les antennes & la queue des secondes ailes sont comme dans le *Boeticus*.

Ce polyommate se trouve, en juillet & en août, dans nos départemens les plus méridionaux & dans toutes les contrées adjacentes à la Méditerranée.

129. POLYOMMATE LYBAS.

POLYOMMATUS Lybas.

Pol. alis supra cærulescenti-violaceis (feminae limbo fusco): subtus fuscis, anticarum fuscis bifidis catenulâque terminali, posticarum caracteribus intricatis albis; posticis ocellis quatuor anguli ani auratis.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre-pâle, avec la frange blanche & entrecoupée de brun.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet-changeant, avec les bords bruns, & le disque tacheté de blanc.

Le dessous des deux sexes est brun, avec quatre bandes bifides, & une chaînette terminale, blanches aux premières ailes; avec des hiéroglyphes blancs, entrelacés, aux secondes. L'angle interne des secondes ailes offre en outre quatre yeux noirs à iris d'un vert-doré, & dont les deux intermédiaires entourés d'un cercle rouffâtre, les deux extrêmes plus petits.

Chez la femelle, les bandes bifides du dessous

des premières ailes font plus larges, & les yeux des secondes se font sentir en dessus.

De Timor.

130. POLYOMMATE Lingéus.

POLYOMMATUS Lingeus.

Pol. alis suprà cœrulescenti-violaceis (æminæ limbo fusco) : subtus fuscis, anticarum amudis fuscisque repandis, posticarum maculis difformibus albis; posticis ocellis duobus anguli ani auratis.

Papilio Lingeus. CRAM. pl. 379. fig. F. G.

Papilio Lingeus. HERBST, tab. 288. n°. 1. 2.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre-pâle, avec la frange blanche & entrecoupée de brun.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet-changeant, avec les bords bruns, & le disque des quatre ailes marqué de blanc, surtout quand le bleu est oblitéré.

Le dessous des deux sexes est brun, avec plusieurs anneaux blancs, & deux bandes blanches, postérieures, sinuées, aux premières ailes; avec des taches blanches, difformes, aux secondes. Il y a en outre, à l'angle interne des secondes ailes, deux yeux noirs à iris d'un vert-doré & entourés d'un cercle rouillâtre. Ces yeux sont sensibles en dessus dans la femelle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

131. POLYOMMATE Ericus.

POLYOMMATUS Ericus.

Pol. alis caudatis, cœrulescentibus : subtus albo fuscoque variis; posticis punctis duobus anguli ani (albis nigro cinctis). FAB.

Hesperia R. Ericus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 281. n°. 81. *

Papilio Lingeus. JON. Fig. pict. 6. tab. 18. fig. 4.

Fabricius rapporte ce polyommate au *Lingeus* de Cramer; mais, comme il le dit d'un autre pays, & qu'il paroît différer en dessous, du moins par le nombre & par la couleur des yeux de l'angle anal des secondes ailes, nous le donnons séparément, sauf à le retrancher s'il est en double emploi.

Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-pâle & sans taches.

Le dessous est panaché de blanc & de brun, & il y a près de l'angle anal des secondes ailes deux points blancs entourés d'un cercle noir.

Il ne s'agit sans doute ici que du mâle ?

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

132. POLYOMMATE Démocrite.

POLYOMMATUS Democritus.

Pol. alis caudatis, cœruleis, nitidissimis : subtus nigris, albo maculatis. FAB.

Hesperia R. Democritus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n°. 94.

Les antennes & tout le corps font noirs. Le dessus des ailes est d'un bleu très-luisant, avec un liseré noir.

Le dessous est noir, avec des points, & des petites lignes transversales, blanchâtres. Les secondes ailes ont à l'angle de l'aube deux yeux noirs à iris d'un vert-doré, & leur queue est noire avec le bout blanc.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

133. POLYOMMATE Emolus.

POLYOMMATUS Emolus.

Pol. alis suprà violaceis, nitidis : subtus fuscifluentibus; posticis paginâ omni strigis albidis, undulatis, interruptis, punctisque duobus ocellaribus nigris, altero marginis interni, altero postici. (Mas.)

Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-foncé & luisant, avec deux petites taches noirâtres près de l'angle anal des inférieures.

Le dessous est d'un brun-pâle, avec quatre lignes blanches, transverses & ondulées, dont les deux antérieures beaucoup plus courtes, à l'extrémité des premières ailes. Les secondes ailes ont des lignes semblables sur toute la surface, & elles offrent en outre deux points noirs, dont l'un cercle de blanc & placé sur le milieu du bord interne, l'autre situé près du bord postérieur & immédiatement surmonté d'une lunule rousse.

La femelle nous est inconnue.

Du Bengale, par feu Macé.

134. POLYOMMATE Strabon.

POLYOMMATUS Strabo.

Pol. alis suprà violaceo-cœrulescentibus, limbo fusco : subtus cinereis, ponè médium catenulis albidis, punctisque costalibus anticarum unico posticarum duobus nigris; posticis sequi ocello anguli ani aurato.

Hesperia R. Strabo, alis caudatis, cœruleis : subtus cinereis, albo undatis : posticis punctis duobus atris marginalibus duobusque anguli ani. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 287. n°. 101.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-pâle, avec le

limbe

limbe postérieur finement liseré de brun, & marqué à l'angle interne des secondes ailes d'un simple point noir.

Le dessous est cendré, & il offre à partir du milieu un anneau oblong, puis trois rangées transversales de chaînettes blanchâtres. Les premières ailes ont un point noir vers le tiers postérieur de la côte. Les secondes ailes ont deux points semblables sur la moitié antérieure du bord d'en haut, & leur angle anal offre deux yeux noirs à iris doré & bordé de fauve en avant. L'œil extérieur est beaucoup plus gros que celui qui avoisine le bord abdominal.

La femelle a en dessus une bordure brune, médiocrement large, qui est coupée aux premières ailes par quelques traits blancs, & aux secondes par des annelets également blancs, dont le troisième ceignant un gros point noir. On remarque en outre quatre à cinq points bruns derrière le disque des secondes ailes. Le dessous est comme chez le mâle.

De l'Australasie.

155. POLYOMMATE CNEJUS.

POLYOMMATUS Cnejus.

Pol. alis suprà cœruleo-violaceis, limbo fusco: subtus cinereis, ponè medium catenulis albidis; posticus punctis quatuor basois nigris ocellisque duobus anguli anti auratis.

Hesperia R. Cnejus, alis caudatis, cœrulescentibus, limbo fusco: subtus cinereis, albo undatis; posticus punctis plurimis basois duobusque apicis albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. Suppl. p. 450. n°. 100-101.

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre, avec le limbe postérieur brun, & précédé à l'angle anal des secondes ailes de deux points noirs qui sont souvent cerclés de fauve.

Le dessous est cendré, & il offre à partir du milieu un anneau oblong, puis trois rangées transversales de chaînettes, blanchâtres. Les secondes ailes ont en outre à la base quatre points noirs ocellés, & à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris d'un vert-doré & bordé de fauve antérieurement.

La femelle a le dessus d'un brun-noirâtre, avec le disque d'un bleu-violetâtre, & les deux petits yeux de ses ailes inférieures s'alignent avec trois anneaux blanchâtres. Elle a le dessous comme le mâle.

Des Indes orientales.

156. POLYOMMATE PARRHASIUS.

POLYOMMATUS Parrhasius.

Pol. alis caudatis, cœruleis (fuscis): subtus cinereis. Hist. nat. Inf. Tome LX.

nereis, albo strigosis; posticus punctis murg. nalisibus aureis. FAB.

Hesperia R. Parrhasius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 289. n°. 103.

Papilio Parrhasius. JON. Fig. pict. 6. tab. 16. fig. 2.

Papilio Parrhasius. DONOV. of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cub. 7. pl. 5. fig. 5.

Voici ce qu'en dit Fabricius: il est petit. Le dessus de ses quatre ailes est bleu, avec une bordure brune, qui est précédée aux inférieures d'un rang de points noirs ocellés.

Le dessous est cendré, avec des ondes blanches derrière le milieu. Outre cela, les ailes inférieures ont à la base trois points noirs cerclés de blanc, & à l'extrémité quatre points dorés, dont le troisième marqué de noir.

De l'Inde.

Nota. Il résulte de cette description que le *Parrhasius* ne diffère de la femelle du *Cnejus*, qu'en ce qu'il a quatre points dorés, au lieu de deux, à l'extrémité des ailes inférieures en dessous.

157. POLYOMMATE ASTRIS.

POLYOMMATUS Asteris.

Pol. alis suprà argenteo-violaceis, nitidis, limbo fusco: posticus subtus obscure cinereis, punctis sex basois ocellaribus nigris, fasciâ disici crenatâ albâ ocellisque tribus anguli uni cœruleo-argenteis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-argenté-luisant, avec le limbe postérieur brun & frangé de blanc. Les ailes supérieures ont vers le milieu une lunule noirâtre, & les inférieures ollient vers l'angle de l'anus un point noir surmonté d'une lunule fauve.

Le dessous des premières est d'un cendré-clair depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec un anneau central blanc; ensuite d'un cendré-obscur jusqu'au bout, avec quatre lignes blanches, transversales & ondulées.

Le dessous des secondes ailes est entièrement d'un cendré-obscur, & il présente les caractères que voici: à la base sont six points noirs cerclés de blanc & suivis d'une ligne blanche très-flexueuse; vient ensuite une bande blanche transversale, crénelée sur chaque côté, puis une série terminale d'annelets blancs, dont les trois plus intérieurs renfermant chacun un œil noir faibli de bleu-argenté. L'œil qui fait face à la queue est surmonté, comme en dessus, d'une lunule fauve.

La femelle a le dessus plus pâle, avec la bordure plus large & marquée de blanchâtre. Son dessous est comme chez le mâle.

O o o o

Pris au Cap de Bonne-Espérance, près de la montagne de la Table, par M. Jules Verreaux, préparateur de zoologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

158. POLYOMMATE Centaure.

POLYOMMATUS Centaurus.

Pol. alis caudatis, cærulescentibus, limbo fusco : subtus cinereis, maculis baseos ocellaribus. FAB.

Papilio P. R. Centaurus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n° 646.*

Hesperia R. Centaurus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 275. n° 63.*

Le dessus des ailes est d'un bleu-pâle, avec la côte des premières, & le bord postérieur des quatre, d'un brun-noirâtre.

Le dessous est cendré, avec quatre ou cinq taches brunes cerclées de blanc aux ailes supérieures, & six à sept à la base des inférieures. Les taches des ailes supérieures sont suivies d'une bande brune, bordée de blanc & ne descendant pas jusqu'au bord interne de Paile. Les ailes inférieures ont à l'extrémité des ondes peu prononcées.

De la Nouvelle-Hollande.

(Traduction de Fabricius.)

159. POLYOMMATE Théophraste.

POLYOMMATUS Theophrastus.

Pol. alis supra cærulescenti-violeaceis, limbo fusco : subtus albis, strigis plurimis macularibus atris ; posticis ocellis quinque marginalibus aureis, anali didymo.

Hesperia R. Theophrastus, alis caudatis, fuscescentibus : subtus albis, nigro maculatis ; posticis punctis quinque marginalibus aureis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 281. n° 82.* (La femelle.)

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet légèrement bleuâtre, avec le limbe postérieur brun, & trois points noirs, dont un près du milieu de la côte des ailes supérieures, les deux autres à l'angle interne des inférieures.

Le dessous de la femelle est marqué de brun & de blanchâtre, & plus ou moins glacé de bleu-violet.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec plusieurs lignes noires, transverses, & maculaires pour la plupart. Les secondes ailes offrent en outre une rangée marginale de cinq yeux dorés à iris noir. L'œil anal est double, & le suivant représente une lunule placée sur un gros point noir.

Fabricius n'a point connu le mâle.

De la Barbarie. — Feu M. Olivier l'a aussi trouvé en Egypte.

140. POLYOMMATE Plinie.

POLYOMMATUS Plinius.

Pol. alis caudatis, albo fuscoque variis : posticis subtus puncto gemino aureo anguli ani. FAB.

Hesperia R. Plinius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 284. n° 92.*

Papilio Plinius. JON. *Fig. pict. 6. tab. 48. fig. 1.*

Papilio Plinius. DONOW. *of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, pl. 3. fig. 1.*

Fabricius le décrit ainsi : il est petit, varié de blanc & de noir. Les ailes supérieures ont des taches brunes, carrées.

Le dessous des quatre ailes est fascié, & celui des inférieures offre à l'angle de l'anus un double point doré.

Des Indes.

Nota. Le lépidoptère dont il est ici question doit être une femelle voisine de celle du *Theophraste* ; aussi n'en parlons-nous que pour qu'on puisse, s'il est possible, reconnoître l'espèce à laquelle il appartient.

141. POLYOMMATE Rosimon.

POLYOMMATUS Rosimon.

Pol. alis utrinque albis, punctis sparsis marginæ omni nigris : omnibus supra basi, posticis subtus punctis tribus anguli ani cæruleo-argenteis.

Papilio P. R. Rosimon, alis caudatis, albis, supra limbo punctisque disci nigris : subtus nigro punctatis ; angulo ani punctis tribus aureis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n° 672.*

Hesperia R. Rosimon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 288. n° 104.*

Papilio Rosimon. HERBST, *Pap. tab. 237. fig. 5-7.*

Papilio Coridon. GRAM. *pl. 540. fig. C. D. E.*

Il a de douze à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est blanc, avec la base glacée de bleu-argente, des points épars & tout le pourtour extérieur noirs. La bordure de l'extrémité des premières ailes est sans taches, celle de l'extrémité des secondes est chargée d'une double série de lunules blanches qui le regardent par leur concavité.

Le dessous est blanc, avec une multitude de points, & une ligne basilaire oblique, noirs. Les points du bord postérieur forment deux rangées, & les trois intérieurs de la rangée externe des se-

condes ailes font fablés de bleu-argénté. L'abdomen & les antennes font annelés de blanc & de noir.

La femelle refsemble au mâle, mais elle a le dessus des ailes plus largement bordé de noir. De Timor.

142. POLYOMMATE ROXUS.

POLYOMMATUS ROXUS.

Pol. alis suprà atris, disco communi albo: subtus albis, fasciâ obliquâ baseos duabusque macularibus apicis atris.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande blanche, commune, discoïdale, linéée en dehors, n'atteignant pas la côte des supérieures. La queue des inférieures est noire, avec le bout blanc.

Le dessous est d'un blanc-jaunâtre, avec une bande oblique à la base, deux bandes courbes & maculaires à l'extrémité, d'un noir-brun. Le corps est noir, avec des anneaux blancs à l'abdomen.

Nous ne connoissons pas la femelle.

De Java.

143. POLYOMMATE HIPPOCRATE.

POLYOMMATUS HIPPOCRATES.

Pol. alis caudatis, fuscis, apice albis: subtus albis, nigro punctatis. FAB.

Hesperia R. Hippocrates. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 288. n°. 105.

Papilio Hippocrates. JON. Fig. piél. 6. tab. 17. fig. 1.

Papilio Hippocrates. DOXOW. of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cah. 7. pl. 5. fig. 5.

Il est petit. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec le sommet des supérieures & le bord des inférieures blancs.

Le dessous est blanchâtre, avec une rangée transverse de points noirs aux ailes de devant, & des points noirs épars aux ailes de derrière.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

144. POLYOMMATE GABINUS.

POLYOMMATUS GABINUS.

Pol. alis suprà argenteo-cæruleis: subtus albis, fuscescenti undatis; posticis punctis duobus baseos duabusque anguli uni nigris: puncto anali externo lunulæ fulvæ subjecto. (Mas.)

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argénté, avec le bord

postérieur liseré de noir & garni d'une frange entièrement blanche.

Le dessous est blanc, avec des ondes brunâtres à l'extrémité des ailes supérieures, & sur toute la surface des inférieures. Ces dernières ailes ont la base d'un vert-argénté-luisant, & elles offrent quatre points noirs, dont deux à la partie antérieure de la côte, & deux à la région anale. Le point extérieur de l'angle de l'anus est surmonté d'une bande fauve.

Décrit d'après un mauvais individu mâle.

Du Brésil?

145. POLYOMMATE MICYCLUS.

POLYOMMATUS MICYCLUS.

Pol. alis suprà cæruleo-violaceis (feminae limbo fusco): subtus canis, strigis tribus undulatis rufescentibus serieque marginali è punctis nigris; posticarum puncto penultimo pupillâ argenteâ.

Papilio Micyclus. GRAM. pl. 282. fig. F. G. (La femelle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre, avec un liseré obtur.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet-rose pâle & largement bordé de brun, avec une rangée d'anneaux blanchâtres à l'extrémité des ailes inférieures.

Le dessous des quatre ailes, chez les deux sexes, est d'un gris-blanchâtre, avec un arc central, & deux lignes ondulées, roussâtres, puis une série marginale de points noirs. L'avant-dernier point des ailes inférieures est sablé de bleu-argénté, & il y a près de la base de ces mêmes ailes trois autres points noirs.

Décrit d'après des individus fatigués.

De la côte occidentale d'Afrique.

146. POLYOMMATE AMYNTAS.

POLYOMMATUS AMYNTAS.

Pol. alis suprà maris violaceo-cæruleis, feminae fuscis: subtus canis, nigro ocellatis; posticis lunulis duabus anguli uni fulvis puncto simplici singularum factis.

Papilio P. R. Amyntas, alis caudatis, cyanis, margine nigro: subtus cinereis, punctis nigris, posticisque duobus ferrugineis anguli uni. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 666.

Hesperia R. Amyntas. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 285. n°. 95.

Papilio Amyntas. WIEN. Verz. p. 185. fam. N. n°. 18.

Papilio Amyntas. ILLIG. N. Aufg. Deff. tom. 2. p. 274. n°. 18.

Papilio Amyntas. HERBST, *Pap. tab.* 506. fig. 5-7.

Papilio Amyntas. ROSSI, *Mant. tom. 2. p. 12. n.º. 555.*

Papilio Amyntas. HUBN. *Pap. tab.* 65. fig. 522-524.

Papilio Amyntas. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. edit. 1.*

Papilio Tiresias. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 54. Suppl. 10. fig. 1. 2.*

Papilio Tiresias. NATURE. 6. p. 25. n.º. 10.

Papilio Tiresias. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. pag. 166 & 280. n.º. 19. — part. 2. p. 252.*

Papilio Tiresias. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 292. n.º. 100.*

Papilio Tiresias. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 260. n.º. 160.*

Papilio Tiresias. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 75. n.º. 153.*

Le petit Porte-queue. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 167. pl. 57. fig. 73. a-d.*

♂ *Papilio Amyntas, alis caudatis, maris supra caeruleis, feminae fusco-caeruleis: subtus lacteo-canis, punctis ocellaribus nigris; posticis maculis duabus anguli ani ferrugineis: ut antennis clavè abbreviatà, totà nigrà, anticè subternatà.* BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 292. n.º. 101.*

Papilio Tiresias, var. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 49. Suppl. 25. fig. 2.*

Papilio Tiresias. BRANN. *Inf. Kalend. p. 586. n.º. 264.*

Papilio Tiresias. HERBST, *Pap. tab.* 506. fig. 8. 9. 10.

Papilio Tiresias. HUBN. *Pap. tab.* 65. fig. 519-521.

Le Myrmidon. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 167. pl. 57. fig. 79. a. b. — p. 508. pl. 85. 2.º. Suppl. pl. 4. pl. 79. a. b. c. d. bis.*

Papilio Polyperchon. BERGSTR. *Nomenkl. p. 72. tab. 44. fig. 5-5.*

Papilio Polyperchon. OCHSEN. *tom. 1. edit. 2.*

Polyommate Amyntas. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat. tom. 27. p. 492.*

Polyommate Amyntas. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom 1. p. 194. pl. 9. secund. & pl. 9. tert. fig. 5.*

Polyommate Amyntas. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 50. n.º. 159.*

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus

du mâle est d'un bleu-violet, avec le bord postérieur noirâtre.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec une poussière bleuâtre à la base des premières ailes, & deux petits yeux fauves à prunelle noire près de l'angle interne des secondes.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-bleuâtre, avec un arc central, puis une ligne arquée de points oculaires noirs, & deux séries marginales de petites taches brunâtres. Les secondes ailes ont en outre deux petits points basiliaires noirs, & deux taches anales fauves, renfermées chacune entre deux lunules de la couleur des points.

Les antennes sont noires, annelées de blanc, & terminées de fauve.

On trouve une variété qui paroît répondre au *Tiresias* de Hubner, au *Polyperchon* de M. Ochsenheimer, & au *Myrmidon* d'Engramelle. Elle ne diffère des individus ordinaires qu'en ce qu'elle est plus petite. Suivant Borkhaufen, elle n'auroit point de fauve à l'extrémité des antennes.

Dans les prairies & les clairières des bois de l'Europe, en juillet & en août. Il y a des années où il est assez commun aux environs de Paris.

147. POLYOMMATE COMYNTAS.

POLYOMMATUS COMYNTAS.

Pol. alis supra maris violaceo-caeruleis, feminae fuscis: subtus canis, nigro ocellatis; posticis lunulis duabus anguli ani fulvis oculo inaurato singularitè setis.

Il ne diffère absolument de l'*Amyntas* que parce que les deux lunules fauves du dessous des secondes ailes sont chargées chacune d'un œil noir à iris doré, au lieu d'être chargées d'un simple point noir.

Il se trouve dans l'Amérique septentrionale.

Observation. Comment séparer actuellement de l'*Amyntas* le *Polyperchon* de M. Ochsenheimer? Prendra-t-on pour différence caractéristique le manque, probablement accidentel, du point fauve qui termine les antennes?

148. POLYOMMATE LACURNUS.

POLYOMMATUS LACURNUS.

Pol. alis supra violaceo-caerulescentibus, limbo fusco: subtus canis; posticis ad basin nigro, ad apicem fusco ocellatis, fuscà repandà anguli ani rufà ocellis duobus inauratis setatè. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec le limbe terminal des quatre brun, & l'angle interne des inférieures marqué de deux points noirs qui sont bordés de fauve antérieurement.

Le dessous est d'un gris-blanchâtre, avec des points bruns cerclés de blanc vers l'extrémité

de toutes les ailes. Les ailes inférieures offrent en outre vers la base quatre points oculaires très-noirs, & à l'angle de l'aune une bande rouille, large, sinuée, & chargée de deux yeux noirs à iris doré.

Nous ne connoissons pas la femelle.
De Timor.

149. POLYOMMATE Phidias.

POLYOMMATUS Phidias.

Pol. alis caudatis, cœrulescentibus, limbo fusco: subtus cinereis, omnibus puncto anguli ani atro. FAB.

Hesperia R. Phidias. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 286. n.º 99.*

Papilio Phidias. JON. *Fig. pict. 6. tab. 15. fig. 2.*

Fabricius le décrit ainsi: il est un peu plus grand que le polyommate de *la Ronce*. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-pâle, avec le bord brun & ondulé de blanc, & un point noir vers l'angle interne. Le dessous est cendré, avec le bord ondulé & un point pareillement noir.

De l'Inde.

Nota. Comme nous n'avons point vu ce Lépidoptère, nous ne le plaçons ici qu'en tâtonnant.

150. POLYOMMATE Bochus.

POLYOMMATUS Bochus.

Pol. alis suprà cœruleis, limbo nigro: subtus obscurè cinereis; anticis immaculatis, posticis angulo ani nigro lunatis argenteis.

Papilio Bochus. CRAM. *pl. 391. fig. C. D.*

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-changeant, avec une bordure noire, plus large aux supérieures qu'aux inférieures.

Le dessous est d'un cendré-obscur, sans taches aux premières ailes, avec l'angle anal des secondes noir & marqué de quatre petits croissants d'un blanc-argenté.

Décrit d'après un mauvais individu.

De l'île de Ceylan, selon Cramer.

Nota. La queue des secondes ailes est plus courte que dans les autres espèces de cette subdivision.

D. Ailes dentées ou entières: les inférieures ayant l'angle interne plus ou moins prolongé dans les mâles.

151. POLYOMMATE Polycète.

POLYOMMATUS Polycetus.

Pol. alis dentatis, maris suprà cyaneis, fe-

mina: fuscis disco basè viridi-cœrulescente: subtus fuscis, fuscis macularibus sanguineis nigro auroque marginatis.

Papilio P. U. alis subcaudatis, viridi-fuscis: primoribus maculâ albâ: subtus argenteo punctatis. LINS. *Syst. Nat. 2. pag. 793. n.º 265. — Mus. Lud. Ur. pag. 336. (La femelle.)*

Papilio P. U. Polycetus, alis subcaudatis, viridi-fuscis: anticis maculâ albâ: subtus maculis fulvis argenteo marginatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 89. n.º 808. (La femelle.)*

Hesperia U. Polycetus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 344. n.º 308.*

Papilio Polycetus. CLERCK, *Icon. tab. 17. fig. 3. 4.*

Papilio Epopus. CRAM. *pl. 363. fig. G. H. (Le mâle.)*

Papilio Polycetus. CRAM. *pl. 159. fig. F. G. (La femelle.)*

Papilio Epopus. HERBST, *Pap. tab. 285. fig. 5. 4.*

Papilio Polycetus. HERBST, *Pap. tab. 284. fig. 5. 6.*

Linne n'a connu que la femelle de ce Lépidoptère, & il l'a placée à tort dans la division des *Plébéiens urbicoles* (nos *Hespéries*).

Le Polycète a un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-barbeau, avec le bord postérieur liseré de noir.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-verdâtre-pâle qui s'étend sur le disque des premières ailes.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-obscur, avec des bandes d'un rouge-sanguin, bordées de noir, puis de vert-doré. Les bandes des premières ailes sont au nombre de trois, dont l'antérieure longitudinale, sinuée, & allant de la base au-delà du milieu; la suivante transversale & formée de quatre taches; la troisième étroite, longeant tout le bord postérieur, & séparée de la précédente par une rangée transversale de six points qui sont noirs en avant, rouges en arrière. Les bandes des secondes ailes sont au nombre de six, dont les cinq antérieures maculaires & transversales, la postérieure linéaire & suivant les sinuosités du bord terminal de l'aile.

De l'île d'Amboine. — Selon Cramer, il se trouveroit aussi au Bengale.

152. POLYOMMATE Narcisse.

POLYOMMATUS Narcissus.

Pol. alis dentatis, fuscis, disco cœrulescente: subtus fuscis maculisque sanguineis argenteo marginatis. FAB.

Papilio P. R. Narciffus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n.º. 675.*

Hesperia R. Narciffus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 290. n.º. 110.*

Papilio Narciffus. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an. Epit. of the Insects of New Holl. pl. 50. fig. 5. 6.*

Ce lépidoptère paroît bien voisin de la femelle du *Polycète* ; mais , comme nous ne pouvons pas bien saisir d'après une figure les différences qui l'en séparent , nous traduisons ici Fabricius.

Les antennes sont variées de blanc & de noir , & elles ont l'extrémité de la masse rousse. Les ailes supérieures sont d'un brun-noirâtre en dessus , avec une tache d'un bleu-luisant qui se communique aux inférieures. Leur dessous est brun , avec le bord extérieur jaunâtre , & deux lignes argentées allant de la base au milieu : derrière ces lignes , il y a un trait transversal , & trois points , argentés ; puis une grande tache rousse transversale , bordée d'argent ; enfin , cinq points argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures sont dentées , noires , avec le disque d'un bleu-luisant. Leur dessous est brun , avec deux taches basilaires , dont l'antérieure oblongue , la suivante grande & ovale , puis deux bandes médiales , dont la postérieure interrompue , rouges toutes les quatre & bordées d'argent. Indépendamment de cela , le bord terminal des ailes est rouge & longé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

153. POLYOMMATE Apelle.

POLYOMMATUS Apelles.

Pol. alis dentatis , fulvis , limbo fusco : posticis subtus fuscis rufis argenteo marginatis. FAB.

Papilio P. R. Apelles. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n.º. 676.*

Hesperia R. Apelles. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 290. n.º. 111.*

Papilio Apelles. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an. Epit. of the Insects of New Holl. pl. 50. fig. 5. 4.*

Fabricius le décrit ainsi : il a de l'affinité avec le *Narciffe* , dont il n'est peut-être qu'une variété de sexe. Les antennes sont annelées de blanc & elles ont le bout fauve. Les ailes supérieures sont fauves en dessus , avec l'extrémité d'un brun-noirâtre. Leur dessous est jaunâtre , avec trois lignes argentées , allant de la base au milieu , à l'exception de l'antérieure qui est plus courte : derrière ces lignes , il y a une petite tache rousse , transversale , & six points argentés , placés vers la côte. Outre cela , le bord postérieur est terminé par cinq points argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures ont le dessus fauve , avec le limbe d'un brun-noirâtre. Leur dessous est gris , avec quatre bandes rousses , un peu interrompues & bordées d'argent : la région anale offre trois taches noires , transverses , & le bord postérieur est terminé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

154. POLYOMMATE Théro.

POLYOMMATUS Thero.

Pol. alis dentatis , supra nigricanti-fuscis , fulvo-maculatis : posticis subtus nebuloso-cinereis , maculis linearibus nitenti-albis ; maculâ disci apicibus uncinatâ.

Papilio P. R. Thero , alis dentatis , subbicaudatis , nigricantibus , maculis fulvis : subtus maculis argenteis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 787. n.º. 219. — Mus. Lud. Ulr. p. 328. n.º. 146.*

Papilio N. P. Erofine , alis dentatis , fuscis : anticis punctis septem , posticis tribus rubris ; subtus anticis punctis tribus argenteis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 51. n.º. 506.*

Hesperia R. Erofine. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 266. n.º. 28.*

Papilio P. R. Thero. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n.º. 642.*

Hesperia R. Thero. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 274. n.º. 57.*

Papilio Erofine. HEREST. *Pap. tab. 501. fig. 7. 8.*

Papilio Salmoneus. CRAM. *pl. 341. fig. D. E.*

Papilio Rumina. DRURY. *Inf. tom. 1. pl. 2. fig. 6.*

Fabricius a donné ce polyommate sous deux noms différents , & cependant Cramer avoit déjà dit que le papillon *Thero* de Linnéus répondoit à celui qu'il a figuré sous le nom de *Salmoneus*.

Il a approchant deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre , avec huit à neuf taches fauves inégales sur le disque des supérieures , & une rangée de lunules pareillement fauves avant le bord terminal des inférieures. Ce bord est liseré de blanc aux petites échancrures des quatre ailes.

Le dessous des premières ailes est fauve , mais bordé de cendré-obscur , avec une dizaine de taches noires , dont quatre alignées sous la côte , & ayant une prunelle d'un blanc-luisant.

Le dessous des secondes ailes est cendré , avec une dizaine de taches d'un blanc-argentin , environnées de brun-obscur , & pour la plupart linéaires. La tache du disque est plus allongée que les autres & crochue à chaque bout , caractère

qui empêchera toujours de confondre cette espèce avec ses analogues.

Chez la femelle, les lunules fauves du dessus des secondes ailes sont surmontées de deux ou trois taches de leur couleur.

Du Cap de Bonne-Espérance.

155. POLYOMMATE Alphée.

POLYOMMATUS Alphæus.

Pol. alis denticulatis, suprâ atris, fasciâ communi fulvâ, nitidâ: posticis subtus margaritaceis, fasciâ mediâ repandâ limboque postico ferrugineis.

Papilio P. U. Alphæus, alis subcaudatis, atris, fasciâ sanguineâ: subtus variegatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 86. n.º 782.*

Hesperia U. Alphæus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 555. n.º 263.*

Papilio Alpheus. GRAM. *pl. 380. fig. F. G.*

Fabricius a fort mal-à-propos placé cette espèce dans la division de ses *Plébéiens urbicoles*, division dont se compose en grande partie notre genre *Hespérie*.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec une bande transversale d'un fauve-ponceau-vif sur le milieu, & un petit liséré blanc aux échancrures du bord postérieur.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec le pourtour extérieur cendré, le sommet d'un gris de perle & précédé de quelques lunules ferrugineuses avant lesquelles il y a deux taches noires & un espace blanc intermédiaire.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris de perle, avec une bande sinuée sur le milieu, & deux lignes ondulées sur le bord postérieur, d'un ferrugineux-pourpré. La bande du milieu est un peu blablée de gris, ce qui la rend bifide à sa partie antérieure & comme moniliforme à sa partie postérieure. Le corps est noir en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes font noirâtres, annelées de blanc, avec la massue allongée & terminée de ferrugineux.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

156. POLYOMMATE Thyra.

POLYOMMATUS Thyra.

Pol. alis suprâ atris, disco fulvo: subtus testaceo-ferrugineis, maculis numerosis nigris pupillâ elevatâ argenteâ. (MUS.)

Papilio P. R. Thyra, alis unidentatis, nigricantibus, disco fulvo: subtus purpurascensibus, maculis argenteis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 789. n.º 227. — Mus. Lud. Ulr. p. 329. n.º 147.*

Papilio P. R. Thyra, alis integris, disco fulvo, nigro punctato: subtus purpurascensibus, maculis argenteis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n.º 756.*

Hesperia R. Thyra. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 514. n.º 188.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, avec le disque d'un fauve-briqueté. Le fauve des premières ailes est comme divisé en taches; le fauve des secondes a beaucoup plus de largeur, & il est quelquefois ponctué de noir.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, mais plus ou moins lavé de fauve sur le disque des supérieures, avec une multitude de taches noires ayant une prunelle argentée & élevée. Indépendamment de cela, les ailes supérieures ont l'origine de la côte d'un jaune-verdâtre qui s'étend sur la poitrine & sur les palpes. Le dessus du corps est d'un rouge-ferrugineux.

Nous n'avons pas vu de femelles.

De la côte occidentale d'Afrique.

157. POLYOMMATE Thysbé.

POLYOMMATUS Thysbe.

Pol. alis denticulatis, suprâ fulvis, nigro maculatis (basi argenteo maculatis): posticis subtus ferrugineis, flavido variegatis & striatis auroque maculatis.

Papilio P. R. Thysbe, alis denticulatis, subunicaudatis, fulvis, nigro maculatis: posticis, imprimis subtus, striatis auroque maculatis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 789. n.º 228. — Mus. Lud. Ulr. p. 330. n.º 148.*

Papilio P. R. Thysbe, alis denticulatis, subcaudatis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtus striatis auroque maculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n.º 677.*

Papilio P. R. Nais, alis dentato-subcaudatis, basi argenteis auro striatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n.º 678.*

Hesperia R. Thysbe. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 292. n.º 114.*

Hesperia R. Nais. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 4. p. 292. n.º 115.*

Papilio Nais. GRAM. *pl. 47. fig. D. E.*

Papilio Palmus. GRAM. *pl. 341. fig. F. G.*

Les papillons *Nais* & *Palmus* de Cramer se rapportent sans contredit au papillon *Thysbé* de Linnæus, mais l'état des corps, dans les individus que nous avons vus, ne nous permet pas de dire si ce sont les deux sexes, ou si le *Palmus* n'est qu'une simple variété du *Nais*.

L'envergure du *Thysbé* est de douze à quinze

lignes. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau-luisant, avec six à sept taches discordales & une bordure postérieure noires. La bordure des premières ailes est crénelée; celle des secondes se compose de traits longitudinaux, plus prononcés vers le sommet que vers l'angle anal. Chez les individus auxquels Cramer donne le nom de *Nais*, la base des quatre ailes est légèrement glacée de bleu-argente; elle est au contraire un peu noirâtre & sans relief chez ceux qu'il nomme *Pulmus*.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec une douzaine de points noirs éparés depuis la base jusqu'au-delà du milieu, & des ltries longitudinales d'un jaune-grisâtre à l'extrémité. Les quatre ou cinq points qui avoisinent la côte ont une prunelle argentée & un peu élevée.

Le dessous des secondes ailes est varié de ferrugineux & de jaunâtre, & il offre huit à neuf taches argentées, dont les antérieures linéaires, les autres plus larges, échancrées, & formant une bande arquée derrière le disque. Le bord postérieur est un outre strié de jaunâtre comme aux ailes de devant.

Le corps est noirâtre, avec des poils d'un roux-obscur sur le devant du corselet & vers l'extrémité de l'abdomen. Les palpes & les antennes font aussi d'un roux-obscur.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Fabricius a décrit son papillon *Nais* d'après la figure de Cramer, qui représente mal à-propos des lignes dorées à la base des ailes en dessus. Il paroît aussi qu'il donne le *Thysbé* de Linnæus sans l'avoir vu.

153. POLYOMMATE Hiéré.

Polyommatus Hiere.

Pol. alis subintegris, supra fuscis, sublo virgulatis nigroque maculatis (maïs violaceo nitidissimus); *posticis subfuscis cinereis, nigro ocellatis, basi cærulefcente subciliâque marginali fulvâ.*

Papilio P. R. Hiere, alis fuscis, nigro punctatis: subtis cinereis, punctis ocellaribus numerosis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 80. n. 726.*

Hefferia R. Hiere. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 310. n. 177.

Papilio Lampetie. WIEN. Verz. p. 522. f. un. M. n. 8.

Papilio Lampetie. ILLIG. N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 255. n. 5.

Papilio Lampetie. HUBN. tab. 71. fig. 556-559.

SCHÆFF. *Icon. tab. 280. fig. 1-4.*

Papilio Hipponoe. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Hippothoe, var. Esp. Pap. Eur. part.

1. tab. 51. Suppl. 7. fig. 3. (Fœm.) — tab. 55. Suppl. 11. fig. 5. (Mas.)

Papilio Hipponoe. Esp. Pap. Eur. part. 1. tab. 62. cont. 12. fig. 2. (Mas.) — tab. 73. cont. 28. fig. 6. (Fœm.)

Papilio Hipponoe. BERGSTR. Nomencl. tab. 54. fig. 3. 4. (Mas.)

Papilio Lampetie. LANG. Verz. 2. p. 50. n. 599-600.

Papilio Helle. LANG. Verz. 2. n. 403-405.

Papilio Helle. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 146 & 272. n. 5. — part. 2. p. 221.

Papilio Hipponoe. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 270. n. 77.

Papilio Lampetie. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. n. 78.

Papilio Hipponoe. SCHNEID. Syst. Besch. p. 252. n. 159.

Papilio Alciphron. SCHNEID. Syst. Besch. p. 254. n. 140.

Papilio Alciphron. NATURF. 6. p. 11.

Papilio Virgaurea. HUFNAG. tab. im. Berol. Mag. tom. 2. p. 80. n. 45.

L'argus satiné. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 44. fig. 92. a. b. (Mâle.) — pl. 72. Suppl. 18. fig. 92. f. g. (Femelle.)*

Polyommata Hiere. LATR. nouv. Diâ. d'Hist. nat. 2^e. édit. tom. 27. p. 489.

Polyommata Hiéré. GOD. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 181. pl. W-XXIII. fig. 5. 4.

Polyommata Hiéré. GOD. Tab. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 50. n. 140.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, souillé de fauve & ponctué de noir, avec un relief violet très-vif, qui absorbe quelquefois presque toute la couleur du fond. On voit à l'extrémité des secondes ailes une bandelette fauve crénelée en arrière, & la frange est blanche à toutes les ailes.

Le dessus de la femelle est toujours sans relief violet aux quatre ailes, & le plus souvent sans marques fauves au milieu des secondes; mais, en revanche, la bande crénelée de l'extrémité de ces dernières ailes est beaucoup plus apparente.

Le dessous des premières ailes est rouffâtre, principalement chez la femelle, avec les bords cendrés, & beaucoup de points oculaires noirs, dont les extérieurs moins gros & distribués sur deux rangs le long du bord postérieur.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré-clair

clair chez les deux sexes, avec la base bleuâtre, & une multitude de points noirs ocellés, dont les postérieures forment deux séries marginales entre lesquelles il y a une bande de taches fauves.

Dans quelques femelles, la bande fauve du dessus des ailes inférieures est surmontée d'un cordon de petites lunules bleues.

On rencontre au contraire des mâles qui n'ont qu'un ou deux points noirs sur le dessus des ailes supérieures.

En Allemagne. Il a aussi été trouvé près de Phalsbourg par M. Pattier, pharmacien à l'hôpital militaire de cette ville, & aux environs de Dijon, par M. le docteur Lorey, ancien chirurgien-major des armées des France.

159. POLYOMMATE Gordius.

POLYOMMATUS Gordius.

Pol. alis subintegris, supra fulvis (maris violaceo nitidis), punctis limboque nigris: posticis subtis luteo-cinereis, nigro ocellatis, basi vixrescente fasciâque marginali fulvâ.

Papilio Gordius, alis integerrimis, luteo-fulvis: omnibus utrinque maculis ocellaribus nigris: posterioribus subtis cinereis, fasciâ marginali luteâ. SCHNEID. *Syst. Befchr.* p. 250. n°. 157.

Papilio Gordius. ROEM. *Gen. Inf. tab.* 18. fig. 7. 8.

FUESL. *Magaz. toni.* 1. p. 206.

Papilio Gordius. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 50. *Suppl. 6. fig.* 3. a. b. — *tab.* 77. *cont.* 27. fig. 4.

Papilio Gordius. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 147 & 272. n°. 6.

Papilio Gordius. HUBN. *Pap. tab.* 69. *fig.* 545-545.

Papilio Gordius. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Gordius. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 75. n°. 129.

Le grand Argus bronzé. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 278. *pl.* 72. *Suppl.* 18. *fig.* 91. a. b. *bis.* — p. 281. *pl.* 75. *Suppl.* 19. *fig.* 91. c. d. *bis.*

Polyommate Gordius. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. p. 486.

Polyommate Gordius. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. p. 179. *pl.* W. XXIII. *fig.* 1. 2.

Polyommate Gordius. GOD. *Tab. méth. des lépid. de France, DIURNES, p.* 50. n°. 141.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau à reflet violet dans le mâle, d'un fauve-doré sans reflet

dans la femelle, avec beaucoup de points discoïdaux & le limbe postérieur noirs. Les points des premières ailes font plus gros que ceux des secondes.

Le dessous est d'un fauve-pâle aux premières ailes, d'un cendré-jaunâtre aux secondes, avec une multitude de points noirs oculaires. Les secondes ailes ont la base verdâtre, & leur extrémité offre une bande fauve placée entre deux séries de points.

Il se trouve au mois de juillet, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les parties montagneuses du midi de la France, &c.

Nota. La figure de Roemer est, comme il le dit lui-même, beaucoup trop grande. « *Magitudine naturalem excedente depictus.* »

160. POLYOMMATE Therfamou.

POLYOMMATUS Therfamou.

Pol. alis subintegris, fulvis, maris violaceo nitidulis, femina nigro maculatis: posticis supra disco fuscescente; subtis cinereis nigro ocellatis, fasciâ marginali fulvâ.

Hesperia R. Therfamou, alis subcaudatis, fulvis: subtis punctis ocellaribus numerosis; anticis fulvis, posticis cinereis. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. p. 315. n°. 184.

Papilio Therfamou. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 89. *cont.* 59. *fig.* 6.

Papilio Therfamou. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 150 & 274. n°. 10. — *part.* 2. p. 225. n°. 11.

Papilio Therfamou. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 79. n°. 158.

Papilio Therfamou. OCHS. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Xanthe. HUBN. *Pap. tab.* 69. *fig.* 546-546.

Polyommate Therfamou. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. p. 487.

Polyommate Therfamou. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. p. 177. *pl.* V. XXII. *fig.* 7. 8.

Polyommate Therfamou. GOD. *Tab. méth. des lépid. de France, DIURNES, p.* 50. n°. 142.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau, légèrement glacé de violet, avec le bord postérieur noir & frangé de blanc. Ses premières ailes ont huit à neuf points noirâtres, mais on ne les voit qu'à certains jours. Ses secondes ailes ont le bord interne & l'extrémité obscurs, avec une bande postérieure fauve, chargée en arrière d'un rang de points noirs.

Le dessus de la femelle est d'un fauve-doré aux premières ailes, avec des points noirs très-dis-

tindis; il est d'un fauve-rembruni aux secondes ailes, avec des points noirs, & une bande postérieure d'un fauve-doré.

Le dessous des deux sexes est d'un jaune-fauve aux premières ailes, d'un gris-cendré aux secondes, avec une multitude de points noirs cerclés de blanchâtre. Les unes & les autres ont en outre à l'extrémité une bande rouille, transversale, & bordée par de simples points noirs.

Il habite les Alpes, l'Autriche, la Hongrie & les contrées les plus méridionales de la Russie.

Nota. Fabricius, qui a décrit ce polyommate d'après des individus de la Russie australe, dit que la femelle a une queue allongée. Cela paroît probable, car dans la femelle du *Phléas*, la dent qui précède extérieurement l'angle anal des ailes inférieures est plus prononcée chez les individus de l'Asie mineure que chez ceux du nord de l'Europe.

161. POLYOMMATE Xanthé.

Polyommatus Xanthe.

Pol. als subintegris, supra fuscis, nitidis, nigro maculatis; subtis viridi-lutescentibus, nigro ocellatis: utrinque strigâ marginali fulvâ.

Papilio P. R. Xanthe, als subintegris, fuscis, nigro punctatis, fuscâ marginali fulvâ: subtis lutescentibus, punctis numerosis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 81. n. 751.*

Papilio P. R. Garbas, als fuscis, nigro punctatis, margine albo: subtis viridibus, punctis numerosis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 81. n. 752.*

Hesperia R. Xanthe. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 512. n. 182.*

Hesperia R. Garbas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 512. n. 183.*

Papilio Xanthe. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n. 6.*

Papilio Circe. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n. 7.*

Papilio Xanthe. ILLIC. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 257. n. 6.*

Papilio Circe. ILLIC. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 259. n. 7.*

Papilio Circe. HUDN. *Pap. tab. 67. fig. 554-556.*

Papilio Circe (mas). MULLER, *Faun. Silesiac.*

Papilio Xanthe. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 149 & 274. n. 9. — part. 2. p. 225.*

Papilio Circe. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 148 & 275. n. 8. — part. 2. p. 222.*

Papilio Xanthe. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 280. n. 2.*

Papilio Circe. BORKH. *Rhein. Magaz. p. 280. n. 1.*

Papilio Xanthe. BRAHM. *Inf. Kalend. p. 504. n. 505.*

Papilio Circe. BRAHM. *Inf. Kalend. p. 505. n. 504.*

Papilio Circe. LANG. *Verz. 2. p. 51. n. 410-415. — n. 414-416. (Var.)*

Papilio Circe. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Xanthe. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 157. n. 1059.*

Papilio Xanthe. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 491. n. 157.*

Papilio Garbas. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 492. n. 158.*

Papilio Alexis, var. 4. SCOPOLI, *Ent. Carn. p. 180.*

SCHEFF. *Icon. tab. 272. fig. 1. 2.*

Papilio Dorilas. HUFNAG. *Tabel. im. Beil. Mag. tom. 2. p. 68. n. 21.*

Papilio Dorilas. NATUREF. 6. p. 6. n. 21.

Papilio Phocas. NATUREF. 6. p. 29. n. 17.

Papilio Phocas. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 55. Suppl. 11. fig. 1. 2. — tab. 63. cont. 15. fig. 6. (Var.)*

L'Argus myope. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 64. n. 55.*

L'Argus myope. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 185. pl. 45. fig. 89. a. b. c. d. — p. 512. pl. 84. 2. Suppl. fig. 89. e. 1.*

Polyommate Circé. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2. édit. tom. 27. p. 490.*

Polyommate Xanthé. GOD. *Hist. nat. des Lépid. de France, p. 196. pl. 9. secund. fig. 3. & pl. 10. secund. fig. 1.*

Polyommate Xanthé. GOD. *Tabl. method. des Lépid. de France, DIURNES, p. 51. n. 145.*

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le mâle a le dessus des ailes d'un brun-noirâtre-chaotant, avec des points noirs épars, une ligne marginale de taches fauves, & la frange blanche. Il a le dessous d'un jaune-verdâtre-pâle, avec une multitude de points noirs olivâtres, & une série de taches fauves répondant à celle de la surface opposée.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a le fond des ailes supérieures fauve de part & d'autre.

Il écrot en mai & en août. On le trouve dans plusieurs contrées de l'Europe, & il est très-commun aux environs de Paris.

162. POLYOMMATE HELLÉ.

Polyommatus Helle.

Pol. alis subintegris, supra fuscis, violaceo micantibus, disco anticarum fulvo nigroque vario: posticis subtus corticinis, punctis ocellaribus nigris, strigâ angulatâ albâ fuscâque marginali rubrâ.

Hesperia R. Helle, *alis integris, obscuris, cœruleo micantibus: omnibus subtus punctis ocellaribus numerosis.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 80. n. 750.*

Hesperia R. Helle. *FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 512. n. 181.*

Papilio Helle. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n. 4.*

NATURF. 6. p. 114. tab. 5. fig. 2.

Papilio Helle. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 256. n. 4.*

Papilio Helle. HUBN. *Pap. tab. 67. fig. 351-355.*

Papilio Helle. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 491. n. 156.*

Papilio Helle. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Amphidamas. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 58. cont. 8. fig. 4. (Mas.)—tab. 63. cont. 13. fig. 5. (Fem.)*

Papilio Amphidamas. KNOCH, *Beytr. part. 2. p. 90. tab. 6. fig. 4. 5. (Fem.)*

BERGSTR. *Nomenkl. tab. 122. fig. 5-7.*

Papilio Amphidamas. BORKH. *Pap. Europ. part. 1. p. 151 & 274. n. 11. — part. 2. p. 225. n. 10.*

Papilio Amphidamas. BORKH. *Rhein. Magazin. tom. 1. p. 279. n. 79.*

Papilio Amphidamas. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 257. n. 145.*

Papilio Xanthe. LANG. *Verz. 2. p. 52. n. 417-420.*

Argus myope violet. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 276. pl. 71. Suppl. 17. fig. 89. a. b. — pl. 6. Suppl. 3. fig. 89. d. e. bis. (Var. fem.)*

Polyommate HELLÉ. LATH. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2. éd. tom. 27. p. 490.*

Polyommate HELLÉ. GOD. *Hist. nat. des Lépid. de France, tom. 2. p. 164. pl. W. XXIII. fig. 5. 6.*

Polyommate HELLÉ. GOD. *Tabl. method. des Lépid. de France, DIURNES, p. 51. n. 144.*

Il a de onze à douze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, glacé de violet, avec le disque des premières ailes fauve & coupé transversalement par des points noirs. Ses secondes ailes ont avant le bord postérieur une bande fauve dont le côté externe est crénelé & longé par une ligne blanche interrompue.

Le dessus de la femelle est comme celui du mâle, mais, en place de rellet, il a des atomes bleus à la base des premières ailes, & une série de lunules de cette couleur, puis une bande fauve à l'extrémité de toutes les ailes.

Le dessous des deux sexes est d'un jaune-orangé aux premières ailes, avec de gros points noirs à iris grisâtre. Il est d'un brun-tané aux secondes ailes, avec des points semblables, mais plus petits, & une bande terminale d'un rouge-fauve. Outre cela, l'extrémité des quatre ailes offre deux rangées transverses de lunules noires, dont les extérieures plus petites & appuyées sur un cordon de traits blanchâtres, les intérieures surmontées chacune d'un chevron blanc assez large. La frange des secondes ailes est entrecoupée de blanc & de brun, tandis que celle des premières ailes est toute blanche de part & d'autre.

On le trouve, aux mois de mai & d'août, en Allemagne & dans l'est de la France. Il se plaît dans les parties montagneuses.

163. POLYOMMATE CHRYSEIS.

Polyommatus Chryseis.

Pol. alis subintegris, supra fulvis, maris disco bipunctato margineque violaceo micante, saminæ nigro maculatis: posticis subtus fuscocinereis, punctis ocellaribus numerosis, fuscâque anguli ani rubrâ.

Papilio P. R. *Chryseis, alis aurcis, margine cœrulescente: posticis subdentatis, subtus obscurè griseis punctis ocellaribus numerosis.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n. 725.*

Hesperia R. *Chryseis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 209. n. 174.*

Papilio Chryseis. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n. 3.*

Papilio Chryseis. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 255. n. 5.*

Papilio Chryseis. BERGSTR. *Nomenkl. p. 45. tab. 68. fig. 4-5. (Mas.) fig. 6-8. (Fem.)*

Papilio Chryseis. PETAGNA, *Inf. Ent. tom. 1. p. 490. n. 155.*

Papilio Chryseis. LANG. *Verz. 2. p. 50. n. 401-402.*

Papilio Chryseis. BORKH. *Pap. Eur. part. 1.* p. 144 & 271. n^o. 4.

Papilio Euridice. BORKH. *Pap. Eur. part. 1.* p. 145 & 270. n^o. 3. — *part. 2.* p. 220.

Papilio Euridice. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1.* p. 275. n^o. 76.

Papilio Euridice. SCHNEID. *Syfl. Befchr. p. 231.* n^o. 158.

Papilio Hippothoe. ESP. *Pap. Eur. part. 1.* tab. 22. fig. 3. (Mas.) — *tab. 78. cont. 28. fig. 5.* (Fem.) — *tab. 100. cont. 55. fig. 2.* (Aber-tatio.)

Papilio Chryseis. HUBN. *Pap. tab. 68. fig. 357.* 558. — *tab. 71. fig. 555.*

Papilio Chryseis. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1.*

Argus fatiné changeant, première espèce. EN-GRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1.* p. 282. pl. 78. *Suppl. 19. fig. 95. a-g. bis.*

Polyommate Chryseis. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat. 2^e. édit. tom. 27.* p. 488.

Polyommate Chryseis. GOD. *Hist. natur. des lépid. de France, p. 198. pl. 9. secund. fig. 4. & pl. 10. secund. fig. 2.*

Polyommate Chryseis. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 51. n^o. 145.*

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau-vif, avec tout le pourtour noirâtre & glacé de bleu-violet. Le milieu de toutes les ailes est marqué d'un double point noir, & les inférieures ont sur le brun du bord terminal une ligne fauve carrément échancrée en arrière.

La femelle a le dessus des premières ailes d'un fauve-foncé, avec des points & les bords noirâtres. Le dessus de ses secondes ailes est noirâtre, avec une ligne fauve, postérieure, & semblable à celle que l'on voit sur les ailes correspondantes du mâle.

Le dessous des deux sexes est d'un cendré tirant sur le brun, avec des points noirs à iris gris. Outre cela, les premières ailes ont le milieu plus ou moins fauve, & les secondes sont traversées à leur extrémité par une bande également fauve.

Il se trouve dans les clairières des bois en juin & en août. On l'a pris plusieurs fois à quelques lieues de Paris.

164. POLYOMMATE Eurydice.

POLYOMMATUS Eurydice.

Pol. alis suprà maris fulvis, disco immaculato margineque omni nigro; feminae fuscis, nigro maculatis: subtùs lutescenti-cinereis, punctis ocellaribus numerosis basique virescente.

Papilio Euridice, alis fulvis, nitentibus, margine antico limboque lateri nigro, disco immaculato: subtùs rufis, ocellis nigris albo annulatis. ESP. *Pap. Eur. tab. 116. cont. 71. fig. 6. 7.*

Papilio Euridice. HUBN. *Pap. tab. 68. fig. 359-542.*

Papilio Eurybia. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. 2^e. édit.*

Polyommate Eurydice. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat. 2^e. édit. tom. 27.* p. 488.

Polyommate Eurydice. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2.* p. 175. pl. V. XXII. fig. 5. 6.

Polyommate Eurydice. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 51. n^o. 146.*

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau-vif, avec le contour extérieur des quatre ailes & le bord abdominal des secondes d'un brun-noirâtre. Le dessous est d'un cendré-jaunâtre, avec une multitude de points noirs à iris gris, une teinte rouffâtre au milieu des premières ailes, & une teinte verdâtre à la base des secondes.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec une dizaine de points noirs sur le disque de chaque aile. Le dessous est, à une légère nuance près, comme dans le mâle. La frange des quatre ailes est blanche dans les deux sexes.

Se trouve dans les Alpes, en juillet & en août.

Nota. Fabricius rapporte ce polyommate au *Chryseis*; cependant il y a de la différence entre l'un & l'autre, car l'*Eurydice mâle* a la bordure du dessus moins large & sans rellet, & le disque sans points noirs. L'*Eurydice femelle* n'a point de fauve en dessus; les points oculaires du dessous des deux sexes sont constamment plus petits, quoique d'ailleurs aussi nombreux que chez le *Chryseis*.

165. POLYOMMATE Hippothoe.

POLYOMMATUS Hippothoe.

Pol. alis suprà fulvis, singularum maris margine tenui lunulâque centrali, anticarum feminae maculis plurimis, nigris: subtùs cinereis, basi curvulscente, punctis ocellaribus numerosis fasciâque marginali fulvâ.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integerrimis, suprà fulvis, immaculatis: subtùs cinerascens, punctis ocellaribus numerosis. LINN. *Syfl. Nat. 2.* p. 793. n^o. 254. — *Faun. Suec. édit. 2.* p. 274. n^o. 1046.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integris, margine albo: subtùs cinereis, punctis ocellaribus numerosis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2.* p. 126. — *Mant. Inf. tom. 2.* p. 79. n^o. 725.

Hesperia R. Hippothoe. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 309. n° 172.*

Papilio Hippothoe. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n° 2.*

Papilio Hippothoe. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 252. n° 2.*

ROES. *Inf. part. 3. tab. 37. fig. 6. 7.*

NATURF. 6. p. 11.

Papilio Hippothoe. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 68. fig. 1-3.*

Papilio Hippothoe. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 143 & 270. — part. 2. p. 220. n° 2.*

Papilio Hippothoe. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 228. n° 156.*

Papilio Hippothoe. LANG. *Verz. 2. p. 50. n° 395-398.*

Papilio Hippothoe. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 32. n° 607.*

Papilio Hippothoe, var. ESP. *Pap. Extr. part. 1. tab. 58. Suppl. 15. fig. 1. a. b.*

Papilio Hippothoe fem., var. KNOCH, *Beytr. part. 2. tab. 6. fig. 3.*

Papilio Hippothoe. HUBN. *Pap. tab. 70. fig. 552-554.*

Papilio Hippothoe. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

L'Argus bronzé, var. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 43. fig. 91. c. d.*

L'Argus fatiné à taches noires. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 44. fig. 93. a. b. c.*

Polyommate Hippothoé. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 487.*

Polyommate Hippothoé. GOD. *Hist. natur. des lépid. de France, tom. 1. p. 200. pl. 9. secund. fig. 5. & pl. 10. secund. fig. 5.*

Polyommate Hippothoé. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 52. n° 147.*

Il a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau-vif, avec une petite bordure noire, entière aux premières ailes, crénelée intérieurement aux secondes. Il y a en outre une lunule noire au centre de chaque aile.

La femelle a le dessus des ailes supérieures d'un fauve-gai, avec plusieurs taches & les bords noirs. Elle a le dessus des ailes inférieures d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, placée avant le bord terminal & échancrée en arrière.

Le dessous des deux sexes est comme dans le *Chryseis*, mais les secondes ailes ont la base bleuâtre, & leur milieu offre un arc noir au lieu d'offrir deux points oculés.

Se trouve en juin, dans les endroits marécageux.

166. POLTONMATE de la Verge-d'or.

POLYOMMATUS Virgaureæ.

Pol. alis suprà fulvis, limbo nigro, maris immaculatis, feminae multimaculatis: posticis subtis pallide luteis, punctis albis, subocellaribus nigris strigatæ à maculis albis.

Papilio P. R. Virgaureæ, alis subangulatis, fulvis margine fusco, punctis atris sparjis. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 793. n° 255. — Faun. Suec. edit. 2. p. 285. n° 1079.*

Papilio P. R. Virgaureæ, alis subangulatis, fulvis margine atro: subtis punctis nigris albisque. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 126. — Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n° 724.*

Hesperia R. Virgaureæ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 309. n° 175.*

Papilio Virgaureæ. WIEN. *Verz. p. 180. fam. M. n° 1.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 97. fig. 7.*

NATURF. 6. p. 11.

Papilio Virgaureæ. SCOP. *Ent. Carn. p. 180. n° 462.*

Papilio Virgaureæ. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 137. n° 1038.*

Papilio Virgaureæ. PETAG. *Inflit. Ent. tom. 1. p. 490. n° 152.*

Papilio Virgaureæ. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 22. fig. 2. a. b.*

Papilio Virgaureæ. BERGSTR. *tab. 65. fig. 1-4.*

Papilio Virgaureæ. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 141 & 269. — part. 2. p. 220. n° 1.*

Papilio Virgaureæ. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 274. n° 75.*

Papilio Virgaureæ. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 250. n° 1.*

Papilio Virgaureæ. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 227. n° 155.*

Papilio Virgaureæ. LANG. *Verz. 2. p. 49. n° 395. 394.*

Papilio Virgaureæ. SCHWARZ, *Raupenk. p. 345.*

Papilio Virgaureæ. PANZ. *Faun. Germ. 21. 22.*

Papilio Virgaureæ. HUBN. *Pap. tab. 70. fig. 549-551.*

Papilio Virgaureæ. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 71. n° 120.*

Papilio Virgaureæ. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Phlæas. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 52.*
n°. 605.

L'Argus fatiné. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1.*
p. 187. pl. 44. fig. 92. c. d. e.

Polyommate de la Verge-d'or. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e. édit. tom. 27. p. 487.*

Polyommate de la Verge-d'or. GOD. *Hist. nat. des Lépid. de France, tom. 1. p. 202. pl. 9. secund. fig. 6. & pl. 10. secund. fig. 4.*

Polyommate de la Verge-d'or. GOD. *Tabl. méthodique des Lépidop. de France, DIURNES, p. 52. n°. 148.*

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le mâle a le dessus des ailes d'un fauve-doré-brillant, avec une petite bordure noire, entière aux supérieures, crénelée intérieurement aux inférieures.

La femelle est fauve & ponctuée de noir en dessus, mais le fond de ses ailes inférieures est plus ou moins rembruni sur le milieu.

Le dessous des deux sexes est d'un fauve-jaunâtre-pâle, avec une douzaine de points noirs légèrement ocellés. Les points des secondes ailes sont plus petits, & immédiatement suivis d'une rangée transversale de taches blanches.

La chenille est pubescente, d'un vert-foncé, avec une ligne jaune le long du dos, & des lignes d'un vert-pâle sur les côtés. Sa tête & ses pattes écailleuses sont noires. Elle vit sur la *veige-d'or* commune & sur la *patience sauvage*.

La chrysalide est d'un jaune-brunâtre, avec l'enveloppe des ailes plus foncée.

Il paraît au printemps & en été. On le trouve dans plusieurs parties de l'Europe, dans l'est de la France, &c.

167. POLYOMMATE PHLÆAS.

POLYOMMATUS Phlæas.

Pol. alis anticis cupreo-fulvis, nigro maculatis: posticis supra fuscis, fuscis crenatâ, fulvâ; subtus fusciscenti-cinereis, punctis nigricantibus singulaque flexuosa testacea.

Papilio P. R. Phlæas, alis subangulatis, fulvis, nigro punctatis: subtus albo marginatis; posticis canescentibus. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 793. n°. 252. — Faun. Suec. edit. 2. p. 265. n°. 1076.*

Papilio P. R. Phlæas, alis subintegris, fulvis, nigro punctatis: subtus canescentibus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 126. — Mant. Inf. tom. 2. p. 80. n°. 727.*

Hesperia R. Phlæas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 511. n°. 178.*

Hesperia R. Eleus, alis emarginatis, fuscis:

anticis utrinquè disco fulvo, nigro punctato; posticis fasciolâ fulvâ: subtus cinereis, nigro punctatis. FAB. *Ent. Syst. Suppl. tom. 5. p. 450. n°. 180-181. (Femelle.)*

Papilio P. R. Timeus, alis caudatis, fulvo fuscoque variis: anticis subtus punctis ocellaribus atis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 667. (Variété femelle.)*

Hesperia R. Timeus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 285. n°. 96.*

Papilio Timeus. CRAM. *pl. 186. fig. E. F. (Var. femelle.)*

Papilio Phlæas. WIEN. *Verz. p. 181. fam. M. n°. 5.*

SCHÆFF. *Icon. tab. 145. fig. 5. 4.*

ROES. *Inf. part. 3. tab. 45. fig. 5. 6.*

NATURF. *6. p. 11. tab. 1. fig. 1.*

Papilio Phlæas. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 22. fig. 1. — tab. 62. cont. 12. fig. 5. — tab. 60. cont. 10. fig. 5.*

Papilio Phlæas. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 148 & 272. n°. 7. — part. 2. p. 222.*

Papilio Phlæas. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 279. n°. 80.*

Papilio Phlæas. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 256. n°. 5.*

Papilio Phlæas. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 255. n°. 141.*

Papilio Phlæas. HUFNAG. *Tabell. im. Berl. Magaz. tom. 2. p. 80. n°. 44.*

Papilio Phlæas. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 65. fig. 5. 6.*

Papilio Phlæas. LANG. *Verz. 2. p. 51. n°. 406-409.*

Papilio Phlæas. BRAHM. *Inf. Kalend. p. 157. n°. 69.*

Papilio Phlæas. SCHWARZ, *Raupenkal. p. 179 & 344.*

Papilio Phlæas. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 157. n°. 1040.*

Papilio Phlæas. PETAG. *Instit. Ent. tom. 1. p. 490. n°. 154.*

Papilio Phlæas. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 70. n°. 125.*

Papilio Phlæas. HUBN. *Pap. tab. 72. fig. 362. 363.*

Papilio Phlæas. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Virgaureæ (sexus alter). SCOP. *Ent. Carn. p. 181.*

Papilio Virgaureæ. FUESSL. *Suiff. Inf. p.* 52. n^o. 606.

Le bronzé. GEOFF. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 65. n^o. 55.

L'Argus bronzé. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 186. pl. 45. figs 91. a. b. — pl. 72. *Suppl.* 18. fig. 91. e. g. h.

Polyommate Phléas. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. édit. p. 489.

Polyommate Phléas. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. p. 204. pl. 10. fig. 1.

Polyommate Phléas. GOD. *Tab. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p.* 52. n^o. 149.

Les hespéries rurales *Phléas, Eleus & Timeus* de Fabricius, ne font qu'une seule espèce, dont l'envergure est de douze à quatorze lignes.

Le dessus des premières ailes, chez les deux sexes, est d'un fauve-cuirreux-luisant, avec huit gros points noirs, & la côte ainsi que le bord postérieur d'un brun-noirâtre. Leur dessous est d'un fauve-jaunâtre, avec une douzaine de points noirs à iris blanc, & l'extrémité cendrée.

Le dessus des secondes ailes est d'un brun-noirâtre, avec un arc central & quelques points plus foncés, puis une bande fauve postérieure ayant les côtés crénelés. Leur dessous est d'un cendré-brunâtre, avec une quinzaine de petits points noirs épars, & une ligne flexueuse briquetée répondant à la bande fauve de la surface opposée.

Quelquefois la bande fauve du dessus des secondes ailes est surmontée de trois à quatre points bleuâtres comme dans le *Timeus* de Fabricius.

La chenille, suivant quelques auteurs, est d'un vert-clair, avec une ligne jaune le long du dos. Elle vit sur la *patience des prés*.

Ce polyommate se trouve, au printemps & à la fin de l'été, en Europe, dans l'Asie mineure & dans l'Amérique septentrionale. Il se repose principalement sur les fleurs de *renoncules*. Les individus du midi de l'Europe & même du centre de la France ont le dessus des ailes supérieures plus rembruni; & chez leurs femelles (l'*Eleus* & le *Timeus* de Fabricius), l'échancrure du bord terminal des ailes inférieures est très-prononcée, ce qui forme en quelque sorte deux petites queues. Les individus de l'Amérique septentrionale ressemblent parfaitement en dessus à ceux des environs de Paris, mais ils ont le dessous des secondes ailes d'un cendré plus clair & qui fait ressortir davantage les points noirs.

Fabricius se trompe probablement en disant que l'*Eleus* se trouve à Surinam. L'individu figuré par Cramer a été pris aux environs de Smyrne.

168. POLYOMMATE *Hylla*.

POLYOMMATUS Hylla.

Pol. alis dentatis, fulvis, nigro punctatis: posticis basi suprâ fuscis, subtus albidis. FAB.

Papilio N. P. Hylla. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 59. n^o. 572.

Papilio S. Hylla. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 253. n^o. 784.

Papilio Hyllus. CRAM. pl. 45. fig. B. C.

Fabricius a pris ce lépidoptère pour une de ces argennes qu'on nomme vulgairement *Damiers*. Quoique nous ne l'ayons pas vu, nous en parlons ici pour fixer l'attention des entomologistes & des amateurs.

Il se rapproche extrêmement du *Phléas*, mais il est plus grand; ses ailes inférieures ont le dessous blanchâtre & beaucoup plus chargé de points noirs.

Des environs de Smyrne.

Nota. Ne seroit-ce pas la femelle d'une espèce voisine du *Chryseis* ou de l'*Hippothodé*?

169. POLYOMMATE *Salustius*.

POLYOMMATUS Salustius.

Pol. alis integerrimis, fulvis, nigro variis: anticis subtus nigro punctatis, posticis cinereis fuscis maculatis. FAB.

Hesperia R. Salustius. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 310. n^o. 175.

Hypilio Salustius. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 59. fig. 1.

Il a tout-à-fait le port du *Phléas*. Le dessus des ailes est fauve, avec des points & plusieurs lignes transverses noirs. Le dessous des ailes supérieures est fauve & ponctué de noir. Le dessous des inférieures est cendré & tacheté de brun.

De l'Inde.

(Traduction de Fabricius.)

170. POLYOMMATE *Evadrus*.

POLYOMMATUS Evadrus.

Pol. alis denticulatis, suprâ fulvis, margine omni fuscâ subtriâque variegatâ: posticis subtus corticinis, cinereo maculatis.

Hesperia U. Evadrus, alis caudatis, fuscis, disco fulvo: anticis subtus punctis argenteis subocellatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 343. n^o. 306.

Papilio Pierus. CRAM. pl. 245. fig. E. F.

Papilio Nycetus. CRAM. pl. 580. fig. F. G. (Var.)

Papilio Pierus. HERBST, *Pap. tab.* 325. fig. 10. 11.

M. Latreille a reconnu le premier que le pa-

pillon urticole *Evadrus* de Fabricius étoit un polyommate.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-gai, avec une bordure d'un noir-brun, partant de l'origine des ailes supérieures, se rétrécissant entre le sommet & l'angle interne des inférieures, & offrant un entrecoupé blanc sur la frange du bord terminal des unes & des autres.

Le dessus de la femelle est d'un fauve moins gai que celui du mâle, & entièrement bordé de brun-noirâtre.

Le dessous des premières ailes est fauve dans les deux sexes, avec le pourtour extérieur d'un brun-tanné, & une douzaine de points noirs à prunelle blanche.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-tanné, plus foncé chez le mâle que chez la femelle, avec des taches cendrées, dont les intermédiaires forment parfois une sorte d'X, les postérieures tantôt séparées, tantôt réunies en une bande flexueuse. Le corps a le dessus jaunâtre, & le dessous d'un brun-tanné. Les antennes sont entièrement noirâtres.

Cette espèce nous a offert plusieurs variétés.

La première a en dessous le sommet des ailes supérieures & le fond des inférieures d'une couleur pourpre ou lie de vin; du reste elle ressemble aux mâles ordinaires.

La seconde est, comme le mâle précédent, d'une couleur lie de vin en dessous, mais ses ailes inférieures offrent des lignes blanches très-étroites, au lieu d'offrir des taches cendrées. Elle répond au papillon *Nyxetus* de Cramer.

La troisième, beaucoup plus extraordinaire que les deux autres, est une femelle. Elle a le fauve du dessus des secondes ailes coupé transversalement par une bande noirâtre. Le dessous de ses quatre ailes est parsemé de points & de chevrons d'un blanc-argenté, seulement les points de ses ailes supérieures sont un peu bordés de noir.

Du Cap de Bonne-Espérance.

171. POLYOMMATE Pétalus.

POLYOMMATUS Petalus.

Pol. alis integerrimis, supra fulvis, maculis disci lunoque postico nigris: posticis subtus nebuloso-griseis, fasciis duabus transversis albis.

Papilio Petalus. CRAM. pl. 245. fig. C. D.

Papilio Petalus. HERBST, Pap. tab. 325. fig. 8. 9.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-jaunâtre, avec quelques gros points discoïdaux, & une bordure assez large, d'un noir-brun.

Le dessous des premières ailes est de la couleur du dessus, mais il a le milieu plus tacheté de noir,

& la bordure est remplacée par des atomes noirâtres.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris piqué de brun, avec deux bandes blanches, transverses, dont l'antérieure discoïdale & fortement interrompue vers le bord interne.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être une femelle.

Du Cap de Bonne-Espérance.

172. POLYOMMATE Orus.

POLYOMMATUS Orus.

Pol. alis integris, supra fulvis (maris violaceo-nitidulis), punctis marginique nigris: posticis subtus cinereis, maculis ocellaribus obsoletis, strigâque posticâ à lunulis fuscescentibus.

Papilio Orus. CRAM. pl. 332. fig. E. F.

Papilio Orus. HERBST, Pap. tab. 324. fig. 8. 9.

Papilio P. R. Arcas, alis integerrimis, fulvis, margine punctisque nigris: posticis subtus griseis, immaculatis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. pag. 80. n°. 728.

Hesperia R. Arcas. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 311. n°. 179.

Fabricius a pris la femelle pour le mâle. Il a vu en outre des individus dont le dessous des ailes inférieures étoit effacé, ce qui l'a probablement empêché de reconnoître l'*Orus* de Cramer, dont la figure n'est pas d'ailleurs très-exacte.

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un fauve-ponceau, avec deux taches centrales, une rangée postérieure de points & le bord terminal ucirs. La rangée de points manque aux secondes ailes du mâle, mais il a un léger reflet violet.

Le dessous des premières diffère du dessus en ce que les bords sont cendrés, & en ce que les points noirs sont oculaires & qu'il y en a un de plus sur le milieu.

Le dessous des secondes ailes est cendré, avec des taches un peu plus claires, à prunelle noirâtre, & une série marginale de lunules brunâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

173. POLYOMMATE Zeuxo.

POLYOMMATUS Zeuxo.

Pol. alis caudatis, integris, disco fulvo, nigro maculato: primoribus subtus argenteo maculatis. LINN.

Papilio P. R. Zeuxo. LINN. Syll. Nat. 2. p. 789. n°. 231. — *Mus. Lud. Utr.* p. 351. n°. 149.

Papilio P. R. Zeuxo. FAB. Mant. Inf. tom. 2. pag. 82. n°. 737.

Hesperia

Hesperia R. ZEUXO. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 314. n^o. 189.

N'ayant pas vu ce polyommate, nous traduisons la description que Linné en donne dans son *Museum Ludovicæ Utricæ*.

Sa taille est moitié plus petite que celle de l'*Argus* proprement dit, en sorte qu'on doit le mettre parmi les plus petits papillons. Ses premières ailes sont noires en dessus, avec le disque largement fauve; ou plutôt elles sont d'un fauve-luisant & largement bordées de noir tout autour, avec plusieurs taches noires (environ neuf), carrées & souvent adhérentes. Leur dessous est d'un cendré-pâle, mais un peu fauve sur le milieu, avec beaucoup de taches (au-delà de dix ou douze), noires, éparpillées, ayant, à l'exception de deux ou trois qui avoisinent le bord interne, une prunelle d'un bleu-argenté-luisant.

Le dessus des ailes inférieures est comme celui des supérieures. Leur dessous est d'un cendré-obscur & sans taches.

Du Cap de Bonne-Espérance.

174. POLYOMMATE Ballus.

POLYOMMATUS Ballus.

Pol. alis integris, suprâ fuscis (fœminæ arê fulvâ): *posticis subtus ad basin viridibus oculo centrali obsolete, ad apicem carneo-cinereis sîngâ que è punctis rubris albo unatis.*

Papilio P. R. Ballus, *alis integris, fulvis, (fœminæ fuscis), margine fusco: subtus anticis nigro punctatis, posticis viridibus margine fusco.* FAB. Mant. Inf. tom. 2. pag. 80. n^o. 279.

Hesperia R. Ballus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 511. n^o. 180.

Papilio Ballus. BORKH. Pap. Eur. part. 2. p. 224. n^o. 12.

Papilio Ballus. HUBN. Pap. tab. 107. fig. 550. (Mas.) — tab. 72. fig. 560. 561. (Fœm.)

Papilio Ballus. PETAGNA, Instit. Entom. tom. 1. p. 491. n^o. 155.

Papilio Ballus. OSCHEN. Pap. Eur. tom. 1.

Polyommate Ballus. GOD. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 186. OBSERVATION.

Fabricius a connu les deux sexes de ce polyommate, mais il a pris le mâle pour la femelle, & réciproquement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre, avec la frange plus pâle, & deux petits points fauves à l'angle interne des ailes inférieures.

Le dessus de la femelle est du même brun que chez le mâle, avec un grand espace fauve sur le disque des ailes supérieures, & un espace fem-

Hist. Nat. Inf. Tome LX.

blable, mais moins large, à la région anale des inférieures.

Le dessous des premières ailes est d'un fauve plus foncé chez la femelle que chez le mâle, avec les bords bruns, la base verte, & une quinzaine de points noirs difcoïdaux, ayant pour la plupart un iris blanc.

Le dessous des secondes ailes est vert, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache centrale obscure & en majeure partie cerclée de blanc; il est d'un cendré-incarnat vers l'extrémité, avec deux rangées courbes de points blancs, dont les antérieurs moins distincts, les postérieurs appuyés chacun sur un point rouge. Le corps est d'un brun-noirâtre, avec des poils verts sur le corselet & sur le ventre. Les antennes sont noirâtres, annelées de blanc, avec le dessus de la massue ferrugineux.

En Espagne & en Italie. M. Lefebvre de Cérify l'a pris en 1825 aux environs de Perpignan.

175. POLYOMMATE de la Roncée.

POLYOMMATUS Rubi.

Pol. alis denticulatis, suprâ fuscis, nitidis: subtus viridibus, margine tenui ferrugineo sîngâ que è punctis albis.

Papilio P. R. *alis dentato-subcaudatis, suprâ fuscis, subtus viridibus.* LINN. Syst. Nat. 2. p. 791. n^o. 257. — Faun. Suec. ed. 2. p. 284. n^o. 1077.

Papilio P. R. Rubi. FAB. Spec. Inf. tom. 2. pag. 121. — Mant. Inf. tom. 2. p. 71. n^o. 670.

Hesperia R. Rubi. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 287. n^o. 102.

Papilio Rubi. WIEN. Verz. pag. 186. fam. O. n^o. 1.

SCHÆFF. Icon. tab. 29. fig. 5. 6.

NATURE. 6. p. 12. n^o. 47.

ROEM. Gen. Inf. tab. 18. fig. 11. 12.

Papilio Rubi. ESP. Pap. Eur. part. 1. tab. 21. fig. 2. — tab. 98. cont. 55. fig. 1-4. (La feuille & la chrysalide.)

Papilio Rubi. HUFNAG. Tab. im. Berl. Magaz. tom. 2. p. 82. n^o. 47.

Papilio Rubi. BERGSTA. Nomenkl. tab. 22. fig. 3. 9. — tab. 51. fig. 4. — tab. 71. fig. 7.

Papilio Rubi. ПЕРВСТ, tab. 508. fig. 5. 6.

Papilio Rubi. BORKH. Pap. Eur. part. 1. pag. 158 & 267. n^o. 5. — part. 2. p. 218.

Papilio Rubi. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 294. n^o. 102.

Papilio Rubi. LILLIG. N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 277. n^o. 1.

Papilio Rubi. SCHNEID. *Syfl. Befchr.* p. 225. n^o. 154.

Papilio Rubi. LANG. *Verz.* 2. p. 47. n^o. 382-385.

Papilio Rubi. BRAHM. *Inf. Kalend.* p. 227. n^o. 122.

Papilio Rubi. SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 17 & 49.

Papilio Rubi. FUSSL. *Suiff. Inf.* p. 51. n^o. 600.

Papilio Rubi. ROSSI, *Faun. Etr. tom.* 2. p. 156. n^o. 1035.

Papilio Rubi. SCRIBA, *Beytr.* 3. tab. 15. fig. 8-10.

Papilio Rubi. SCOP. *Ent. Carn. pag.* 176. n^o. 460.

Papilio Rubi. PETAG. *Instit. Ent. pag.* 482. n^o. 115.

Papilio Rubi. HUBN. *Pap. tab.* 72. fig. 364-365.

Papilio Rubi. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

L'Argus vert ou l'Argus aveugle. GEOFF. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 64. n^o. 54.

Argus verd. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 185. pl. 45. fig. 90. a. b. — pag. 277. pl. 72. *Suppl.* 18. fig. 90. C.

Polyommate de la Ronce. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 495.

Polyommate de la Ronce. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. p. 205. pl. 10. fig. 3. & pl. 10. *secund.* fig. 5.

Polyommate de la Ronce. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DUVRES, p.* 52. n^o. 150.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la frange blanchâtre.

Le dessous est vert & liseré de ferrugineux, avec une rangée transverse de points blancs derrière le milieu des quatre ailes ou des inférieures seulement. Ces points sont plus ou moins bordés de brun à leur côté interne, & il arrive quelquefois qu'ils manquent totalement chez des individus d'ailleurs très-frais.

Dans le mâle, le dessus des premières ailes offre vers le milieu de la côte une tache oblongue, cotoneuse, un peu enfoncée, tantôt plus colorée que le fond de l'aile, tantôt blanchâtre. Nous avons cru d'abord que ce caractère étoit propre à la femelle, mais un examen plus approfondi nous a fait reconnoître le contraire.

Le polyommate de la Ronce se trouve dans les bois de l'Europe depuis la mi-avril jusqu'à la mi-mai. Il repose sur les épinées en fleurs.

La chenille est pubescente, verte, avec un rang de taches triangulaires jaunâtres sur chacun des côtés, & une ligne blanche au-dessus des nattes. Elle vit sur la ronce, l'escarcelle, le genêt, les cytises, &c., & elle se transforme avant l'hiver. La chrysalide est brune, avec les stigmates plus clairs.

176. POLYOMMATE ROMULUS.

POLYOMMATUS Romulus.

Pol. alis integerrimis, fuscis: subtus viridibus; posticis maculâ rufâ. FAB.

Hesperia R. Romulus. FAB. *Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 316. n^o. 195.

Papilio Romulus. JOX. *Fig. pict.* 6. tab. 61. fig. 4.

Papilio Romulus. DONOV. *of an Epit. of the Nat. Hist. Insects of India, cah.* 6. pl. 1. fig. 5.

Il est un peu plus grand que le papillon de la Ronce. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre sans taches.

Le dessous est vert, sans aucune tache aux ailes supérieures, avec une ligne transverse brune & une tache postérieure rouille aux inférieures.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

177. POLYOMMATE IRUS.

POLYOMMATUS Irus.

Pol. alis denticulatis, fuscis: posticis subtus basi ferrugineis, stngis duabus obscurioribus undulatis; apice cinereo pulverulentis puncto castaneo. (MAs.)

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-noirâtre-chatoyant, avec une petite tache blanchâtre oblongue près du milieu de la côte des ailes supérieures.

Le dessous de ses premières ailes est presque de la couleur du dessus, avec deux petites lignes ferrugineuses, transverses & ondulées, sur le milieu de la surface.

Le dessous de ses secondes ailes est ferrugineux à la base, avec deux lignes flexueuses plus foncées; il est saupoudré de gris vers l'extrémité, avec un point d'un brun-marion placé vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De l'Amérique ?

178. POLYOMMATE PHILIASUS.

POLYOMMATUS Philiasus.

Pol. alis subcaudatis, nigris, subtus maculatis: posticis posticè suprâ ocellis duobus, subtus unico. LINN.

Papilio P. R. Philius. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 790. n^o. 255.

Papilio P. R. Philius. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 83. n^o. 757.

Heperia R. Philius. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 524. n^o. 229.

Nous n'avons pas vu ce Lépidoptère, mais, à en juger par la description qu'en donne Linnæus, il paroit devoir être placé ici plutôt que dans la division suivante.

Il est plus petit que l'*Argus* (n^o. 212). Le dessous des ailes est d'un brun-noirâtre. Le dessus est cendré, avec des taches noires & des taches blanchâtres. Les ailes inférieures sont un peu anguleuses vers l'angle de l'anus, & elles ont deux ou trois yeux noirs en dessus, & un seul à iris ferrugineux en dessous.

D'Alger.

179. POLYOMMATE LARA.

POLYOMMATUS Lara.

Pol. alis omnibus supra subtestaceo-fuscis, basi cœrulescenti nitidulis, angulo ani biocellatis: subtus cinereis, anticis ocellis duobus ut supra, posticis cæcis.

Papilio P. R. Lara, alis integerrimis, subtestaceis: primoribus supra uniocellatis, posticis supra biocellatis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 791. n^o. 258. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 520. n^o. 158.

Papilio P. R. Lara. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 82. n^o. 759.

Heperia R. Lara. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 515. n^o. 191.

Papilio Gorgias. STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAM. pl. 55. fig. 5 & 5 d. (Le mâle.)

Papilio Jolaus. CRAM. pl. 270. fig. F. G. (La femelle.)

Le papillon *Gorgias* de Stoll, & le papillon *Jolaus* de Cramer sont bien certainement les deux sexes du *Lara* de Linné.

Il a un pouce d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun un peu briqueté, avec un léger reflet bleu à la base, & deux yeux noirs à iris blanc à l'angle anal de toutes les ailes. La frange est de plus entrecoupée de blanc.

Le dessous des premières ailes est cendré, avec deux yeux correspondans à ceux du dessus & précédés d'une ligne transverse de taches blanches qui ont le côté interne bordé de brun-noirâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré-blanchâtre, avec deux lignes llexueuses brunâtres. L'on n'y voit point d'yeux.

Les yeux du dessus des secondes ailes sont

parfois accompagnés de petits croissans blanchâtres.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Les figures de Stoll & de Cramer sont trop grandes.

180. POLYOMMATE Symethus.

POLYOMMATUS Symethus.

Pol. alis subdentatis, supra fuscis, singularum maculâ disci albâ: posticis subtus infuscato-albidis, caracteribus nigricantibus obsolete.

Papilio P. R. Symethus, alis subcaudatis, fuscis, maculâ disci albâ: anticis apice atris. FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 69. n^o. 656.

Heperia R. Symethus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 280. n^o. 76.

Papilio Symethus. CRAM. pl. 149. fig. B. C. (Le mâle.)

Papilio Symethus. STOLL, *Pap. Suppl.* à CRAM. pl. 57. fig. 5 & 5 c.

Papilio Symethus. HERBST, *Pap. tab.* 284. fig. 5. 4.

Fabricius le dit petit, & cependant il a au moins un pouce & demi d'envergure.

Le dessus des premières ailes est d'un noir-brun, mais un peu plus clair à la base, avec une tache blanche discoïdale, ayant la partie supérieure arrondie, & l'extrémité postérieure terminée par une pointe légèrement bilobée.

Le dessous des secondes ailes est noir vers la côte, cendré vers l'extrémité, & marqué au milieu d'une liture blanche longitudinale.

Le dessous des ailes supérieures est grisâtre, avec une tache blanche, correspondant à celle du dessus, & entourée de quelques hiéroglyphes noirâtres dont les bords sont blanchâtres. Outre cela, le bord postérieur de l'aile est d'un ferrugineux-pâle & longé par une série de points noirs.

Le dessous des ailes inférieures est d'un blanc très-falé, avec des hiéroglyphes peu prononcés, & une série de points marginaux, noirâtres.

Dans la femelle, la tache blanche du dessus des premières ailes est ordinairement moins grande que dans le mâle.

Il se trouve dans l'île de Java, comme le dit Swill. Fabricius & Cramer ont cru à tort qu'il étoit de l'Amérique.

181. POLYOMMATE Phædrus.

POLYOMMATUS Phædrus.

Pol. alis integris, maris supra fulvis, margine exteriori nigro; feminae fuscis, disco albo: subtus ferruceo-albis, stigmâ marginali è punctis minutis nigris.

Papilio P. R. Phædrus, alis integerrimis,
Q q q q 2

fulvis, margine fusco : subtus albis, immaculatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n. 720.* (Le mâle.)

Hesperia R. *Phœdrus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 507. n. 165.*

Papilio P. R. *Æfopus, alis integerrimis, suprâ fuscis, maculâ albâ : subtus albis, immaculatis.* FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 79. n. 719.* (La femelle.)

Hesperia R. *Æfopus.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 507. n. 164.*

Papilio *Æfopus.* HERBST, *Pap. tab. 525. fig. 5. 4.*

Papilio *Cinyra.* CRAM. *pl. 258. fig. C.* (Le mâle.)

Papilio *Thetis.* CRAM. *pl. 258. fig. D.*

Papilio *Thetys.* DAURY, *Inf. tom. 2. pl. 9. fig. 5. 4.*

Les papillons *Phœdrus* & *Æfopus* de Fabricius ne font qu'une seule espèce, dont le premier est le mâle & le second la femelle.

Il a un pouce trois quarts d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-ponceau, avec une bordure noire, partant de la côte des ailes supérieures & se rétrécissant sur le limbe terminal des inférieures.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec le disque & la frange des quatre ailes blancs.

Le dessous de toutes les ailes est d'un blanc-faîné dans les deux sexes, avec une série de points noirs, très-menus, le long du bord postérieur. Les points sont quelquefois précédés d'une légère ligne noirâtre, tranversale & ondulée.

Le corps est brun chez le mâle & chez la femelle, avec les deux premiers articles des palpes blancs. Les antennes sont brunes, avec le bout de la massue fauve.

Du Bengale, du Coromandel, &c.

182. POLYOMMATE Térampus.

POLYOMMATUS Terampus.

Pol. alis integris, suprâ violaceo-cœruleis, limbo exteriori nigro : subtus dilutè corticinis, strigâ communi ferrugineâ ; posticis ocellò anali albo.

Il a un pouce & demi d'envergure, & il est d'un bleu-violet en dessus, avec tout le contour extérieur des premières ailes & la côte des secondes largement noirs. Les premières ailes sont en outre un peu faibles de bleu vis-à-vis du sommet.

Le dessous des quatre ailes est d'un brun-tanné-clair, avec une ligne ferrugineuse descendant du sommet des supérieures au milieu du bord interne des inférieures. Ces dernières ailes offrent à l'an-

gle de l'anus un œil blanc à prunelle noire.

Décrit d'après deux individus femelles, dont l'un appartenant au Muséum de Paris, & l'autre à M. le capitaine de Villiers.

De Java.

183. POLYOMMATE Pétavius.

POLYOMMATUS Petavius.

Pol. alis integris, suprâ nigris : anticis fusciâ obliquâ fulvâ : subtus omnibus fulvis, nigro irrotatis, punctis ocellaribus disci violaceo-cœrulefcentibus.

Papilio *Petavius.* CRAM. *pl. 565. fig. C. D.*

Papilio *Petavius.* HERBST, *Pap. tab. 526. fig. 5. 6.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande fauve, oblique, à l'extrémité des supérieures.

Le dessous est d'un jaune-fauve, aspergé de noir, avec le disque lavé de rougeâtre, & marqué de quelques petites taches oculaires d'un bleu-lilas.

Décrit d'après un individu unique.

De Java & d'Amboine.

184. POLYOMMATE Evandras.

POLYOMMATUS Evandras.

Pol. alis integerrimis, atris, utrinquè fusciâ apicali fulvâ : subtus maculâ disci violaceo-cœrulefcente.

Papilio *Evander.* CRAM. *pl. 551. fig. F. G.*

Papilio *Evander.* HERBST, *Pap. tab. 522. fig. 5. 6.*

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun un peu chatoyant, avec une bande fauve, postérieure, courbe, atteignant la côte & le bord interne. La bande des ailes supérieures est plus large & légèrement sinuée en arrière.

Le dessous ressemble au dessus, mais on remarque une petite tache d'un blanc-bleuâtre au milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu sans corps.

Il se trouve sur la côte occidentale d'Afrique.

E. Ailes inférieures sans queue extérieure & sans prolongement anal (dentées parfois chez la femelle).

«. Dessous des ailes avec plus ou moins de lignes tranversales, maculaires ou continues, & souvent accompagnées de points ocellés.

185. POLYOMMATE Hubner.

POLYOMMATUS Hubnerii.

Pol. alis integerrimis, supra fuscis, violaceo mutabilinucantibus: anticis maculâ discretâ lateâ: subâ omnibus ferriceo-albis, strigâ marginali & punctis nigris. (Mas.)

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, jetant un reflet violet qui change selon les aspects, avec une tache orbiculaire d'un jaune-fauve sur le milieu des supérieures.

Le dessous est d'un blanc-fatiné, avec une série de petits points noirs le long du bord postérieur. Il y a en outre, tantôt deux, tantôt trois points semblables, sur le disque des ailes inférieures. La frange des quatre ailes est blanche de part & d'autre. Les antennes sont noires, avec des anneaux & le bout blancs.

Décrit d'après des individus mâles, & dédié à M. Hubner qui a donné l'iconographie la plus complète que nous ayons jusqu'ici sur les Lépidoptères d'Europe, & qui publie actuellement une belle iconographie des papillons exotiques.

Il habite l'île de Timor?

* 186. POLYOMMATE Duponchel.

POLYOMMATUS Duponcheli.

Pol. alis integerrimis, supra fuscis, omnium disco albo: subtus ferriceo-albis, lineâ centrali, strigis duabus undulatis punctisque marginalibus in simplici serie fuscis.

Il a un peu moins d'un pouce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque blanc.

Le dessous est d'un blanc-fatiné, avec un trait central, puis deux lignes flexueuses & une série de points lunulés, d'un brun-noirâtre. Les ailes inférieures ont en outre deux points très-noirs, dont un vers le milieu de la côte, l'autre vers le milieu du bord interne. Les antennes sont noires, avec des anneaux & le bout de la massue blancs.

Chez certains individus, qui paroissent être des femelles, le dessus des secondes ailes offre à l'extrémité un cordon de petits anneaux blancs.

Dédié à M. Duponchel père, très-bon observateur, qui rendra un grand service aux entomologistes en publiant son excellente monographie du genre *Erotyla*.

Il habite l'île de Timor?

187. POLYOMMATE Duménil.

POLYOMMATUS Dumenilii.

Pol. alis integris, supra niveis, anticarum margine exteriori latè fusco: subtus albidis, pone medium strigis duabus undulatis punctiformi-

que fuscescentibus: posticis maculâ marginali nigeramâ. (Mas.)

Il est petit, d'un beau blanc en dessus, avec tout le contour extérieur des premières ailes largement brun, & le bord terminal des secondes longé par une ligne noire. Les premières ailes ont vers leur milieu une grande tache noire, orbiculaire & un peu enfoncée.

Le dessous des quatre ailes est d'un blanc-sale, principalement vers la base, & il offre au-delà du milieu deux lignes brunâtres transverses, dont l'antérieure légèrement ondulée & précédée d'un arc discoïdal de sa couleur; la postérieure est feston, & embrassant une série de points marginaux également brunâtres, à l'exception toutefois de l'antépénultième des secondes ailes, lequel est très-noir & beaucoup plus gros que les autres. Ces dernières ailes offrent encore un petit point noir près du milieu de la côte.

Décrit d'après un individu mâle que nous a communiqué M. P. Duménil, peintre d'histoire naturelle, & avantageusement connu par les figures de l'*Histoire des Lépidoptères de France*, & de l'*Histoire des Coléoptères d'Europe*, &c.

Des Antilles?

188. POLYOMMATE Héraldus.

POLYOMMATUS Heraldus.

Pol. alis integerrimis, caruleis, limbo atro: subtus albis, margine atro punctato. FAB.

Papilio P. R. *Heraldus*. FAB. *Munt. Inf.* tom. 2. p. 32. n°. 744.

Hesperia R. *Heraldus*. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. *part* 1. p. 517. n°. 201.

Il est de moyenne taille. Les antennes sont noires & annelées de blanc. Le dessus de toutes les ailes est d'un bleu-luisant, avec les bords d'un noir-brun, & l'origine de la côte des inférieures blanche.

Le dessous est blanc, & il offre vers le bord une rangée transverse de petites lunules noires, puis une rangée de lunules plus grandes surmontant chacune un gros point pareillement noir.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

189. POLYOMMATE Ladon.

POLYOMMATUS Ladon.

Pol. alis supra violaceo-carulescentibus (anticarum feminae apice fusco): subtus canis, pone medium strigâ flexuosâ & maculis nigris, tunc lineâ angulatâ punctisque marginalibus fuscis.

Papilio Ladon. GRAM. pl. 270. fig. D. F.

Papilio Ladon. HERBST, *Pap. fig.* 10. 11. *pl.* 324.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-pâle, avec la frange des ailes supérieures entrecoignée de brun.

Le dessus de la femelle est du même bleu que chez le mâle, avec une bande brune assez large sur le bord postérieur des premières ailes, & une série de points bruns sur le bord correspondant des secondes. Les premières ailes offrent en outre un arc noir sur leur milieu.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-bleuâtre, avec une série transverse & flexueuse de taches noires derrière le milieu, puis une ligne brune en feston, dans chacun des creux de laquelle il y a un point brun marginal. La série de taches est précédée à chaque aile d'un croissant obscur, & l'on voit à la base des ailes inférieures trois points oculaires très-noirs & des atomes bleus.

Du Cap de Bonne-Espérance.

190. POLYOMMATE *Argiolus*.

POLYOMMATUS Argiolus.

Pol. alis integerrimis, supra violaceo-cæruleiscentibus (anticarum fæminæ apice fusco) : subtus lacteo-canis, punctis simplicibus nigris.

Papilio P. R. Argiolus, alis ecaudatis, supra cæruleis, margine nigris : subtus cæruleiscentibus, punctis nigris dispersis. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 790. n°. 254. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 284. n°. 1076.

Papilio P. R. Acis, alis integris, cæruleis : subtus lacte canis, punctis oblongis nigris simplicibus. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 75. n°. 687.

Hesperia R. Acis. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 295. n°. 124.

Papilio Argiolus. DE GEER, *Mem. Inf. part.* 1. tab. 4. fig. 9-15.

Papilio Argiolus. SCOP. *Ent. Carn. pag.* 177.

Papilio Argiolus. WIEN. *Verz. p.* 184. *fam. N.* n°. 8.

Papilio Argiolus. NATURF. 6. p. 7. n°. 50.

Papilio Argiolus. ROSSI, *Faun. Etr. tom.* 2. p. 156. n°. 1036.

Papilio Argiolus. BRAHM. *Inf. Kalend. p.* 327. n°. 215.

Papilio Argiolus. SCHWARZ, *Raupenkul. p.* 178. 344. 492.

Papilio Argiolus. HERBST, *tab.* 510. *fig.* 4-6.

Papilio Argiolus. LANG. *Verz.* 2. p. 57. 490-494.

Papilio Argiolus. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 175 & 282. n°. 8. — *part.* 2. p. 254.

Papilio Argiolus. BORKH. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 285. n°. 91.

Papilio Argiolus. HUFNAG. *Tabell. im. Berl. Mag. tom.* 2. p. 72. n°. 50.

Papilio Argiolus. ILLIG. *N. Aufg. D. fl. tom.* 2. p. 266. n°. 8.

Papilio Argiolus. OSCHEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Cleobis. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 40. *Suppl.* 16. *fig.* 3. — *tab.* 54. *cont.* 4. *fig.* 4. a. b.

Papilio Cleobis. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 76. n°. 142.

Papilio Cleobis. SULZ. *Inf. tab.* 18. *fig.* 15. 14.

Papilio Cleobis. FUESSL. *Alt. Magaz. tom.* 1. *part.* 2. p. 209.

Papilio Cleobis. SCHNEID. *Syst. Besch. p.* 268. n°. 167.

Papilio Argiolus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 45. *fig.* 5-8.

Papilio Argiolus, var. BERGSTR. Nomenkl. tab. 54. *fig.* 5. 6. (La femelle.)

Papilio Therfanon. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 49. *fig.* 5. 6.

Papilio Argyphontes. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 58. *fig.* 5. 6.

Papilio Argalus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 60. *fig.* 4. 5.

Papilio Acis. ROEM. *Gen. Inf. tab.* 18. *fig.* 15. 14.

Papilio Acis. PETAGNA, *Instit. Ent. tom.* 1. p. 485. n°. 110.

Papilio Acis. HUBN. *Pap. tab.* 57. *fig.* 272-274.

Argus bleu à bandes brunes. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pag.* 178. *pl.* 41. *fig.* 86. l. m. — *pl.* 38. *fig.* 80. 1.

Polyommate *Acis.* LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat.* 2^e. *édit. tom.* 27. p. 500.

Polyommate *Argiolus.* GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. *pag.* 225. *pl.* 11. *secund. fig.* 8. & *pl.* 11. *quart. fig.* 5.

Polyommate *Argiolus.* GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p.* 59. n°. 172.

Ce polyommate est le véritable *Argiolus* de Linné. Il a près de quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet tendre, sans taches. Le dessus de la femelle est d'un bleu un peu plus pâle, avec une large bordure d'un brun-noirâtre aux premières ailes, & une série de points

de cette couleur à l'extrémité des secondes. La frange des premières ailes est entrecoupée de brun dans les deux sexes.

Le dessous des quatre ailes est conflamment d'un blanc-bleuâtre, avec un arc central, & une ligne transverse de simples points, noirs. Il y a encore d'autres points semblables à la base & à l'extrémité des secondes ailes.

La chenille, d'après M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert-jaunâtre, avec le dos foncé, la tête & les pattes noires. Elle vit sur le *nerprun-bourdaunier*.

La chrysalide est lisse, verdâtre antérieurement, brunâtre postérieurement, avec une ligne dorsale noire.

Il habite l'Europe, & il paroît en mai & à la fin de juillet. On le trouve par-ci par-là dans les bois & dans les jardins, voltigeant toujours autour des arbres & des buissons.

191. POLYOMMATE Dion.

POLYOMMATUS Dion.

Pol. alis suprà cœrulefcenti-violaceis : subtus albis, punctis simplicibus lineolisque fuscis ; posticis ocellis duobus anguli ani pupillâ cœruleâ. (Mas.)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-bleuâtre, avec une légère bordure brune & une frange blanche.

Le dessous est blanc, avec de simples points & quelques traits transversaux d'un brun-noirâtre. L'angle interne des secondes ailes offre en outre deux yeux noirs & une prunelle bleue. L'œil extérieur est bordé en avant par une lunule fauve.

Nous ne connoissons point la femelle, & nous n'avons vu qu'un mâle en mauvais état.

De l'Australasie.

192. POLYOMMATE Cassius.

POLYOMMATUS Cassius.

Pol. alis suprà maris violaceo-cœrulefcentibus, fœminæ albis anticarum limbo exteriori fusco : subtus albis nigro maculatis fasciatisque ; posticis ocellis duobus anguli ani argenteis.

Papilio P. R. Cassius, alis integerrimis, suprà albis : anticis limbo fusco, posticis fimbriâ punctatâ. FAB. Mant. inf. tom. 2. p. 82. n°. 743. (La femelle.)

Hesperia R. Cassius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 516. n°. 197. (La femelle.)

Papilio Cassius. CRAM. pl. 25. fig. C. D. (La femelle.)

Papilio Cassius. HERBST, Pap. tab. 320. fig. 6. 7. (La femelle.)

Il est petit. Le dessus du mâle est d'un bleu-vio-

let-pâle, avec la région du bord interne des secondes ailes plus ou moins blanche.

Le dessus de la femelle est blanc, avec la base des quatre ailes bleuâtre & tout le pourtour extérieur des supérieures d'un brun-noirâtre-chatoyant. Ces ailes ont en outre quelques petites taches brunes sur le dique, & les ailes inférieures sont bordées par une série de points noirs, renfermée entre deux lignes flexueuses également noires.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec une multitude de taches & de petites bandes transverses noires, & à la suite desquelles viennent une ligne en feston, & une rangée de points marginaux de cette couleur. Les deux points de l'angle anal des secondes ailes sont plus noirs que les suivants, & couverts d'atomes argentés. Les premières ailes ont à la base un trait longitudinal.

De Surinam & du Brésil.

Nota. Les auteurs n'ont connu que la femelle.

195. POLYOMMATE Clyton.

POLYOMMATUS Clyton.

Pol. alis integerrimis, suprà albo nigroque varis, basi cœruleo micante : subtus albis, maculis numerosissimis ; posticis ocellis anguli ani nullis.

Papilio Clyton. CRAM. pl. 67. fig. F. G.

Il a de très-grands rapports avec le *Rosmon*, n°. 141 ; mais il est sans queue, & ses ailes n'ont point d'yeux en dessous.

Des Indes orientales.

194. POLYOMMATE Ifarchus.

POLYOMMATUS Ifarchus.

Pol. alis suprà violaceo-cœrulefcentibus, disc. anticarum maculâ, posticarum fasciâ albis : subtus albis ; posticis fasciis duabus repandis nigris ocellisque duobus anguli ani argentatis. (Mas.)

Hesperia R. Ifarchus, alis integerrimis, cœruleis : posticis fasciâ albâ : subtus albo nigroque varis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 516. n°. 198.

Papilio Ifarchus. JON. Fig. pict. 6. tab. 34. fig. 1.

Papilio Ifarchus. HERBST, Pap. tab. 320. fig. 8. 9.

Papilio Camillus. CRAM. pl. 300. fig. A. B.

Papilio Isis. DRURY, Inf. tom. 2. pl. 5. fig. 4. 5.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec une tache blanche sur le dique des supérieures, & une

bande transverse de cette couleur sur le disque des inférieures.

Le dessous des premières ailes est blanc, avec la côte, deux lites discoïdales, deux bandes postérieures sinuées, & des points marginaux, noirs. La liture antérieure est longitudinale, tandis que l'autre est disposée dans le même sens que les bandes.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec deux bandes noires transverses, dont l'antérieure basilaire & presque en forme de palme; la postérieure sinuée & suivie d'une série marginale de points noirs. Les deux points qui avoisinent l'angle de l'anus ont un iris d'un bleu-argenté.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Cramer le dit de Sierra-Leone, & Fabricius de l'Amérique.

195. POLYOMMATE Lagus.

POLYOMMATUS Lagus.

Pol. alis integris, supra violaceis, nitidis, apice nigro; subtus cinereis, nigro venosis. (Mas.)

Hesperia R. Lagus, *alis integerrimis, cæruleis: anticis maculâ geminâ albâ: subtus cinereis nigro lineatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 306. n. 159.*

Papilio Lagus. CRAM. *pl. 117. fig. F. G.*

Papilio Lagus. HERBST, *Pap. tab. 520. fig. 1. 2.*

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-luisant, avec le sommet noir. Dans l'individu mâle que nous décrivons, les ailes supérieures ont vers le milieu du bord terminal une double tache d'un blanc-argenté, oblongue & un peu transparente.

Le dessous est cendré, avec des lignes longitudinales, & une raie transverse, noires.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

196. POLYOMMATE Erinus.

POLYOMMATUS Erinus.

Pol. alis integerrimis, supra fuscis, nitidis; subtus cinereis; anticis angulo postico puncto duabus nigris, posticus basi punctus ocellaribus obsoletis.

Hesperia R. Erinus, *alis integerrimis, fuscis: subtus cinereis; anticis angulo postico puncto gemino nigro.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 502. n. 145.*

Papilio P. R. Erinus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n. 704.*

Papilio Erinus. DONOW. *Gen. Illust. of Entom.*

part. 1. an Epit. of the Insects of New Holl. pl. 31. fig. 5. 6.

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, & sans taches.

Le dessous est cendré, avec deux taches noires arrondies à l'angle interne des ailes supérieures, & des points oculaires brunâtres peu prononcés vers la base des inférieures. Les deux taches des premières ailes sont précédées d'une ligne obscure, transverse & interrompue, & l'on remarque avant le bord postérieur des secondes, du moins quelquefois, une série de points noirs très-petits.

De la Nouvelle-Hollande, environs de port Jackson.

197. POLYOMMATE Labradus.

POLYOMMATUS Labradus.

Pol. alis integerrimis, supra violaceo-cæruleiscentibus: subtus cinereis; posticus annulis numerosis albis jusque cæruleiscente. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec le bord postérieur liseré de brun & cilié de blanc.

Le dessous est cendré, avec des anneaux blancs à l'extrémité des ailes supérieures & sur toute la surface des inférieures. Ces dernières ailes ont la base bleuâtre, mais du reste l'on n'y voit pas d'autres taches que les anneaux blancs dont nous venons de parler.

Décrit d'après un individu mâle qui n'étoit pas de la première fraîcheur.

De la Nouvelle-Hollande, environs de port Jackson.

198. POLYOMMATE Damoetès.

POLYOMMATUS Damoetes.

Pol. alis integerrimis, fuscis: subtus cinereo undatis; posticus ocello gemino aurato. FAB.

Hesperia R. Damoetes. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 305. n. 148.*

Papilio P. R. Damoetes. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n. 707.*

Papilio Damoetes. DONOW. *Gen. Illust. of Entom. part. 1. an Epit. of the Insects of New Holl. pl. 31 fig. 5. 4.*

Il est petit. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches.

Le dessous est gris, avec des ondes cendrées, & il offre vers l'angle anal des secondes ailes deux yeux noirs dont l'iris est jaune en avant, doré en arrière. L'œil intérieur est moins grand que l'extérieur.

De la Nouvelle-Hollande.

(Traduction de Fabricius.)

199. POLYOMMATE

199. POLYOMMATE Damæus.

POLYOMMATUS Damæus.

Pol. alis integerrimis, supra fuscis, nitidis: subtus griseiventibus, annulis numerosis fuscis albo cinctis; posticis ocellis duobus anguli anterioris fulvâ. (Fem.)

Il est petit. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chatoyant, sans taches aux supérieures, avec une série de petits traits bleus le long du bord terminal des inférieures.

Le dessous des quatre ailes est grisâtre, avec une multitude d'anneaux bruns cerclés de blanc. Les deux anneaux qui avoisinent l'angle anal des secondes ailes renferment chacun un œil noir à iris fauve, mais l'œil intérieur est plus petit que l'extérieur.

Nous n'avons vu que des femelles.
De Timor.

200. POLYOMMATE Catilina.

POLYOMMATUS Catilina.

Pol. alis integerrimis, fuscis, cœruleo nitentibus: subtus albo fasciatis ocellisque duobus cœruleis anguli anterioris. FAB.

Hesperia R. Catilina. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 304. n° 150.

Papilio Archias. CRAM. pl. 181. fig. C?

Il est petit. Les antennes sont noires, avec des anneaux & le bout de la massue blancs. Le corps est bleuâtre. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre à reflet bleu.

Le dessous est plus pâle que le dessus, avec plusieurs bandes blanches. L'angle interne des secondes ailes offre deux yeux, moitié bleus, moitié noirs.

Des îles de l'Amérique méridionale.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Si ce polyommate n'est pas l'*Archias* de Cramer, il parait du moins en être très-voisin. L'*Archias* a l'antépénultième bande du dessous des secondes ailes bifide & beaucoup plus large que les autres. Il se trouve à Surinam.

201. POLYOMMATE Ceraunus.

POLYOMMATUS Ceraunus.

Pol. alis integerrimis, fuscis, cœruleo micantibus: subtus emereis; posticis basi punctis ocellaribus atris apice ocello punctoque. FAB.

Hesperia R. Ceraunus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 305 n° 149.

Fabricius le décrit ainsi: il est plus petit que le *Parfimon* (n° 209), & il en diffère tout-à-fait. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre à reflet

Hist. Nat. Inf. Tome IX.

bleu, avec des points noirs marginaux aux inférieures.

Le dessous est cendré, avec des ondes blanches à l'extrémité de toutes les ailes. Les ailes inférieures offrent en outre à la base des points noirs oculaires, & vers l'angle de l'anus deux autres points noirs, dont l'extérieur à iris fauve, l'intérieur se liant à une ligne marginale également noire.

Des îles de l'Amérique méridionale.

202. POLYOMMATE Minercus.

POLYOMMATUS Minereus.

Pol. alis integerrimis, fuscis: posticis subtus punctis ocellaribus rubris ocelloque anguli anterioris. FAB.

Hesperia R. Minereus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 304. n° 151.

Papilio P. R. Minereus. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n° 703.

Il est petit. Les antennes sont brunes, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rousse. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec des taches oculaires noires sur le bord terminal des inférieures.

Le dessous est cendré, avec des taches à l'extrémité des ailes supérieures, & plusieurs points rouges à iris blanc sur les inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'angle de l'anus un œil noir cerclé de fauve.

De l'Amérique méridionale.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Si ce polyommate avoit des queues, il se placeroit entre l'*Echion* & la *Columnelle*, nos. 73 & 74.

203. POLYOMMATE Bazoche.

POLYOMMATUS Bazochii.

Pol. alis integerrimis, fuscis, posticarum supra disco cœruleo: subtus anticis fasciâ apicis securiformi albâ, posticis marmoratis. (Mas.)

Nous ne connoissons ce polyommate brésilien que par des individus mâles. Il a approchant un pouce d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun-noirâtre, avec une tache orbiculaire plus foncée vers le milieu de la surface. Le dessous des ailes inférieures est brun, avec la région du bord interne d'un bleu-violet & marquée de deux à trois points noirs près de l'angle de l'anus.

Le dessous des premières ailes est presque de la couleur du dessus, avec une bande terminale blanche, représentant à peu près une hachette. Le dessous des secondes ailes est blanchâtre, avec deux taches brunes, dont l'antérieure arrondie & placée sur le milieu de la côte, la postérieure beaucoup plus grande, avoisinant le sommet & se liant

par son côté interne à deux bandes moniformes jaunâtres qui aboutissent au bord abdominal. La frange du bord postérieur de ces ailes est blanche de part & d'autre, tandis que celle du bord correspondant des premières ailes est brune comme le fond.

Dédié à M. de Bazoche, de Falaife, favant philologue & habile naturaliste.

204. POLYOMMATE Ubaldu.

POLYOMMATUS Ubaldu.

Pol. alis suprà maris violaceo-cæruleis, femine fuscis: subtus cineris; posticis basi punctis tribus ocellaribus. nigris, tunc annulus maculisque quadratis albis, ocello anguli ani aurato.

Papilio Ubaldu. CRAM. pl. 590. fig. 1. M.

Papilio Ubaldu. HERBST, Pap. tab. 512. fig. 5. 4.

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec le limbe postérieur brun.

Le dessus de la femelle est brun, & saupoudré de bleu vers la base. Chez l'un & l'autre sexe, la frange est blanche.

Le dessous est cendré, avec des anneaux blancs, dont l'anterieur solitaire, vers l'extrémité des premières ailes. Les secondes ailes ont vers la base trois points noirs ocellés, dont le postérieur occupant le milieu de la côte. Viennent ensuite dix à douze anneaux blancs, parmi lesquels il y a une série de taches blanches quadrangulaires, & un grand oeil marginal noir, entouré d'un iris fauve & sablé de vert-doré inférieurement.

Du Coromandel, selon Cramer.

Nota. Dans le texte de Cramer, ce polyommate porte le nom d'*Ubaldu*, & dans la table celui d'*Artemidas*, mais nous avons adopté de préférence la première de ces deux dénominations.

205. POLYOMMATE Messapus.

POLYOMMATUS Messapus.

Pol. alis suprà violaceis, limbo fusco: subtus cineris, à medio ad apicem annulus distinctus albis; posticis punctis duobus costalibus nigris ocelloque anali lunulae nixæ subjecto. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est violet, avec le limbe postérieur des quatre brun, & la région anale des inférieures marquée d'un point noir bordé de fauve en avant.

Le dessous est cendré, & il est, à partir du milieu jusqu'au bout, des anneaux blancs, dont l'anterieur solitaire, les autres disposés sur trois rangs, & séparés les uns des autres. Outre cela, les secondes ailes ont trois points noirs, cerclés

de blanc: il y en a deux sur la côte, l'autre n'est que la répétition de celui qu'on voit en dessus près de l'angle de l'anus.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonne-Espérance, par M. J. Verreaux.

206. POLYOMMATE Pirithoüs.

POLYOMMATUS Pirithoüs.

Pol. alis suprà cæruleo-violaceis (femina: limbo latè fusco): subtus fuscis, à basi ad apicem catenulis albis; posticis fasciâ continuâ repandâ ocellisque duobus anguli ani violaceis.

Papilio P. R. Pirithoüs, alis ecaudatis, cæruleiscentibus: subtus undiquè fusco maculatis; ocellis posticis duobus. LINS. Syst. Nat. 2. p. 790. n.º. 255.

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-bleuâtre-lusant, sans taches dans le mâle, avec une large bordure brune dans la femelle.

Le dessous des deux sexes est d'un brun-obscur, avec des chaînettes blanches depuis la base jusqu'à l'extrémité. Avant la chaînette du bord postérieur, les secondes ailes ont une bande blanche, transversale, flexueuse, continue, & leur angle anal offre, très-près l'un de l'autre, deux grands yeux noirs sablés de violet & entourés d'un iris fauve.

De la Barbarie, par M. le professeur Desfontaines.

207. POLYOMMATE Thepsis.

POLYOMMATUS Thepsis.

Pol. alis suprà violaceo-cæruleis, limbo fusco fimbriatè variegatâ: subtus fuscis, albo tessellatis; posticis punctis duobus anguli ani aureis.

Papilio P. R. Thepsis, alis ecaudatis cæruleis: subtus undiquè albo maculatis: LINS. Syst. Nat. 2. p. 791. n.º. 256. — Mus. Lud. Ulr. p. 318. n.º. 156.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec la frange du bord postérieur entrecoupée de brun & de blanc.

Le dessus de la femelle est d'un bleu-violet vers la base, brun & ponctué de blanc vers l'extrémité, avec la frange comme dans le mâle.

Le dessous des deux sexes est brun, avec une multitude de taches blanches, quadrangulaires, & disposées en échiquier. Outre cela, les secondes ailes ont près de l'angle de l'anus deux petits points d'un vert-doré.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Linné n'a connu que le mâle.

208. POLYOMMATE Ochsenheimer.

POLYOMMATUS Ochsenheimerii.

Pol. alis supra violaceo-ceruleis, limbo fusco: subtus anticis disco fulvo reticulatoque; posticis fuscis, annulis griseis, tunc fuscis flexuosis niveis ocellisque tribus auratis.

Il a un peu plus d'un ponce d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un bleu-violet, avec le bord postérieur brun & entre-coupé de blanc à la frange.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec le pourtour extérieur obscur, quelques anneaux d'un jaune-pâle sur le disque, une ligne terneuse blanche vis-à-vis du sommet, & une série de points noirâtres le long du bord terminal.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-falé, avec des anneaux gris vers la base, une bande flexueuse très-blanche au-delà du milieu, & une rangée de cinq points noirs à l'extrémité. Les trois points qui avoisinent l'angle de l'anus sont faibles de vert-doré.

Nous avons vu trois individus, dont deux ayant la bordure brune du dessus un peu plus large; mais il nous est impossible de dire s'ils diffèrent du troisième par le sexe, attendu qu'ils paraissent tous avoir un corps rapporté.

Dédié à M. Ochsenheimer, entomologiste viennois qui a publié sur les lépidoptères d'Europe un ouvrage justement estimé.

Des Antilles ?

209. POLYOMMATE Parfimon.

POLYOMMATUS Parfimon.

Pol. alis integris, supra fuscis: subtus cinereis, annulo centrali, strigâ geminâ arcuatâ lunulisque marginalibus in duplici serie albis; posticis basi punctis ocellaribus nigris, angulo ani ocello argenteo.

Hesperia R. Parfimon, *alis integris, fuscis: subtus cinereis, albo undatis; posticis basi punctis ocellaribus nigris apiceque ocello.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 303. n. 147.*

Papilio P. R. Parfimon. *FAB. Mant. Insc. tm. 2. p. 77. n. 706.*

Papilio *Celaus*. CRAM. *pl. 579. fig. K. K.*

Fabricius n'a pas reconnu cette espèce dans Cramer.

Elle a environ dix-huit lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec la tranche du bord postérieur noire & ciliée de blanc.

Le dessous est cendré, avec un anneau central, une double ligne arquée, puis une double série de chevrons marginaux, blancs. Les ailes inférieures ont en outre à la base quatre ou cinq

points noirs cerclés de blanc, & à l'angle de l'anus une lunule fauve surmontant un œil noir à prunelle d'un bleu-argente.

La femelle a le dessous comme le mâle, mais elle s'en distingue en dessus par une tache noire au milieu des ailes postérieures, & par une lunule fauve accompagnée d'anneaux blanchâtres à l'extrémité des inférieures.

De la côte de Guinée.

Nota. Si ce lépidoptère avoit une queue, il se placeroit à côté du polyommate *Affinis* n. 137.

210. POLYOMMATE Ciffus.

POLYOMMATUS Ciffus.

Pol. alis supra ceruleo-violaceis, limbo fusco: subtus cineriscentibus, nigro ocellatis; posticis ad angulum ani fuscis abbreviatis fulvâ ocello aurato.

Ce polyommate paroîtroit devoir aller à côté du *Cnejus* (n. 155); mais comme les deux individus que nous avons vus n'ont aucun vestige de queue, nous le plaçons ici conditionnellement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un violet-blennâtre, avec le pourtour extérieur des quatre brun, & l'angle anal des inférieures chargé de quatre taches fauves, dont une plus grande & s'appuyant sur un point noir.

Le dessous est d'un cendré-pâle, avec des points noirs ocellés, dont quelques-uns basilaires, les autres disposés au-delà du milieu en une ligne courbe & transverse, derrière laquelle sont deux séries marginales de lunules blanchâtres. La série extérieure est masquée vers l'angle de l'anus par une petite bande fauve, linéaire, & marquée en dehors d'un gros point noir sur lequel sont des atomes dorés, atomes qui, chez le mâle, longent presque tout le côté externe de cette bande.

La femelle a le dessus plus pâle & un peu plus largement bordé de brun.

Du Cap de Bonne-Espérance, par M. Jules Verreaux.

211. POLYOMMATE Evippus.

POLYOMMATUS Evippus.

Pol. alis supra fuscis, basi violaceo micantibus: subtus cinereis, strigâ marginali & maculis triangularibus fulvis, intus puncto ocellari nigro, extus lineâ à caruleâ fectis.

Papilio P. R. Robois, *alis caudatis (eccaudatis), nigro caruleis: subtus cinereis, serie marginali macularum ocelliformium, introrsum albo, extrorsum fulvo inductis.* *Esp. Pap. Eur. tab. 105. cont. 58. fig. 5.*

Papilio *Roboris*. OSCHEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Evippus. HUBN. *Pap. tab.* 73. *fig.* 366. 367.

Polyommate Evippus. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e édit. tom. 27. *pag.* 486.

Polyommate Evippus. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. *pag.* 170. *pl.* V. XXII. *fig.* 1. 2.

Polyommate Evippus. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIJANES, *pag.* 49. n^o. 156.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le mâle a le dessus des ailes d'un brun-noirâtre, avec plus de la moitié antérieure des premières & la base des secondes glacées de violet-obscur. Les secondes ailes ont vers l'angle de l'anus une rangée de trois points d'un bleu-violet-luisant.

Le dessus de la femelle est comme dans le mâle, mais le violet de ses ailes supérieures est plus vif & moins prolongé sur le disque, & ses ailes inférieures offrent six points bleus marginaux au lieu de trois.

Le dessous des deux sexes est d'un gris-faîné, avec une lèvie marginale de taches fauves triangulaires, chargées chacune en dehors d'un trait bleu, & en dedans d'un point noir qui est immédiatement surmonté d'un chevron blanc. Ces taches sont presque toujours plus prononcées aux secondes ailes qu'aux premières.

En Espagne, en Portugal, dans les départements les plus méridionaux de la France. Il se repose sur les brousses.

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés, & ayant vers l'extrémité une bande transverse blanche ou blanchâtre, suivie de taches marginales ou d'une bande fauve.

212. POLYOMMATE ARGUS.

Polyommatus Argus.

Pol. alis integris, supra violaceo-cæruleis, margine lato fusco fimbriâ albâ : subtus cancellatis-cinereis, nigro ocellatis; posticis fuscâ sinuatâ fulvâ punctis argenteis notatâ. (Major.)

Papilio P. R. ARGUS, *alis ecaudatis, cæruleis: posticis subtus limbo ferrugineo ocellis cæruleo-argenteis.* LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 789. n^o. 252. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 284. n^o. 1075. (Mas.)

Papilio IDAS. LINN. *Faun. Suec. edit.* 2. p. 284. n^o. 1075. (Fæm.)

Papilio P. R. ARGUS, *alis integris: posticis subtus limbo ferrugineo ocellisque cæruleo-argenteis.* FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 123. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 74. n^o. 690. (Le mâle.)

Heesperia R. ARGUS. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. *pars* 1. p. 296. n^o. 128. (Le mâle.)

Heesperia R. Amphion, *alis integerrimis, cæruleis, nigro marginatis: subtus cinereis, nigro ocellatis; posticis lunulis rubris puncto nigro aureo notatis.* FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. *pars* 1. p. 301. n^o. 139. (Le mâle.)

Papilio P. R. ACREON, *alis integerrimis, fuscis: subtus nigro ocellatis; posticis fuscâ albâ, rubrâ sinuatâ punctum aureorum.* FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 76. n^o. 699. (La femelle.)

Heesperia R. ACREON. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. *pars* 1. p. 301. n^o. 139. (La femelle.)

Papilio ARGUS. WIEN. *Ferz.* p. 184. *sum.* N. n^o. 14.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 29. *fig.* 3. 4. — *tab.* 255. *fig.* 4. 5.

Papilio ARGUS. ROSSI, *Faun. Etr.* tom. 2. p. 156. n^o. 1055.

Papilio ARGUS. PETAG. *Inflit. Ent.* tom. 1. p. 485. n^o. 122.

Papilio ARGUS. HERBST, *tab.* 315. *fig.* 1—3.

Papilio ARGUS. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 20. *fig.* 3. 4. (Le mâle.)

Papilio LEODORUS. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 80. *cont.* 50 *fig.* 1. 2. (La femelle.)

Papilio ARGUS. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 66. n^o. 120.

Papilio LEODORUS. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 76. n^o. 154.

Papilio ARGUS. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 272. n^o. 14.

Papilio ARGUS. HUBN. *Pap. tab.* 64. *fig.* 316-318.

Papilio ARGUS. OSCHEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Papilio ARGUS. SCRIBA, *Beutr. tab.* 15. *fig.* 6. 7. (La chenille & la chrysalide.)

Papilio ARGUS. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 288. n^o. 96.

Papilio ARGUS. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 152 & 274. n^o. 1. — *part.* 2. p. 224.

Papilio ATRYGNOMON. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 152. n^o. 2.

Papilio LEODORUS. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 156. n^o. 5.

Papilio ARGUS. SCHNEID. *Syst. Befchr.* p. 255. n^o. 153.

Papilio LEODORUS. SCHNEID. *Syst. Befchr.* p. 253. n^o. 155.

Papilio LEODORUS. LANG. *Ferz.* 2. *pag.* 154. n^o. 448-451.

Papilio Alfus. LANG. *Verz.* 2. p. 155. n^o. 462-465.

Papilio Leodorus. SCHWARZ, *Raupenkal.* pag. 191 & 350.

Papilio Argus. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 52. fig. 1-4.

Papilio Argyrognomon. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 46. fig. 1. 2. — tab. 51. fig. 7. 8.

Papilio Argyrocapelus. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 46. fig. 3. 4.

Papilio Argyroela. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 46. fig. 5. 6.

Papilio Argyrocopus. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 46. fig. 7. 8.

Papilio Argyrophytax. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 56. fig. 3. 4.

Papilio Argyrobius. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 58. fig. 7. 8.

BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 121. fig. 1-5.

Polyommate Argus. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 497.

Polyommate Argus. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 215. pl. 11. fig. 1. & pl. 11. tert. fig. 4.

Polyommate Argus. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 56. n^o. 161.

Fabricius a donné le mâle de ce polyommate sous les noms d'*Argus* & d'*Amphion*, & la femelle sous celui d'*Acreon*.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec une bordure brune, assez large & garnie d'une frange blanche. La tranche de la côte est en outre blanche.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, faiblement bleu jusque vers l'extrémité, avec une térie marginale d'yeux fauves à pruëlle noire, & la frange blanche.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-clair chez le mâle, d'un cendré un peu bruniâtre chez la femelle, avec la base bleuâtre, & deux rangées transverses de points noirs oculaires, entre lesquels il y a une bande fauve, flexueuse & ayant le côté interne bordé par un cordon de lunules noires. Les points extérieurs des secondes ailes sont foupoudrés de bleu-argenté. Outre cela, le milieu de chaque aile offre un croissant noir, & celui des ailes inférieures est précédé de trois à quatre points basiliaires.

La chenille, suivant M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert-obscur, avec la tête ainsi que les pattes écailleuses noires, & plusieurs lignes ferrugineuses, dont une le long du dos,

les autres obliques & bordées de blanc. Elle vit sur la fleur du genêt & du sainfoin.

La chrysalide est svelte, verdâtre, avec le bord externe de l'enveloppe des ailes & les dernières incisions de l'abdomen ferrugineux.

On le trouve vers la fin de juillet dans les bois & les prairies. Il est commun aux environs de Paris.

213. POLYOMMATE ÆGON.

POLYOMMATUS Ægon.

Pol. alis integris, maris supra violaceo-cæruleis, margine lato fusco-fumbratâ albâ; fæminæ fuscis: subtis fusco-cinereis, nigro ocellatis; posticis fasciâ sinuatâ fulvâ, punctis argenteis notatâ. (Minor.)

Papilio Ægon. WIEN. *Verz.* p. 185. fam. N. n^o. 15.

Papilio Ægon. SCHNEID. *Syl. Besch.* p. 252. n^o. 154.

Papilio Ægon. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 272. n^o. 15.

Papilio Ægon. HUBN. *Pap.* tab. 64. fig. 513-515.

Papilio Ægon. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Papilio Ægon, alis maris supra cæruleis, fæminæ fuscis: subtis cinereis, ocellis numerosis; posticis fasciâ albâ, limbo ferrugineo & ocellis cæruleo-argenteis. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 289. n^o. 97.

Papilio Ægon. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 154 & 276. — part. 2. p. 225. n^o. 5.

Papilio Philonomus. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 166. n^o. 18.

Papilio Ægon. HERBST, tab. 315. fig. b-c.

Papilio Philonomus. HERBST, tab. 516. fig. 11-15.

Papilio Ægon. SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 187.

Papilio Alfus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 101. cont. 56. fig. 3. 4.

Papilio Philonomus & Philonome. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 44. fig. 6-8.

Papilio Agrotolus. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 47. fig. 5. 4.

Papilio Agyra. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 47. fig. 5. 6.

Papilio Argyrophalara. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 54. fig. 1. 2.

Polyommate Ægon. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 497.

Polyommate Egon. God. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 217. pl. 11. *secund.* fig. 4.

Polyommate Egon. God. *Tabl. méthod. des Lépid. de France*, DIURNES, p. 56. n^o. 162.

Il ressemble extrêmement à l'*Argus*, mais il n'a guère que dix à onze lignes d'envergure; le dessus de la femelle n'est sablé de bleu qu'à la base & il a la frange d'un blanc très-faive; le dessous des deux sexes est d'un cendré plus brun, avec les points oculaires plus gros, surtout aux secondes ailes.

Il paraît trois semaines avant l'*Argus*, & il aime particulièrement les endroits fœcs.

214. POLYOMMATE Optilète.

POLYOMMATUS Optilete.

Pol. alis integris, supra argenteo-violaceis, margine nigro fimbriâ albâ : subtus cinerascens-tibus, nigro ocellatis; posticis lunulis duabus fulvis punctisque duobus anguli ani argenteis.

Papilio P. R. Optilète, a'is integerrimis, caeruleis nitibus, margine nigricante : posticis subtus cinereis, punctis ocellaribus atris lunulisque duabus fulvis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 74. n^o. 691.

Hesperia R. Optilète. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 297. n^o. 151.

Papilio Optilète. KNOCH, *Bezir.* 1. p. 76. tab. 5. fig. 5. 6.

Papilio Optilète. BOBER. *Pap. Eur. part.* 1. p. 155 & 277. n^o. 4. — *part.* 2. p. 225.

Papilio Optilète. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 79. cont. 29. fig. 4. 5.

Papilio Optilète. PETAGNA, *Instit. Entom.* tom. 1. p. 466. n^o. 125.

Papilio Optilète. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 76. n^o. 155.

Papilio Optilète. HERBST, tab. 516. fig. 8-10.

Papilio Optilète. SCHNEID. *Syst. Befchr.* p. 259. n^o. 159.

Papilio Optilète. HUBN. *Pap. tab.* 65. fig. 510-512.

Papilio Optilète. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

L'*Argus* bleu-turquin. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. pl. 84. *Suppl.* 2. pl. 5. fig. 85. a-c. *tert.*

Polyommate Optilète. LATR. *nouv. Diç.* *d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 498.

Polyommate Optilète. God. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 193. pl. Z-XXVI. fig. 5. 4.

Polyommate Optilète. God. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 57. n^o. 165.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-argenté, avec une légère bordure noire & une frange blanche.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-argenté & une frange blanchâtre. Ses ailes inférieures ont à l'angle interne une tache fauve, qui se voit aussi dans certains mâles.

Le dessous des deux sexes est d'un cendré-clair, avec un arc central, une rangée courbe de sept points, puis deux séries marginales de lunules, noirs & bordés de blanchâtre. Il y a en outre deux ou trois points noirs ocellés à la base des secondes ailes. La première, la troisième, & parfois la quatrième, lunules extérieures de ces ailes, à compter de l'angle de l'anus, sont saupoudrées de bleu-argenté & surmontées chacune d'une tache fauve.

Il habite les Alpes, les Pyrénées, le nord de l'Allemagne, la Suède, la Russie, & il se trouve à la fin de juillet & au commencement d'août.

215. POLYOMMATE de l'Orpin.

POLYOMMATUS Telephii.

Pol. alis integris, supra fuscis, fimbriâ variegatâ singulari quâ basi & posticam anulis marginalibus molacis : subtus albis, punctis simplicibus numerosis nigris; posticis fuscâ flexuosâ, fulvâ.

Papilio Telephii, alis integerrimis, atro caeruleis, limbo nigro : subtus cinerascens-tibus, maculis plurimis quadratis nigris fuscâque in inferioribus fulvâ. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. p. 365. tab. 41. *Suppl.* 17. fig. 2. — *tab.* 94. *cont.* 49. fig. 5.

Papilio Telephii. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 76. n^o. 145.

NATURE. 9. tab. 1. fig. 4. 5.

Papilio Telephii. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 56. fig. 5. 6. — *tab.* 60. fig. 1-5.

Papilio Telephii. SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 349.

Papilio Telephii. BOBER. *Pap. Eur. part.* 1. p. 159 & 278. n^o. 9. — *part.* 2. p. 227.

Papilio Telephii. SCHNEID. *Syst. Befchr.* p. 257. n^o. 158.

Papilio P. R. Bathus, alis integris, nigris, caeruleo nitidis : subtus albidis, punctis atris numerosis; posticis fuscâ fulvâ continuâ. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 76. n^o. 697.

Papilio R. Sedi, alis caudatis (recaudatis), caeruleis, margine albo maculato : subtus albis,

maculis quadratis nigris fasciâque nîsâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 669.*

Hesperia R. Battus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 500. n°. 157.*

Hesperia R. Sedi. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 286. n°. 98.*

Papilio Bathus. PETAG. *Instit. Entom. tom. 1. p. 488. n°. 129.*

Papilio Sedi. PETAG. *Instit. Entom. tom. 1. p. 482. n°. 112.*

Papilio Battus. LANG. *Verz. 2. p. 54. n°. 454-457.*

Papilio Battus. HERBST, *tab. 519. fig. 5-7.*

Papilio Battus. V. MULLER, *Fauna Silesiaca.*

Papilio Battus. WIEN. *Verz. p. 186. Jun. N. n°. 17.*

Papilio Battus. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 275. n°. 17.*

Papilio Battus. HUBN. *Pap. tab. 66. fig. 528-550.*

Papilio Battus. OCHESEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Argus. SCOP. *Ent. Carn. p. 177.*

L'Argus brun. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 510. pl. 84. Suppl. 2. pl. 5. fig. 85. a. b. c. bis.*

Polyommate Battus. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e. édit. tom. 27. p. 498.*

Polyommate de l'Orpîu. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 195. pl. Y-XXV. fig. 7. 8.*

Polyommate de l'Orpîu. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 57. n°. 165.*

Fabricius a fait de ce polyommate deux espèces distinctes, en les rapportant aux mêmes figures du *Naturforcher* (le naturaliste), & en décrivant la même chenille pour toutes les deux.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chaotant, avec la base saupoudrée de blanc. Il y a en outre sur le limbe postérieur un cordon d'annelets blentâtres, mais manquant assez souvent aux ailes supérieures du mâle.

Le dessous des deux sexes est blanc, avec cinq lignes transverses de gros points noirs, simples, en y comprenant ceux de la frange. Les ailes inférieures ont une lunule centrale noire, & leurs deux dernières rangées de points sont séparées par une bande fauve, dont le côté externe est crénelé. Les points du milieu des premières ailes sont sensibles en dessus.

La chenille, suivant M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert de mer, avec une ligne

violâtre le long du dos. Elle se trouve en juillet sur l'orpin reprise (*sedum telephium*).

La chrysalide est courte, obtuse, verdâtre & meublée de brun. Elle passe l'hiver, & le papillon n'en sort qu'au mois de juin de l'année suivante. Il se tient dans les bois fourrés & il voltige toujours sur les buissons.

Il habite le midi de la France, le Piémont, l'Allemagne, la Russie. M. J. W. Dalman dit, dans l'extrait des Mémoires de l'Académie de Stockholm pour l'année 1816, qu'en l'a trouvé dans une île voisine de la capitale de la Suède.

216. POLYOMMATE Hylas.

POLYOMMATUS Hylas.

Pol. alis integris, supra violaceo-cærulescentibus (singularum feminae apice fusco), lunulâ mediâ nigriâ sîmbriâque variegatâ: subtus albidocinereis, punctis ocellaribus numerosis nigris; posticis fasciâ à maculis quinque fulvis.

Papilio P. R. Hylas, alis integris, lunulâ mediâ punctisqûe marginalibus nigris: subtus cinereis, punctis ocellaribus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 75. n°. 696.*

Hesperia R. Hylas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 500. n°. 156.*

Papilio Hylas. WIEN. *Verz. p. 185. Jun. N. n°. 16.*

Papilio Hylas. PETAG. *Instit. Ent. tom. 1. p. 488. n°. 128.*

Papilio Hylas. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 275. n°. 16.*

Papilio Hylas. BRAHM. *Inf. Kalend. part. 1. p. 242. n°. 157.*

Papilio Hylas. HERBST, *tab. 515. fig. 9-11.*

Papilio Hylas. HUBN. *Pap. tab. 66. fig. 525-527.*

Papilio Hylas. OCHESEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Amphion. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 53. cout. 5. fig. 1. (Le mâle.)*

Papilio Amphion. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 77. n°. 148.*

Papilio Hylactor. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 47. fig. 7. 8.*

Papilio Baton. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 60. fig. 6-8.*

Papilio Hylactor. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 160 & 278. n°. 10.*

Papilio Amphion. BORKH. *Pap. Eur. part. 2. p. 227. n°. 11.*

Papilio Amphion. BORKH. *Rhein. Musaz. tom. 1. p. 289. n°. 98.*

Papilio Amphion. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 253. n^o. 158.

Argus bleu-violet. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 176. pl. 40. fig. 85. c. f.

Polyommate Hylas. LATR. *nov. Diçl. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 497.

Polyommate Hylas. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 218. pl. 11 secund. & pl. 11. tert. fig. 5.

Polyommate Hylas. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIURNES, p. 57. n^o. 164.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-pâle, avec une bordure brune, très-étroite dans le mâle, large dans la femelle, & entrecoupée de blanc à la frange. Le milieu de chaque aile est marqué d'un petit arc noir, & il y a à l'extrémité des inférieures une série de points noirs à iris blanchâtre. Cet iris est quelquefois rouffâtre dans la femelle.

Le dessous des deux sexes est d'un cendré-blanchâtre, avec une multitude de points noirs oculaires, & la base légèrement bleuâtre. Les deux séries de points postérieures sont séparées aux secondes ailes par un cordon de cinq taches fauves presque quadrangulaires.

On le trouve, au mois d'août, dans les bois de l'Europe. Il est assez commun aux environs de Paris.

217. POLYOMMATE ORBITULUS.

POLYOMMATUS Orbitulus.

Pol. alis integris, maris supra argenteo-cinerascentibus, feminae fuscis, simbrina albâ : subtus cinereis ; anticis punctis ocellaribus numerosis, posticis maculâ cordatâ disci albâ lunulifque duabus anguli ani rufescentibus.

Papilio Orbitulus, alis cyaneo-cinerascentibus, puncto limboque nigro, simbrinâ albâ : subtus cinereis, basi rufescente ; superioribus maculis ocellaribus septem, inferioribus quatuor, maculâ mediâ albâ. Esp. *Pap. Eur. tab.* 112. cont. 67. fig. 4.

Papilio Orbitulus. DE PRUNNER, *Lepid. Pedem. Suppl.* p. 75. n^o. 158.

Papilio Orbitulus. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Meleager. HUBN. *Pap. tab.* 103. fig. 52-525.

Le papillon Orbitule. LATR. *nov. Diçtion. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 499.

Polyommate Orbitulus. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 200. pl. Y-XXV. fig. 3-4.

Polyommate Orbitulus. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIURNES, p. 57. n^o. 166.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un cendré-argenté dans le mâle, avec le bord postérieur obscur ; il est d'un brun-noirâtre dans la femelle, avec la base légèrement faupoudrée de bleuâtre. La frange est blanche chez les deux sexes, & chez la femelle le milieu des quatre ailes est marqué d'un arc noir.

Le dessous des premières ailes, dans le mâle comme dans la femelle, est d'un cendré-clair, avec beaucoup de taches noires oculaires, dont deux sur le disque, cinq à sept rangées en arc au-delà du milieu, les autres moins foncées & formant deux séries le long du bord postérieur.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré-obscur, mais un peu lavé de verdâtre à la base, avec deux points noirs ocellés sur le milieu de la côte, une tache blanche en forme de cœur au centre de la surface, & une bande transverse pareillement blanche près du bord postérieur. La bande à le côté interne très-également incisé, le côté externe bordé par une série de chevrons & par une série de petits points noirâtres. Le premier & le troisième chevrons, à compter de l'angle de l'anus, embrassent chacun une tache rouffâtre.

On le trouve, au mois de juillet, dans les Alpes & dans les Pyrénées.

218. POLYOMMATE TITUS.

POLYOMMATUS Titus.

Pol. alis integerrimis, fuscis, immaculatis : posticis subtus ocellatis strigâque posticâ maculari sulvâ. FAB.

Hesperia R. Titus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 297. n^o. 150.

Papilio Titus. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 44. fig. 2.

Fabricius le décrit ainsi : il a tout-à-fait le port de l'Argus & de l'Artaxercès. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre sans taches. Le dessous est également brun, avec une rangée postérieure de petites lignes blanches & une de petites lignes noires aux ailes supérieures, avec un arc central & une rangée transverse de points noirs à iris blanc aux inférieures. L'extrémité offre en outre une série de taches rouilles, chargées chacune d'un point noir.

De l'Écosse.

219. POLYOMMATE ARTAXERCÈS.

POLYOMMATUS Artaxerxes.

Pol. alis integris, fuscis : anticis supra puncto medio albo : subtus omnibus maculis limboque albis strigâque marginali à luyulis rufis.

Hesperia R. Artaxerxes, alis integerrimis, nigris : anticis puncto medio albo, posticis lunulis

nulis rufis : subtus margine albo rufo punctato.
FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 297.
n^o. 129.

Papilio Artaxerxes. JON. Fig. pict. 6. tab. 65.
fig. 2.

Il a près d'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une série marginale de lunules fauves, & la frange blanche. Les premières ailes ont un point blanc près du milieu de la côte, & leurs lunules fauves sont moins distinctes que celles des secondes ailes.

Le dessous est d'un brun-clair, avec des taches arrondies & une bande terminale blanches. La bande à le côté interne grossièrement denté, & elle est chargée d'un cordon de lunules fauves, bordées chacune en avant par un arc noir, & en arrière par un point également noir. Les taches blanches des premières ailes sont au nombre de six, dont l'antérieure placée solitairement au-delà du disque, les autres formant une rangée courbe près de la bande marginale. Les taches des secondes ailes sont au nombre de onze, savoir : quatre basilaires, une discoidale ressemblant un peu à un marteau, six disposées en arc près de la bande terminale, mais de manière cependant que les deux supérieures sont isolées des inférieures.

Décrit d'après un individu femelle appartenant à M. Latreille.

Il est probable que Fabricius a vu le mâle, car le dessous de toutes les ailes est cendré dans l'individu qu'il décrit, tandis qu'il est d'un brun-clair dans le nôtre.

De l'Ecosse.

7. Dessous des ailes avec des points ocellés. Celui des intérieures offrant au-delà du milieu une tache blanche longitudinale, suivie de taches marginales fauves.

220. POLYOMMATE Aegestis.

POLYOMMATUS Aegestis.

Pol. alis integris, supra fuscis, nitidis : subtus cinereis, nigro multiocellatis : omnibus utrinque fuscis subterminali à maculis rubris fimbriataque variegatâ.

Papilio Aegestis. WIEN. Verz. p. 184. fam. N. n^o. 13.

Papilio Aegestis. ILLIG. N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 271. n^o. 13.

Papilio Aegestis. HUBN. Pap. tab. 62. fig. 303-306.

Papilio Aegestis. OSCHEN. Pap. Eur. tom. 1. Hist. nat. Inf. Tome LX.

Papilio Alexis. Scop. Ent. Carn. p. 179. var. 1.

Papilio Medon, alis supra fusco-nigricantibus, fuscis utrinque macularibus fuscis ad marginem : subtus punctis ocellaribus numerosis.
BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 291. n^o. 99.

Papilio Medon. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 165. n^o. 14. — part. 2. p. 250.

Papilio Medon. SCHNEID. Syst. Besch. p. 247. n^o. 149.

Papilio Medon. HERBST, Pap. tab. 213. fig. 4-7.

Papilio Medon. HUFNAG. Tabell. im. Berl. Magaz. tom. 2. p. 78. n^o. 41.

Papilio Medon. ESP. Pap. Eur. part. 1. tab. 32. Suppl. 3. fig. 1. — tab. 53. cont. 5. fig. 7.

Papilio Medon. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. pag. 74. n^o. 151.

Papilio Asturche. BERGSTA. Nomenkl. tab. 49. fig. 7. 8.

Papilio Alexis. NATURF. 6. p. 22. n^o. 9.

Papilio Medon. NATURF. 6. p. 10. n^o. 41.

L'Argus bleu. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 168. pl. 38. fig. 80. c. d. e. f.

Polyommate Aegestis. LATR. nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e. edit. tom. 27. p. 496.

Polyommate Aegestis. GON. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 215. pl. 10. fig. 4. & pl. 11. tert. fig. 5.

Polyommate Aegestis. GON. Tabl. méth. des lépid. de France, DIURSES, p. 53. n^o. 151.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec une bande presque terminale de taches d'un roux-foncé, & la frange variée de blanc & de brun. Les taches rousses du dessus des secondes ailes s'appuient chacune sur un gros point noir.

Le dessous est d'un cendré légèrement brunâtre, avec une multitude de points noirs oculaires, & une bande de taches rousses répondant à celle du dessus. Les premières ailes n'ont aucun œil avant le point central. Les secondes ailes ont les deux points antérieurs de la série du milieu très-rapprochés & séparés des autres.

Ce polyommate se distingue de la femelle de l'*Alexis*, en ce que le dessus de ses ailes n'est point saupoudré de bleu à la base; en ce que la frange est variée de brun; enfin, en ce que les deux points antérieurs de la rangée du milieu de ses secondes ailes en dessous sont très-voisins l'un de l'autre.

Dans les bois & dans les prairies de l'Europe, au printemps & en été.

221. POLYOMMATE *Ageflor.**POLYOMMATUS Ageflor.*

Pol. alis integris, supra fuscis, nitidis: subtus cinerascens, nigro multiocellatis; posticarum ocellis marginalibus ad angulum ani argentatis: omnibus intrinquè fuscis subterminali è maculis fulvis fimbriatæ variegatâ. (Fœmina.)

Sous le rapport de la couleur & du dessin, la femelle de ce polyommate ressemble à l'*Ageflis*, mais elle est beaucoup plus grande; la bande fluve maculaire de l'extrémité de toutes ses ailes est moins vive & moins large; enlin, les yeux noirs marginaux qui avoisinent en dessous l'angle anal de ses ailes inférieures sont faibles de bleu-argenté.

Nous avons vu cinq femelles & pas un seul mâle.

Trouvé d'abord dans la Lozère par M. Dupouchel père, puis dans les environs de Toulon par M. Alexandre Lefebvre.

222. POLYOMMATE *Alexis.**POLYOMMATUS Alexis.*

Pol. alis integris, supra maris violaceo-cæruleis, fœmiæ fuscis, fimbriâ albâ: subtus cinereis, basi viriscente, punctis ocellariis numerosis fuscisq; marginali è maculis fulvis.

Papilio Alexis. WIEN. *Verz.* p. 184. *fam.* N. n°. 12.

Papilio Alexis. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 271. n°. 12.

Papilio Alexis. BRAHM. *Inf. Kalend.* p. 462. n°. 525.

Papilio Alexis. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 287. n°. 94.

Papilio Icarus. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 161 & 278. n°. 12. — *part.* 2. p. 227.

Papilio Icarus. NATURE. 6. p. 21. n°. 8.

Papilio Icarus. SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 186. n°. 175. — p. 347. n°. 565.

ROES. *Inf. part.* 3. *tab.* 37. *fig.* 5-5.

SCHÆFF. *Icon.* *tab.* 153. *fig.* 6. 7. (Fœm.)

Papilio Alexis. SCOP. *Ent. Carn.* p. 179. *var.* 2.

Papilio Alexis. HÜBN. *Pap.* *tab.* 60. *fig.* 292-294.

Papilio Alexis. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Papilio Icarus. HERBST, *Pap.* *tab.* 312. *fig.* 10-12.

Papilio Alexis. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 244. n°. 147.

Papilio Polyphemus. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 250. n°. 156.

Papilio Thetis mas. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 52. *Suppl.* 8. *fig.* 2. (Fœm.)

Papilio Icarus mas. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 52. *Suppl.* 8. *fig.* 4.

Papilio Polyphemus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 50. *Suppl.* 26. *fig.* 2. 3. (Fœm.)

Papilio Polyphemus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 55. *cont.* 5. *fig.* 5. (Var. mas.)

Papilio Polyphemus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 79. *cont.* 29. *fig.* 2. (Var. fœm.)

Papilio Polyphemus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 92. *cont.* 42. *fig.* 3. (Larva.)

Papilio Thetis. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 74. n°. 154.

Papilio Icarus. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 74. n°. 153.

Papilio Polyphemus. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 77. n°. 146.

Papilio Ageflis. LANG. *Verz.* 2. p. 54. n°. 459-445.

Papilio Candybus. BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 48. *fig.* 1. 2. (Mas.)

Papilio Candaon. BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 49. *fig.* 3. 4. (Mas.)

Papilio Pampholyge. BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 47. *fig.* 1. 2. (Fœm.)

Papilio Candiope. BERGSTR. *Nomenkl.* *tab.* 48. *fig.* 3. 4. (Fœm.)

L'Argus bleu. GEOFF. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 61. n°. 50. (Le mâle.)

L'Argus brun. GEOFF. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 63. n°. 52. (La femelle.)

Argus bleu. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. *pl.* 58. *fig.* 80. g. h. (Le mâle.)

Argus bleu-violet. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. *pl.* 40. *fig.* 85. a. b. (La femelle.)

Polyommate Alexis. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2^e. *édit.* tom. 27. p. 495.

Polyommate Alexis. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 212. *pl.* 11. *secund.* *fig.* 3.

Polyommate Alexis. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 53. n°. 152.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet. Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu, & l'extrémité longée par une

férie de taches fauves, qui s'appuient aux secondes ailes sur des points noirs oculaires. Dans l'un & dans l'autre sexe, la frange est entièrement blanche.

Le dessous des quatre ailes, chez les deux sexes, est cendré, avec la base verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, & une bande marginale de taches fauves. Les deux points antérieurs de la rangée du milieu des secondes ailes sont notablement séparés l'un de l'autre.

La chenille est pubescente, verte, avec le dos plus foncé. Elle vit sur la luzerne, le tréste, la bugrane épineuse, l'astragale à feuilles de réglisse, &c.

La chrysalide est d'un gris-brun, avec le bord postérieur de l'enveloppe des ailes plus obscur.

Commun dans presque toute l'Europe, au printemps & en été.

225. POLYOMMATE Adonis.

Polyommatus Adonis.

Pol. alis integris, supra maris rubescenti-azuræis, læminæ fuscis, fimbriâ variegatâ: subtus fuscescentibus, basi virescente, punctis ocellaribus numerosis fuscisâque marginali à lunulis fulvis.

Papilio P. R. Adonis, alis integris, cæruleis, strigâ marginali atrâ: subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis; postlicis maculâ centrali albâ. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 75. n.º 694.

Hesperia R. Adonis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 299. n.º 154.

Papilio Adonis. WIEN. Verz. p. 184. fam. N. n.º 11.

SCHÆFF. Icon. tab. 98. fig. 5. 4.

Papilio Adonis. LANG. Verz. 2. p. 53. n.º 425-429.

Papilio Adonis. ROSSI, Faun. Etr. tom. 2. p. 156. n.º 1053.

Papilio Adonis. PETAGNA, Instit. Ent. tom. 1. p. 487. n.º 126.

Papilio Adonis. ILLIG. N. Auß. Dess. tom. 2. p. 270. n.º 11.

Papilio Adonis. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Adonis. HUBN. Pap. tab. 61. fig. 298-300.

Papilio Ceronus. HUBN. Pap. tab. 61. fig. 295-297.

Papilio Adonis. HERBST, Pap. tab. 512. fig. 7-9.

Papilio Ceronus. HERBST, Pap. tab. 514. fig. 7-9.

Papilio Adonis. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 286. n.º 93.

Papilio Bellargus. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 157 & 277. n.º 6. — part. 2. p. 226.

Papilio Thetis. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 162 & 279. n.º 13. — part. 2. p. 228. fig. 6-8.

Papilio Thetis. SCHNEID. Syst. Besch. p. 259. n.º 144.

Papilio Bellargus. SCHNEID. Syst. Besch. p. 245. n.º 148.

Papilio Bellargus. SCHNARZ, Raupenkal. p. 547. n.º 364.

Papilio Bellargus. V. MULLER, Faun. Silesiaca.

Papilio Thetis. NATUREL. 6. p. 24. n.º 11.

Papilio Bellargus. NATUREL. 6. p. 25. n.º 12.

Papilio Oceanus. BERGSTR. Nomenkl. tab. 53. fig. 5. 4.

Papilio Bellargus. BERGSTR. Nomenkl. tab. 53. fig. 5. 6.

Papilio Salacia. BERGSTR. Nomenkl. tab. 50. fig. 1. 2.

Papilio Venilia. BERGSTR. Nomenkl. tab. 50. fig. 3. 4.

Papilio Bellargus. ESP. Pap. Eur. part. 1. tab. 52. Suppl. 8. fig. 5. — tab. 55. cont. 5. fig. 2. 5. 6. (Mas.) fig. 4. (Fœm.)

Papilio Ceronus. ESP. Pap. Eur. part. 1. tab. 90. cont. 40. fig. 2. — tab. 102. cont. 57. fig. 1.

Papilio Bellargus. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 74. n.º 152.

Papilio Ceronus. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 79. n.º 159.

Argus bleu-céleste. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 175. pl. 39. fig. a-1.

Polyommate Adonis. LATR. nouv. Diç. d'Hist. nat. 2.º. édit. p. 495.

Polyommate Adonis. GOD. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 210. pl. 11. second. & pl. 11. tert. fig. 2.

Polyommate Adonis. GOD. Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 54. n.º 153.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-d'azur tirant un peu sur le violet. Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu, & l'extrémité longée par une série de taches fauves qui s'appuient aux secondes ailes sur des points noirs oculaires. Dans l'un & l'autre sexe, la frange est entrecoupée de blanc & de noir.

Le dessous des deux sexes est brunâtre, mais plus foncé aux secondes ailes qu'aux premières, avec la base verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, & une bande marginale de lunules fauves. Le deuxième point postérieur de la rangée du milieu des secondes ailes est beaucoup plus en avant que les autres, & les lunules fauves sont bordées de noir & de blanc à leur côté interne.

La femelle de l'*Adonis* ne se distingue en dessus de celle de l'*Althis* que par l'entrecoûpé de la frange.

La chenille est pubescente, verte ou brunâtre, avec une ligne dorsale plus foncée & comprise entre deux rangs de taches fauves triangulaires. Elle vit principalement sur le *genêt herbacé*, dont elle ne mange que la fleur.

La chrysalide est d'un gris-verdâtre.

Dans les prairies & les clairières des bois de l'Europe, au printemps & en été:

224. POLYOMMATE DORYLAS.

POLYOMMATUS Dorylas.

Pol. alis integris, supra maris azureis, fæmine fuscis, fimbriâ albâ : subtis fusciscentibus, basi virescente, punctis ocellaribus numerosis, fasciâ à maculis sagittatis fulvis margineque postico albicante.

Papilio P. R. Dorylas, alis integris, cæruleis (fuscis) : subtis cinereis ; anticis puncto medio strigâque posticâ punctorum ocellatorum. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 75. n. 695.*

Hesperia R. Dorylas. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 299. p. 155.*

Papilio Dorylas. WIEN. *Verz. p. 522. fam. N. n. 19.*

Papilio Dorylas. ROSSI, *Faun. Etr. Mant. tom. 2. p. 12. n. 555.*

Papilio Dorylas. PÉTAG. *Instit. Entom. tom. 1. p. 488. n. 127.*

SCHEFF. *Icon. tab. 214. fig. 1. 2. (Mas.)*

Papilio Dorylas. LLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 270. n. 11. 12.*

Papilio Dorylas. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Dorylas. HUBN. *tab. 60. fig. 289-291.*

Papilio Dorylas. HERBST, *Pap. tab. 514. fig. 1-5.*

Papilio Dorylas. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 283. n. 95.*

Papilio Hylas. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 157 & 277. n. 7. — part. 2. p. 226.*

Papilio Hylas. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 241. n. 145.*

Papilio Hylas. LANG. *Verz. 2. p. 53. n. 450-455.*

Papilio Argestes. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 58. fig. 5. 4. (Mas.)*

Papilio Argestes alter. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 61. fig. 1. 2. (Mas.) fig. 5. 4. (Fæm.)*

Papilio Hylas. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 45. Suppl. 21. fig. 5. (Mas.)*

Papilio Thetis. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 52. Suppl. 9. fig. 5. (Fæm.) — tab. 55. cont. 5. fig. 1. (Fæm.)*

Papilio Hylas. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 76. n. 145.*

L'Azuré. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 509. pl. 83. Suppl. 2. pl. 4. fig. 82. a, b, c, d. bis.*
Polyommate Dorylas. LATR. *nov. Diction. d'Hist. nat. 2. édit. tom. 27. p. 494.*

Polyommate Dorylas. GOD. *Hyll. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 195 & 194. OBSERVATION.*

Polyommate Dorylas. GOD. *Tab. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 54. n. 154.*

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessous du mâle est d'un bleu-d'azur, sans mélange de violet, avec le bord postérieur plus largement liseré de noir que chez l'*Adonis*. Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu, & l'extrémité longée par une série de lunules fauves. Dans l'un & l'autre sexe, la frange est toute blanche.

Le dessous du mâle comme de la femelle est brunâtre, avec la base verdâtre, une multitude de points noirs ocellés, une bande de taches fauves en fer de flèche, & le bord postérieur blanchâtre. Les premières ailes n'ont aucune tache, du moins ordinairement, entre la base & le point central. Le pénultième & l'antépénultième points de la rangée du milieu des secondes ailes sont plus en avant que les autres, & les taches fauves de ces mêmes ailes ne sont point bordées à leur côté interne.

En Allemagne, en Italie. — M. Alexandre Lefebvre l'a pris, au mois de juin, dans les environs de Barège.

225. POLYOMMATE TITHONUS.

POLYOMMATUS Tithonus.

Pol. alis integris, supra argenteo-cæruleis, rubido nitidulis, margine crenato nigro fimbriâ albâ : subtis cinereis, punctis ocellaribus numerosis fasciâque marginali à lunulis fulvis. (Mas.)

Papilio Tithonus. HUBN. *Pap. tab. 108. fig. 553. 556.*

Papilio Eros. OCHSENH. *Pap. Eur. tom. 1. édit. 2.*

Polyommata Tithonus. GODART, *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 195 & 194. OBSERVATION.

Polyommata Tithonus. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 54. n^o. 155.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argenté chatoyant en rougeâtre, avec une bordure crénelée, ainsi que l'extrémité des nervures, noires, & la frange toute blanche.

Le dessous est cendré, avec une multitude de points noirs oculaires, & une bande marginale de lunules fauves. La tache centrale des premières ailes est précédée de deux points noirs placés l'un au-dessus de l'autre. Les points de la rangée du milieu des secondes ailes sont tous disposés sur une ligne courbe.

La femelle nous est inconnue.

Dans les montagnes alpines, en juin.

226. POLYOMMATE TRITON.

POLYOMMATUS Triton.

Pol. alis integerinis, cærulescentibus, subtus strigâ ferragineâ punctisque numerosis nigri.
FAB.

Papilio P. R. Triton. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 74. n^o. 692.*

Hesperia R. Triton. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 293 n^o. 152.*

N'ayant pas vu ce lépidoptère, nous le donnons d'après Fabricius, qui, selon toute apparence, n'a décrit que le mâle.

Il est de moyenne taille, d'un bleu-pâle en dessus, avec un petit liseré noir.

Le dessous de les quatre ailes est cendré : celui des supérieures offre plusieurs points noirs faiblement ocellés, dont l'anérieur central, les autres situés à l'extrémité, & précédés d'un rang de taches ferrugineuses. Le dessous de les ailes inférieures a une multitude de points noirs, & une bande postérieure ferrugineuse.

De la Russie méridionale.

Nota. Si par hasard ce polyommate n'avoit pas de tache blanche longitudinale sur le dessous des secondes ailes, il faudroit le mettre dans la subdivision suivante, à côté de *Icarius*.

227. POLYOMMATE Coryden.

POLYOMMATUS Coryden.

Pol. alis integris, supra virescenti-argenteis, margine ocellato sinubusque variegatâ : subtus cinereis, punctis ocellariis numerosis ; postlicis basi virescente sericeque marginali è lunulis fulvis.

Papilio P. R. Corydon, *alis integris, cæruleo-argenteis, margine nigro : subtus cinereis, punc-*

tis ocellaribus ; postlicis maculâ centrali albâ.
FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 74. n^o. 693.*

Hesperia R. Corydon. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 293. n^o. 153.*

Papilio Corydon. WIEN. *Verz. p. 184. fam. N. n^o. 10.*

KLEMMER, *Beitr. tab. 14. fig. 3. 4.*

SCHNEF. *Icon. tab. 93. fig. 5. (Mas.) — tab. 276. fig. 1. 2. (Fem.)*

NATUREL. 5. p. 19. n^o. 11.

Papilio Corydon. BORCKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 153 & 277. n^o. 8. — part. 2. p. 227.*

Papilio Corydon. BORCKH. *Rhem. Magaz. tom. 1. p. 266. n^o. 92.*

Papilio Corydon. ROSSI, *Faun. Etr. Mant. tom. 2. p. 12. n^o. 354.*

Papilio Corydon. SCOP. *Ent. Carn. p. 179.*

Papilio Corydon. PETAG. *Instit. Ent. tom. 1. p. 487. n^o. 125.*

Papilio Corydon. ILLIG. *N. Aufg. Dcß. tom. 2. p. 269. n^o. 10.*

Papilio Corydon. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 49. fig. 1. 2. (Mas.)*

Papilio Corydonis. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 59. fig. 5-8. (Fem.)*

Papilio Corydon. HUBS. *Pap. tab. 59. fig. 286-288.*

Papilio Corydon. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Corydon. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 242. n^o. 146.*

Papilio Typhis. SCHNEID. *Syfl. Besch. p. 251. n^o. 157.*

Papilio Corydon. LANG. *Verz. 2. p. 55. n^o. 454-458.*

Papilio Corydon. HERBST, *tab. 313. fig. 1-5.*

Papilio Corydon. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 55. fig. 4. (Mas.) — tab. 79. cont. 29. fig. 1. (Fem.)*

Papilio Tiphys. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 51. fig. 4.*

Papilio Corydon. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 75. n^o. 156.*

L'Argus bleu, variété 1. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 62.*

Argus bleu-nacré. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 174. pl. 39. fig. 83. a-d. (Le mâle.)*

Argus bleu-nacré. ENGRAM. *Pap. d'Europe,*

tom. 1. p. 276. pl. 71. Suppl. 17. fig. 85. e. (La femelle.)

Polyommate Corydon. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e édit. tom. 27. p. 494.

Polyommate Corydon. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 208. pl. 11 *secund.* & pl. 11 *tert.* fig. 1.

Polyommate Corydon. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIURNES, p. 54. n^o. 156.

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté chatoyant en verdâtre, avec une ligne noire marginale, immédiatement surmontée d'un rang de points noirâtres à iris blanchâtre.

Le dessus de la femelle est tantôt brun & plus ou moins saupoudré de bleu; tantôt comme chez le mâle, avec la bordure plus large & l'iris des points ocellés des secondes ailes lavé de fauve du côté qui regarde le corps. Dans l'un & dans l'autre sexe, la frange est entre coupée de blanc & de noir.

Le dessous est cendré chez le mâle & chez la femelle, avec une multitude de points noirs oculaires, dont trois ou quatre alignés transversalement avant la tache centrale des premières ailes. Les secondes ailes ont la base verdâtre, & leur extrémité offre une série de sept à huit lunules fauves ayant le côté interne bordé par un chevron noir.

On le trouve dans les bois, les prairies & les jardins de l'Europe, à la fin de juillet & dans le courant d'août.

228. POLYOMMATE Méléagre.

POLYOMMATUS Meleager.

Pol. alis dentatis, supra argenteo-cæruleis, rubido nudatis, margine nigro sintriâ albâ: subtis maris albidis, feminae fuscescentibus, punctis ocellaribus nigris lunulâ/que marginalibus in duplici serie albidis.

Papilio L. R. Meleager, *alis dentatis, caruleis, limbo nigro: subtis canis, punctis ocellaribus nigris.* FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 71. n^o. 679.

Hesperia R. Meleager. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 292. n^o. 116.

Papilio Meleager. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. tab. 45. *Suppl.* 21. fig. 2. — tab. 62. *cont.* 12. fig. 1.

Papilio Meleager. PANZER, *Faun. Germ.* 1. 5.

Papilio Meleager. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 265. n^o. 164.

Papilio Meleager. HERBST, *t. b.* 311. fig. 1-3.

Papilio Meleager. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 76. n^o. 144.

Papilio Meleager. BERGTR. *Nomenkl. tab.* 55. fig. 3. 4.

Papilio Daphnis. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 58. fig. 1. 2.

Papilio Meleager. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 171 & 282. n^o. 5. — *part.* 2. p. 254.

Papilio Daphnis. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 171 & 282. n^o. 4. — *part.* 2. p. 254.

Papilio Entemnon. LANG. *Verz.* 2. p. 56. n^o. 480-482.

Papilio Endymion. WIEN. *Verz.* p. 182. *fam.* N. n^o. 1.

Papilio Daphnis. WIEN. *Verz.* p. 182. *fam.* N. n^o. 2.

Papilio Endymion. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 262. n^o. 1.

Papilio Daphnis. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 262. n^o. 2.

Papilio Daphnis. HUBN. *Pap. tab.* 58. fig. 280-282.

Papilio Daphnis. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Argus bleu découpé. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 172. pl. 58. fig. 81. a. b.

Argus bleu-pâle. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 175. pl. 40. fig. 84. a. b.

Polyommate Méléagre. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e édit. tom. 27. p. 495.

Polyommate Méléagre. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 187. pl. X-XXIV. fig. 1-4.

Polyommate Méléagre. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIURNES, p. 55. n^o. 157.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté chatoyant en rougeâtre, avec le bord postérieur liseré de noir & garni d'une frange blanche. Le dessous est blanchâtre, avec une ligne courbe de points noirs ocellés, après laquelle il y a deux séries transverses de lunules obscures, dont les extérieures plus petites & moins distinctes. Le milieu des premières ailes est marqué d'un arc noir, & la base des secondes est bleuâtre, avec trois points ocellés précédant ceux dont nous avons parlé.

Le dessous de la femelle est plus brillant que celui du mâle, avec tout le pourtour extérieur ainsi que l'extrémité des nervures largement noirs, & la frange d'un blanc-sale. Le noir du bord est chargé de deux séries de chevrons blanchâtres, plus grossiers aux premières ailes qu'aux secondes, & il y a sur chacune des quatre ailes un trait noir vaguement entouré de blanc. Le dessous offre les mêmes caractères que chez le mâle,

mais le fond est brunâtre, & les lunules obscures de l'extrémité sont surmontées de chevrons blanchâtres, dont l'anale embrassant une petite tache rouffâtre aux ailes inférieures. Ces dernières ailes n'ont pas de bleu à la base, & l'on voit sur leur milieu deux taches blanches, dont l'une presqu'en forme de cœur, l'autre longitudinale & coupant la ligne de points oculaires.

Les mâles sont d'ordinaire plus grands que les femelles.

Il se trouve aux mois de juillet & d'août, dans la Lozère, les Cévennes, en Italie, en Allemagne, &c.

Nota. Le Méléagre n'appartient à cette subdivision que par la femelle, car le dessous des ailes inférieures du mâle n'offre pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures offrant des lunules marginales fauves, mais n'ayant pas de tache blanche longitudinale au-delà du milieu.

229. POLYOMMATE Agathos.

POLYOMMATUS Agathon.

Pol. alis subdentatis, supra argenteo-ceruleis, rufescenti nitidulis, margine nigro-fimbriatâ albâ : subtus cineriscentibus, punctis ocellaribus ; posticus basi rufescente lunulisque quatuor analibus fuis. (Mûs.)

Polyommate Agathon. *God. Tabl. méth. des Esp. de France, Dignes, p. 55. n. 158.*

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-argenté chatoyant en verdâtre, avec l'extrémité des nervures ainsi que le bord postérieur noirs, & la frange blanche.

Le dessous est d'un cendré-pâle, avec la base verdâtre, une lunule centrale, puis une rangée de points oculaires noirs aux premières ailes, trois rangées de points oculaires & un arc central aux secondes. La rangée de points des premières ailes est suivie d'un double cordon marginal de lunules obscures, dont les postérieures plus grandes & plus apparentes. Les points du bord terminal des secondes ailes sont surmontés d'une série de petits chevrons noirâtres, dont les quatre plus intérieurs embrassant chacun une lunule fauve.

Trouvé, au mois d'août, dans la vallée de Barège par M. Alexandre Lefebvre de Paris.

Nota. Si la femelle, que nous ne connoissons pas, avoit une tache blanche longitudinale sur le dessous des secondes ailes, il faudroit mettre ce polyommate dans la subdivision précédente, après le Méléagre.

230. POLYOMMATE Icarus.

POLYOMMATUS Icarus.

Pol. alis integris, supra violaceo-ceruleis, argenteo nitidulis, margine fusco fimbriâ albâ : subtus cineris, lunulâ centrali strigata punctorum ocellatorum ; posticus fuscâ maculari fulvâ & pone hanc serîe à punctis marginalibus nigris.

Papilio Icarus, alis supra azureis, margine nigro-fimbriâ albis : subtus cineris, utriusque puncto serîeque arcuatâ ex ocellis quinque ; inferioribus maculis marginalibus fulvis. *Es. Pap. Eur. part. 1. p. 35. tab. 99. cont. 54. fig. 4.*

Papilio Icarus, alis integris, argenteo-ceruleis, nigro marginatis : subtus cineris, serîe arcuatâ punctorum ocellarum. *Ocasen. Pap. Eur. edd. 2. tom. 1. par. 2. p. 37. n. 16.*

Zephyrus Icarus. *J. V. DALMAN, Ext. des Mém. de l'Acad. de Stockholm (année 1816), n. 19. du genre ZEPHYRUS.*

Papilio Avandus. *HUBN. Pap. tab. 59. fig. 285-285.*

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-argentin, avec une bordure indéterminée d'un brun-noirâtre & une frange blanche.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu plus ou moins gai. Ses ailes inférieures ont une rangée marginale de points noirs, qui sont parfois cerclés de fauve.

Le dessous des deux sexes est cendré, avec une lunule centrale & une ligne courbe de cinq points noirs ocellés à toutes les ailes. Les secondes ailes ont une série marginale de sept autres points noirs ocellés, au-dessus de laquelle il y a une bande de lunules fauves, dont les trois anales ordinairement plus prononcées.

Le mâle offre parfois une variété chez laquelle la bordure du dessus des secondes ailes est surmontée d'un cordon de points noirs. Cette variété est, suivant M. Dalman, le véritable *Icarus* de M. Ochsenheimer.

Il se trouve, en juillet, dans les prairies du nord de l'Europe.

Nota. La bande maculaire fauve du dessous des ailes inférieures n'est point, comme chez l'*Alceis*, & autres espèces analogues, précédée d'une tache longitudinale blanche.

♂. Dessous des ailes avec des points ocellés : celui des inférieures ayant sur son milieu une bandelette longitudinale blanche ou blanchâtre.

231. POLYOMMATE Damon.

POLYOMMATUS Damon.

Pol. als integris, maris supra argenteo-ceruleis, feminae fuscis: subtus rubido-cinereis, striga punctorum ocellatorum; posticis vittâ albâ à basi ad marginem posticum ductâ.

Papilio P. R. Damon, als integerrimis, cœruleis: subtus fusco-cinereis, punctis numerosis; posticis vittâ albâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 72. n. 684.*

Hesperia R. Damon. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 295. n. 121.

Papilio Damon. WIEN. Verz. p. 182. sam. N. n. 6.

Papilio Damon. ILLIG. N. Aufg. Dessl. tom. 2. p. 265. n. 6.

Papilio Damon. ROEM. Gen. Inf. tab. 18. fig. 9.

Papilio Damon. BERGSTR. Nomenkl. tab. 55. fig. 7. 3. — tab. 56. fig. 1. 2. (Ficm.)

NATURF. 3. p. 20.

SCRIBA, *Beytr. 5. p. 250. tab. 15. fig. 1-5.* (La chenille & la chrysalide.)

Papilio Damon. HUBN. Pap. tab. 57. fig. 275-277.

Papilio Damon. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Damon. PETAGNA, Instit. Entom. tom. 1. p. 483. n. 117.

Papilio Damon. HERBST, tab. 310. fig. 7-9.

Papilio Damon. BORKH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 285. n. 87.

Papilio Biton. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 172 & 282. n. 6. — part. 2. p. 254.

Papilio Biton. SCHNEID. Syst. Besch. p. 266. n. 165.

Papilio Biton. FUSSL. All. Magaz. tom. 1. part. 2. p. 203.

Papilio Biton. SULZ. Inf. p. 146. tab. 18. fig. 9.

Papilio Biton. ESP. Pap. Eur. part. 1. tab. 55. Suppl. 9. fig. 5. (Mas.) — tab. 62. cont. 12. fig. 4. (Fœm.)

Papilio Biton. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 75. n. 157.

Argus bleu, à bandes brunes, lignes blanches. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 180. pl. 42. fig. 87. a-d.*

Polyommate Damon. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2. édit. tom. 27. p. 500.*

Polyommate Damon. GOD. *Hist. nat. des Lépid. de France, tom. 2. p. 190. pl. XXXIV. fig. 5. 6.*

Polyommate Damon. GOD. *Tabl. méthod. des Lépid. de France, DIURNES, p. 55. n. 159.*

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-argenté, avec l'extrémité des nervures & une bordure d'un brun-noirâtre. La bordure va toujours en se rétrécissant depuis le sommet des premières ailes jusqu'à l'angle anal des secondes.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la frange moins blanche que chez le mâle.

Le dessous est d'un cendré-rougeâtre, moins foncé dans le mâle que dans la femelle, avec une rangée courbe de points noirs à iris blanc, & beaucoup plus gros aux ailes supérieures qu'aux inférieures. Le milieu des ailes supérieures offre une lunule noire qui est bordée de blanc comme les points. Le milieu des ailes inférieures est divisé par une ligne blanche, qui va de la base au bord postérieur. Cette ligne manque quelquefois. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec le dessous de la massue ferrugineux.

La chenille, d'après M. Ochsenheimer, est pubescente dans le mâle que dans la femelle, avec une ligne d'un vert-foncé le long du dos, & une ligne du même ton, mais bordée de blanc, le long de chaque côté. Il y a en outre avant les pattes une ligne longitudinale très-fine, qui est rouge dans certains individus, d'un jaune-paille dans d'autres.

La chrysalide est très-obtuse & d'un jaune d'ocre.

Il se trouve, au mois de juillet, en Allemagne, dans la Lozère, les Cévennes, les Pyrénées, &c.

252. POLYOMMATE Lefebvre.

Polyommatus Lefebvrii.

Pol. als integris, maris supra cœruleo-argenteis anticarum basi tomentosa flavida, feminae fuscis limbo nigro: subtus cinereis aut fusciscentibus, strigâ punctorum ocellatorum; posticis vittâ longitudinali albicante.

Comme ce polyommate paroît être absolument nouveau, nous nous faisons un devoir de le dédier à l'Amateur qui nous l'a communiqué le premier.

Il a le port & la taille du *Damon*. Le dessus du mâle est d'une couleur argentée-bleuâtre, avec le bord postérieur des quatre ailes uniformément liseré de noir & garni d'une frange blanchâtre. Ses premières ailes ont en outre à la base un duvet d'un jaune-sale, & vers le milieu un petit arc noir.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre-luisant, avec un liseré & une frange comme dans le mâle. On remarque aussi une tache noire au milieu de ses ailes supérieures.

Le dessous de toutes les ailes est cendré chez le

Le mâle, brunâtre chez la femelle, avec une raie courbe de points noirs à iris blanc. Les points des premières ailes font plus gros & précédés d'une lunule centrale de leur couleur. Les points des secondes ailes font le plus souvent accompagnés d'une bandelette longitudinale blanchâtre, & celui qui avoisine le milieu du bord interne est double. Les antennes font comme celles du *Damon*.

Trouvé récemment aux environs de Toulon par M. Alexandre J. Fevbre de Paris, & dans les Bouches-du-Rhône par M. Boyer de Fons-Colombe, savant naturaliste de la ville d'Aix.

255. POLYOMMATE Eumédon.

POLYOMMATUS Eumedon.

Pol. alis integris, supra fuscis, nitidis: subtus obscuris cinereis, punctis ocellaribus nigris lunulique limbi rufescentibus; posticis basi rufescente utraque malleiformi albâ.

Papilio Eumedon, alis ecaudatis, supra fuscis fimbriâ albâ (feminae maculis marginalibus fulvis): subtus cinereis; superioribus ocellis medio majori fasciâque ocellari arcuatâ, inferioribus radio albo & fasciâ ocellari rectangulatâ. Esp. Pap. 1. ur. part. 1. p. 16. tab. 52. fig. 2. 5. — tab. 80. cont. 50. fig. 5. (Var.)

Papilio Eumedon. LANG. Verz. 2. p. 54. n°. 444-447.

BERGST. Nomenkl. tab. 125. fig. 5-7.

Papilio Eumedon. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 77. n°. 147.

Papilio Eumedon. HUBN. Pap. tab. 62. fig. 501. 502.

Papilio Eumedon. HERBST, Pap. tab. 315. fig. 8. 9.

Papilio Eumedon. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Eumedon. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 164 & 279. n°. 15. — part. 2. p. 251.

Papilio Chirra. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 165 & 260. n°. 16.

Papilio Eumedon. SCHNEID. Syst. B. f. Chr. p. 249. n°. 151.

Papilio Cicon. SCHNEID. Syst. B. f. Chr. p. 249. n°. 152.

Papilio Chirra. NATURE. 6. p. 27. n°. 15.

Eumédon. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 275. pl. 71. Suppl. 17. fig. 80. a. b. c. bis.

Polyommate Eumédon. LATR. nouv. Diction. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 436.

Polyommate Eumédon. GOD. Hist. nat. des Égl. Nat. Inf. Tom. 122.

lépid. de France, tom. 2. p. 192. pl. Y-XXV. fig. 1. 2.

Polyommate Eumédon. GOD. Tabl. méthod. des lépidop. de France, DIURANS, p. 55. n°. 160.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des deux feves est d'un brun-noirâtre-luisant, avec la frange blanchâtre. Le mâle est sans taches, mais la femelle a quelques lunules fauves près de l'angle interne des secondes ailes.

Le dessous est d'un cendré-obscur, avec une lunule centrale, & une ligne arquée de points oculaires, noirs. On remarque encore une série de points semblables le long du bord postérieur, mais elle est beaucoup moins apparente, surtout aux premières ailes, & celle des secondes ailes est surmontée d'un cordon de lunules roussâtres, bordées chacune antérieurement par un chevron obscur. Outre cela, les secondes ailes ont la base d'un vert-argentin, & elles offrent une raie blanche formant le marteau à son origine & descendant au disque au bord postérieur.

Il habite le Piémont, l'Allemagne, le midi de la France, &c., & il paroît au mois de juin.

254. POLYOMMATE Admète.

POLYOMMATUS Admetus.

Pol. alis integris, supra fuscis fimbriâ albiâ (posticorum feminae limbo lunulo, fulvis): subtus flavo-cinereis, omnium fregâ & punctis ocellaribus anticarumque unââ centrali nigris.

Papilio Admetus, alis integris, fascis nigro marginatis (posticis feminae maculis marginalibus fulvis): subtus cinerofuscis; punctis ocellaribus nigris maculâque marginalibus obliquis flavis. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Admetus. ESP. Pap. Eur. part. 1. p. 148. tab. 82. cont. 52. fig. 2. 5.

Papilio Admetus. LORER. Pap. Eur. part. 1. p. 167. n°. 20.

Papilio Admetus. SCHNEID. Syst. B. f. Chr. p. 248. n°. 150.

Papilio Admetus. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 79. n°. 153.

Papilio Admetus. HUBN. Pap. tab. 65. fig. 507-509.

L'Argus capucin. ENGRAM. Pap. Eur. tom. 1. p. 327. pl. 6. Suppl. 5. fig. 80. a. d. quart.

Polyommate Admetus. LATR. nouv. Diction. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 497.

Il a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus des deux feves est d'un brun-noirâtre-luisant, avec le bord postérieur noir & garni d'une frange blanchâtre. Le mâle est sans taches, mais

la femelle a un point noir au milieu de chaque aile, & l'extrémité de ses ailes inférieures offre une série de lunules fauves plus ou moins apparentes.

Le dessous des quatre ailes est d'un cendré-jau-nâtre, avec une rangée flexueuse de points noirs à iris blanchâtre, & des vestiges de taches marginales rouillâtres. Les points des ailes supérieures sont beaucoup plus gros que ceux des inférieures, & précédés d'une lunule centrale noire, ayant aussi le contour blanchâtre.

Il habite la Hongrie. M. Alexandre Lefebvre l'a pris récemment aux environs de Toulon, & suivant Devillers, il se trouve aussi près de Lyon.

Nota. Ce polyommate doit être plutôt ici que dans la subdivision suivante, car, comme l'a remarqué Esper, on aperçoit à certains jours un sentiment de bandelette blanche sur le dessous des secondes ailes.

ζ. Dessous des ailes n'offrant que des taches ocellées.

255. POLYOMMATE ARION.

POLYOMMATUS Arion.

Pol. alis supra obscure argenteo-cæruleis, omnium disco maculis atris posticarumque limbo ocellato: subtus cinereis, lunulâ centrali strigif-que quatuor è punctis ocellatis; posticus basi argenteo-virescentibus.

Papilio P. R. Arion, alis ecaudatis, supra fuscis, disco cæruleo maculis atris: subtus cinis punctis ocellaribus. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 789. n°. 250. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 283. n°. 1073.

Papilio P. R. Arion. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 122. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 71. n°. 681.

Hesperia R. Arion. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. pars 1. p. 293. n°. 118.

Papilio Arion. WIEN. *Verz.* p. 182. *fam. N.* n°. 5.

ROES. *Inf. part.* 5. *tab.* 45. *fig.* 3. 4.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 98. *fig.* 6.

NATURF. 6. p. 7. n°. 28.

Papilio Arion. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 20. *fig.* 2. — *tab.* 59. *cont.* 9. *fig.* 2. (Var.)

Papilio Arion. FUESSL. *Suiff. Inf. pag.* 51. n°. 596.

Papilio Arion. SCOP. *Ent. Carn.* p. 177.

Papilio Arion. PETAG. *Instit. Ent. tom.* 1. p. 483. n°. 115.

Papilio Arion. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 65. n°. 119.

Papilio Arion. HERBST. *tab.* 308. *fig.* 7. 8.

Papilio Arion. LANG. *Verz.* 2. p. 55. n°. 466-471.

Papilio Arion. ILLIG. *N. Aufg. Deff.* *tom.* 2. p. 265. n°. 3.

Papilio Arion. SCHEID. *Syfl. Besch.* p. 261. n°. 161.

Papilio Arion. HUFNAG. *Tabell. in. Berl. Magaz. tom.* 2. p. 70. n°. 28.

Papilio Arion. BORKE. *Pap. Eur. part.* 1. p. 167 & 280. n°. 1. — *part.* 2. p. 252.

Papilio Arion. BORKE. *Rhein. Magaz. tom.* 1. p. 281. n°. 83.

Papilio Arion. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 24. *fig.* 5. 6. — *tab.* 51. *fig.* 5. 6.

Papilio Telxus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 43. *fig.* 4.

Papilio Tolegonus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 44. *fig.* 2.

Papilio Arion. HUBN. *Pap. tab.* 54. *fig.* 254-256.

Papilio Arion. OSCHEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. p. 78. *pl.* 41. *fig.* 86. d-f.

Polyommate Arion. LATR. *nouv. Diâ. d'Hist. nat.* 2°. *édit. tom.* 27. p. 499.

Polyommate Arion. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 1. p. 219. *pl.* 11. *fig.* 2. & *pl.* 11 *quart. fig.* 1.

Polyommate Arion. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p.* 58. n°. 168.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un bleu-argenté-obscur, bordé de brun, avec des taches noires discoïdales aux ailes supérieures du mâle, & aux quatre ailes de la femelle. La bordure des ailes inférieures est en outre surmontée d'une série de points noirs à iris blanchâtre.

Le dessous est cendré, avec quatre rangées de points oculaires & une lunule centrale noires, & un entrecoupé brun sur la frange. La base des secondes ailes est d'un vert-argenté sur lequel on remarque un point noir, solitaire.

Chez la femelle, les taches noires discoïdales du dessus des premières ailes sont beaucoup plus grosses que chez le mâle.

Il se trouve, en juillet, dans beaucoup de contrées de l'Europe. Il aime les lieux secs & couverts de bruyères. Nous l'avons pris souvent aux environs de Paris, & particulièrement aux bois de Verrières & de Ville-d'Avray.

256. POLYOMMATE ALCON.

Polyommatus Alcon.

Pol. alis supra obscure violaceo-cæruleis, limbo lato fusco: subtus cinereis, lunulâ mediâ strigisque tribus è punctis ocellaribus nigris; posticis à basi ad discum argenteo-virescentibus.

Papilio P. R. Alcon, mas, alis integerrimis, cæruleis, margine fusco: subtus fusco-cinereis, punctis numerosis ocellaribus. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 72. n.º 685.

Hesperia R. Alcon, mas. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 293. n.º 120.

Papilio Alcon. WIEN. *Verz.* p. 182. *fum. N.* n.º 4.

Papilio Alcon. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 265. n.º 4.

Papilio Alcon. LANG. *Verz.* 2. p. 55. n.º 472-475.

Papilio Alcon. PETAGN. *Instit. Entom.* tom. 1. p. 485. n.º 116.

Papilio Alcon. HERBST, *tab.* 511. *fig.* 6-8.

Papilio Alcon. HUBN. *Pap. tab.* 55. *fig.* 265-265.

Papilio Alcon. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Zephyrus Alcon. *dir.* 5. (Cyanires). n.º 4. J. W. DALMAN, *Extrait des Mémoires de l'Académie de Stockholm, année 1816.*

Papilio Alcon. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 282. n.º 84.

Papilio Diomedes. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 169 & 281. n.º 5. — *part.* 2. p. 285.

Papilio Arcas. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *tab.* 54. *Suppl.* 10. *fig.* 4. 5.

Papilio Arcas. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 262. n.º 162.

Papilio Arcas. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 75. n.º 140.

Papilio Arcas. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 51. *fig.* 5. 4. — *tab.* 57. *fig.* 7. 8.

Papilio Telxus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 45. *fig.* 6.

Papilio Mimers. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 59. *fig.* 1. 2.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom.* 1. *pl.* 41. *fig.* 86. I. K.

Le Protée. ENGRAM. *Pap. d'Europe, pl.* 85. *Suppl.* 2. *pl.* 4. *fig.* 80. a. b. c. d. *tert.*

LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2.º *édit.* tom. 27. p. 500.

Polyommate Alcon. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom.* 2. p. 205. *pl.* Z-XXVI. *fig.* 1. 2.

Polyommate Alcon. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p.* 58. n.º 169.

Il a presque dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un brun-violet-obscure, avec une bordure brune assez large aux quatre ailes, & un arc noir au centre des supérieures.

Le dessous de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base un peu bleuâtre. La frange est entrecoupée de blanc & de brun chez les deux sexes.

Le dessous de toutes les ailes, dans le mâle & dans la femelle, est cendré, avec une lunule centrale, puis trois rangées de points oculaires, noires. Les points de la rangée antérieure sont plus ronds & un peu plus gros que ceux des deux rangées postérieures. Indépendamment de cela, les ailes inférieures ont la base d'un blanc-verdâtre qui s'étend jusqu'au disque, & sur lequel sont trois autres points noirs ocellés.

Se trouve, au mois de juillet, aux environs de Lyon & en Allemagne.

257. POLYOMMATE EUPHÉMUS.

Polyommatus Euphenus.

Pol. alis supra violaceo-cæruleiscentibus, maris immaculatis, femine limbo lato fusco anticarumque disco punctis nigricantibus: subtus cinereis, lunulâ mediâ strigisque duabus è punctis ocellaribus nigris.

Papilio P. R. Argiades, alis integerrimis, cæruleis, margine nigricante: subtus fusco-cinereis, lunulâ mediâ strigisque duabus punctorum ocellatorum. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 76. n.º 698.

Hesperia R. Argiades. FAB. *Ent. Syst. e m.* tom. 5. *pars* 1. p. 300. n.º 158.

Hesperia R. Alcon, fem. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. *pars* 1. p. 293. n.º 120.

Papilio P. R. Argiades. PETAG. *Instit. Entom.* tom. 1. p. 489. n.º 150.

Papilio Diomedes. NATUREF. 6. p. 26. n.º 14.

Papilio Diomedes. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 169 & 281. n.º 3. — *part.* 2. p. 233.

Papilio Arctophylax. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 51. *fig.* 1. 2.

Papilio Arctophonus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 55. *fig.* 7. 8. *tab.* 59. *fig.* 5. 4.

Papilio Euphenus. HERBST, *tab.* 509. *fig.* 1-5.

Papilio Euphenus. HUBN. *Pap. tab.* 54. *fig.* 257-259.

Papilio Euphemus. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Polyommate Euphémus. LATR. *nouv. Diç. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 499.*

Polyommate Euphémus. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 221. pl. 11 secund. fig. 6. & pl. 11 quart. fig. 2.*

Polyommate Euphémus. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 58. n^o. 170.*

Suivant nous, l'*Argioles* de Fabricius & son *Alcon* femelle doivent être rapportés à l'*Euphémus*, le premier comme mâle & le second comme femelle, attendu qu'ils en ont absolument tous les caractères.

L'*Euphémus* a de seize à dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-pâle, avec le bord postérieur liseré de noirâtre & entièrement cilié de blanc.

Le dessus de la femelle est à peu près du même bleu que chez le mâle, avec une large bordure brune aux quatre ailes, & quelques points noirs sur le disque des supérieures.

Le dessous des deux sexes est cendré, avec une lunule centrale, & deux rangées courbes de points oculaires, noires. Les secondes ailes ont deux autres points & un tant soit peu de vert à la base.

Il habite les clairières un peu humides des bois. Nous l'avons trouvé aux environs de Paris, & particulièrement à Saint-Germain-en-Laye.

258. POLYOMMATE Erebus.

POLYOMMATUS Erebus.

Pol. alis maris supra violaceo-cæruleis strigâ maculari margineque nigris, feminae fuscis : subtus fuscis, strigâ angulatâ & punctis ocellaribus nigris.

Papilio Erebus, alis integerrimis, supra cæruleis (feminae fuscis) sinubus, fuscis que arcuatâ & punctis cuneiformibus nigris : subtus brunneis ordine oculorum septem angulari. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 101. cont. 56. fig. 1. 2.*

Papilio Erebus, alis integerrimis, fuscis : subtus pallidioribus, anticis ocellis sex, posticis septem ordine angulari dispositis. KNOCH, *Byetr. 2. p. 95. tab. 6. fig. 6. 7.*

Papilio P. R. Erebus, alis integerrimis, fuscis : omnibus subtus strigâ puncturam ocellatorum. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 72. n^o. 682.*

Hesperia R. Erebus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 295. n^o. 119.*

Papilio Erebus. SCHNEID. *Syst. Beschp. p. 264. n^o. 165.*

Papilio Erebus. LANG. *Verz. 2. p. 56. n^o. 476-479.*

Papilio Erebus. HÜBES. *Pap. tab. 55. fig. 260-262.*

Papilio Erebus, alis integris, fuscis (disco maris cæruleo) : subtus fuscis strigâ puncturam ocellatorum. OCHSEN. *Exp. Eur. tom. 1.*

Papilio Arcas. BORKE. *Pap. Eur. part. 1. p. 169 & 281. — part. 2. p. 255.*

Papilio Arcas. BORKE. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 282. n^o. 85.*

Papilio Arcas. NATURF. 6. p. 25. n^o. 15.

Papilio Nautilithous. BERGSTR. *Nomencl. tab. 45. fig. 1-5.*

Argus bleu à bandes brunes. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 177. pl. 40. fig. 86. a. b. c.*

Polyommate Erèbe. LATR. *nouv. Diç. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 500.*

Il a environ dix-huit lignes d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec les nervures, une rangée transverse de taches triangulaires & une large bordure, noires.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la frange un peu plus claire.

Le dessous des deux sexes est d'un brun moins foncé que le dessus de la femelle, avec une ligne anguleuse de points noirs foiblement ocellés.

Engramelle a pris la femelle pour le mâle, & celui-ci pour une variété de la femelle.

Il se trouve en Allemagne, & principalement aux environs de Leipsick, dans les mois de juillet & d'août.

259. POLYOMMATE Iolas.

POLYOMMATUS Iolas.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis, nitidis, sinubus albâ (feminae margine lato fusco) : subtus carneo-cinereis, arcu medio strigâque incurvâ & punctis ocellaribus ; posticis lunulis tribus angulâ uni nigris.

Lycæna Iolas, alis integris, cæruleis, mari immaculatis, feminae fuscis disco cæruleo : subtus cinereis, lunulâ incurvâ strigâque puncturam nigrorum ocellarium. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 4. p. 144. n^o. 5.*

Ce polyommate est jusqu'ici le plus grand que nous ayons en Europe. Il a de vingt à vingt-deux lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-violet-luisant, avec un simple liseré noir dans le mâle, avec toute la côte & l'extrémité largement bordées de brun-noirâtre dans la femelle. Les deux sexes ont la frange entièrement blanche, & chez la femelle, la bordure des secondes ailes se termine à l'angle anal par trois taches noires un peu ocellées.

Le dessous des quatre ailes, dans l'un & dans l'autre sexe, est d'un cendré légèrement incarnat, avec un arc central, & une rangée courbe de

points oculaires, noirs. Les secondes ailes ent en outre la base un peu verdâtre, avec deux points semblables à ceux dont il vient d'être question, & leur angle anal offre trois lunules noires bordées de blanchâtre & s'alignant avec d'autres lunules foiblement obscures qui se continuent sur le bord postérieur des premières ailes.

Le corps est fléaué en dessus, centré en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, & ce qui est assez remarquable, c'est qu'elles ont aussi l'extrémité blanche.

Découvert il y a quelques années près de Bude en Hongrie, & décrit d'après les deux sexes qui nous ont été envoyés par M. Franck, savant amateur de Strasbourg. M. Latreille posséda un mâle pris en Dalmatie par M. le baron Dejeu, & M. Duponchel a vu à Rome dans la collection de M. le pharmacien Rossi des individus trouvés aux environs de cette ville.

240. POLYOMMATE *Lysimôn*.

POLYOMMATUS Lysimôn.

Pol. alis suprà violaceo-cæruleis, nitidis, limbo fusco-fimbriatæ variegatâ: subtus cinereis, basi & disco punctis ocellaribus nigris, apice lunulis fuscis in duplici serie.

Papilio Lysimôn, alis integerrimis, fuscis, disco (maris) cæruleo: subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Lysimôn. HEAN. *Pap. tab. 105. fig. 554. 555. (Mas.)*

Papilio Lysimôn. ILLIG. *Magaz. tom. 5. p. 197.*

Papilio P. R. Oitîs, alis integerrimis, fuscis, basi cæruleis: subtus cinereis; anticis puncto medio fimbriatæ, posticis punctis numerosis ocellatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 75. n. 609.* An femina?

Hesperia R. Oitîs. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 296. n. 127.* An femina?

Il a environ dix pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet-luisant, avec une bordure assez large d'un brun-noirâtre, & la frange variée de blanc & de brun.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base d'un bleu-violet-luisant, & la frange comme chez le mâle.

Le dessous des quatre ailes est cendré dans les deux sexes, avec des points noirs à la base ainsi qu'au-delà du milieu, & deux séries marginales de lunules obscures; bordées de blanc comme les points. Il y a en outre au centre de chaque aile une lunule semblable, qui se fait plus ou moins sentir en dessus. Les points basiliaires sont au nombre de deux aux ailes antérieures, au nombre de quatre ou de cinq aux inférieures. Les points ultramédianes forment une rangée courbe,

mais dans la rangée des secondes ailes, les trois points antérieurs sont plus éloignés l'un de l'autre que les quatre suivants. Pour ne point donner prise aux *faiseurs d'espèces*, il est peut-être nécessaire de dire que les lunules de la série intérieure des quatre ailes sont plus élevées que celles de la série extérieure, & que dans cette dernière série les trois lunules anales des secondes ailes sont ordinairement plus colorées que les autres.

Il se trouve au Bengale, à l'Île-de-France, en Egypte & dans la péninsule espagnole.

Nota. Le papillon *Oitîs* de Fabricius ressemble en dessus à la femelle du *Lysimôn*, mais il paraît en différer en dessous par l'absence des points basiliaires & des lunules marginales des ailes supérieures. Ces caractères n'étoient-ils pas effacés dans l'individu mâle décrit par Fabricius? Nous avons vu des *Lysimôn*s ou *Oitîs* étoient déjà presque nuls.

241. POLYOMMATE *Hylax*.

POLYOMMATUS Hylax.

Pol. alis integerrimis, suprà fuscis, immaculatis: subtus cinereis nigro punctatis. FAB.

Papilio P. R. Hylax. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n. 709.*

Hesperia R. Hylax. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 504. n. 132.*

Papilio Hylax. DOXW. *of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, vol. 6. pl. 1. fig. 2.*

Il est très-petit. Les antennes sont annelées de blanc & de brun. Les ailes sont arrondies, brunes & sans taches en dessus. Elles sont cendrées en dessous, avec des points noirs & des arcs postérieurs obscurs.

Des Indes orientales.

(Traduction de Fabricius.)

Nota. Ce polyommate n'est peut-être qu'une femelle plus petite du *Lysimôn*, & chez laquelle le bleu de la base du dessus des ailes a disparu. Mais on est forcé de rester dans le doute d'après la description vague de Fabricius. Comment en effet savoir si les points du dessous sont ocellés ou simples, & si les lunules marginales forment deux rangs ou un seul?

242. POLYOMMATE *Cajus*.

POLYOMMATUS Cajus.

Pol. alis integerrimis, fuscis, disco cæruleo: subtus cinereo alboque varis, punctis ocellaribus fuscis. FAB.

Hesperia R. Cajus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 296. n. 126.*

Papilio Lajus. CRAM. *pl. 519. fig. D. E.*

Fabricius le décrit ainsi : il est petit. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec le disque des quatre d'un bleu-violet-pâle, & le limbe postérieur des inférieures chargé d'un rang de points noirs un peu ocellés.

Le dessous est cendré, varié de blanc, avec des points noirs oculaires, bien distincts.

Des Indes orientales.

Nota. A en juger par la figure de Cramer, à laquelle Fabricius renvoie, le dessous de ce polyommate diffère principalement du dessous de notre *Lysimon*, en ce que ses premières ailes sont sans points à la base; en ce que les deux points antérieurs de la rangée ultramédiaire des secondes sont adhérens, tandis que les deux qui viennent ensuite sont groupés en arrière des autres, sur un espace plus obscur que le reste de la surface.

245. POLYOMMATE Phérètes.

POLYOMMATUS Pheretes.

Pol. alis maris supra violaceo-cæruleis, femina fuscis, sinistrâ albâ : subtus rufescenti-cinereis ; anticis lunulâ centrali strigâque incurvâ à punctis ocellaribus nigris ; posticis maculis albis in serie duplici.

Papilio Pheretes. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Atys. HUBN. *Pap. tab. 97. fig. 495. 496.* (Le mâle.) — *tab. 107. fig. 548. 549.* (La femelle.)

Polyommate Atys. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e édit. tom. 27. p. 498.*

Polyommate Phérètes. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 202. pl. Y-XXV. fig. 5. 6.*

Polyommate Phérètes. GOD. *Tabl. method. des lépid. de France, DIURNES, p. 58. n^o. 167.*

Il a approchant un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un bleu-violet, avec un liseré noir au bord postérieur.

Le dessous de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base saupoudrée de bleu. Dans l'un & dans l'autre sexe, la frange est toute blanche.

Le dessous des premières ailes, chez le mâle comme chez la femelle, est d'un cendré-clair, lavé de verdâtre le long de la côte, avec une lunule centrale, puis une ligne courbe de points oculaires, noires. Les points manquent quelquefois en totalité ou en partie, même dans les individus les mieux conservés.

Le dessous des secondes ailes est d'un cendré un peu obscur, avec la base bleuâtre, & huit à neuf taches blanches orbitaires & inégales. Ces taches forment deux séries transversales, dont l'antérieure sur le milieu de la surface, l'autre à égale distance de la précédente & du bord terminal.

Il se trouve dans les Alpes.

244. POLYOMMATE Cyllarus.

POLYOMMATUS Cyllarus.

Pol. alis supra violaceo-cæruleis ; margine nigro : subtus dilute cinereis, strigâ à punctis ocellaribus nigris ; posticis à basi ultra medium argenteo-rufescentibus.

Papilio P. R. Cyllarus, alis integris, cæruleis, margine nigro : subtus dilute cinereis, strigâ punctorum ocellatorum ; posticis basi cæruleis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 72. n^o. 685.*

Hesperia R. Cyllarus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 294. n^o. 122.*

Papilio Cyllarus. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 53. Suppl. 9. fig. 1. 2.*

Papilio Cyllarus. ROSSI, *Mant. tom. 2. p. 12. n^o. 556.*

Papilio Cyllarus. PETAG. *Instit. Entom. tom. 1. p. 484. n^o. 118.*

Papilio Cyllarus. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 74. n^o. 135.*

Papilio Cyllarus. NATUREL. 6. p. 20. n^o. 7.

Papilio Cyllarus. SCHNEID. *Syst. Besch. p. 267. n^o. 166.*

Papilio Cyllarus. LANG. *Verz. 2. p. 56. n^o. 485-485.*

Papilio Cyllarus. BRAHM. *Inf. Kalend. p. 297. n^o. 187.*

Papilio Cyllarus. SCHWARZ, *Raupenk. pag. 628 & 747.*

Papilio Cyllarus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 176 & 283. n^o. 9. — part. 2. p. 254.*

Papilio Dymus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 177. n^o. 10.*

Papilio Damoctas. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 285. n^o. 88.*

Papilio Dymus. BORKH. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 284. n^o. 89.*

Papilio Cyllarus. HERBST, *tab. 509. fig. 7-9.*

Papilio Dymus. HERBST, *tab. 509. fig. 10. 11.*

Papilio Cyllarus. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 55. fig. 1. 2.*

Papilio Bronte. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 56. fig. 7. 8.*

Papilio Phobos. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 54. fig. 7. 8.*

Papilio Dimus. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 43. fig. 7. 8.*

Papilio Damoctas. WIES. *Verz. p. 185. fam. N. n^o. 7.*

Papilio Damoetas. ILLIG. *N. Aufg. Deff.* tom. 2. p. 265. n^o. 7.

Papilio Damoetas. HUBN. *Pap. tab.* 56. fig. 266-268.

Papilio Damoetas. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Alexis. PODA, *Mus. Græc. pag.* 77. n^o. 47.

Suite de l'Argus bleu. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 178. pl. 41. fig. 86. fig. 0.

Polyommate Cyllare. LATR. *nouv. Diâ. d'Hysl. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 50L.

Polyommate Cyllarus. GOD. *Hysl. natur. des lépid. de France*, tom. 1. pag. 222. pl. 11. & pl. 11 quart. fig. 3.

Polyommate Cyllarus. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 59. n^o. 171.

Il a à peu près quinze lignes d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un bleu-violet, avec une bordure noire, très-étroite dans le mâle, avec le sommet des quatre ailes d'un brun-noirâtre dans la femelle.

Le dessous est d'un cendré-clair, avec une rangée courbe de points noirs ocellés. Les points des ailes supérieures sont plus gros & précédés d'un arc central noir. La base des ailes inférieures est d'un vert-argenté qui s'étend jusqu'au-delà du milieu, & elle offre un point noir placé près de la côte.

La chenille, selon M. Ochsenheimer, est pubescente, d'un vert-jaunâtre, avec une ligne rougeâtre le long du dos, & des traits obliques d'un vert-obscur sur chaque côté. Sa tête & les pattes écailleuses sont noires; ses pattes membraneuses sont d'un vert plus foncé que le corps. Elle passe l'hiver, & elle vit sur plusieurs *astragales*, sur le *mélilot*, le *genêt herbacé*.

La chrysalide est brunâtre.

On trouve ce papillon, vers la fin de juin, dans les bois & les prairies de l'Europe. Il habite les environs de Paris.

245. POLYOMMATE ACIS.

POLYOMMATUS ACIS.

Pol. alis maris supra cærulescenti-violaceis margine nigro, fuscis: subtus obscurè cineris, lunulâ mediâ strigâque à punctis ocellaribus nigris.

Papilio P. R. *Argiolus*, *alis ecaudatis (intergris)*, *suprà cæruleis, margine nigris: subtus fusco-cineris, strigâ punctorum ocellatorum.* FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 75. n^o. 686.

Hesperia R. *Argiolus*. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 295. n^o. 123.

Papilio Argiolus. ESP. *Pap. Eur. tab.* 21. fig. 1. a. b.

Papilio Argiolus. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 67. n^o. 12.

Papilio Argiolus. PETAG. *Instit. Entom. tom.* 1. p. 484 n^o. 119.

Papilio Argiolus. FUESSL. *Suiff. Inf. pag.* 31. n^o. 598.

ROES. *Inf. part.* 3. tab. 37. fig. 4.

SCHÆFF. *Icon. tab.* 185. fig. 1. 2.

Papilio Argiolus. HUBN. *Pap. tab.* 56. fig. 269-271.

Papilio Argiolus. SCHNEID. *Syfl. Besch.* p. 269. n^o. 168.

Papilio Bizas. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 48. fig. 5. 6. (Le mâle.)

Papilio Bize. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 48. fig. 7. 8. (La femelle.)

Papilio Argopoeus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 52. fig. 7. 8.

Papilio Bizenus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 57. fig. 1. 2.

Papilio Bizene. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 57. fig. 5. 4.

Papilio Damoetas. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 57. fig. 5. 6.

Papilio Argopoei. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 61. fig. 5. 6.

Papilio Acis. LANG. *Verz.* 2. p. 56. n^o. 486-489.

Papilio Acis. WIEN. *Verz.* p. 182. *sum.* N. n^o. 5.

Papilio Acis. ILLIG. *N. Aufg. Deff.* tom. 2. p. 264. n^o. 5.

Papilio Acis. HERBST, *tab.* 310. fig. 1-3.

Papilio Acis. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 285. n^o. 86.

Papilio Acis. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Papilio Semiargus. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 172 & 282. n^o. 7. — *part.* 2. p. 234.

Papilio Semiargus. NATUREF. 6. p. 20. n^o. 6.

Le Demi-Argus. GEOFF. *Hysl. Inf.* tom. 2. p. 63. n^o. 51.

Le Demi-Argus. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 181. pl. 42. fig. 88. a-d.

Polyommate Demi-Argus. LATR. *nouv. Diâ. d'Hysl. nat.* 2^e. édit. tom. 27. p. 501.

Polyommate Acis. GOD. *Hysl. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 224. pl. 11 *secund.* fig. 7. & pl. 11 quart. fig. 4.

Polyommata Acis. GOD. *Tabl. méthod. des Lépid. de France*, DIURNES, p. 59. n°. 175.

Il a environ un pouce d'envergure. Le dessus du mâle est d'un violet-bleuâtre, avec une légère bordure noire & la frange blanche.

Le dessus de la femelle est d'un brun-noirâtre, avec la base faiblement saupoudrée de bleu & la frange grisâtre.

Le dessous des deux sexes est d'un cendré-obscure, avec une lunule centrale, & une rangée de points oculaires, noires. La base des secondes ailes est en outre un peu bleuâtre & marquée d'un point oculaire.

On le trouve en juillet & en août, dans les prairies & dans les bois de l'Europe. Il est très-commun aux environs de Paris.

246. POLYOMMATE ALFUS.

Polyommata Alfus.

Pol. alis supra fuscis, nitidis, (males caeruleo pubescentibus) : subis caeruleis, lunulâ mediâ singulae à punctis ocellaribus nigris.

Papilio P. R. Alfus, alis integerrimis, fuscis, immaculatis : subis caeruleis, striga punctorum ocellatorum. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 70. n°. 663.

Hesperia R. Alfus. FAB. *Ent. Syst. ém.* tom. 5. pars 1. 293. n°. 125.

Papilio Alfus. WIEN. *Verz.* p. 184. fam. N. n°. 9.

Papilio Alfus. BRAHM. *Inf. Kalend. part.* 1. p. 510. n°. 196.

Papilio Alfus. LANG. *Verz.* 2. p. 53. n°. 493-494.

Papilio Alfus. HILIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 261. n°. 9.

Papilio Alfus. HERBST, *Pap.* tab. 511. f. 3. 4. 5.

СЛАВЯН. *Icon. tab.* 165, fig. 1. 2.

Papilio Alfus. PERAZ. *Infl. Latom.* tom. 1. p. 401. n°. 124.

Papilio Alfus. OCHSEN. *Pap. Eur.* tom. 1.

Papilio Alfus. HUBN. *Pap. tab.* 58. fig. 278. 279.

Papilio Minimus. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. *Suppl.* 10. fig. 3.

Papilio Argus minutus. ESP. *tab.* 106. cont. 61. fig. 3.

Papilio Minimus. DEWILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 75. n°. 159.

Papilio Minimus. FÜESSL. *Suiff. Inf.* p. 51. n°. 509.

Papilio Minimus. SCHNEID. *Syfl. Besch.* p. 270. n°. 169.

Papilio Alfus. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 263. n°. 99.

Papilio Pseudolus. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 177 & 284. — *part.* 2. p. 255. n°. 11.

Papilio Pseudolus. BERGSTR. *Nomenkl. tab.* 50. fig. 5. 6.

Le Demi-Argus, var. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 181. pl. 42. fig. 53. c. f.

Polyommata Alfus. IATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2°. édit. tom. 27. p. 301.

Polyommata Alfus. GOD. *Hist. nat. des Lépid. de France*, tom. 2. p. 206. pl. Z-LXXVI. fig. 5. 6.

Polyommata Alfus. GOD. *Tabl. méthod. des Lépid. de France*, DIURNES, p. 60. n°. 174.

C'est le plus petit des polyommates de l'Europe. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-chaoyant, sans taches dans la femelle, avec des atomes bleus très-clair-fermés dans le mâle.

Le dessous est d'un cendré-bienâtre, avec une lunule centrale, & une rangée de points oculaires, noires. Les secondes ailes offrent à la base deux autres points semblables, & l'on aperçoit quelques fois à leur extrémité des veilles de taches obscures. La frange est divisée par une ligne brune parallèle à la bordure au bord de chaque aile.

L'*Argus montatus* d'Eisner parait d'en être qu'une variété.

En mai & en juillet, dans plusieurs parties de la France.

GENRE BARBICORNE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

ANTENNES sétacées, plumeuses. Palpes s'élevant à peine au-delà du chaperon. Ailes inférieures ayant la cellule discoïdale ouverte, le bord interne concave et replié.

Nota. Ce nouveau genre, distinct de tous les précédens, et rapproché des *Uranies* par ses antennes sétacées, fait le passage de la tribu des PAPILLONIDES à celle des HESPERIDES.

ESPÈCE.

Ailes supérieures allongées. Les inférieures terminées en dehors par une queue assez longue et légèrement en spatule.

1. BARBICORNE Basilis.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires : supérieures avec deux bandes, inférieures avec une seule et un point, fauves.



1. *BARRICORNIS* *Basilis*.*BARRICORNIS* *Basilis*.

Barb. alis integris, concoloribus, nigris : anticae fuscis duabus, posticae unica punctoque falcis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, avec deux bandes fauves obliques aux premières, & une bande longitudinale de cette couleur près du bord interne des secondes. Ces dernières ailes ont en outre un point fauve à l'origine de la queue. Le corps & les antennes sont noirs.

Du Brésil.

TRIBU SECONDE (1).

HESPERIDES. *Hesperides*.

Six pieds ambulatoires dans tous. Côté interne des ailes inférieures toujours plissé. Jambes postérieures ayant deux paires d'ergots (ou d'épines), l'une, ou l'ordinaire, au bout, & l'autre près du milieu de leur côté interne; extrémité de la massue des antennes presque toujours très-crochue ou arquée. (Ailes inférieures souvent presque horizontales dans le repos, les supérieures seules élevées; cellule discoïdale des inférieures ouverte.)

Après avoir d'abord suivi Linné à l'égard de son genre *Papilio*, Fabricius se détermina, dans son *Entomologie systématique*, à en séparer, sous le nom générique d'*Hesperia*, les espèces de sa dernière division, les plébiens, & de même que dans la méthode de son maître, ces Hespéries furent partagées en ruricoles & en urbicoles. J'ai formé avec les premières les genres *Erycine* & *Polyommata*. Celui d'Hespérie n'a plus compris que les secondes ou les urbicoles. Outre que les chenilles des Hespéries diffèrent de celles des autres diurnes par leurs habitudes, ces Lépidoptères sont les seuls qui, ainsi que les crépusculaires & les nocturnes, aient deux paires d'épines ou d'ergots à leurs jambes postérieures. Déjà encore, dans un certain nombre d'espèces, le port d'ailes n'est plus le même que celui des autres diurnes; les inférieures, dans le repos, sont presque horizontales, & forment avec les supérieures, qui sont relevées, sans être cependant tout-à-fait perpendiculaires, un angle plus ou moins ouvert.

Linnéus, faisant allusion à des espèces de bombyx, a quelquefois signalé ce port par les expressions d'*ailes reverses* ou *débordantes*, mais le plus souvent par celles d'*ailes divariquées* ou *divergentes*. Tels sont aussi les termes dont

s'est servi Fabricius dans les mêmes circonstances. Geoffroy a distingué ces Lépidoptères sous la dénomination d'*Atropiés*; celle d'*ailes en chevron* ou *chevronnées* me paroîtroit plus convenable. Les supérieures au moins étant toujours élevées au-dessus du plan de position, & les inférieures n'ayant point, près de l'origine de leur bord extérieur, de frein ou de crochet, les Hespéries ne peuvent être confondues avec les castnies, dont elles se rapprochent le plus, ni avec les sphinx & autres Lépidoptères crépusculaires; mais les uranies de Fabricius leur ressemblent sous ce rapport, ainsi qu'à l'égard du nombre des ergots des jambes postérieures. Ces deux genres doivent donc être réunis dans une coupe particulière & faisant le passage des diurnes aux crépusculaires: c'est ma tribu des Hespérides. La nature semble nous préparer à ces changements, par la modification de formes qu'elle a fait subir aux chenilles & aux chrysalides des polyommates.

Les auteurs du Catalogue systématique des Lépidoptères des environs de Vienne ont eu néanmoins une opinion bien opposée, quant au rapprochement de ces genres, puisqu'ils ont ouvert la famille des Lépidoptères diurnes par nos Hespéries, nos parnassiens, les thais, &c., & qu'ils la terminent par nos polyommates & un genre de névroptères (ascalaphe) qui, d'après de fautes apparences, leur avoit paru appartenir à cet ordre d'insectes. Les uranies & les Hespéries ayant six pieds ambulatoires & les ailes inférieures plissées à leur côté interne, ainsi que nos papillons proprement dits, il est certain qu'en prenant ces considérations pour fondement de la distribution des Lépidoptères diurnes, ces trois genres devroient venir de file, & les caractères naturels exigeroient que l'on passât des papillons aux parnassiens, aux thais, aux piérides & aux coliadés. Dès-lors, les polyommates devroient être reportés à l'autre extrémité des diurnes hexapodes. Les Erycines, qui ont tant d'affinité avec les polyommates, seroient ces hexapodes avec les tétrapodes, en commençant par les libythés, les fatyres, les brassolides, les morpho, &c.; par la continuation de cette série de rapports, on arriveroit aux héliconiés & aux danades, qui deviendroient alors les premiers genres de la tribu des papillouides. Cet ordre ne contrarieroit nullement les rapports que l'on peut déduire de la comparaison des chenilles & des chrysalides; mais il n'en seroit pas ainsi de ceux que nous fournit l'examen de la cellule discoïdale des ailes inférieures, & dont M. Godart, par d'heureuses combinaisons, a si avantageusement profité dans la quatorzième livraison de son *Histoire naturelle des Lépidoptères de France*. Notre distribution des genres de la famille des diurnes y est présentée avec les perfectionnements que nous avons jugés nécessaires, & auxquels il a lui-même contribué par d'intéressantes observations. Mais, comme nous n'avons point la présomption de

(1) Afin d'accélérer la publication de ce demi-volume, je me suis chargé de la rédaction de cette tribu des Lépidoptères diurnes; j'en excepte seulement le genre *Uranie* & les *Hespéries d'Europe*. L'ÉTRÉILLE.

croire que cette méthode soit absolument conforme à l'ordre naturel, nous en avons exposé ici une nouvelle, & uniquement établie sur l'étude de l'insecte parfait.

L'uranie *Leilus* est la seule espèce de ce genre dont on ait observé les métamorphoses; encore même, ce que mademoiselle Mérian nous en a appris, est-il très-incomplet. Mais celles de plusieurs hespéries, tant indigènes qu'exotiques (voyez Stoll, *Suppl. aux papillons exotiques* de Cramer, & l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Géorgie* par Smith, d'après les dessins & les notes d'Abbot), nous sont bien connues, & l'on ne peut douter que leurs chenilles ne soient des rouleuses ou plieuses de feuilles, habitude exclusivement propre à ce genre de lépidoptères diurnes. Aussi les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères des environs de Vienne en Autriche caractérisent-ils la division du genre Papillon, comprenant les hespéries, & qui, dans leur méthode, est la première, par les expressions suivantes : *larvæ torticiformes*, chenilles semblables à celles des pyrales, ou pbalènes *tritorices* de Linné.

Fabricius, dans un nouveau travail sur les lépidoptères, a partagé son genre primitif d'hespérie en plusieurs autres, & celui qu'il désigne ainsi se compose de diverses espèces de polyommates (*Faunus*, *Fulcanus*, *Marfyus*, *Boeticus*, &c.).

Ceux qu'il nomme *Thymele*, *Heliás* & *Pamphila*, embrassent nos hespéries proprement dites. Malgré tous nos efforts pour améliorer cette coupe, nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'en réduire l'étendue & de simplifier son étude, par l'adoption de ces genres & l'introduction de quelques autres. Il nous faut des caractères exacts, faciles & naturels, & malheureusement cet auteur, trop superficiel dans ses observations & trop systématique, ne peut être ici d'aucun secours pour nous. C'est aux naturalistes des contrées équatoriales de l'Amérique, ou à ceux qui y feront un long séjour, qu'il est peut-être exclusivement réservé de nous donner, par des recherches suivies sur les métamorphoses des hespéries, une classification naturelle & rigoureuse de cette division de lépidoptères.

Dans la méthode de M. Duméril, nos érycines & nos polyommates composent son genre *Hespérie*, & celui que nous appelons ainsi, répond à son genre *Hétéroptère*.

La tribu des hespérides est formée, comme nous l'avons dit plus haut, des genres URANIE & HESPÉRIE.

Un lépidoptère qui m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff, & offrant les antennes & les ailes inférieures des castnies, mais dont les palpes extérieurs sont tout-à-fait semblables à ceux des uranies, paroîtroit lier ces deux genres.



G E N R E U R A N I E .

C A R A C T È R E S G É N É R I Q U E S .

ANTENNES d'abord filiformes, ensuite grêles et sétacées. Palpes inférieurs allongés, grêles, ayant le second article très-comprimé, le dernier beaucoup plus mince, presque cylindrique et nu.

G. URANIA. Fab. (*Syst. Glossat.*) des CHEVALIERS GRECS, des NYMPHALES et des NOCTUELLES. Fab. (*Ent. Syst.*)

E S P È C E S .

A. Bord postérieur des premières ailes presque entier. Bord analogue des secondes avec six dents, dont les trois intérieures en forme de queues.

1. URANIE Rhiphéus.

Ailes noires : supérieures offrant de part et d'autre des lignes transverses et une bande médiane d'un vert-doré ; inférieures avec un espace anal d'un rouge-cuivré glacé de violet et tacheté de noir.

B. bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes brièvement denté et ayant avant l'angle de l'anus une longue queue lancéolée.

2. URANIE Sloane.

Ailes noires : supérieures offrant de part et d'autre des lignes transverses et une bande d'un vert-doré : dessus des inférieures avec une bande en scie d'un rouge-cuivré.

3. URANIE Léilus.

Ailes noires, semblables de part et d'autre, avec des lignes transverses et une bande d'un vert-soleil : bande des inférieures en scie.

C. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes denté et ayant avant l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue, arquée et obtuse.

4. URANIE Oronite.

Ailes d'un vert-noir : leur dessus avec deux bandes, leur dessous avec pareil nombre de bandes et la base, d'un vert-doré.

5 URANIE Patrocle.

Dessus des ailes d'un brun-chatoyant ; dessous gris et ondulé de noirâtre : les deux surfaces offrant sur le milieu une bande blanche, commune.

D. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées et ayant avant l'angle de l'anus une large queue en spatule, sur laquelle il y a trois yeux.

6. URANIE Lunus.

Dessus des ailes brun, réticulé et ondulé de fauve : dessous d'un jaune d'ocre pâle, avec deux bandes brunes.

7. URANIE Empédocle.

Ailes brunes, ayant le dessus réticulé et ondulé de gris : les deux surfaces des quatre avec une bande médiane et le bord postérieur blanchâtres.



A. Bord postérieur des premières ailes presque entier. Bord analogue des secondes avec six dents, dont les trois intérieures en forme de queues.

1. URANIE Rhiphéus.

URANIA Rhipheus.

Uran. alis nigris : anticis utrinquè lineolis transversis fasciâque mediâ aureo-viridibus ; posticis areâ anali cupreâ violaceo micante nigro-que maculatâ.

Papilio E. A. Rhipheus, alis sex dentato-caudatis, nigris, viridi fasciatis : posticis subtus maculatâ aut ferrugineâ nigro punctatâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 6. n.º 45. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 21. n.º 62.*

Papilio Rhipheus. CRAM. *pl. 585. fig. A. B.*

Papilio Rhipheus. DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 25. fig. 1. 2. (Sans queues.)*

Papilio Rhipheus. ESP. *Pap. exot. tab. 21. fig. 1. — fig. 2. (D'après Drury.)*

Le Page de Chandernagor, vulgairement.

Uranie Prométhée. DRAPIEZ, *Diâ. class. d'Hist. nat. 3.º. livraison, pl. 8. fig. 1. 2.º.*

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec une multitude de petites lignes transverses & une large bande discoïdale d'un vert-doré-brillant aux supérieures; avec une bande médiane & une bande terminale du même vert aux inférieures. La bande des premières ailes est profondément bifide vers la côte, & les lignes qui la séparent de la base n'atteignent pas le milieu de la surface. Les deux bandes des secondes ailes sont sinuées, & elles se perdent vers l'angle de l'anus dans un espace d'un rouge-cuivré qui jette un reflet violet vif, & sur lequel il y a quatre ou cinq taches noires.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais les lignes vertes y sont plus larges.

Le dessous des ailes inférieures est d'un vert-doré à la base ainsi qu'à l'extrémité, avec des mouchetures noires; il est traversé au milieu par une bande d'un rouge-cuivré-chatoyant, bande qui offre une douzaine de taches noires orbiculaires, & qui se dilate à mesure qu'elle approche de la région de l'angle de l'anus. Les échancrures & les queues de ces ailes sont garnies de cils blancs de part & d'autre. Le corps est noir, avec des atomes d'un vert-doré sur l'abdomen, & des poils d'un jaune-saule sur la poitrine ainsi que sur les cuisses. Les antennes sont entièrement noires.

Il est des individus qui ont une petite ligne verte dans la fissure de la bande des ailes supérieures. Il en est d'autres chez lesquels la branche extérieure de cette bande est séparée en dessus,

tandis qu'elle est adhérente en dessous. Ces variations existent dans les deux sexes.

Cette espèce est de Madagascar & nou du Bengale; ainsi c'est d'après de flux renseignements qu'on lui a donné le nom vulgaire de *Page de Chandernagor*. Selon M. Bory de Saint-Vincent, elle se trouveroit aussi à Sainte-Hélène.

B. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes brièvement denté & ayant avant l'angle de l'anus une longue queue lancéolée.

2. URANIE Sloane.

URANIA Sloanus.

Uran. alis nigris : anticis utrinquè lineis transversis fasciâque aureo-viridibus ; posticis suprà fasciâ serratâ cupreo-rubrà.

Papilio Sloanus. CRAM. *pl. 85. fig. E. F.*

Papilio Sloanus. HERBST, *Pap. tab. 51. fig. 3. 4.*

SLOANE, *Jamaic. Hist. 2. tab. 259. fig. 11. 12.*

Cette uranie porte le nom de Sloane, célèbre médecin anglais, connu des naturalistes par son *Histoire de la Jamaïque*.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces d'envergure. Ses ailes sont noires. Les supérieures ont de part & d'autre six sept lignes transverses d'un vert-doré-brillant, entre lesquelles il y a une bande bifide ou trifide du même vert.

Le dessus des ailes inférieures est traversé dans son milieu par une bande d'un rouge-cuivré-luisant. Le dessous est d'un vert-doré, avec des mouchetures noires sur la côte & vers l'extrémité. Les queues sont noires, ce qui distingue encore cette espèce de l'uranie *Leilus*.

De la Jamaïque.

3. URANIE Léilus.

URANIA Leilus.

Uran. alis nigris, concoloribus, lineis transversis fasciâque sericeo-viridibus ; fasciâ posticâ serratâ.

Papilio E. A. Leilus, alis caudatis, concoloribus, nigris, fasciâ lineisque viridibus, utentibus, numerosis. LINN. *Syst. Nat. 2. pag. 750. n.º 51. — Mus. Lud. Ulr. 206.*

Papilio E. A. Leilus. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 12. n.º 48. — Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n.º 54. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 21. n.º 63.*

Papilio Leilus. CLERCK, *Icon. tab. 27. fig. 1.*

Papilio Leilus. CRAM. *pl. 85. fig. C. D.*

MERIAN, *Surin. Inf. tab. 29.*

KLEMAN, *Beytr. 1. tab. 2. fig. 1.*

KNOER, *Delic. tab. C. fig. 1.*

SEBA, *Musf. 4. tab. 56. fig. 1. 2. 3. 4.*

Papilio Leilus. HERBST, Pap. tab. 50. fig. 2. 3.

Papilio Leilus. Esp. Pap. exot. tab. 53. fig. 2.

Le Page de Cayenne. DAUBENTON, *pl. enlum. 71. fig. 1.*

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Ses ailes sont noires de part & d'autre, avec huit à neuf lignes transverses & une bande d'un vert-foyeux. La bande des premières ailes est trifide ou quadrifide à son extrémité supérieure. La bande des secondes ailes a le côté externe denté en scie, & le côté interne plus ou moins déchiqueté. Ces dernières ailes ont la frange du bord postérieur & la queue blanches, mais la queue a le milieu longé par une ligne noire. Le corps est rayé de vert, & beaucoup plus gros dans les femelles que dans les mâles.

De Cayenne & de Surinam.

C. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes denté & ayant avant l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue, marquée & obtuse.

4. URANIE ORONTE.

URANIA Orontes.

Uran. alis atro-viridibus : suprâ fasciâ duabus, subtis basi fasciisque totidem maurato-virescentibus.

Papilio E. A. Orontes, alis caudatis, nigris, albedo-virescente fasciatis : caudis albis distantibus. LINN. Syst. Nat. 2. p. 750. n. 27. — Amœn. acad. tom. 6. p. 402. n. 51.

Papilio E. A. Orontes. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 20. n. 80. — Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n. 91.

Papilio N. Orontes. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 69. n. 214.

Papilio Orontes. CLERCK, Icon. tab. 26. fig. 1.

Papilio Orontes. CRAM. pl. 83. fig. A. B.

Papilio Orontes. HERBST, Pap. tab. 47. fig. 1. 2.

SEBA, *Musf. 4. tab. 16. fig. 1. 2. — tab. 47. fig. 7. 8.*

Papilio Orontes. Esp. Pap. exot. tab. 50. fig. 1. 2.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-houille foncé, avec deux bandes courbes & transverses d'un vert-doré pâle. La bande postérieure est plus courte aux premières ailes, & maculaire aux secondes. Ces dernières ailes ont les échancrures & la queue ciliées de blanc.

Le dessous diffère du dessus en ce que la moitié antérieure de la surface est d'un vert-doré pâle, comme les deux bandes. Le corps est d'un vert-obscure en dessus, avec un collier blanc très-étroit. Il est d'un vert-blanchâtre en dessous, avec une bande longitudinale orangée sur le milieu du ventre. Les antennes sont noires.

Dans les femelles, l'abdomen est très-gros, & l'on voit quelquefois des mâles qui ont la bande postérieure du dessus des premières ailes presque nulle.

Des îles de Java & d'Amboine.

5. URANIE PATROCLUS.

URANIA Patroclus.

Uran. alis suprâ fuscis, nitidis ; subtis griseis, fusco undatis : utrinque fasciâ communi mediâ albâ.

Papilio E. A. Patroclus, alis caudatis, concoloribus, fuscis, fasciâ lineari albâ apicibusque albis. LINN. Syst. Nat. 2. p. 749. n. 24. — Musf. Utr. 204.

Papilio E. A. Patroclus. FAB. Spec. Inf. tom. 2. p. 13. n. 53. — Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n. 59.

Noctua Patroclus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 2. p. 8. n. 2.

Papilio Patroclus. CLERCK, Icon. tab. 37. fig. 1.

Papilio Patroclus. CRAM. pl. 109. fig. A. B. — pl. 193. fig. A.

Papilio Patroclus. HERBST, Pap. tab. 54. fig. 2. 3. — tab. 55. fig. 1.

SEBA, *Musf. 4. tab. 47. fig. 15. 16.*

Papilio Patroclus. DRURY, Inf. tom. 1. tab. 7. fig. 1. — tab. 8. fig. 1.

La Chauve-fouris. DAUBENTON, *pl. enlum. 17.*

Elle a de cinq à six pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-bruyant, avec une bande blanche, transverse, médiane & presque droite. Les premières ailes ont la côte entrecoupée de blanchâtre. Les secondes, dont l'extrémité est grisâtre & ondulée de noirâtre, ont les dents du bord postérieur & le bout de la queue blancs.

Le dessous des quatre ailes est gris & finement ondé de noirâtre, avec une bande blanche, répondant à celle du dessus, & largement bordée de brun. Le corps est brun en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont obscures.

Chez la femelle, la bande blanche des ailes est moins étroite que chez le mâle. Celui-ci a la dent qui précède la queue plus longue que les autres.

Elle se trouve en Chine, dans les îles de Java & d'Amboine.

D. Ailes supérieures entières. Ailes inférieures dentées & ayant avant l'angle de l'anus une large queue en spatule, sur laquelle il y a trois yeux.

6. URANIE LUNUS.

URANIA Lunus.

Uran. alis suprà fuscis, fulvo reticulatis & undatis: subtus lutescentibus, fuscis duabus fuscis.

Phalæna Attacus Lunus, feticornis, spirilignis: alis caudatis, fusco luteoque undulatis, ocellis caudalibus subternis. LANN. *Syst. Nat.* 2. p. 810. n^o. 6. — *Mus. Lud. Utr.* 371.

Ph. Lunus. CLERCK, *Icon. Llab.* 52. fig. 5. 4.

Papilio Lunus. CRAM. *pl.* 200. fig. A. B. C.

Papilio Lunus. HERBST, *Pap. tab.* 55. fig. 1. 2. 3.

Papilio E. A. Ægistrus, alis caudatis, fusco luteoque undulatis, ocellis luteoalibus subternis. FAB. *Spec. Inf. tom.* 2. p. 20. n^o. 82. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 10. n^o. 95.

Papilio N. Ægistrus. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. p. 69. n^o. 215.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-encumé, avec une multitude de lignes fauves, ondulées & transversales. Les premières ailes ont en outre les nervures fauves depuis la base jusqu'au-delà du milieu, ce qui les fait paroître réticulées à leur moitié antérieure. Les secondes ailes ont l'angle anal relevé, & leurs yeux sont noirs, fablés de bleu & cerclés de fauve. L'œil antérieur est placé à la naissance du bord interne de la queue, le second sur le milieu de ce même bord, & le postérieur au milieu de la spatule. De l'œil intermédiaire part une ligne noire, courbe, qui passe au-dessous de l'œil postérieur sur un fond jaunâtre, & va se perdre sur le bord interne de la queue.

Le dessous des quatre ailes est d'un jaune d'ocre pâle, & traversé entre le milieu & l'extrémité par deux bandes brunes, sinuées, dont la postérieure plus large & couvrant presque toute la queue. Le corps a le dessus brun & rayé de fauve; il a le dessous entièrement jaune. Les antennes font brunnâtres.

La femelle ressemble au mâle, mais elle a le corps plus gros.

De Surinam & du Brésil.

7. URANIE EMPÉDOCLE.

URANIA Empedocles.

Uran. alis fuscis, suprà griseo reticulatis & undatis: omnibus utrinquè fuscis mediâ transversâ margineque postico albidis.

Papilio Empedocles. CRAM. *pl.* 99. fig. A. B.

Papilio Empedocles. HERBST, *Pap. tab.* 53. fig. 4. 5.

Elle a de grands rapports avec la précédente, néanmoins elle s'en distingue par plusieurs caractères. D'abord elle est brune de part & d'autre, avec deux bandes blanchâtres, dont l'antérieure médiane, la postérieure terminale. En second lieu, les lignes ondulées du dessus de ses ailes sont grises, & celles qui séparent les deux bandes des inférieures ont une teinte rougeâtre; enfin, le bout de la queue est blanc au lieu d'être jaune.

De Surinam.

HESPERIE. *Hesperia.* Genre d'insectes de l'ordre des lépidoptères, famille des diurnes, tribu des hespérides, & distingué de celui d'uranie, autre & premier genre de la même tribu, par les caractères suivans: antennes terminées en massue. Palpes extérieurs (labiaux ou inférieurs) courts, larges & très-garnis d'écaillés.

Ces lépidoptères ont généralement le corps court & gros; la tête large; les antennes écartées à leur insertion & terminées brusquement en une massue plus ou moins ovale ou oblongue, finissant en pointe, & tantôt arquée, tantôt subitement courbée ou crochue; les palpes extérieurs ou labiaux larges, très-fourrus d'écaillés, de trois articles, dont le dernier très-petit, comparativement au second; les ailes fortes, & dont les inférieures toujours plissées au côté interne & souvent parallèles au plau de position dans le repos; l'abdomen court, presque conique, ou conico-cylindrique; toutes les pattes propres à la locomotion; les jambes postérieures armées de quatre ergots & les tarses terminés par deux crochets petits, simples & très-arqués. Leurs couleurs sont généralement obscures ou peu éclatantes. Leur vol est sautillant.

Leurs chenilles ressemblent à celles de divers lépidoptères nocturnes. Elles sont allongées, plus grêles aux deux extrémités, ou du moins antérieurement, presque nues, peu variées en couleurs, avec la tête grosse & souvent marquée de deux taches arrondies, imitant des yeux. Elles vivent entre des feuilles qu'elles roulent & qu'elles fixent avec de la soie. C'est là qu'elles se métamorphosent en une chrysalide unie ou sans éminences angulaires, & dont l'extrémité antérieure est plus ou moins avancée en une pointe simple.

Si les figures de Stoll, relatives aux métamorphoses de quelques espèces de Surinam, sont exactes, leurs chrysalides seroient fixées à la manière de celles des papillonides hexapodes, c'est-à-dire, par la queue, & par un lien de soie passant au-dessus du corps & lui formant une ceinture. Quelques espèces donnent deux fois dans la même année. Ces insectes fréquentent plus généralement les bois & les lieux très-garnis de graminées; quelques-uns se plaisent dans ceux qui

font humides ou aquatiques. L'Amérique équinoxiale en fournit le plus grand nombre d'espèces.

Dans l'article précédent, celui d'hespérides, nous avons exposé Philtoire de ce genre. Les proportions des deux derniers articles des palpes extérieures, la forme de la massue des antennes & celle des ailes inférieures, ainsi que leur position, donnent le moyen de le diviser. (*Voyez mon Genera Crust. & Insect. tom. 4, p. 208; l'article Hespérie du nouv. Dict. d'Hist. nat. 2^e édit., & la 14^e livraison des Papillons diurnes de France de M. Godart.*) Mais ces caractères se nuancent tellement, qu'il est bien difficile de fixer rigoureusement les limites de ces coupes. Il est certain que beaucoup d'espèces ont un port d'ailes particulier & que nous avons désigné (*voyez Hespérides*) par les mots d'ailes en chevron (*les estropiés de Geoffroy*); mais nous nous sommes assurés que beaucoup d'espèces exotiques ont, dans le repos, les quatre ailes élevées perpendiculairement, de même que les autres diurnes. Dans le premier cas, le bord extérieur des inférieures est proportionnellement plus dilaté & plus arqué à sa base. Il ne nous a pas encore été possible d'étudier, sous ce point de vue, chaque espèce. Il nous a donc fallu, dans un travail aussi général, renoncer à l'emploi de ce caractère. Celui que peut nous fournir la

faillie plus ou moins avancée de l'angle anal des mêmes ailes, est, dans bien des circonstances, & surtout lorsque ces ailes n'ont pas été étendues avec beaucoup de soin, très-équivoque. Comme cependant l'on ne peut arriver à la détermination des espèces sans former dans ce genre des divisions & subdivisions nombreuses, nous en avons établi plusieurs. Toutefois nous ne garantirons point l'homogénéité, ni l'exacitude de ces groupes. Le peu de temps que nous avons eu pour rédiger cet article ne nous a point permis de donner la dernière main à notre travail. Mais si nous avons erré dans le placement de quelques espèces, on fera sûr de les trouver dans les divisions les plus voisines de celle à laquelle elles doivent appartenir. Nos caractères spécifiques sont même très-souvent indépendans de ceux des divisions, ou peuvent seuls suffire. Nous eussions désiré de pouvoir citer les figures d'Hubner, relatives aux hespéries exotiques. Son ouvrage sur les lépidoptères étrangers n'existant dans aucune bibliothèque de Paris, cela nous a été impossible. Nous avons cherché à y suppléer, soit avec l'ouvrage de Cramer, trop négligé par Fabricius, & par ceux de Donovan, qui, étant maintenant possesseur des dessins inédits de Jones, que le naturaliste précédent a très-souvent cités, en a reproduit plusieurs.



GENRE HESPÉRIE.

HESPERIA, LATR., CUV., LAM., WALCK., GOD. — *PAPILIO* (Pleb. urbic.), LINN., GEOFF., SCOP., SCHEFF., DEN., SCHIFF., ESP., BORKH., CRAM., ENGRAM., OLIV., VILL., ROSS., PANZ., PRUN., HUBN., OCHSENH. — *ERYNNIS*, SCHR. — *THYMELE*, *HELIAS*, *PAMPHILA*, FAB. — *HETEROPTERUS*, DUMÉRIE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

ANTENNES très-écartées à leur base, courtes, terminées brusquement en une massue arquée ou crochue.

Une trompe roulée en spirale.

Palpes inférieurs ou labiaux courts, de trois articles, dont le second grand, large, très-garni d'écaïlles, et dont le troisième très-petit.

Six pieds ambulatoires; les deux jambes postérieures ayant deux paires d'ergots, l'une ordinaire et terminale, l'autre située plus haut, au côté interne.

Ailes inférieures sans crochet à leur base, plissées au côté interne, horizontales dans plusieurs, lorsque l'insecte est en repos.

Chenille à seize pattes, ordinairement nue, alongée, presque fusiforme, à tête grosse, et vivant entre des feuilles qu'elle roule et fixe avec de la soie.

Chrysalide renfermée dans ce rouleau, unie, avec l'extrémité antérieure entière ou sans échancrure à sa pointe.

ESPÈCES.

I. *Angle anal des ailes inférieures prolongé en une queue presque linéaire.*

1. *Bord postérieur des ailes inférieures entier.*

A. *Une bande blanche ou jaunâtre aux ailes inférieures, soit interne, soit marginale.*

1. HESPÉRIE Endoxe.

Ailes d'un noirâtre-foncé; une bande transverse sur les supérieures et bord postérieur des inférieures, blanches, une bande jaunâtre sous celles-ci.

2. HESPÉRIE Métopliis.

Ailes noirâtres en dessus, d'un ferrugineux-obscur en dessous; limbe posté-

rieur, bord interne et une raie sur le milieu des postérieures, gris: cinq taches transparentes formant une série sur les supérieures.

3. HESPÉRIE Cœlus.

Ailes noires en dessus, noirâtres en dessous; des taches vitrées aux antérieures: une bande transverse d'un blanc de neige sur le milieu du dessous des secondes.

4. HESPÉRIE Orion.

Ailes d'un noirâtre-foncé; les postérieures ayant leur limbe extérieur et la queue blancs.

HESPÉRIE. (Insecte.)

B. Point de bande blanche ou jaunâtre, soit interne, soit marginale, aux ailes inférieures.

5. HESPÉRIE Euryclès.

Ailes noirâtres; dessous des postérieures à trois bandes noires, celle de la base courte ou remplacée par une tache.

2. Bord postérieur des ailes inférieures denté ou sinué.

6. HESPÉRIE Catillus.

Noirâtre; une tache apicale sur le dessus des ailes antérieures et une bande maculaire et arquée sur les postérieures, d'un noirâtre-brun: espaces adjacens gris.

7. HESPÉRIE Protée.

Noirâtre; dessous des postérieures plus clair, avec trois bandes et une tache vers la base, noirâtres.

II. Ailes inférieures, sans queue ou à angle anal prolongé au plus en manière de dent.

1. Ailes supérieures peu ou point arquées à la côte: leur sommet peu ou point prolongé, ne formant ni de crochet, ni de finis.

A. Bord postérieur des ailes inférieures soit prolongé à l'angle anal ou plus extérieurement en manière de dent ou de très-petite queue, soit offrant avant cet angle un sinus ou une échancrure.

a. Ailes des deux sexes semblables ou sans différences notables.

* Une portion de la tête, l'anus ou l'angle anal (souvent aussi le collier) rouges ou orangés.

† Bord postérieur des ailes inférieures droit et très-entier.

— Antennes courbées brusquement à leur extrémité et terminées en une pointe fine, très-arguë.

8. HESPÉRIE Arinus.

Ailes très-noires; une tache sur le

milieu des supérieures, le bord postérieur des inférieures d'un blanc de neige.

9. HESPÉRIE Cléanthe.

Très-noire, avec la tête et l'anus d'un rouge de sang; dessus des ailes d'un bleu tirant sur le noir-foncé; trois taches et un point vitré, sur le disque des supérieures; bord postérieur des inférieures blanc, avec l'extrémité interne sanguine.

10. HESPÉRIE Polybie.

Ailes d'un noir-foncé; une tache fauve aux antérieurs; angle anal des secondes jaune.

11. HESPÉRIE Lycagus.

Ailes d'un bleu-verdâtre, sans taches.

— — Antennes presque graduellement arquées à leur extrémité et terminées par une petite massue oblongue, insensiblement amincie vers sa pointe ou obtuse.

12. HESPÉRIE Jupiter.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le vert, d'un verdâtre-doré en dessus, avec des veines et le bord postérieur noirs, sur leur dessous.

13. HESPÉRIE Zéleucus.

Ailes très-noires, sans taches, avec le bord postérieur blanc.

14. HESPÉRIE Ménéade.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu; bord postérieur et base des inférieures blanches.

15. HESPÉRIE Phidias.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu; limbe postérieur des inférieures rouge ou jaunâtre, bordé de blanc en dehors.

HESPÉRIE. (Insecte.)

16. HESPÉRIE Amiatus.

Ailes très-noires, avec le bord postérieur jaune.

17. HESPÉRIE Xantippe.

Très-noire; des bandes jaunes sur les ailes.

†† *Bord postérieur des ailes inférieures sinueux, à frange entrecoupée et paroissant dentelée.*

18. HESPÉRIE versicolore.

Très-noire; des bandes bleues sur l'abdomen et sur les ailes, une bande rouge et deux taches jaunes sur les ailes supérieures.

19. HESPÉRIE Assaricus.

Ailes très-noires; les supérieures tachetées de jaune et de blanc, le disque des inférieures jaune, avec des points noirs.

** *Point simultanément de teinte rouge ou orangée à la tête et à l'anus, ou à la tête et à l'angle anal des ailes inférieures.*

† *Bord postérieur des ailes inférieures sensiblement denté ou anguleux.*

— *Ailes inférieures sans taches vitrées ou n'en ayant qu'une au plus et diffoïdale.*

20. HESPÉRIE Iphiinon.

Très-noire; ailes antérieures avec une bande et deux taches jaunes, dessous des postérieures et des lignes sur l'abdomen d'un blanc-bleuâtre.

21. HESPÉRIE Polyzone.

Très-noire, avec des bandes bleues et blanches; ailes antérieures ayant des taches vitrées et des bandes transverses à la base; extrémité des antennes arquée graduellement.

22. HESPÉRIE Gnetus.

Très-noire; extrémité des antennes brusquement arquée; ailes postérieures fasciées de bleu, les antérieures ayant des taches vitrées et des rayons bleus à leur base.

23. HESPÉRIE Salus.

Ailes fauves, avec des bandes noires; des taches sur les antérieures et centre des postérieures vitrés.

24. HESPÉRIE Saint-Hilaire.

Ailes fauves en dessus, noires en dessous; des taches vitrées, bordées de noir, sur les antérieures: les postérieures ayant à l'angle interne un prolongement tronqué, ponctuées de noir en dessus, et fasciées de jaunâtre en dessous.

25. HESPÉRIE Éacus.

Ailes d'un noirâtre tirant sur le jaune, avec des points obscurs; des taches d'un blanc-transparent sur les antérieures.

— — *Les quatre ailes parsemées de plusieurs taches vitrées.*

26. HESPÉRIE Momus.

Ailes noires; les antérieures presque entièrement striées de lignes transparentes.

27. HESPÉRIE Erythus.

Ailes mélangées de noir et de brun-noirâtre, avec des taches transparentes, les unes presque carrées, où presque triangulaires, les autres en forme de points.

28. HESPÉRIE Cramer.

Ailes d'un ferrugineux-obscur, avec des taches vitrées, bordées de noir: une bande formée de taches bleuâtres et terminée postérieurement par une ligne noire, ondulée, sur leur dessous.

HESPÉRIE. (Insecte.)

†† Bord postérieur des ailes inférieures entier.

— Dessus du corps et origine supérieure des ailes verts ou d'un vert-bleuâtre : dessus de ces ailes noir ou noirâtre, celui des inférieures sans taches.

29. HESPÉRIE Creteus.

Ailes noires et sans taches en dessus, noirâtres en dessous, avec deux bandes transverses plus obscures : limbe postérieur ordinairement plus clair.

30. HESPÉRIE Parménide.

Noirâtre ; dessus des ailes sans taches : une grande tache blanche et interne sur le dessous des antérieures, celui des postérieures sans bandes.

31. HESPÉRIE du Roucou.

Noirâtre, sans taches en dessus ; une bande blanche sur le dessous des ailes postérieures.

32. HESPÉRIE Acastus.

Dessus des ailes d'un noir-bleu ; les supérieures ayant une bande d'un blanc-transparent, avec le sommet sans taches : dessous des inférieures d'un noirâtre-vert, avec le limbe postérieur cendré ou plus clair.

33. HESPÉRIE Mercatus.

Dessus des ailes noir ; les supérieures ayant une bande et une ligne de points près du sommet d'un blanc-transparent, base du dessous des inférieures blanche.

34. HESPÉRIE Ausone.

Ailes noirâtres ; les supérieures ayant une bande et une ligne de points, avant le sommet, d'un jaunâtre-transparent : dessus des inférieures, à l'exception du limbe, vert.

35. HESPÉRIE Savigny.

Dessus des ailes antérieures noir, avec des taches et trois points blancs et transparens ; les ailes postérieures noirâtres en dessus, brunes en dessous, avec un point noir à la base, et trois bandes obscures, transverses.

— — Dessus du corps et origine supérieure des ailes jaunâtres ; dessus des ailes noirâtre : des taches jaunâtres, transparentes et pour la plupart disposées en une ligne transverse, aux supérieures ; dessous des inférieures ayant soit des taches discoïdales d'un blanc-argenté (quelquefois effacées), soit une bande ou une raie (commune quelquefois aux deux surfaces) parcourant toute sa longueur ou toute sa largeur, tantôt de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre : ces ailes ordinairement sans taches ritrées.

φ. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures très-saillante.

36. HESPÉRIE Schœuherr.

Ailes noirâtres ; limbe postérieur et supérieur des inférieures et dessous de leur angle anal noirs ; les supérieures ayant une bande vitrée et une tache blanche près du sommet : une bande d'un jaune-pâle, large et transverse, sur les deux faces des postérieures.

37. HESPÉRIE Mercure.

Ailes postérieures ayant en dessous deux taches transverses d'un noirâtre très-foncé, avec l'espace intermédiaire d'un gris de perle luisant : limbe postérieur cendré en dehors, noirâtre intérieurement ; abdomen annelé de blanc.

38. HESPÉRIE Tityre.

Dessus des ailes postérieures d'un brun-foncé, avec une tache angulaire ou une bande transverse d'un blanc-argenté, au milieu.

HESPÉRIE. (Insecte.)

♂ ♀. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures soit point ou très-pet saillante, soit obtuse ou arrondie.

39. HESPÉRIE Epitus.

Ailes noirâtres en dessus, d'un fauve-obscur en dessous; des taches d'un jaunâtre-transparent et dont les trois intérieures disposées en triangle, aux supérieures: une bande transverse argentée sur le dessous des inférieures.

40. HESPÉRIE Ericus.

Ailes noirâtres; trois petits points vitrés aux supérieures, une tache jaunâtre et postérieure sur le dessous des inférieures.

41. HESPÉRIE Chromus.

Noirâtre, plus pâle en dessous; une ligne blanche, transverse, et une tache anale et noirâtre sur le dessous des ailes inférieures.

— — Dessus du corps et base supérieure des ailes point garnis d'un duvet soyeux vert ou d'un vert-bleuâtre; dessous des inférieures n'offrant point, du moins dans les espèces où ces parties sont jaunâtres, de taches discoïdales argentées, ni une bande longitudinale ou transverse, soit pareillement argentée, soit blanche ou jaunâtre.

♂. Des taches vitrées et dont plusieurs bordées de noir ou de noirâtre, en forme de petits yeux, sur les quatre ailes.

42. HESPÉRIE Polygius.

D'un noirâtre-roussâtre; une bande vitrée et maculaire au milieu des ailes antérieures.

43. HESPÉRIE Salatis.

Dessus des ailes d'un roussâtre-obscur; toutes les taches vitrées en forme de points.

44. HESPÉRIE Ramusis.

Ailes d'un noirâtre-brun, avec des taches et des points d'un blanc-transparent.

♂ ♀. Des taches transparentes sur les quatre ailes, sans cercle brun ou noirâtre autour; dessus des ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uniforme, soit avec un ou plusieurs points, soit avec de petites taches, transparentes.

45. HESPÉRIE Chemuis.

Corps brun; ailes noirâtres, bordées postérieurement de jaune: les postérieures de la même couleur des deux côtés, avec trois taches carrées, transparentes.

46. HESPÉRIE Ethlius.

Ailes noirâtres en dessus, jaunâtres en dessous, à l'exception du disque des antérieures; quatre taches et trois points près du sommet, transparents, sur celles-ci: quatre taches jaunâtres, formant une série transverse, sur les inférieures.

47. HESPÉRIE Antonin.

Ailes antérieures et dessus des postérieures noirâtres; côte des premières jaunâtre en dessous; les secondes ayant deux points jaunâtres: leur dessous d'un brun-rouge, avec la base d'un gris-jaune.

48. HESPÉRIE Dalman.

Dessus des ailes noirâtre; une tache apicale, triangulaire, d'un noirâtre-foncé, bordée de jaune aux supérieures; les inférieures ayant en dessus une ligne transverse de quatre points jaunâtres: leur dessous noirâtre, avec une bande jaunâtre ponctuée de noirâtre et une tache d'un noir-foncé presque oculaire.

49. HESPÉRIE Basoches.

Dessus des ailes d'un noir-brun; leur dessous, le disque des premières excepté,

HESPÉRIE. (Insecte.)

d'un brun-cendré; trois taches d'un blanc-transparent sur le disque des quatre; une tache apicale d'un blanc de neige sur le dessus des premières: trois points noirs en dessous, près de leur sommet.

50. HESPÉRIE FISCHER.

Ailes noires; sept taches aux supérieures et trois aux inférieures, d'un blanc-transparent.

51. HESPÉRIE LESOUR.

Ailes d'un noirâtre-foncé, avec des taches et des points d'un blanc-transparent; cinq points sur les inférieures, dont un discoidal, et les quatre autres situés en dessous et formant une ligne transversé.

52. HESPÉRIE BONFILS.

Ailes noirâtres en dessus, d'un fauve-noirâtre en dessous, avec le limbe postérieur plus clair; une bande sur les supérieures et des points disposés en une série transversé sur le milieu des inférieures, blancs et transparents: frange postérieure des quatre ailes entrecoupé de noir et de blanc.

♀ ♀ ♀. Des taches ou des points transparents aux ailes supérieures au plus.

53. HESPÉRIE THRIX.

Ailes noirâtres, moins foncées en dessous; trois taches d'un jaunâtre-transparent, et disposées en triangle aux antérieures: l'inférieure des antérieures en carré-long.

54. HESPÉRIE ENNIUS.

Ailes antérieures noirâtres, avec des taches d'un jaunâtre-transparent; dessus des secondes jaune, avec une bande marginale très-noire et arquée: leur dessous noirâtre, avec le disque blanc.

55. HESPÉRIE PHOCAS.

D'un jaunâtre-foncé ou roussâtre; des taches d'un jaunâtre-transparent aux ailes supérieures: les trois antérieures plus grandes, échancrées postérieurement, cinq à six autres points près du sommet; ailes inférieures jaunâtres, avec des bandes ou des lignes de points jaunâtres et transverses; antennes terminées brusquement en crochet.

56. HESPÉRIE AVITUS.

D'un jaunâtre-obscur; des taches d'un jaunâtre-transparent aux ailes supérieures: les deux antérieures plus grandes, presque carrées: deux ou trois autres en forme de points, près du sommet; des points noirâtres, disposés en lignes transverses, sur les inférieures; massue des antennes arquée graduellement.

57. HESPÉRIE RHÉTUS.

D'un fauve-jaunâtre, avec des ondes noirâtres sur les ailes; bord externe des supérieures très-replié: celui des inférieures d'un noir-bleu.

58. HESPÉRIE CRINISUS.

Ailes noirâtres, avec la base roussâtre en dessus et d'un jaunâtre-gris en dessous; disque du dessous des inférieures roussâtre, avec des bandes noirâtres: le plus souvent de petites taches transparentes aux ailes supérieures.

59. HESPÉRIE LYCIDAS.

Ailes antérieures et dessus des secondes d'un noirâtre-clair; des taches d'un jaunâtre-transparent sur le disque de celles-ci; les autres d'un noirâtre-nébleux à leur base, blanchâtres extérieurement: frange de toutes entrecoupée de blanc et de noirâtre.

HESPÉRIE. (Insecte.)

60. HESPÉRIE Lucas.

Ailes noirâtres ; quatre à cinq taches d'un jaune-transparent sur le disque des premières, les secondes sans taches.

61. HESPÉRIE Mathias.

Ailes noirâtres en dessus, d'un noirâtre-jauvâtre en dessous ; des taches et des points d'un blanc-transparent aux supérieures : une ligne arquée de points blancs sur les inférieures ou du moins sur leur dessous.

62. HESPÉRIE Grcmius.

Ailes noirâtres en dessus, d'un cendré-obscur en dessous ; des taches et des points d'un blanc-transparent aux supérieures, quatre à cinq points d'un noir-foncé et bordés de blanc sur le disque du dessous des inférieures.

63. HESPÉRIE Néron.

D'un noirâtre-foncé, un peu luisant ; une raie transverse de points blancs des deux côtés des ailes supérieures et sur le dessous des inférieures.

64. HESPÉRIE Jacchus.

Ailes noirâtres ; des taches jaunes et transparentes aux supérieures ; les postérieures ayant en dessus une tache discoïdale et composée, jaune, et en dessous six points blancs.

65. HESPÉRIE Flaccus.

Noirâtre ; des points transparents aux ailes supérieures, un point et une bande blancs aux inférieures.

66. HESPÉRIE Marc.

Dessus des ailes noir ; des taches d'un blanc-transparent aux supérieures ; les inférieures ayant au milieu de leur face supérieure une bande maculaire d'un blanc-bleuâtre ; leur dessous d'un brun-clair, avec le côté extérieur et une bande longitudinale interne, d'un jaune-pâle.

67. HESPÉRIE Lucrèce.

Ailes antérieures et dessus des secondes noirâtres ; celles-ci ayant en dessus une série transverse de points jauvâtres : leur dessous gris, mêlé de noirâtre, avec une tache triangulaire et interne, et un point placé sur une tache blanche et de forme semblable, d'un noir-foncé.

68. HESPÉRIE Lafrenaye.

Ailes noires en dessus, d'un fauve-obscur en dessous ; des taches, d'un blanc-transparent aux supérieures ; les inférieures ayant sur leur disque supérieur une bande maculaire, et en dessous une grande tache triangulaire et marquée d'un point ferrugineux, blanches.

69. HESPÉRIE Tibulle.

Ailes antérieures noires, avec des taches jaunes ; les secondes jaunes, avec le limbe noir.

70. HESPÉRIE Abébalus.

Ailes antérieures et dessus des secondes noirâtres ; une ligne de points blancs transverse et arquée sur celles-là : celles-ci ayant en dessus et dans leur milieu une bande jauvâtre, transverse ; leur dessous blanc, avec des veines rougeâtres, et trois taches d'un noirâtre-faive, deux au milieu et l'autre anale.

71. HESPÉRIE Pertinax.

Ailes entières et dessus des secondes d'un noirâtre-foncé ; quatre petites taches et trois points d'un blanc-transparent sur celles-là : dessous de celles-ci blanc, plus foncé postérieurement, avec des veines et une rangée transverse de points, blanchâtres.

72. HESPÉRIE Satorne.

Ailes noirâtres ; des points sur les supérieures et des stries sur le dessous des inférieures ; blancs.

HESPÉRIE. (Insecte.)

73. HESPÉRIE CÆSAR.

Ailes antérieures noirâtres, avec des taches vitrées; les postérieures d'un noir-foncé en dessus, avec une tache d'un blanc de neige au milieu: leur disque inférieur cendré, avec des points noirs.

74. HESPÉRIE VIRBIUS.

Corps et ailes noirs; deux petites taches et deux points d'un blanc-transparent aux supérieures, extrémité postérieure des inférieures d'un blanc de neige.

75. HESPÉRIE CURTIUS.

Ailes noires; quatre points blancs aux antérieures, les postérieures sans taches.

76. HESPÉRIE SÉNÈQUE.

Dessus des ailes noirâtre; leur dessous, le disque des premières excepté, d'un brun-cendré, avec des taches d'un jaune-obscur: une bande transverse et un point d'un blanc-transparent aux supérieures; dessus des inférieures sans taches.

77. HESPÉRIE CLAUDIEN.

Ailes d'un noir-foncé; deux bandes maculaires d'un blanc-transparent aux supérieures; les inférieures ayant en dessus une tache blanche, orbiculaire: leur dessous d'un brun-clair, avec la base grise, une bande transverse et des veines d'un noir-foncé.

78. HESPÉRIE MIROS.

Ailes d'un noir-foncé; deux taches médianes et une série de petits traits subopicale, d'un blanc-transparent, aux supérieures: disque des inférieures ayant une bande blanche et transverse, plus longue avec les extrémités jaunes, et en dessous.

79. HESPÉRIE HÉMÈS.

Ailes noires; des taches médianes et plusieurs points alignés aux supérieures, et les inférieures, à l'exception du limbe extérieur, blancs.

80. HESPÉRIE DUMÉRIL.

Dessus des ailes noir; leur dessous, à l'exception du disque des antérieures, d'un jaunâtre-brun: celles-ci ayant des taches et des lignes à leur base supérieure, jaunes; deux bandes jaunâtres et transverses sur le dessus des postérieures.

81. HESPÉRIE TALAUS.

Ailes d'un noirâtre-foncé; une tache sanguine à la base des supérieures: une bande maculaire à leur milieu et une série de points près de leur extrémité, d'un blanc-transparent; disque des inférieures, blanc.

82. HESPÉRIE EUMÈLE.

Ailes supérieures d'un noir-foncé, avec une tache à leur base et le bord interne fauves, deux bandes maculaires et un point intermédiaires, blancs; ailes postérieures fauves, avec des veines et le bord antérieur, noirs.

83. HESPÉRIE CLONIAS.

Ailes supérieures obtuses à leur extrémité, avec une bande transverse d'un blanc-transparent: leur dessus, ainsi que celui des inférieures, noirs; dessous de toutes mélangé de brun, de gris et de noirâtre.

84. HESPÉRIE BUSIRIS.

Ailes oblongues, très-noires; des taches et deux points jaunes, aux supérieures; les inférieures fauves, avec une bordure d'un noir-foncé.

HESPÉRIE. (Insecte.)

85. HESPÉRIE Pelée.

Ailes très-noires ; deux bandes transverses aux supérieures, l'une rouge sur leur milieu, l'autre près de leur extrémité et jaunâtre : une tache transparente dans l'entre-deux.

86. HESPÉRIE Gentius.

Jaune ; limbe des ailes postérieures et extrémité inférieure des supérieures noirs ; deux bandes transverses et un point intermédiaire jaunes près de l'extrémité de celles-ci.

87. HESPÉRIE Celsus.

Ailes noires en dessus, d'un noirâtre-brun en dessous ; une bande d'un jaunâtre-fauve des deux côtés des supérieures ; dessus des inférieures sans taches : leur dessous ayant une poussière cendrée, avec le bord extérieur et une raie transverse d'un noirâtre-brun.

88. HESPÉRIE Brontès.

Ailes noires ; une bande médiane aux supérieures et bord externe des inférieures, tantôt blancs, tantôt jaunes.

89. HESPÉRIE Justinien.

Ailes noirâtres ; des points transparents aux supérieures ; dessus des inférieures sans taches : milieu de leur dessous roussâtre, bordé postérieurement d'une rangée de taches cendrées, presque en forme d'yeux.

90. HESPÉRIE Rémus.

Ailes noires ; les supérieures sans taches ; dessous des inférieures ayant une bande sinieuse blanche, avec un point noirâtre.

91. HESPÉRIE Ménestriés.

Dessus des ailes noir ; celui des inférieures sans taches : deux lignes transverses, bleuâtres, sur leur dessous.

92. HESPÉRIE Anaphus.

Ailes noirâtres ; extrémité postérieure des inférieures et des anneaux sur l'abdomen jaunes.

93. HESPÉRIE Cebrenus.

Ailes d'un brun-clair ; une bande d'un blanchâtre-jaunâtre et demi-transparente aux supérieures.

94. HESPÉRIE Hélius.

Ailes noirâtres ; côté extérieur des inférieures fauve.

95. HESPÉRIE Pisistrate.

Ailes noirâtres ; les supérieures sans taches, avec un reflet jaune ; milieu du dessus des inférieures jaune : une bande d'un blanc de neige, ponctuée de noir, sur leur dessous.

b. *Ailes, ou du moins les supérieures, différant sensiblement par leurs couleurs ou leur disposition dans les deux sexes : une ligne ou une tache plus ou moins noire, en forme de cicatrice oblique, coupant les nervures, sur le milieu du dessus de ces ailes, dans la plupart des mâles.*

* *Dessus des ailes supérieures ayant au milieu un trait ou une tache d'un noir plus ou moins foncé, oblique, ou coupant les nervures.*

† *Des taches constamment vîtrées aux ailes supérieures.*

— *Massue des antennes terminée brusquement par un crochet.*

96. HESPÉRIE Phocion.

Dessus des ailes noirâtre ; quatre taches jaunes et transparentes aux supérieures : les trois postérieures disposées en une rangée transverse, l'autre située à la côte, échanerée ; dessus des ailes inférieures sans taches : des lignes et des taches d'un noirâtre-brun sur leur dessous.

HESPÉRIE. (Insecte.)

97. HESPÉRIE Sinon.

Disque des ailes d'un noirâtre-brun; quatre taches d'un jaune-transparent aux supérieures: deux près de la côte, écartées, les autres rapprochées; un point jaune et discoïdal des deux côtés des ailes inférieures.

98. HESPÉRIE Godart.

Dessus des ailes d'un noirâtre-brun; cinq taches d'un jaune-transparent aux supérieures; un point jaune sur le dessus des inférieures: leur dessous fauve, avec deux raies parallèles d'un jaune d'or pâle.

99. HESPÉRIE Julien.

Ailes (mâle) noirâtres; plusieurs points blancs et transparents au milieu des supérieures, deux antérieurs et rapprochés, les autres disposés en une ligne arquée; une raie de points blancs sur le milieu du dessous des inférieures.

— Antennes terminées en une massue régulièrement arquée dès son origine et sans crochet brusque à son extrémité.

100. HESPÉRIE Péron.

Ailes (mâle) noirâtres en dessus, d'un noirâtre-cendré en dessous; les supérieures ayant une petite ligne placée au-dessus d'une tache très-noire et quatre points près du sommet, d'un blanc-transparent; les inférieures sans taches.

†† Point de taches parfaitement et constamment vitrés aux ailes supérieures, quelques-unes au plus semi-diaphanes.

101. HESPÉRIE Nason.

Ailes noirâtres, le plus souvent sans taches, avec la frange postérieure rousâtre ou blanchâtre.

102. HESPÉRIE Pélopidas.

Ailes (mâle) cendrées; les supérieures et des points marginaux aux inférieures plus obscurs.

103. HESPÉRIE Silius.

Ailes (femelle) d'un noirâtre-brun; une bande transverse fauve et courte des deux côtés du disque des supérieures.

104. HESPÉRIE Cornélius.

Ailes (mâle) noirâtres, luisantes; une tache d'un noir-foncé, médiane, ovoïde et deux points blancs, sur les supérieures; une ligne de points de la même couleur, sur le dessous de toutes.

105. HESPÉRIE Pompée.

Ailes (mâle) supérieures et dessus des inférieures noirâtres; une tache très-noire avec deux points d'un brun-pâle et rapprochés au milieu du dessus des supérieures; dessous des inférieures d'un jaunâtre-obscur, avec des bandes noirâtres.

106. HESPÉRIE Mésogramme.

Ailes noirâtres; inférieures ayant en dessus un point presque central et en dessous une bande transverse, d'un jaune-pâle ou blanchâtre; une tache d'un noir-foncé, ovoïde, bordée de fauve, sur le dessus des ailes supérieures du mâle.

107. HESPÉRIE Phinée.

Ailes noirâtres en dessus, d'un jaunâtre-fauve en dessous, le milieu des supérieures excepté; extrémité antérieure du bord externe et une bande maculaire sur le dessus de celles-ci, extrémité du bord postérieur et une bande continue sur le même côté, aux inférieures, d'un fauve-jaune.

HESPÉRIE. (Insecte.)

108. HESPÉRIE CORAS.

Ailes noirâtres ; une bande maculaire, une tache striée à la base des supérieures et des taches à la base du dessous des inférieures, d'un jaunâtre-fauve.

109. HESPÉRIE THAUMAS.

Ailes noirâtres ; les supérieures ayant tantôt (mâle) le côté extérieur, depuis la base jusqu'au milieu, fauve, avec une petite ligne d'un noir-foncé, terminée par un point de cette couleur, et quelques points fauves près du sommet ; tantôt (femelle) n'offrant qu'une raie de points blancs et vitrés.

110. HESPÉRIE DRURY.

Ailes supérieures noirâtres, avec la côte, son extrémité exceptée, et une raie maculaire et transverse, rousâtres : un point très-noir sur leur disque, dans le mâle ; les inférieures d'un noirâtre-roussâtre, avec une raie peu marquée de points plus pâles sur le milieu de leur dessous.

111. HESPÉRIE AUGIAS.

Ailes supérieures et dessous des inférieures d'un jaune-roux ; dessus de celles-ci noir, avec un point presque central et une bande postérieure dentée de chaque côté, d'un jaune-fauve ; dessus des premières ayant une ligne oblique et courbe et le limbe postérieur noirs.

112. HESPÉRIE PHYLEUS.

Ailes d'un jaune-fauve ; dessus des supérieures ayant soit (mâle) une bande oblique et interrompue, soit (femelle) une tache arquée et le limbe postérieur noirâtres ; même côté des postérieures bordé extérieurement de noirâtre.

113. HESPÉRIE EPICTÈTE.

Dessus des ailes noir ; deux lignes aux supérieures, dont l'une costale et l'autre interne, oblique, plus longue et recourbée postérieurement, un point intermédiaire et milieu du dessous des quatre ailes, d'un jaune-fauve.

114. HESPÉRIE BANDES-JAUNES.

Ailes noires ; les supérieures ayant des deux côtés deux taches marginales, l'une à leur base, grande, triangulaire, l'autre près du sommet, et une bande postérieure, jaunes ; deux points et une bande transverse de cette couleur aux inférieures.

115. HESPÉRIE THÉMISTOCLE.

Ailes noirâtres ; une tache et une raie maculaire jaunes aux supérieures ; les postérieures sans taches, grises en dessous.

116. HESPÉRIE COMMIA.

Ailes d'un fauve-obscur, avec des taches d'un jaune-pâle en dessus et des taches blanches en dessous : taches du dessous des inférieures au nombre de neuf.

117. HESPÉRIE SYLVAIN.

Ailes d'un fauve-obscur et ayant de part et d'autre des taches d'un jaune-pâle : taches du dessous des inférieures au nombre de cinq.

118. HESPÉRIE LINÉA.

Ailes d'un fauve-luisant, avec une bordure brune en dessus, et la région du sommet d'un cendré-verdâtre en dessous : les deux surfaces des quatre sans taches dans la femelle.

HESPÉRIE. (Insecte.)

119. HESPÉRIE Linéola.

Ailes entières, divergentes, fauves, semblables de part et d'autre, sans taches dans la femelle, avec un trait noir plus étroit dans le mâle.

120. HESPÉRIE Actéon.

Ailes d'un fauve-obscur, avec une bordure brune en dessus et la région du sommet d'un cendré-verdâtre en dessous : les supérieures ayant de part et d'autre un arc transverse de taches d'un jaune-pâle.

*** Milieu du dessus des ailes supérieures des mâles sans ligne ni tache noire ou noirâtre et oblique, caractérisant ce sexe.*

121. HESPÉRIE ornée.

Ailes supérieures noirâtres, avec trois (mâle) ou cinq (femelle) taches jaunâtres en dessus : taches et sommet de leur côté inférieur blanchâtres ; dessous des ailes inférieures noir, avec une bande safranée, transverse, et le bord postérieur entrecoupé de noir et de lilac : leur dessous blanchâtre, avec des rangées transverses de taches noires.

122. HESPÉRIE Peinte.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec des taches jaunâtres et une série de points transparents près du sommet ; dessous des inférieures noir, avec une bande transverse et une rangée marginale de points, safranés : dessous de toutes, le disque des supérieures excepté, d'un fauve-brun ; des nervures longitudinales, une bande et une ligne transverses, blanchâtres, aux inférieures.

123. HESPÉRIE Propere.

Dessus des ailes noir ; des lignes et des taches jaunes sur les supérieures ; une bande de cette couleur sur le dessus des inférieures : des bandes fauves et jaunes alternantes sur leur dessous.

124. HESPÉRIE Calien.

Ailes noirâtres, avec des points et des taches jaunes ; une bande maculaire et transverse aux supérieures et une tache de cette couleur, grande, en forme de carré-long, s'étendant depuis le centre jusqu'au bord postérieur, aux inférieures.

125. HESPÉRIE Nostradamus.

Ailes entières, brunes : milieu du dessus des supérieures noir dans le mâle, traversé de part et d'autre dans la femelle par une ligne de taches jaunes : dessous des inférieures cendré.

126. HESPÉRIE Paniscus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre, chatoyant en rougeâtre, avec des taches fauves : les inférieures ayant dix taches en dessus et treize plus pâles en dessous.

127. HESPÉRIE Sylvius.

Ailes entières ; les deux surfaces des supérieures d'un jaune-doré-luisant, avec des points noirs ; les inférieures brunâtres, avec onze taches d'un jaune-doré en dessus et douze en dessous.

128. HESPÉRIE Aracynthus.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre-luisant ; sommet des supérieures tacheté de jaune de part et d'autre ; dessous des inférieures d'un jaune-roussâtre, avec douze taches blanches orbiculaires et cerclees de noir.

129. HESPÉRIE Métis.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-foncé, avec des taches fauves et pour la plupart en forme de points ; dessous des inférieures d'un noirâtre-brun, sans taches.

130. HESPÉRIE Plutargus.

Ailes noirâtres, parsemées d'or ; une

HESPÉRIE. (Insecte.)

tache à l'extrémité supérieure des premières et le dessous de leur bord extérieur roussâtres.

131. HESPÉRIE Numitor.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec un reflet fauve; celui des inférieures d'un jaune-roussâtre, avec le limbe extérieur noirâtre: leur dessous jaunâtre.

132. HESPÉRIE Catulle.

Ailes d'un noir-foncé, ayant le plus souvent en dessus une ligne postérieure de points blancs.

133. HESPÉRIE hottentote.

Ailes supérieures d'un noirâtre-cendré: leur côté interne et les postérieures d'un jaunâtre-pâle.

134. HESPÉRIE Lepeletier.

Ailes noirâtres; deux lignes blanches, longitudinales, droites et dont l'interne courte, sur le dessous des inférieures.

135. HESPÉRIE l'Herminier.

Ailes sans taches, noirâtres en dessus, d'un noirâtre-cendré en dessous; antennes annelées de blanc.

B. Ailes inférieures sans prolongement ni sinus à l'angle anal (généralement plus larges et plus arquées au bord postérieur que dans les divisions précédentes: le noir et le blanc, plus ou moins mélangés, dominant dans la plupart).

a. Ailes dentées.

* Dentelures des ailes assez fortes et très-sensibles.

136. HESPÉRIE de la Lavatère.

Ailes supérieures jaunâtres, avec deux

bandes plus pâles et des taches transparentes; dessus des inférieures d'un brun-olivâtre et ponctué de blanchâtre: leur dessous blanchâtre et presque sans taches.

137. HESPÉRIE de la Guinée.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus; les supérieures ayant deux bandes transverses d'un gris-bleuâtre et des taches transparentes; les inférieures ponctuées de blanc de part et d'autre, et ayant le dessous d'un cendré-pâle.

138. HESPÉRIE de la Mauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus, avec trois bandes transverses d'un gris-rougeâtre; supérieures ayant des taches transparentes; dessous des inférieures d'un brun-pâle et ponctué de blanc.

** Dentelures des ailes faibles ou à peine sensibles.

139. HESPÉRIE Eucrate.

Ailes d'un brun-pâle, et ponctuées de blanc; dessous des inférieures d'un jaune-fauve, avec des taches blanchâtres.

140. HESPÉRIE Proto.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une bande maculaire et des points d'un jaune-pâle; dessous des inférieures brun, presque jascié et ponctué de blanchâtre.

b. Ailes très entières ou sans dentelures.

141. HESPÉRIE Tagès.

Ailes d'un brun-noirâtre, offrant de part et d'autre une rangée marginale de petits points blancs; dessus des supérieures ayant deux bandes transverses d'un cendré-pâle.

142. HESPÉRIE du Sida.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieures

HESPÉRIE. (Insecte.)

res ayant une série flexueuse de taches blanches carrées, et une autre moins distincte avant le bord; dessous des inférieures blâne, avec une tache basilâire et deux bandes transverses d'un jaune-foncé.

143. HESPÉRIE Orbifère.

Ailes d'un brun-violet-luisant en dessous; les supérieures ayant deux séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un brun-tanné-clair, avec plusieurs taches blanches, dont les médiales arrondies: dernier entre-coupé blanc de la frange des ailes supérieures, à partir du sommet, plus largo que les autres.

144. HESPÉRIE Sao.

Ailes d'un brun-violet-luisant en dessus; les supérieures ayant deux séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un rouge-brûque, avec plusieurs taches blanches, dont les médiales irrégulières: troisième entre-coupé blanc de la frange des ailes supérieures, à partir du sommet, plus largo que les autres.

145. HESPÉRIE Plain-chant.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieures ayant une série flexueuse de taches blanches carrées, et une autre moins distincte avant le bord; dessous des inférieures d'un brun-vertâtre, avec des bandes de taches blanches: deuxième tache marginale, à partir du sommet, plus longue et ayant le bout intérieur en pointe bifide.

146. HESPÉRIE Fritillaire.

Ailes d'un brun-noirâtre; les supérieures ayant un œil central et une série flexueuse de taches blanches, carrées; dessous des inférieures d'un brun-vertâtre, avec des bandes de taches blanches: deuxième tache marginale, à partir du

sommet, plus courte et ayant le bout intérieur obtus.

147. HESPÉRIE du Chardon.

Ailes d'un brun-noir; les supérieures ayant trois séries flexueuses de taches blanches; dessous des inférieures d'un brun-olivâtre, avec plusieurs taches blanches, dont une beaucoup plus grande sur le milieu du bord d'en haut.

148. HESPÉRIE Vindex.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirs; des bandes d'un jaunâtre-obscur et blanches, alternantes, sur le dessous de celles-ci: une bande presque centrale, blanche, sur leur dessus; plusieurs taches éparses et une rangée postérieure de points de cette couleur aux supérieures.

149. HESPÉRIE Galba.

Ailes noirâtres, plus claires en dessous; deux lignes postérieures de points sur toutes; plusieurs taches éparses aux antérieures et deux bandes aux postérieures, blanches.

150. HESPÉRIE Syrichtus.

Dessus des ailes noir, avec un duvet, des taches en échiquier et des stries costales, blanches; dessous des supérieures presque semblable à leur dessus: celui des postérieures blanc, avec des ruies noires; limbe postérieur de toutes ponctué de blanc de deux côtés.

151. HESPÉRIE Tryxus.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirâtres, avec une bande transverse, composée de diverses taches anguleuses, d'un blanc-transparent; dessous des inférieures blanchâtre, avec une rangée terminale de points noirâtres.

HESPÉRIE. (Insecte.)

152. HESPÉRIE Arsalte.

Ailes blanches, avec le bord postérieur strié de noir.

153. HESPÉRIE Dioscoride.

Dessus des ailes noirâtre, avec deux lignes maculaires, jaunes; dessous des supérieures fauve, avec le disque noirâtre, tacheté de jaune; dessous des inférieures de cette couleur, avec des ondes noires.

154. HESPÉRIE Mavius.

Dessus des ailes noir, avec des lignes et une bande maculaire jaunâtres: leur dessous verdâtre, avec des stries et des taches blanches.

155. HESPÉRIE Cicéron.

Ailes noirâtres; des taches aux supérieures et disque des inférieures d'un blanc presque transparent: tache discoïdale de celles-ci dentée, avec une tache noirâtre en dessous.

156. HESPÉRIE Népos.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-foncé, avec des taches et des points plus obscurs; des points blancs et transparens sur celles-ci: les mêmes blanches en dessous, à l'exception de leur côté extérieur, cendrées en dessous à l'angle anal, avec la frange postérieure blanche.

157. HESPÉRIE Philémon.

Ailes sans taches, d'un noir-soyeux et luisant en dessus, d'un noirâtre-brun en dessous: bord interne des supérieures plus clair; antennes annelées de blanc.

158. HESPÉRIE Jovien.

Ailes supérieures noires, avec une bande maculaire d'un blanc-transparent; les inférieures bleues, avec une bande blanche: les nervures et le limbe extérieur noirs.

159. HESPÉRIE Salvien.

Dessus des ailes noirâtre, tacheté de vert; dessous des inférieures blanc, avec une ligne marginale de points noirâtres.

160. HESPÉRIE Juvénal.

Ailes d'un noirâtre-clair, avec des lignes de points blanchâtres ou noirâtres, presque en forme d'yeux, sur le limbe postérieur; une rangée transverse de points transparens, bordés de noirâtre, aux ailes supérieures.

161. HESPÉRIE Mimas.

Ailes noirâtres, avec le bord postérieur ferrugineux, et ayant en dessous une ligne de points noirs; trois points blancs et rapprochés aux supérieures.

162. HESPÉRIE Néron.

Dessus des ailes supérieures noirâtre, avec des taches blanches et d'autres cendrées et marginales; celui des inférieures très-noir, sans taches; dessous de toutes jaunâtre, tacheté de blanc et de noir.

163. HESPÉRIE Orcus.

Ailes supérieures et dessus des inférieures noirâtres; des points et une tache en croissant, vitrés, sur celles-là; celles-ci à bandes supérieures et dessous bleuitres.

164. HESPÉRIE Chlorocéphale.

Ailes d'un noirâtre-foncé, avec des bandes maculaires plus obscures; dessous des inférieures cendré au côté interne; palpes et dessus de la tête à écailles vertes et brillantes.

2. *Ailes supérieures ayant soit la côte très-arrquée, soit l'angle du sommet avancé en manière de crochet ou de faulx.*

HESPÉRIE. (Insecte.)

A. Bord postérieur des ailes supérieures presque droit ou sans courbure notable ni angle : le sommet point avancé brusquement en manière de dent ou de crochet.

a. Côté extérieur des ailes inférieures sans dents.

165. HESPÉRIE Mélandre.

Ailes blanches, avec des raies, des taches et plusieurs nervures noirâtres, obscurcissant souvent leur base et leur limbe postérieur ; quelques points transparents aux supérieures.

b. Côté extérieur des ailes inférieures ayant une dent forte et aiguë.

166. HESPÉRIE Néarque.

Ailes noirâtres en dessus, brunes en dessous, avec des lignes plus foncées des deux côtés.

B. Bord postérieur des ailes supérieures soit fortement arqué, soit anguleux, le sommet avancé ou terminé brusquement en manière de crochet ou de dent. (Ailes inférieures comme tronquées postérieurement ou très-concaves à l'angle anal.)

a. Côté extérieur des ailes inférieures denté ou anguleux.

167. HESPÉRIE Westermänn.

Ailes d'un noirâtre-cendré ou d'un brun-noirâtre en dessus, brunes en dessous, avec des lignes plus obscures et ondulées, des deux côtés ; des points vi-

trés et voisins de la côte aux supérieures ; un avancement bidenté au côté extérieur des inférieures.

168. HESPÉRIE Sébaldus.

Ailes noirâtres avec des ondes d'un noir-foncé ; sommet des supérieures crochu ; limbe postérieur des inférieures jaunâtre en dessous, avec des points noirâtres.

b. Côté extérieur des ailes inférieures sans angle ni dents.

169. HESPÉRIE Trasybule.

Dessus des ailes noir, avec des ondulations bleues ; dessous des inférieures cendré et ponctué de noirâtre à l'angle anal.

170. HESPÉRIE Mithridate.

Ailes très-noires, avec une tache et une bande postérieure d'un rouge-pourpre et des taches lunulées plus pâles.

171. HESPÉRIE Brebisson.

Ailes supérieures et dessus des inférieures d'un noirâtre-clair ; celles-ci ponctuées de noir : l'extrémité postérieure de leur dessus, leur dessous, le bord externe excepté, bleuâtres ; bord postérieur des supérieures anguleux.



I. Angle anal des ailes inférieures prolongé en manière de queue (souvent plumeuse), longue, étroite ou presque linéaire.

Observations. Espèces analogues, dans ce genre, aux papillons grecs à queue, toutes propres à l'Amérique, & spécialement à ses contrées équatoriales, à antennes terminées en massue conûbée ou crochue; taille moyenne, envergure d'environ deux pouces.

1. Bord postérieur des ailes inférieures entier ou sans dentelures sensibles; les uns ayant, pour la plupart, aux ailes supérieures, une ligne blanche & transparente, allant du milieu de la côte à l'angle interne: une bande blanche & transverse sur le dessous des inférieures dans les autres.

A. Une bande blanche ou jaunâtre aux ailes inférieures, soit interne, soit marginale.

1. HESPERIE EUDOXE.

HESPERIA Eudoxus.

Hesperia alis nigro-fuscis; anticis fuscis à transverse à posticis que margine postico albis, his infra fasciâ flavescente.

Hesperia U. Eudoxus, alis caudatis, fuscis: anticis utrinque, posticis subtus fasciâ albâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 351. n. 255.*

Papilio P. U. Eudoxus. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 775.

Papilio Eudoxus. Cram. Pap. 31. pl. 366. G. H.

Le corps est d'un noirâtre-foncé, avec un duvet d'un vert-foyeux & luisant à l'origine des ailes. Les supérieures sont traversées dans leur milieu par une bande d'un blanc-transparent, n'atteignant pas les deux bords. Les ailes inférieures sont finement bordées de blanc au bord postérieur & offrent en dessous, à peu de distance de ce bord, une bande étroite & transverse jaunâtre; les queues, d'après la figure de Cramer, sont un peu plus courtes que dans les espèces suivantes & divergentes.

Cette espèce habite Surinam.

2. HESPERIE MÉTAPHIS.

HESPERIA Metaphis.

Hesperia alis supra fuscis, infra fusco-ferrugineis, anticarum limbo postico margineque interno, posticarum strigâ mediâ, griseis: anticis maculis quinque hyalinis transversim seriatis.

Le dessus du corps est noirâtre, avec des poils verdâtres vers l'origine des ailes. Les supérieures ont des taches transparentes, d'inégale grandeur, dont cinq formant une ligne transverse, une sixième isolée, placée extérieurement près du milieu de cette ligne, & quatre autres près de la

Hist. Nat. Inf. Tome IX.

côte, avant le sommet, très-petites, surtout les deux postérieures, disposées aussi sur une ligne, mais très-courte & divisée obliquement dans un sens opposé à la précédente; le dessous des quatre ailes est d'un brun-ferrugineux; le bord interne des supérieures & leur limbe postérieur, à l'exception du bout, est grisâtre; une raie droite & oblique de la même couleur traverse le milieu des inférieures: mais cette teinte s'étend insensiblement sur le côté postérieur, de manière à former une sorte de bande bien terminée seulement au côté antérieur & par la raie; immédiatement au-dessous, l'aile est d'un ferrugineux plus clair, avec le bord postérieur grisâtre.

Elle se trouve au Brésil, d'où M. Langsdorff me l'a envoyée.

3. HESPERIE CÆLUS.

HESPERIA Cælus.

Hesperia alis supra nigris, fuscis; anticis maculis fenestratis, posticis infra fasciâ mediâ transverse à niveâ.

Papilio Cælus. Cram. Pap. 29. pl. 343. G. D.

Le corps proprement dit est noir en dessus & d'un jaunâtre-obscur en dessous. Le dessus des ailes est noir, avec une teinte d'un vert-foyeux se terminant avec les bords. Les supérieures ont de petites taches d'un jaune-transparent, dont cinq sur une ligne transverse, une quatrième en dehors des précédentes, isolée, & deux très-petites, en forme de points très-rapprochés, situées à la côte, avant l'angle du sommet. Le dessous des ailes est noirâtre ou plus clair que le dessus. Les inférieures n'ont point de dentelures sensibles, & leur milieu offre une bande étroite d'un très-beau blanc, un peu fluée sur les bords, partant près du milieu du bord externe & se rendant au bord opposé. Les queues sont plumeuses.

Elle se trouve au Brésil, & m'a été envoyée par M. Langsdorff.

4. HESPERIE ORION.

HESPERIA Orion.

Hesperia nigro-fusca; alatum posticarum limbo externo caudisque albis.

Hesperia U. Orion, alis caudatis, fuscis: anticis maculis fenestratis, posticis caudis albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 350. n. 254.*

Papilio P. U. Orion. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n. 774. — Spec. Inf. tom. 2. p. 133. n. 605.

Papilio P. U. Proteus, var. β. Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 355.

Papilio Orion. Cram. 15. pl. 155. A. B.

Z z z 4

DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 17. fig. 3. 4.*

CLERCK, *Icon. tab. 42. fig. 5. 6.*

Les corps est d'un noirâtre-obscur, avec une teinte d'un vert-foyeux à l'origine supérieure des ailes. La ligne blanche & transverse des premières est composée de quatre à cinq taches contiguës ou simplement séparées par des nervures plus ou moins grandes, & se termine un peu avant l'angle interne. Les secondes ailes ont en outre quatre autres taches blanches & diaphanes, mais très-petites, dont une adjacente au bord postérieur de la raie, près de son milieu, & les trois autres en forme de petits points, disposées en une petite ligne près de la côte, entre cette raie & le fommel. Le limbe postérieur des secondes ailes, à l'exception de la partie supérieure voisine de l'angle externe, & la queue, sont blancs, ou d'un blanc-jaunâtre; en dessous, cette bande blanche est interrompue au bord postérieur d'une rangée de petits traits presque en forme de lunules & noirâtres. Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

B. Point de bande blanche ou jaunâtre, soit marginale, soit interne, aux ailes inférieures.

5. HESPERIE Euryclès.

HESPERIA Euryclès.

Hesperia alis fuscis; posticis subtus fuscis tribus nigris, basilar abbreviata vel punctiformi.

Papilio P. U. Proteus, var. 2. t. LINN. Mus. Lud. Ulr. p. 353?

Papilio Dorantes. STOLL, Suppl. aux Pap. de CRAM. pl. 39. fig. 9. var. A.

Papilio Simplicius. Ibid. fig. 6. 6. E. var. B.

Le corps est noirâtre. Les ailes supérieures, dans plusieurs individus, ont la raie blanche transverse & le groupe de petits points situés près de la côte, que l'on observe dans l'espèce précédente; mais cette ligne est plus fine, sans taches adjacentes à son bord postérieur; dans d'autres individus, elle est plus courte & moins foncée, & finit enfin par disparaître, ainsi que les autres taches, comme cela a lieu dans l'individu représenté par Stoll, sous le nom de *Simplicius*; le nombre des points transparents qui composent le petit trait situé près de la côte, avant le fommel, est généralement de quatre. Le dessous des inférieures présente trois bandes noirâtres ou plus foncées que le fond, dont la supérieure beaucoup plus courbe & souvent réduite à une simple tache arrondie; la seconde, ou l'intermédiaire, est quelquefois divisée en deux, près du bord extérieur. Dans les individus qui, par l'étendue de la raie des ailes supérieures, se rapprochent le plus de l'O-

tion, le dessous des ailes inférieures & les bandes sont plus foncées; une ligne très-fine, jaunâtre, suit en dessous le frangé du bord postérieur. Cette espèce, avec les variétés indiquées ci-dessus, m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

Je n'ai point vu d'individu qui se rapportât parfaitement à la figure du *Dorantes* de Stoll. Mais comme cette hespérie ne paroit différer de de notre *Euryclès*, qu'en ce que les ailes supérieures ont les taches plus isolées & plus nombreuses, & que le bord postérieur des ailes inférieures est représenté entier, je crois pouvoir la considérer comme une simple variété de cette espèce. Si ce bord avoit réellement des dentelures, cette hespérie ne seroit qu'une variété du *Proteus*.

2. Bord postérieur des ailes inférieures sensiblement denté ou sinueux.

Nota. Ailes noirâtres; des taches d'un jaunâtre-transparent sur les supérieures de tous; quatre à cinq plus internes sur une ligne transverse, trois autres très-petites & très-rapprochées, à la côte, avant le fommel, & une dernière, assez grande, isolée dans l'espace intermédiaire.

6. HESPERIE Catillus.

HESPERIA Catillus.

Hesperia fusca; alis anticis subtus maculâ apicali posticisque fuscâ maculari arcuatâ brunneo fuscis, spatii adjectis griseis.

Papilio Catillus. CRAM. Pap. 21. pl. 260. F. G.

Nous pensons avec Cramer, & d'après l'observation de plusieurs individus, que cette espèce est très-distincte de l'*H. Protée*. Le dessous des ailes inférieures offre près de l'angle du fommel une tache triangulaire d'un brun-foncé, placée sur un fond gris. Dans les individus où les couleurs sont le plus tranchées, le dessous des inférieures présente, à peu de distance de leur origine, trois à quatre taches pareillement d'un brun-foncé, & sur un fond gris ou cendré, qui forme même une ligne ou bande oblique bisurquée, à son extrémité inférieure; au bord externe & au-dessous des taches précédentes, on en voit une autre de la même couleur, & bordée aussi de gris; le long du bord postérieur est une ligne de cette couleur, mais qui paroit peu dans d'autres individus. Je l'ai reçue du Brésil.

7. HESPERIE Protée.

HESPERIA Proteus.

Hesperia fusca; alis posticis subtus dilutionibus, maculâ basin versus fuscisque tribus nigris.

Hesperia U. *Proteus*, *alis caudatis, fuscis, maculis fenestratis; antennis uncinatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 351. n. 256.*

Papilio P. U. *Proteus.* MANT. *Inf. tom. 1. p. 85. n. 76. — Spec. Inf. tom. 2. p. 152. n. 606. — Syst. Ent. p. 532. n. 379.*

Papilio P. U. *Proteus.* LINN. *Syst. Nat. 2. p. 794. n. 259. — Mus. Lud. Ulr. p. 533. n. 151.*

Papilio Proteus. CRAM. *Pap. 22. pl. 260. D. E. tom. 1. p. 59. tab. 18.*

CLERCK, *Icon. Inf. tab. 42. fig. 1. 2.*

MERIAN, *Surin. tab. 65. fig. 2.*

Les taches transparentes des ailes supérieures varient pour la grandeur; on voit souvent au-dessous des postérieures un espace plus clair; le bord postérieur, dans quelques individus, offre une rangée de points noirâtres. Le dessous des ailes inférieures est moins foncé que l'autre surface, avec une tache presque en forme de point près de la base, & trois bandes transverses, ondulées, dont la seconde ordinairement coupée près de la côte, & dont la dernière plus étroite ou se formant qu'une ligne d'un noirâtre-foncé. On aperçoit çà & là de petits atomes grisâtres, dont quelques-uns réunis même quelquefois en manière de petits traits, bordant intérieurement la première bande. A l'origine supérieure des ailes est un duvet d'un vert-foyeux.

Je possède une variété où le dessous des ailes inférieures est presque cendré, avec trois bandes transverses noirâtres, & où cette couleur cendrée forme, sur le dessous de l'extrémité des ailes inférieures, une grande tache.

Linnée dit (*Mus. Lud. Ulr.*) que le papillon *Protée* varie presque à l'infini, & il en cite sept variétés principales; mais à moins qu'on ne veuille tout confondre & retomber dans le chaos, il est absolument nécessaire de distinguer spécifiquement plusieurs de ces variétés.

Ce lépidoptère est commun dans toutes les parties de l'Amérique situées entre les tropiques, remonte même au nord, jusqu'en Géorgie, mais où, suivant Abbot, il est rare. Fabricius dit que la chenille vit sur le *dolichus*; qu'elle est verte, avec le col noir & des raies longitudinales dont les latérales jaunes & celles du dos noires.

Abbot l'a trouvée sur le *chloria* rouge. Elle est verte, avec des raies jaunâtres & l'anis rouffâtre; la tête est forte, un peu concave en dessus & bruna, ainsi que le col, avec les espaces oculaires plus pâles. De même que les autres chenilles des *hespéries*, elle plie les feuilles de cette plante, pour s'y mettre à l'abri. Celle qu'il éleva se fila une coque le 2 juillet, & les métamorphoses se terminèrent le 18 août. On ne trouve ainsi ce lépidoptère qu'en automne. Il fut très-commun

en 1782; mais depuis cette époque, l'auteur n'en vit plus. Cette chenille fe nourrit aussi de diverses autres plantes légumineuses.

II. *Ailes inférieures sans queue ou n'ayant au plus qu'un prolongement fort court, en manière de dent, à l'angle anal.*

1. *Ailes supérieures peu ou point arquées à la côte: leur sommet peu ou point prolongé, ne formant ni crochet ni faulx.*

Nota. Dernier article des palpes extérieurs ordinairement très-petits, comparativement au précédent & peu velu.

A. *Bord postérieur des ailes inférieures soit prolongé à l'angle anal ou un peu plus extérieurement, en manière de dent ou de très-petite queue, soit offrant, avant cet angle, un sinus ou une échancrure.*

Nota. Les espèces de la division opposée ont le bord postérieur des ailes inférieures proportionnellement plus long, plus arqué & presque insensiblement réuni avec le bord latéral extérieur. Le plus souvent les quatre ailes sont variées de noir & de blanc, ou noirâtres, avec des lignes ou des bandes plus foncées ou d'une autre couleur, nombreuses & ondulées. Ces caractères secondaires peuvent suppléer à ceux que j'ai donnés, & qu'il n'est pas toujours facile de saisir, tant ces variétés de formes se nuancent imperceptiblement.

a. *Ailes des deux sexes presque semblables, ou sans différences notables; les supérieures des mâles n'offrant jamais en dessus, au milieu du disque, un trait noirâtre ou plus foncé que le fond, oblique & coupant les nervures. (Ailes inférieures dentées ou avec l'angle anal sensiblement prolongé, en manière de dent, dans plusieurs: fond du dessus des supérieures généralement peu varié, & ayant dans le plus grand nombre des taches transparentes.)*

* *Une portion de la tête, l'anis ou l'angle anal des ailes inférieures (souvent aussi le collier ou prothorax) rouges ou orangés.*

Nota. Espèces paroissant représenter dans cette tribu les papillons *Troyens* de Linnæus, propres aux contrées équatoriales, grandes ou moyennes, ayant les ailes noires ou d'un noir-verdâtre & les palpes extérieurs larges, très-velus & noirs à leur extrémité.

† *Bord postérieur des ailes inférieures droit & très-entier.*

— *Antennes courbées brusquement à leur extrémité & terminées en une pointe fine, aiguë.*

8. HESPÉRIE Arinus.

HESPERIA Arinus.

Hesperia alis atris; anticis maculâ mediâ, posticis margine postico, niveis.

Hesperia U. Arinus, *alis caudatis, concoloribus, atris: maculâ transversâ niveâ, ano sanguineo.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 356. n^o. 276.

Papilio P. U. Arinus. Mant. Inf. tom. 2. p. 87. n^o. 792. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 134 n^o. 617.*

Papilio Arinas. CRAM. Pap. g. pl. 100. D.

Sa largeur, les ailes étendues, est d'environ deux pouces. Le corps est d'un noir-foncé, avec une teinte d'un bleu-chatoyant sur les ailes. Le devant de la tête & l'anus sont d'un rouge-sanguin. Les secondes ailes sont bordées de blanc au bord postérieur. Le milieu des supérieures offre une tache de cette couleur, ovale, transverse, d'un lustre argenté & tant soit peu transparente, selon Cramer.

Elle habite la colonie de Surinam.

9. HESPÉRIE Cléanthe.

HESPERIA Cleanthes.

Hesperia atra, capite anoque sanguineis; alis fuscâ atro-ceruleis; antecarum disco maculis tribus punctoque fenestralis, posticarum margine postico albo intus sanguineo.

Je dois à l'amitié de M. Langsdorff un individu mâle de cette espèce, qui se rapproche beaucoup de la précédente par la taille. Son corps est d'un noir-lénié foncé, avec la tête, le collier & l'anus, d'un rouge-sanguin-clair. Les hanches antérieures sont d'un rouge-foncé. Les ailes sont en dessus d'un bleu très-foncé, foyeux & luisant; leur dessous, à l'exception du centre des supérieures qui conserve la teinte supérieure, est d'un ferrugineux-olfeur, avec la partie contiguë au lumbé du bord postérieur, plus claire, & formant presque une bande transverse d'un gris d'agate. Le milieu des supérieures a sur les deux surfaces trois taches & un point an-dessus d'elles, transparents; ces taches sont disposées sur une ligne oblique & très-petites; celle du milieu est un peu plus grande, & presque lunulée. Les ailes inférieures sont terminées par une ligne blanche, jusque près de l'angle interne; cet angle est d'un rouge-sanguin. Le dessous du bouton des antennes est grisâtre.

Elle se trouve au Brésil.

10. HESPÉRIE Polybe.

HESPERIA Polybina.

Hesperia alis atris; anticis maculâ fulvâ, posticis angulo ani flavo.

Hesperia U. Polybius, *alis ecaudatis, atris: anticis maculâ fulvâ, posticis angulo ani flavo.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 337. n^o. 281.

Hesperia P. U. Palemon. *Ibid.* p. 355. n^o. 275. — *Papilio* P. U. Palemon. Mant. Inf. tom. 1. p. 87. n^o. 789. — *Spec. Inf. tom. 2. pag. 134. n^o. 615.*

Papilio P. U. Polybius. DOXOW. of an Epitom. of the Nat. Hist. of the Inf. of India, n^o. 11. pl. 1. fig. 2.

Papilio Palemon. CRAM. Pap. 11. pl. 131. F.

Son envengure est d'environ deux pouces. Le corps est d'un noir-foncé, avec les palpes inférieurs, le dernier article excepté, & le collier rouges. L'anus, dans cette espèce, est de la couleur du corps. Les ailes sont noires, un peu verdâtres, finement bordées de blanc au bord postérieur; la portion interne est rouillée aux inférieures. La base des supérieures offre une teinte d'un vert-foyeux-luisant. Près du milieu de la côte est une petite tache oblongue, d'un rouge de sang, & coupée en deux parties très-inégaux par une nervure.

On la trouve à Surinam & au Brésil.

11. HESPÉRIE Lycagus.

HESPERIA Lycagus.

Hesperia alis viridi-ceruleis, immaculatis.

Hesperia U. *alis rotundatis, integerrimis, viridi-ceruleis, immaculatis; ano sanguineo.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 346. n^o. 322.

Papilio P. U. Lycagus. Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n^o. 815. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 136. n^o. 635.*

Papilio Lycagus. CRAM. Pap. 15. pl. 176. G.

Nous n'avons point vu cette espèce; mais à en juger d'après la description de Fabricius & la figure de Cramer, elle se rapproche beaucoup de la précédente, & ne s'en éloigne qu'en ce que ses ailes sont sans taches & ne sont point sensiblement bordées de blanc. La tête, ou du moins sa partie supérieure & le collier, ne seroient point de couleur rouge, ainsi que cela a lieu dans les espèces de cette division.

Elle se trouve à Surinam.

— — Antennes presque graduellement arquées à leur extrémité & terminées par une petite massue oblongue, insensiblement amincie vers sa pointe ou obtuse.

12. HESPÉRIE Jupiter.

HESPERIA Jupiter.

Hesperia alis suprà viridi-atris, infra aureo-virescentibus, venis margineque postico nigris.

Hesperia U. Jupiter, *alis ecaudatis, atris, viridi-nitentibus, subtis viridibus, venis margineque nigris, capite anoque sanguineis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 356. n^o. 279.

Papilio P. U. Jupiter. Mant. Inf. tom. 2. p. 87. n^o. 792.

Papilio Iphis. DRURY, Inf. 2. pl. 15. fig. 3. 4.

Papilio Phidias. CRAM. Pap. 21. pl. 244. A. B.

Cette espèce a environ trois pouces d'envergure, & doit être placée parmi les plus grandes de ce genre. Son corps est noir, avec les poils des deux premiers articles des palpes inférieures, ceux de l'entre-deux des yeux, de la partie supérieure du prothorax ou du collier, le dessous du segment anal & le milieu du bord postérieur & intérieur du segment précédent d'un rouge-sanguin, mais qui tourne à l'orangé, dans les individus altérés par la vétusté. Les antennes sont entièrement noires & se terminent, un peu au-delà du milieu, en une masse presque en forme de fuseau, avec l'extrémité pointue & arquée. Le dernier article des palpes extérieurs est noir, beaucoup plus grêle que le précédent, proportionnellement plus allongé que dans les espèces voisines, cylindrique & arrondi ou obtus à son sommet. Le dessus des ailes est tantôt d'un noir-foncé un peu verdâtre, sans la moindre tache; tantôt généralement d'un verdâtre-bronzé, entrecoupé longitudinalement de noir, avec le sommet des ailes supérieures d'un rouillâtre-pâle. Le dessous des quatre ailes est d'un vert-bronzé ou doré luisant, avec les nervures & le bord postérieur noirs; la couleur verte domine principalement sur les inférieures, & le noir des nervures y forme de grandes veines.

Selon Cramer, qui a représenté la variété dont les ailes supérieures sont rouillâtres à leur sommet, elle se trouveroit à la Chine, au Bengale & sur les côtes d'Afrique voisines de l'équateur.

13. HESPÉRIE Zéleucus.

HESPERIA Zéleucus.

Hesperia alis atris, immaculatis, margine postico albo.

Hesperia U. Zéleucus, *alis integris, concoloribus, atris; posticis margine albo; capite caudaque sanguineis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 346. n^o. 517.

Papilio Thafus. CRAM. Pap. 32. pl. 380. M. N.

Papilio Zéleucus. DONOW. of an Epitom. of the Natur. Hist. of the Insects Ind. 11. pl. 3. fig. 3.

Elle est une des plus grandes, après la précédente. Son corps est d'un noir-foncé, avec une teinte d'un vert-foyeux foncé & chatoyant sur les ailes. Toute la tête, le collier, les hautes antérieures & l'anus font d'un rouge de sang; le dessous du corps offre aussi sur les côtés des taches de cette couleur. Les quatre ailes sont terminées postérieurement par un liseré blanc & très-fin.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Laugdsdorf.

14. HESPÉRIE Mænade.

HESPERIA Mænade.

Hesperia alis cæruleo-atris, margine postico posticarumque basi albis.

Hesperia U. Mænade, *alis integris, viridi-atris, nitentibus, margine albis; posticis subtis fuscis albâ; ore anoque rubris.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 347. n^o. 518.

Papilio P. U. Phidias, *alis rotundatis atris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* LINS. Syst. Nat. 2. p. 795. n^o. 263. — *Mus. Lud. Ulr* p. 354. n^o. 152.

CLERCK, *Icon. tab. 44. fig. 1. 2.*

Papilio Bixæ. CRAM. Pap. 17. pl. 199. C. D.

Cramer s'est mépris à l'égard du papillon *Phidias* de Linnée, & l'espèce qu'il nomme ainsi est l'*H. Jupiter* de Fabricius.

Son papillon *Bixæ* ou du Roncon est considéré par le naturaliste suédois (*Mus. Lud. Ulr.* p. 354), comme le mâle du *Phidias*, & son *P. Acastus* (pl. 199 E) en est, selon celui-ci, la femelle. Linnée prend aussi pour des variétés du *Phidias*, celle de l'*Acastus* de Cramer (pl. 41, C, D), & le *P. Anyclus* de cet auteur. Il rapporte encore à son *Phidias* un Lépidoptère d'un genre très-différent, figuré par Petiver, & à ce qu'il paroît, par Clerck (*tab. 44. fig. 7 & 81*), & par Cramer (*Phalœna lineæ*, Pap. 19. pl. 228. B.) Fabricius a donné pour une espèce nouvelle (*Mænade*) l'hésperie que Linnée prend pour le mâle du *Phidias*. Dans sa seconde citation de Cramer, au lieu de répéter le nom d'*Acastus*, il écrit, mal-à-propos, *Phidias* (1); & à l'égard des autres synonymes, il copie, sans discernement, Linnée.

Cette hésperie a environ un pouce & demi de largeur, ses ailes étendues. Son corps est noir,

(1) Il n'avoit pas commis cette erreur dans son *Species Insectorum*.

avec la tête & l'anus d'un rouge de sang. Les ailes font d'un noir-bleuâtre-foncé, glacé de vert-chaoyant. L'origine des ailes inférieures est au dessous d'un blanc-mat, y formant une bande transverse, s'étendant même, dans quelques individus, sur les deux ailes supérieures. Les unes & les autres font terminées postérieurement par un liseré très-fin de la même couleur.

Cramer remarque que les mâles ont les ailes plus étroites & plus oblongues que les femelles. Cette observation s'applique aussi à d'autres espèces du même genre.

On trouve celle-ci à Surinam & à Cayenne.

15. HESPERIE Phidias.

HESPERIA Phidias.

Hesperia alis œvulo-atris; posticarum limbo postico rubro vel flavescente, albo exteriori marginato.

Hesperia U. Phidias, *alis integris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 347. n. 319.*

Papilio U. Phidias. *Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n. 814. — Spec. Inf. tom. 2. p. 136. n. 652. — Syst. Ent. p. 554. n. 595.*

Papilio P. U. Phidias, *alis rotundatis, atris, nitentibus, margine albis, ore anoque rubris.* LINN. *Syst. Nat. 2. p. 795. n. 295. — Mus. Lud. Ulr. p. 554. (Fœmina.)*

CLERCK, *Icon. pl. 44. fig. 5. 4.*

Papilio Acaflus. CRAM. *Pap. 17. pl. 199. E. — 4. pl. 41. C. D. (Var.)*

Je n'ai vu que des mâles de cette espèce, & qui tous se rapportent à la figure précitée de Cramer, ou à son papillon *Acaflus*, très-différent de celui qu'il représente ailleurs sous le nom d'*Apaf-tus* & qui est l'*Acaflus* de Fabricius. La taille de ces individus égale presque celle des mâles de l'espèce précédente. Le corps est noir, avec les palpes extérieures, leur extrémité exceptée, le collier, l'anus, la portion supérieure du bord extérieur & inférieur des secondes ailes, & des points sur les côtés de la poitrine & du ventre, d'un rouge-vermillon. Les ailes sont d'un noir-bleuâtre foncé, avec une teinte d'un vert-doré & luisant, depuis leur milieu environ jusqu'à leur naissance. Les secondes sont terminées postérieurement par une bordure blanche très-fine, moins prononcée vers l'angle extérieur; à la face inférieure, cette ligne blanche est un peu sale ou pointillée de noirâtre, du côté du même angle, & sur elle repose, immédiatement dans toute la longueur, une bande jaunâtre, droite, rétrécie en pointe vers l'angle anal. Dans d'autres individus, les femelles, à ce qu'il paroît, tels que ceux figurés par Cramer,

pl. 199 E, cette bande est rouge, & s'étend, en forme de ligne, tout le long du bord extérieur; ses ailes supérieures sont aussi terminées par un liseré blanc. Cramer dit que les parties du corps des femelles colorées en rouge, sont jaunes dans les mâles.

A Cayenne & à Surinam.

16. HESPERIE Amiatius.

HESPERIA Amiatius.

Hesperia alis atris, margine postico flavo.

Hesperia U. Amiatius, *alis integerrimis, atris; margine postico flavo; capite anoque sanguineis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 347. n. 320.*

CLERCK, *Icon. pl. 44. fig. 5. 6.*

Papilio Amyclas. CRAM. *Pap. 7. pl. 199. F.*

Elle est très-voisine du mâle de l'espèce précédente; mais elle en diffère en ce que les quatre ailes sont terminées postérieurement, tant en dessus qu'en dessous, par une bande d'un jaunecouci; qui est plus étroite aux ailes supérieures.

Elle habite les mêmes contrées.

17. HESPERIE Xanthippe.

HESPERIA Xanthippe.

Hesperia atra, alis flavo-fuscatis.

Elle est de la taille de la précédente, d'un noir-foncé & foyeux, avec la tête, l'anus & quelques taches sur les côtés du ventre, d'un rouge-sanguin, mais plus clair à la brosse anale. Le bord postérieur & supérieur des derniers anneaux, le terminal excepté, est dépourvu de poils, luisant & grisâtre, ce qui forme sur cette partie du corps de petites raies transverses de cette couleur. Les quatre ailes ont, des deux côtés & vers leur milieu, une bande transverse d'un jaune-d'oere, coupé par les nervures: celle des inférieures est un peu plus étroite & plus divisée; les supérieures en ont une de plus, située au-dessus de la précédente, à égale distance d'elle & du bord postérieur, plus étroite, commençant vers la moitié de la largeur, gagnant ensuite le bord extérieur en se recourbant un peu, & divisée par les nervures en cinq petites taches. La poitrine offre de chaque côté, immédiatement au-dessous des ailes, une ligne jaune. Le bord externe des ailes inférieures est, vers sa naissance, de cette couleur; leur bord extrême & postérieur est blanc.

Cette espèce se trouve au Brésil, & m'a été donnée par M. Langsdorff, consul de l'empereur de Russie à Rio-Janeiro.

†† Bord postérieur des ailes inférieures sinuées, à frange entrecoupée & paroissant dentelée.

10. HESPÉRIE VERGICOLEUR.

HESPERIA versicolor.

Hesperia atra, abdomine alisque cœruleo fasciatis, alis anticis fasciâ rubrâ maculisque duabus flavidis.

Cette belle espèce a évidemment de grands rapports avec l'hésperie *Gnetus* de Fabricius & quelques autres analogues. Son ouvergure est de près de deux pouces. Les antennes se terminent de la même manière que dans la division précédente. Le corps est noir, mais entrecoupé d'orangé & de bleuâtre, formant des lignes. Les palpes inférieurs, le dessous des hanches & des cuilles, les côtés de la poitrine & l'anus, sont orangés; telle est aussi la couleur de deux points que l'on voit à l'extrémité de l'écuillon & de deux lignes qui s'étendent longitudinalement, une de chaque côté, sur le dessus du corselet, ou plutôt du mésothorax; sur l'espace intermédiaire sont deux autres lignes parallèles aux précédentes & d'un bleu-pâle, tirant sur le blanc ou sur le jaune. Les ailes inférieures sont traversées obliquement, en dessus & en dessous, par des raies ou bandes étroites de cette couleur, deux en dessus & trois sur le dessous; la seconde des inférieures est plus large, plus pâle, ou blanchâtre vers le haut; la postérieure est un peu entrecoupée; la base des ailes offre aussi une petite ligne transverse de la même teinte; leur frange postérieure est blanche & entrecoupée de petites taches noires. Les ailes supérieures ont, dans leur milieu & des deux côtés, une bande transverse, oblique, composée de trois taches réunies, d'un rouge-langun en dessus, de cette couleur près de la côte & ensuite d'un jaune-foncé en dessous: cette bande n'atteint point entièrement les deux bords; entre elle & la côte, ou près de son bord antérieur, est une petite tache blanche; au-dessous de cette bande, en allant du milieu de la surface à l'angle du sommet, sont deux taches ovales, d'un jaune tirant sur le fouci, & dont la plus voisine de la côte, un peu plus étroite & un peu plus longue; de cette tache à l'angle interne postérieur, s'étend une ligne bleuâtre un peu plus arquée, & qui n'est pas toujours bien prononcée dans toute sa longueur; on en voit une autre de cette couleur, & pareillement transverse, au-dessus de la bande rouge. L'origine de ces ailes, une portion de leur surface avoisinant le milieu de la côte, & le sommet de la tête, présentent aussi des espaces ou des taches bleuâtres; enfin, l'abdomen, à l'exception du milieu du dos, a des raies transversales de cette couleur.

Elle habite le Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langfordrll.

19. HESPÉRIE AFFARICUS.

HESPERIA Affaricus.

Hesperia alis atris; anticis albo flavoque maculatis; posticarum disco flavo, punctis nigris.

Hesperia U. Affaricus, alis dentatis, atris; anticis maculis flavis albisque: posticis disco flavo, punctis nigris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 343. n°. 305.

Papilio Affaricus. CRAM. Pap. 22. pl. 261. F. G.

Elle est très-voisine des deux suivantes; mais à raison de la couleur de la brosse terminant l'abdomen, elle n'appartient point à leur division. Le corps est d'un noir-bleuâtre, avec des anneaux, les uns orangés & les autres blancs sur l'abdomen; la brosse anale est de la première de ces deux couleurs. Le corps est d'un noir-bleuâtre, un peu chatoyant sur les ailes; le corselet, la base des ailes supérieures & une grande portion des inférieures, sont garnis d'un duvet d'un brun-jaunâtre. Le milieu des ailes supérieures offre trois taches d'un jaunâtre-transparent, formant une bande transverse; entre elle & le sommet, on en voit cinq à six autres très-petites, de la même couleur: quelques parties des mêmes ailes en présentent de bleuâtres. Le dessus des inférieures est transverse, vers son milieu, par une raie formée d'environ cinq taches d'un noir-bleuâtre; leur dessous offre, à quelque distance du bord postérieur, une rangée transverse de taches bleuâtres, & plus haut, deux autres formées de taches jaunâtres, & parcourant aussi la largeur de l'aile. Les antennes sont brusquement crochues à leur extrémité.

Elle se trouve au Brésil.

Nota. Le *Papilio Renaldus* (Renaud) de Stoll, *Suppl. aux Pap. exot.* de Cramer, pl. 15. fig. 1, nous semble devoir être placé dans cette division. Le corps est bleu en dessus & rouge en dessous. Les ailes supérieures sont noires en dessus, avec deux taches blanches & une grande partie du bord interne bleu; le dessus des inférieures est de cette couleur, avec le bord postérieur noir, un peu anguleux & terminé à l'angle anal en une petite queue. Le dessous des quatre ailes est d'un brun-obscur, avec des espaces plus foucés & deux petites raies jaunâtres sur les supérieures; on voit une tache de cette couleur sur les inférieures, à peu de distance de leur naissance. Les pattes sont rouges.

Cette espèce est de Surinam; nous n'en parlons que d'après Stoll.

** *Point simultanément de teinte rouge ou orangée à la tête & à l'anus, ou à la tête & à l'angle anal des ailes inférieures* (1).

† *Bord postérieur des ailes inférieures notablement denté ou anguleux.*

— *Ailes inférieures sans taches vitrées, ou n'en ayant qu'une au plus & discontinue.*

20. HESPERIE Iphinous.

HESPERIA Iphinous.

Hesperia atra; alis anticis fasciâ maculisque duabus flavidis; posticis subtus abdomineque lineis cæruleo-albis.

Si l'on compare cette espèce avec la précédente, l'on sera convaincu qu'elles le lient entre elles. Les antennes se terminent de la même manière. Le corps est noir, avec le dessous des palpes, quelques taches sur la tête, des raies transverses sur le dessus de l'abdomen d'un blanc-bleuâtre. Le dessous des ailes inférieures offre des raies transverses & obliques de cette couleur, mais dont une seule, la supérieure, continue & bien terminée. La frange postérieure est blanche, avec une série de taches noires qui s'entrecroisent. Les ailes supérieures ont sur leurs deux surfaces trois taches d'un jaune-rouillâtre, dont une vers le milieu, très-grande, en carré-long & oblique, en forme de bande transversale, mais n'atteignant pas les deux bords; & les deux autres, petites, ovales, & situées entre la première & l'angle du sommet; la dernière, ou la plus voisine de cet angle, est plus oblongue. Le dessus du corselet de mon individu a perdu son duvet; mais on y découvre des vestiges de taches blanchâtes, & peut-être est-il rayé longitudinalement, ainsi que celui de l'espèce précédente.

Elle m'a été envoyée du Brésil par M. Langford.

21. HESPERIE Polyzone.

HESPERIA Polyzona.

Hesperia atra, albo cæruleoque fasciata; alis anticis, maculis fenestratis, ad basin transversè fasciatis; antennarum apice sensim arcuato.

Papilio Vulcanus. CRAM. *Pap.* 21. pl. 245. C. D.

SEBA, *Musc.* tom. 4. pl. 20. fig. 12 & 13.

La manière dont les antennes de cette espèce se terminent & les bandes qui traversent la base de ses ailes supérieures & se prolongent ensuite sur les inférieures, la distinguent de l'hespérie *Gnetus* de Fabricius, dont elle le rapproche infiniment.

(1) Anus rouillâtre dans l'*H. Cloanus* & palpes extérieurs rouillâtres dans l'*H. Jovien*.

La femelle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le corps est d'un noir-foncé, avec les palpes extérieurs, des taches sur la tête, & une grande partie des pieds, blanchâtes. Le corselet & l'abdomen sont rayés de gris-bleuâtre, celui-ci transversalement & l'autre longitudinalement. Huit bandes alternativement bleuâtes & noires composent le fond de la couleur des ailes; mais le noir s'étend beaucoup plus sur les supérieures, & les bandes de l'autre couleur sont peu ou moins distinctes; celles-ci ont en outre trois à quatre taches vitrées, dont une beaucoup plus grande, en forme de bande transversale, occupant le milieu de la surface, & les autres, & le plus souvent au nombre de deux, plus rapprochées du sommet. La couleur blanche étant plus étendue sur les ailes inférieures que sur les deux autres; les bandes formées par cette couleur & le noir y sont plus prononcées; le bleu des premières est plus pâle, & dans les individus mâles, la dernière de ces bandes bleues, ou la plus voisine du bord postérieur, est divisée longitudinalement par une ligne noire; le bleu empiète aussi sur la bande noire qui précède & y forme quelques traits. Les échancrures du bord postérieur sont blanches, avec les intervalles ou les dents, noirs; l'angle anal forme une queue très-courte & tronquée. Dans un grand individu femelle de la collection du Muséum d'histoire naturelle, les taches vitrées des ailes supérieures sont proportionnellement plus grandes; les bandes bleues des ailes inférieures sont d'un bleu un peu argenté; l'une des dents du bord postérieur y forme près de son milieu un angle tres-faillant.

Dans un individu mâle que M. Langford m'a envoyé du Brésil, les ailes supérieures ont quatre taches vitrées, & dont la première, ou la plus interne, est plus fortement divisée par les nervures; le bleu y occupant plus d'étendue que dans la plupart des autres individus, donne à cette variété une disposition de teintes plus agréable.

Cette espèce se trouve aussi à Surinam, & probablement à Cayenne.

22. HESPERIE Gnetus.

HESPERIA Gnetus.

Hesperia atra, alis posticis cæruleo-fasciatis; anticis maculis fenestratis, ad basin cæruleo radiatis; antennarum apice abruptè uncinato.

Hesperia U. *Gnetus, alis dentatis, subconcoloribus, atris; anticis maculis tribus fenestratis, posticis cæruleo fasciatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 342. n.º 302.*

Papilio P. U. *Gnetus. Mant. Inf. tom. 2. p. 89. n.º 805. — Spec. Inf. tom. 2. p. 155. n.º 624.*

AUBERT. *Miscell. pl. 18. fig. 8.*

Papilio Pigmalion. CRAM. *Pap.* 21. pl. 245. A. B.

Cette espèce étant extrêmement voisine de celle que nous nommons *Polyzona*, & Fabricius n'ayant point donné une description complète de l'hésperie *Gnetus*, il nous est impossible de dire positivement quelle est celle des deux qu'il distingue ainsi. Mais comme il cite les planches de d'Aubenton, & que nous sommes sûrs que l'espèce dont il s'agit ici le rapporte très-bien aux figures précitées de cet auteur, il nous paroît très-probable que cette hésperie est bien celle qu'il appelle *Gnetus*. L'individu que nous avons sous les yeux, & qui vient de l'ancienne collection du Muséum d'histoire naturelle, pourroit bien être l'individu original, représenté sur ces planches. Cette espèce, ainsi que nous l'avons remarqué, ressemble beaucoup à notre *H. polyzone*, mais le noir y domine davantage, est un peu glacé de bleu, & les bandes ou raies formées par cette couleur sont plus vives & plus brillantes; sur le dessus des ailes supérieures, elle s'y divise en cinq raies, partant de leur origine, se dirigeant en manière de rayons longitudinaux, vers la base transparente du milieu; les intermédiaires sont plus courtes. Les taches vitrées sont proportionnellement plus petites que dans l'hésperie *polyzone*; le dessous des ailes inférieures est traversé obliquement par trois bandes étroites d'un bleu-verdâtre & luisant, & dont l'intermédiaire plus courte. En dessus ces raies sont moins vives; la première, ou la plus proche de la base, est même d'un gris-bleuâtre, & partagée en deux; l'intermédiaire est plus petite que la correspondante inférieure. Le bord postérieur est un peu anguleux & très-finement bordé de blanc.

Elle se trouve à Cayenne & à Surinam. L'individu figuré par Cramer, que nous rapportons à cette espèce, se rapproche beaucoup plus que le nôtre de l'hésperie *Polyzone*, ou de son papillon *Vukain*. L'individu qu'il représente est une femelle; nous n'en avons vu aucun de ce sexe, & le mâle que nous avons décrit est même unique dans la collection du Muséum d'histoire naturelle.

25. HESPERIE Salus.

HESPERIA Salus.

Hesperia alis fulvis, nigro-fuscatis; anticis maculis, posticis centro fensinitis.

Hesperia U. Salus, alis dentatis fulvis, nigro fuscatis; anticis maculis, posticis centro fensinitis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 542. n^o. 500.

Papilio P. U. Salus. Mant. Inf. tom. 2. p. 88. n^o. 801. — Spéc. Inf. tom. 2. p. 155. n^o. 622.

Papilio Nobilis. CRAM. Pap. 9. pl. 103. A. B.

L'ouvergure du mâle est d'environ un pouce & demi. Les antennes sont noires & se terminent en

une petite massue, brusquement recourbée à son origine, mais peu prolongée à la pointe. Le corps & le dessous des ailes sont entièrement d'un jaunec-d'ocre; en dessous, cette couleur est plus claire & tire sur le citron. L'abdomen, dans la plupart des individus, paroît être rayé transversalement de noir; mais je crois que cela provient de ce que le bord postérieur des anneaux a été accidentellement défilé. Les ailes supérieures ont des taches transparentes & inégales; trois d'entr'elles, & dont deux, particulièrement celle du milieu, plus grandes, forment au milieu de l'aile une bande transverse, mais n'atteignant pas le bord interne; les autres, au nombre de six, sont situées entre les précédentes & le bord postérieur, & disposées en une ligne courbe, dont un des bouts s'appuie sur la côte, près de l'angle du sommet; deux ou trois de ces taches sont en forme de pointes; les unes & les autres sont bordées de noirâtre; mais cette teinte est plus prononcée sur la face supérieure, y suit les nervures terminales, le bord postérieur, & forme de petites stries obliques, le long de la côte. Les ailes inférieures offrent près du milieu une autre tache transparente, presque orbiculaire; elles sont traversées obliquement par quatre lignes noirâtres, dont la dernière plus étendue, sur tout en dessous, & dont la précédente beaucoup plus courte, & ne dépassant pas le milieu de la largeur de l'aile, à partir du bord externe; le bord postérieur est de cette couleur & inégalement sinué & anguleux; la dent postérieure est la plus forte.

Dans un individu mâle qui m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff, le dessous des ailes est simplement un peu plus pâle; les lignes noirâtres sont plus fines, & les taches transparentes des ailes supérieures ne font point aussi grandes; celle du milieu de la bande n'est pas aussi allongée.

Cette espèce se trouve aussi à Surinam.

24. HESPERIE Saint-Hilaire.

HESPERIA Santhilarius.

Hesperia alis supra ferrugineis, infra nigris; anticis maculis fensinitis, nigro marginatis; posticis intus truncato-productis, supra nigro punctatis, infra flavido-fuscatis.

Cette belle & rare espèce, que je dédie, autant par estime que par gratitude, à l'un de nos plus savans botanistes, a de grands rapports avec les hésperies *Salus*, *Polyzone*, &c. Les antennes sont noires, courbées près du bout, & terminées ensuite par une massue droite & obtuse. Tout le dessus du corps est d'un fauve-obscur, avec le bord postérieur des ailes & quelques portions de leurs nervures noirâtres. Le dessous des quatre ailes est noir. Les supérieures sont traversées dans leur milieu par une grande bande transparente d'un blanc-jaunâtre, divisée en trois taches, &

n'atteignant pas les deux bords; entre l'extrémité inférieure de cette bande & la côte est une rangée de sept petites taches, inégales, presque en forme de points, pareillement transparents, & bordés de noir, ainsi que les précédentes; en dessous, l'espace occupé par ces dernières présente quelques nébulosités d'un jaunâtre-pâle; la base de ces ailes est aussi de cette couleur. Les ailes inférieures sont très-dentées, avec un prolongement large, tronqué & très-anguleux vers l'angle anal; leur milieu a en dessus une rangée transversale de points noirs; leur dessous est traversé par deux bandes d'un jaunâtre-pâle, dont l'une occupant la base, l'autre le milieu & séparée de la précédente par une bande noire, offrant près du bord extérieur une petite tache noire & oblique; au-dessous de cette bande est une rangée de taches pareillement jaunâtres, mais peu prononcées; les échancrures du bord postérieur sont blanchâtres.

Elle se trouve au Brésil & m'a été donnée par M. Langdoiff.

25. HESPERIE ÉACUS.

HESPERIA Eacus.

Hesperia alis flavido-fuscis, fusco punctatis; anticis maculis albo-hyalinis.

Hesperia U. Dan, *alis ecaudatis, obscurè cinereis, fusco punctatis: anticis maculis fenestratiss.* FAB. Ent. Syst. Em. tom. 5. pars 1. p. 541. n°. 297?

Papilio P. U. Dan. Mant. Inf. tom. 2. p. 88. n°. 798?

Elle est de petite taille, & ressemble beaucoup au papillon *Arctus* de Cramer, pl. 354. D. E. La massue des antennes se termine insensiblement en pointe, sans former de crochet. Ce caractère, qui domine plus généralement dans la division des hespéries à ailes inférieures arrondies & sans saillie à l'angle anal, me seroit presumer que cette espèce, nonobstant les dentelures des ailes, devroit être placée dans cette division, & près de l'*Hesperia Alalva* & autres analogues. Les ailes sont noirâtres, mais avec une teinte d'un jaunâtre-obscure, formant près du limbe postérieur une raie transversale, entrecoupée & arquée. Le fond est ponctué de noirâtre, particulièrement sur les inférieures, où plusieurs de ces points sont disposés en raies transversales & arquées. Les ailes supérieures ont des taches transparentes: quatre au milieu, situées en une ligne transversale, & dont deux plus grandes, les autres en forme de petits points, au nombre de trois dans non individu, & composant un petit arc près de l'angle du sommet. Sur le dessous des inférieures, la teinte jaunâtre est divisée en un grand nombre de petites taches, disposées en lignes transversales. La frange du bord postérieur des quatre ailes est grisâtre.

Cette espèce se trouve à Tranguébar selon

Fabricius. L'individu que je possède vient de Java, & m'a été envoyé par M. le baron Dejeau.

— — Les quatre ailes parsemées de plusieurs taches vitrées.

26. HESPERIE MOMUS.

HESPERIA Momus.

Hesperia alis nigris; anticis penitus serè hyalino stratis.

Hesperia U. Momus, *alis subcaudatis fuscis, basi hyalino stratis, apice maculatis.* FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 554. n°. 268.

Papilio P. U. Momus. Mant. Inf. tom. 2. p. 86. n°. 785.

Papilio Momus. JON. Fig. piçl. 6. tab. 90. fig. 1.

Papilio Vitreus. CRAM. Pap. 31. pl. 566. fig. D.

Sa taille est moyenne. Ses antennes se terminent en une massue insensiblement arquée & très-aiguë au bout. Le corps est recouvert en grande partie de poils d'un gris-jaunâtre, avec le dessous de l'abdomen rayé longitudinalement de noir. Les ailes sont noires, avec un duvet d'un gris-jaunâtre, particulièrement à la côte & au bord opposé; les taches vitrées sont si nombreuses, aux ailes supérieures surtout, que ces ailes sont en grande partie transparentes, d'où vient le nom de *Vitreus*, donné à cette espèce par Cramer, & que Fabricius auroit dû conserver; ces taches y sont disposées sur trois rangées transversales; les deux premières semblent se confondre sur les supérieures, & y sont composées de taches fort allongées, presque en manière de stries longitudinales; il en part trois de la base, & entre les extrémités inférieures de la seconde & de la troisième ligne, en commençant à compter au bord extérieur, est située une tache profondément bifide; l'extrémité postérieure de la troisième ligne est pareillement bifide; l'on voit près de l'angle du sommet cinq à six autres petites taches, composant la troisième rangée transversale. Les ailes inférieures ont près de leur base deux taches, dont l'extérieure beaucoup plus grande & anale; elles forment la première rangée; on en compte environ cinq à chacune des deux autres; le bord postérieur de ces ailes est entrecoupé de blanc; ses dentelures sont peu distinctes dans quelques individus; l'angle anal est assez saillant, & en forme de dent obtuse.

Cette hespérie habite la Guyane & le Brésil.

27. HESPERIE ERYTHUS.

HESPERIA Erythus.

Hesperia alis fusco nigroque variis, maculis

hyalinis : his subquadratis vel trigonis, illis punctiformibus.

Papilio Erythus. CRAM. *Pap.* 5. *pl.* 59. G.

Cette hespérie est assez grande, noirâtre, avec des espaces plus foncés sur les ailes, particulièrement aux inférieures. Elles sont parsemées de taches transparentes, mais en moindre nombre que dans l'espèce précédente, & dont les unes presque carrées ou triangulaires, & les autres plus petites & en forme de points; celles des ailes supérieures y sont disposées à peu près de la même manière que dans l'hespérie *Protée* & plusieurs autres espèces. Celles des ailes inférieures n'y composent qu'une rangée transverse; la base offre en outre une tache plus grande & correspondante aux deux de la base des ailes inférieures de l'hespérie *Momus*. Le bord postérieur des ailes inférieures & la portion interne du même bord aux ailes supérieures, sont entrecoupés de blanc; cette couleur occupe les échanerures.

Je n'ai point vu cette espèce, & je la rapporte à cette division, d'après la figure de Cramer. Elle conduit à la division suivante.

De Surinam.

28. HESPÉRIE Cramer.

HESPERIA Cramer.

Hesperia alis fusco-ferrugineis, maculis fenestratis nigro marginatis; infra fasciâ maculari carulefcente, posteriùs lineâ nigrâ undulatâ terminatâ.

Papilio Sebaldus. CRAM. *Pap.* 29. *pl.* 342. *fig.* A. B.

Fabricius, qui applique le nom de *Sebaldus* à une hespérie très-différente de celle-ci, rapporte celle que Cramer désigne de la sorte, ainsi que celles qu'il a figurées sous les dénominations de *Salus*, de *Ramufis*, au papillon *Thrax* de Linné. Mais cette dernière espèce est très-distincte des précédentes, & habite les Indes orientales, tandis que les autres ne se trouvent que dans l'Amérique méridionale. Les caractères distinctifs que Fabricius lui donne, conviennent à plusieurs espèces. Voulant conserver la dénomination de *Sebaldus* à l'hespérie qu'il appelle ainsi, l'espèce homonyme de Cramer recevra le nom de ce naturaliste, qui, par son bel ouvrage sur les lépidoptères exotiques, a rendu un service très-important à la science, & sans lequel peut-être il seroit bien difficile de reconnoître, avec l'entomologie seule de Fabricius, un grand nombre d'espèces.

L'hespérie *Cramer* est de taille moyenne & d'un brun-roussâtre un peu plus foncé sur le dessous des ailes; les taches transparentes, à l'exception de quatre à cinq & dont une située près de la base des ailes inférieures & les autres placées près de l'extrémité des ailes supérieures, sont générale-

ment petites, en forme de points & bordées de noir. Ces taches, aux ailes inférieures, y sont disposées en deux bandes transverses, & dont la postérieure est appuyée inférieurement sur une autre bande, formée de taches bleuâtres & bordée de noir inférieurement; celle-ci est commune aux ailes supérieures. Il y a en outre, sur le dessous des inférieures, trois taches bleuâtres, entourées de noir, dont deux situées près du bord extérieur, & l'autre au bord interne.

Cette espèce, dont je ne parle que d'après Cramer, habite Surinam.

Voyez, pour quelques autres hespéries à ailes inférieures dentées, mais sans faille anale, la division B.

† † *Bord postérieur des ailes inférieures entier.*

— *Dessus du corps & origine supérieure des ailes verts ou d'un vert-bleuâtre. Dessus des ailes noir ou noirâtre; celui des inférieures sans taches.*

Nota. Espèces généralement assez grandes, de l'Amérique méridionale; massue des antennes toujours erochue & terminée en pointe fine; angle anal des ailes inférieures prolongé en une dent pointue.

29. HESPÉRIE Creteus.

HESPERIA Creteus.

Hesperia alis supra nigris, immaculatis, infra fasciis, fasciis duabus transversis, obscurioribus; lunbo postico sæpiùs diluore.

Papilio Creteus. CRAM. *Pap.* 24. *pl.* 284. C. D.

Papilio Alardus. STOLL, *Suppl. aux Pap. exot. de CRAM.* *pl.* 59 *fig.* 7. var. A

Les ailes sont noires en dessus, avec leur base garnie, ainsi que le dessus du corps, d'un duvet soyeux, d'un vert-bleu, un peu doré & luisant; leur dessous est noirâtre, avec deux bandes ou deux lignes transverses plus foncées, dont la dernière quelcfois bordée postérieurement de brun-jaunâtre. Le limbe postérieur est tantôt de la couleur du dessous, tantôt plus clair, quelcfois même, comme dans l'*Alardus* de Stoll, prenant une teinte grisâtre, plus tendue sur les ailes inférieures, & y formant une grande bande terminale; les bandes transverses & noirâtres sont plus ou moins prononcées & paroissent peu dans la variété précédente. Les quatre ailes n'ont aucune tache transparente.

Cette hespérie m'a été envoyée du Brésil par M. Langlébort.

Nota. Le papillon *Celenus* de Cramer, *Pap.* 33. *pl.* 293, A B, paroît, dans un ordre naturel, devoir le placer près de l'espèce précédente. Le corps & les ailes font d'un brun-lacé;

le dessous des ailes offre des bandes transverses plus claires, & de même que dans cette Hespérie, les supérieures ont le long du bord interne, une grande tache arrondie plus pâle que le fond ou blanchâtre. L'individu que nous rapportons à cette espèce a aussi sur le dessous de chaque aile inférieure, deux petites taches presque en forme de points, de cette couleur, l'une un peu au-dessus du milieu, & l'autre au-dessus de l'angle anal. Elles n'existent point dans la figure donnée par cet auteur.

Cette espèce se trouve à Amboine.

Nous soupçonnons que l'*H. Cassandra* (*Cassandra*) de Fabricius en est voisine. Sel n lui, elle est plus grande que l'*H. Thrax*, noirâtre & sans aucunes taches.

Sa patrie est inconnue.

30. HESPÉRIE Parménide.

HESPERIA Parmenides.

Hesperia fusca, supra immaculata; alis anticis infra maculâ magnâ albâ, internâ: posticis ibidem fuscis nullis.

Papilio Parmenides. CRAM. *Pap.* 31. *pl.* 364. E. F.

Elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Les ailes sont d'un noirâtre-obscur, avec l'origine de leur surface supérieure & la partie externe de la base du dessous des premières, d'un vert-bleuâtre & luisant; on voit aussi des traces de cette couleur à la naissance des inférieures. Sur le bord interne des supérieures, est appuyée une grande tache blanche triangulaire, mais que l'on observe quelquefois dans l'espèce précédente; le dessous de ces ailes, ainsi que celui des inférieures, est entièrement noirâtre; on observe seulement sur chacune de celles-ci, une petite tache ou un trait jaunâtre. Le dessous du corps & de la masse des antennes sont d'un gris-jaunâtre; le ventre est rayé longitudinalement de noirâtre.

Elle se trouve au Brésil. Collection du Jardin du Roi.

31. HESPÉRIE du Roucou.

HESPERIA Bixæ.

Hesperia fusca, supra immaculata; alis posterioribus subtus fuscâ transversâ luteâ.

Hesperia U. alis rotundatis fuscis, basi virescentibus; posticis subtus fuscâ luteâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 344. *n°.* 307.

Papilio P. U. Bixæ. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 89. *n°.* 807. — *Spec. Inf. tom.* 2. *p.* 135. *n°.* 626. — *Syst. Ent. p.* 534. *n°.* 390.

Papilio P. U. Bixæ. LINN. *Syst. Nat.* 12. *tom.*

2. *p.* 795. *n°.* 264. — *Mus. Lud. Ulr. pag.* 335. *n°.* 135.

CLERCK, *Icon. Inf. tab.* 42. *fig.* 7. 8.

A en juger d'après la citation d'une figure de Petiver, Linné rapporte à cette espèce, comme simple variété, notre *H. Tityre*. Fabricius, qui a copié sa phrase spécifique, ne s'est pas aperçu que dans son *Mantissa Insectorum* on avoit, par erreur, écrit *fuscâ luteâ* pour *fuscâ luteâ*.

Les ailes sont noirâtres; leur base & presque tout le dessous des secondes sont d'un vert-bleuâtre soyeux & luisant, mais qui, à l'exception de la base extérieure, est moins vif & plus foible sur celles-ci. Le dessous de ces ailes inférieures offre, à quelque distance de leur origine, une tache d'un beau blanc, en forme de parallélogramme ou de bande courbe, oblique, partant du bord externe & se terminant vers le milieu de la largeur de l'aile. Dans l'individu figuré par Clerck, la bande est centrale. Une grande partie du limbe postérieur & inférieur des premières ailes est un peu verdâtre. Les palpes extérieurs sont d'un bleu entrecoupé de noir.

Cette espèce fait partie de la collection du Roi. Elle se trouve en Amérique.

32. HESPÉRIE Acaïus.

HESPERIA Acaïus.

Hesperia alis supra cœruleo-nigris; anticis fuscâ utrinquâ albo-hyalinâ, apice immaculato; posticis infra viridi-fuscis, basi immaculatâ, limbo postico cinerascente vel distincto.

Hesperia A. U. Acaïus, alis subcaudatis, atris; posticis subtus virescentibus, strigis abbreviatis flavis. FAB. *Ent. Syst. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 335. *n°.* 272.

Papilio P. U. Acaïus. *Mant. Inf. tom.* 2. *p.* 87. *n°.* 783. — *Spec. Inf. tom.* 2. *pag.* 135. *n°.* 614.

Papilio Acaïus. CRAM. *Pap.* 10. *pl.* 111. *fig.* D. E. — *Ejusd. P. Aulætes.* *Ibid.* 24. *pl.* 283. E. F. G. *var. A.* — *Ejusd. P. Hylæpes.* *Ibid.* 31. *pl.* 364. G. H. *var. B.* *

Cette espèce & les suivantes de la même division sont distinguées des précédentes par les taches blanches & transparentes des ailes supérieures. Ici & dans la suivante, elles forment une bande qui traverse obliquement le milieu de leur surface; elles sont au nombre de cinq, dont quatre sur une même ligne, & dont la cinquième est en dehors de la bande & dans l'entre-deux des deux taches du milieu; celles-ci sont les plus grandes de toutes. Le dessous des ailes inférieures est noirâtre ou d'un verdâtre-obscur, & offre, dans ce cas, quelques lignes plus claires mais peu marquées; le limbe postérieur est tantôt d'un noi-

râtre plus clair & tantôt, à l'exception de son extrémité extérieure, cendré ou bleuâtre. Le bord postérieur de ces ailes & l'extrémité interne de celui des supérieures sont entrecoupés de noir & de blanc.

Le papillon *Pertinax* de Stoll (*Suppl. aux Pap. de Cramer*, pl. 35, fig. 2) n'est peut-être qu'une variété de l'espèce précédente. Il est plus petit. La bande vitrée des ailes supérieures est moins grande & sans tache extérieure. Le dessus des ailes inférieures & tout le dessous du corps font d'un brun-noirâtre.

Ces hespéries se trouvent au Brésil, à Surinam, &c.

Nota. C'est probablement près de cette espèce que se range l'hespérie *Scipion* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 338. n. 284.*) Son corps est grand, noir, avec les antennes crochues. Les quatre ailes sont noires en dessus, avec la base bleuâtre. Les antérieures ont une bande maculaire d'un blanc-transparent; leur dessous est vert & offre la même bande. Le bord interne des postérieures est plus obscur. Cet auteur avoit décrit cette espèce d'après les dessins de Jones (*6. tab. 87. fig. 1.*). Le *P. Narcosius* de Stoll (*Suppl. aux Pap. de Cramer*, pl. 59, fig. 8) ne me paroît pas en différer. L'*H. Scipion*, selon Fabricius, se trouve aux Indes.

33. HESPÉRIE *Mercatus*.

HESPERIA Mercatus.

Hesperia alis supra nigris; anticis utrinque fasciâ mediâ punctisq; ante apicem albo-hyalinis, posticis infra basi albis.

Hesperia U. *Mercatus*, *alis subcaudatis, atris; anticis maculis hyalinis, posticis subius fuscis, fasciâ basæ albâ.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 332. n. 260.*

Papilio Mercatus. JON. *Fig. pict. 6. tab. 87. D.*

Papilio Fulgerator. CRAM. *Pap. 24. pl. 284. A. B.*

Fabricius cite pour synonyme de cette espèce le *P. Talus* de Cramer; mais il est évident que sa description ne peut convenir qu'au *Fulgerator* de celui-ci.

Le dessus des ailes de l'*H. Mercatus* n'offre point ce resset bleuâtre que l'on observe dans l'*Acacus*. Les supérieures ont en outre, avant l'angle du sommet & près de la côte, une petite ligne formée de trois points transparents; la bande blanche est terminée en dessous, au bord interne, par une tache blanche assez grande. Le dessous des inférieures est d'un bleu-obscur, avec une bande blanche, courte & transverse à sa base; le bord extérieur est jaunâtre à son origine, & séparé de la bande blanche par une petite ligne transverse, noirâtre. Le dessous du corps est jau-

nâtre, avec une partie des pattes & une ligne sur le milieu de l'abdomen, noirâtres.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil.

34. HESPÉRIE *Aufonius*.

HESPERIA Aufonius.

Hesperia alis fuscis; anticis fasciâ maculari punctisq; lineolâ ante apicem hyalino-hyalinis; posticis supra, lumbis excepto, viridibus.

Papilio Talus. CRAM. *Pap. 13. pl. 176. D.*

Tout le dessus du corps, celui des ailes inférieures, à l'exception du bord extérieur, leur origine inférieure & celle des supérieures, tant en dessus qu'en dessous, font d'un vert-foyeux, mais point luisant; les autres parties font d'un noirâtre-obscur. Les ailes supérieures ont une bande transverse oblique, formée de quatre taches d'un jaunâtre-pâle & transparentes; près du milieu de cette bande, est situé en dehors une tache de la même couleur, & près du sommet est une petite ligne composée de trois points, pareillement jaunâtes & diaphanes. Le dessous des ailes inférieures présente au-dessus de l'angle anal une petite tache jaunâtre, en forme de chevron. Le bord postérieur des anneaux du ventre est grisâtre. L'angle anal se prolonge en une queue très-courte & pointue.

Cette espèce & la suivante paroissent conduire à l'hespérie *Protée* & aux autres de la même division.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

35. HESPÉRIE *Savigny*.

HESPERIA Savigny.

Hesperia alis anticis supra nigris, maculis punctisque tribus albo-hyalinis; posticis supra fuscis, infra brunneis, puncto nigro ad basin fuscisq; tribus fuscis transversis.

Le nom de cette hespérie nous rappelle l'un des plus profonds naturalistes de ce siècle, M. Savigny, membre de l'Académie royale des sciences. Le vert-foyeux qui eclaire le dessus du corps & la base des ailes dans les autres espèces de cette division, est ici beaucoup moins étendu & plus foncé; il ne se montre bien qu'à la naissance des ailes supérieures. Le corps est noirâtre, mais un peu plus clair en dessous. Le dessus des ailes supérieures est noir, avec trois taches & un pareil nombre de points d'un blanc-transparent; deux de ces taches sont placées au milieu & rapprochées sur une ligne transverse; elles répondent à la bande maculaire des espèces précédentes; les trois points sont disposés sur une petite ligne oblique, près de la côte, un peu avant l'angle du sommet; la troisième tache est isolée au milieu de l'espace qui sépare les deux

premières & la ligne de points; le dessous de ces ailes est d'un brun-vineux foncé, avec le disque noirâtre. Les ailes inférieures sont en dessous d'un noirâtre tirant sur le brun; leur dessous est d'un brun plus clair, un peu vineux ou rougeâtre, avec une teinte d'un gris de perle laissant. Près de leur base & vers le milieu de la largeur, est un point noir, mais qui n'est point constant; au-dessous sont trois bandes transverses, noirâtres, dont la plus basse occupe le limbe postérieur; la dent de l'angle anal est bien prononcée.

Cette espèce se trouve aux Antilles. Entr'elle & la précédente, me paroit devoir se ranger le *P. Pyramus* de Cramer, *Pap.* 21, pl. 245 E. Mais ici, le duvet qui garnit le dessus du corps & la base des ailes est, selon cet auteur, couleur de canelle. Je n'ai point vu en nature cette Hespérie.

Près de ces espèces, l'on placera encore le *P. Phidon* de Cramer, *Pap.* 21, pl. 219, F G. Le dessous des ailes est plus varié que dans les autres de la même division. Le milieu de celui des inférieures est noirâtre, avec de petites taches jaunâtres; leur dessus offre près du milieu du disque un point de cette couleur; l'angle anal est peu saillant.

Cette espèce se rapproche aussi du *P. Sinon* de cet auteur, *Pap.* 29, pl. 545, D, E, & de quelques autres Hespéries analogues.

Son *P. Cometes*, *ibid.* 19, pl. 227 F, paroit, sous quelques rapports, hier cette division avec la précédente, & par d'autres, devoir se placer avec les Hespéries à tête & à ailes rouges, ou du moins avec les espèces qui, dans notre méthode, viennent immédiatement après elles. N'ayant point vu cette espèce, il nous est impossible de fixer à cet égard notre opinion.

— — *Dessus du corps & origine supérieure des ailes jaunâtres; dessus des ailes noirâtre; des taches jaunâtres, transparentes, & pour la plupart disposées en une ligne transversale, aux supérieures; dessous des inférieures ayant, soit des taches discoïdales d'un blanc-argenté (s'effaçant quelquefois), soit une bande ou une raie (quelquefois comme aux deux surfaces) parcourant toute sa longueur ou toute sa largeur, tantôt de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre: ces ailes ordinairement sans taches ritrées.*

q. *Dent extérieure de la tronçature oblique du prolongement anal des ailes inférieures très-saillante.*

56. HESPERIE Schœnherr.

HESPERIA Schœnherr.

Hesperia alis fuscis; posticum limbo postico supero anguloso anali infra nigris; anticis fasciâ fenestratâ maculâque subapicali albis;

posticis utrinque fasciâ transversâ, latâ, pallidoflavâ.

Nous devons à M. Schœnherr, naturaliste suédois, un excellent ouvrage sur la synonymie des coléoptères, & qui, à ce précieux avantage, joint celui de nous faire connoître un grand nombre d'espèces nouvelles, soit de sa collection, soit de celles de ses amis. Qu'il reçoive, par la dédicace de cette espèce, un témoignage bien sincère de notre profonde estime & de notre amitié!

L'Hespérie *Schœnherr* est de grandeur moyenne. Les ailes sont d'un brun-noirâtre, avec la base, particulièrement en dessous, d'un brun-jaunâtre pâle ou verdâtre: ici cette teinte occupe presque toute la moitié antérieure de la surface. Les ailes supérieures ont dans leur milieu une bande transparente, composée de trois taches réunies, & accompagnée intérieurement & en dessus de jaunâtre; de son bord intérieur part un petit trait de la même couleur, comme formé de points réunis, se rendant obliquement au bord interne, en se rapprochant de la base. Près de la côte, & à peu de distance de son origine, est en dessus une tache oblongue, longitudinale, pareillement d'un jaune-pâle; l'on voit, à l'autre extrémité, un peu avant le sommet, une petite tache transversale, oblongue, d'un blanc-transparent, & commune aux deux côtés. Le milieu des inférieures, en allant du bord extérieur à l'angle interne, est traversé par une large bande d'un jaune-pâle, tirant un peu sur le fouci, qui se rétrécit légèrement vers le bas; en dessus, l'espace qui s'étend de cette bande à l'extrémité, ou le limbe postérieur, est d'un noirâtre plus foncé ou forme une bande terminale presque noire; en dessous, l'espace correspondant n'est plus foncé ou noir que vers le bord interne, ou à l'angle anal. En général, le dessous des quatre ailes est un peu plus clair que le dessus, ou d'un noirâtre tirant sur le brun. Les palpes extérieures sont blanchâtres. Les antennes manquent.

Elle a été apportée de Java par M. Lefchenault. Collection du Jardin du Roi.

37. HESPERIE Mercure.

Hesperia Mercurius.

Hesperia alis posticis subtis maculis duabus transversis atro-fuscis, spatio interjecto margaritaceo, nitido: limbo postico extus cinerascens, intus fusco; abdomine albo annulato.

Hesperia U. Mercurius, alis subcaudatis, fuscis, basi flavis, anticis punctis hyalinis, posticis subtis nigris, fuscâ cinerâ. Fab. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 553. n. 265.

Papilio P. U. Mercurius. Mant. Inf. tom. 2. p. 96. n. 780.

Papilio Idas. Cramer, *Pap.* 22. pl. 260. A. B.

Son envergure est d'un peu plus de deux pou-

ces. Les ailes sont noirâtres & un peu plus foncées en dessous. Le duvet jaunâtre de leur base & du dessus du corps est plus clair & plus apparent que dans les autres espèces de la même division. La grandeur des taches transparentes des ailes supérieures varie. Les quatre inférieures sont disposées en une ligne transverse ou oblique; la cinquième, mais qui manque quelquefois, est située près de la troisième des précédentes; on en voit une ou deux autres, en forme de point, près de la côte, avant le sommet; en dessous, le limbe postérieur de ces ailes est, à l'exception du sommet, cendré. Le dessus des inférieures est sans taches; leur dessous est mélangé; la base est noirâtre, avec une tache plus foncée ou tirant sur le noir; immédiatement après est une bande transverse & arquée de cette couleur; au-delà du milieu de la longueur de l'aile, on voit intérieurement une grande tache presque noire, en forme de triangle allongé & transverse, dont la pointe est en dehors & repose sur une autre bande, mais plus claire, gagnant le bord antérieur & offrant, près de ce bord, deux petites taches plus obscures; l'intervalle compris entre les deux bandes est gris-blanchâtre & luisant; le bord interne, & surtout son extrémité inférieure, est d'un brun-noirâtre; à partir de-là, le limbe postérieur est cendré, & présente quelquefois une rangée de points noirâtres. Le bord postérieur des anneaux de l'abdomen est blanchâtre.

Dans quelques individus, le dessous des ailes inférieures est d'un brun couleur de soie & luisant, sans teinte grise dans l'entre-deux des bandes; le limbe postérieur est noirâtre.

Elle se trouve au Brésil, à Surinam, &c.

58. HESPERIE Tityre.

Hesperia Tityrus.

Hesperia alis posticis subtus fusco-brunneis, maculâ mediâ, angulatâ fasciâve transversâ argenteo-nivâ.

Hesperia U. Tityrus, alis subcaudatis, fuscis: anticis utrinquâ fasciâ flavâ, subtus, str. gâ argentea. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 551. n^o. 258.

Papilio P. U. Tityrus. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n^o. 777. — Spec. Inf. tom. 2. p. 152. n^o. 607. — Syst. Ent. p. 552. n^o. 282.

Papilio Tityrus. SMITH-ABBOT, Lépid. de la Géorg. tom. 1. p. 59. tab. 19.

PELIV. Gazoph. 51. tab. 52. fig. 5.

Papilio Clarus. CRAM. Pap. 4. pl. 41. E. D. — *Ejusd.* P. Exadeus. 22. pl. 260. C. var. A.

Peu d'espèces varient autant que celle-ci pour le dessous des ailes, & particulièrement des inférieures. C'est ce dont nous nous sommes assurés en

comparant un grand nombre d'individus, tant de l'Amérique septentrionale que du Brésil. Les ailes supérieures ont dans tous des taches jaunâtres & transparentes, disposées comme dans l'espèce précédente, l'Hespérie *Protée* & autres espèces analogues; quatre de ces taches forment une bande transverse; trois à quatre autres très-petites, sous la forme de points, sont placées en une petite ligne, près de la côte, un peu avant son extrémité; la dernière tache est liée entre les dernières & la bande. Le dessous des ailes inférieures est d'un brun plus ou moins foncé, d'un rougeâtre-obscure, avec le limbe postérieur, l'angle anal excepté, plus ou moins saupoudré de petits atomes d'un gris-cendré ou d'un gris de perle, qui, lorsqu'ils sont plus abondans & plus étendus dans le sens de la largeur, y forment une bande de cette couleur. Le limbe inférieur des ailes supérieures offre, dans plusieurs individus, les mêmes caractères; la bande y est interrompue avant l'angle du sommet, & s'y termine avant celui qui lui est opposé ou l'interne; quelquefois cependant la bande est continue.

Dans le papillon *Exadeus* de Cramer, qui se trouve au Brésil, à Surinam, &c., le disque du dessous des ailes inférieures présente près de son milieu une tache ovale d'un blanc-argenté, placée au-dessus d'une raie de la même couleur, anguleuse, transverse, oblique & interrompue; rés du bord externe, au-dessus du point où elle se termine, sont deux petits traits situés transversalement & pareillement argentés. Dans d'autres individus des mêmes contrées, la tache centrale est convertie en une bande transverse, & le gris de perle du limbe postérieur paroît y dominer sur le brun.

Les individus de l'Amérique septentrionale, ceux qui paroissent avoir servi de type au *P. Clarus* de Cramer, sont un peu plus petits; la couleur jaunâtre des taches transparentes, & particulièrement de la bande, tire un peu sur le rouillâtre; le dessous des ailes inférieures est presque entièrement rougeâtre; la tache argentée y forme une bande, mais brusquement rétrécie & interrompue vers son extrémité extérieure; cette tache manque dans quelques autres individus. M. Lherminier m'a envoyé cette variété de la Guadeloupe.

La chenille, d'après les observations d'Abbot, vit sur le *Robinia pseudo-acacia* & le *Caroubier* sauvage; elle est verte, ponctuée & rayée transversalement de noir, avec la tête rougeâtre, marquée en devant de deux taches oculaires, jaunes; elle fait sa coque en automne, & l'infécule parfait éclot au printemps suivant.

φ φ. Dent extérieure de la troncature oblique du prolongement anal des ailes inférieures soit point ou peu saillante, soit obtuse ou arrondie.

39. HESPÉRIE Epitus.

HESPERIA Epitus.

Hesperia alis supra fuscis, infra fusco-ferrugineis; anticis maculis vitreis, flavidis; tribus internis in triangulum dispositis; alis posticis infra fuscis transversis, argenteis.

Hesperia U. Epitus, alis subcaudatis, fuscis, flavo maculatis; posticis subtus fuscis argenteis.
FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 532. n^o. 261.

Papilio P. U. Epitus Mant. Inf. tom. 2. p. 86. n^o. 778.

Papilio Epitus. CRAM. Pap. 29. pl. 545. E. F. — P. Evadne. Ibid. G.

Elle est un peu plus petite que l'espèce précédente. Le dessous de la masse des antennes & les palpes extérieurs sont jaunâtres. Les ailes sont noirâtres en dessus & d'un brun-ferrugineux en dessous, avec le limbe postérieur souvent plus clair ou même cendré, du moins en partie, & spécialement sur les ailes inférieures, l'angle anal excepté; les taches transparentes & jaunâtres des ailes supérieures, qui dans les espèces précédentes forment une bande, sont ici au nombre de trois, & disposées en triangle, celle du milieu étant plus en dehors; les autres taches ressemblent, par leur situation & leur grandeur, à celle que l'extrémité postérieure des mêmes ailes nous offre dans ces espèces. Le milieu de la surface inférieure des secondes ailes est traversé par une bande argentée plus ou moins large, tantôt entière, tantôt échancrée, & ne formant quelquefois qu'une simple ligne transversée; le dessus de ces ailes offre aussi quelquefois un point jaune. (*Epitus, Cram.*)

Elle se trouve au Brésil & à la Guyane.

Il faut rapprocher de cette espèce : 1^o. le *P. Comis* de Cramer, *Pap. 55. pl. 591. N. O.*, voisin de l'*H. Pajifrate* de Fabricius; 2^o. son *P. Brino*, *ibid. 50. pl. 555. E. F. & 55. pl. 592. C. D.* Le dessus des ailes est d'un rouge-foncé ou d'un brun-marron. Les inférieures ont deux bandes maculaires & transverses argentées; leur dessus offre aussi un point jaune, peu éloigné du bord postérieur.

M. L. ugédon m'a envoyé du Brésil une hespérie que je soupçonne n'être qu'une variété de cette espèce, & qui en diffère par les caractères suivants : les ailes supérieures ont près du sommet quelques taches transparentes que l'on n'observe point dans les figures de Cramer. Le dessus des inférieures présente près de la base une tache blanchâtre, & entre le milieu & le bord postérieur une bande courte, transversée, arquée, de cette couleur, mais en partie transparente; cette bande est plus étendue en dessous, & se prolonge en manière de dent, dirigée en avant, au milieu

de la courbure; son extrémité interne s'élargit & s'arrondit; à la place de la tache antérieure est une raie transversée, pareillement blanchâtre.

On rapprochera encore de cette espèce le *P. Dubius* de Cramer, *ibid. pl. 554. B. C.* Les taches transparentes des ailes supérieures sont toutes très-petites, en forme de points, & disposées en une ligne oblique. Le dessous des ailes inférieures est d'un rouge-noirâtre, avec une ligne jaune, traversant l'aile d'un bord à l'autre.

Vient encore se placer ici son *P. Florestan*, *ibid. 53. pl. 591. E. F.*; son *P. Orchamus*, *ibid. 15. pl. 155. E. F.*, & enfin son *P. Arculus*, *ibid. 53. pl. 591. I. K.*; mais je ne connois ces espèces que d'après leur figure; elles font toutes de l'Amérique méridionale. Le *P. Ethlius* de cet auteur, que je décrirai plus bas, & quelques autres espèces, doivent, dans un ordre naturel, leur être alloués.

40. HESPÉRIE Ericus.

HESPERIA Ericus.

Hesperia alis fuscis; alis anticis punctis tribus fenestratis, minutissimis; posticis subtus maculâ posticâ stovecente.

Hesperia U. Ericus, alis subcaudatis, fuscis; punctis anticis fenestratis minutis; posticis subtus maculâ posticâ stovecente. FAB. *Suppl. Ent. Syst. p. 452.*

Elle a entièrement le port de l'*H. Phocas*. Les antennes sont crochues. Les ailes font noirâtres. Les antérieures sont plus pâles & en dessous, & ont près de leur extrémité trois points très-petits, transparents. Les inférieures sont presque en queue, & offrent postérieurement en dessous une tache jaunâtre; on n'en voit aucune sur l'autre face.

Je n'ai point vu cette espèce, & je ne la place ici que par présomption.

Elle se trouve aux Indes orientales.

41. HESPÉRIE Chromus.

HESPERIA Chromus.

Hesperia supra fusca, subtus dilutior; alis posticis infra lineâ transversâ albâ, maculâ anali fusca.

Papilio Chromus. CRAM. Pap. 24. pl. 284. E.

Elle est de moyenne taille, noirâtre en dessus, d'une teinte plus claire ou d'un brun-cendré en dessous. Le dessous de la masse des antennes est roussâtre. Le milieu des ailes supérieures est, dans quelques individus, deux ou trois petites taches transparentes. Le dessous des inférieures est traversé de l'angle extérieur à l'angle anal, par une raie étroite, droite & blanchâtre. L'on voit sur l'angle anal une tache noirâtre; assez grande & allongée.

Elle se trouve, selon Cramer, à la côte de Coromandel.

L'hespérie

L'hespérie *Alexis* de Fabricius paroît en être très-voisine; la bande du dessous des ailes inférieures est bleuâtre.

— — — *Deffus du corps & base supérieure des ailes point garnis de davel soyeux vert ou d'un vert-bleuâtre; dessous des inférieures n'offrant point, du moins dans les espèces où ces parties sont jaunâtres, de taches discoïdales argentées, ni une bande longitudinale ou transverse, soit pareillement, argentée, soit blanche ou jaunâtre.*

Nota. Prolongement postérieur & interne des ailes inférieures ordinairement très-court, obtus ou arrondi; ces ailes font arrondies ou très-arquées vers l'angle extérieur, dans plusieurs.

φ. *Des taches vitrées, & dont plusieurs bordées de noir ou de noirâtre, en forme de petits yeux, sur les quatre ailes.*

Massue des antennes entrecoupée de noirâtre & de blanc.

42. HESPÉRIE Polygius.

HESPERIA Polygius.

Hesperia rufo-fusca; alarum anticarum medio fuscâ maculari senefratâ, transversâ.

Elle est très-voisine du papillon *Euribates* de Cramer (*Pap.* 33. p. 393. D), & peut-être même n'en est-elle qu'une variété à taches jaunâtres & transparentes plus nombreuses. Cinq d'entr'elles forment sur le milieu des ailes supérieures une bande transverse; la seconde & la troisième, en commençant à compter du bord extérieur, sont beaucoup plus grandes que les autres, presque carrées, un peu échancrées aux deux bouts; les dents les plus internes sont en forme de points & bordées de noirâtre; entre cette bande & l'angle du sommet font quatre autres taches, dont une plus grande, triangulaire, située près de l'entre-deux des deux grandes de cette bande, & les trois autres, en forme de points ovales, disposées sur une petite ligne, près de la côte, vers le milieu de l'espace compris entre la bande & l'angle du sommet. Les inférieures présentent chacune trois petites taches transparentes, arrondies & bordées de noirâtre; l'une un peu plus grande, près du milieu, & les deux autres rapprochées sur une ligne transverse, au-dessous de la précédente, vers les deux tiers de la longueur de l'aile.

J'ai reçu cette espèce de M. Lang(dorff).

43. HESPÉRIE Salatis.

HESPERIA Salatis.

Hesperia alis suprà fusco rufescentibus, maculis vitreis omnibus punctiformibus.

Papilio Salatis. CRAM. *Pap.* 33. pl. 393. E.
Hist. Nat. Inf. Tome LX.

Les antennes font finement annelées de noir & de blanc, avec la massue noirâtre & marquée d'un anneau blanc. Le dessus du corps est d'un brun-roussâtre ou presque de couleur de tabac d'Espagne; le dessous, le limbe postérieur des ailes & le bord extérieur des inférieures font plus foncés. Les quatre ailes offrent, depuis leur milieu jusqu'à leur extrémité postérieure, quelques taches transparentes, petites, en forme de points jaunâtres & bordées de noir; leur nombre varie; l'une d'elles est placée près du milieu, mais manque quelquefois aux ailes supérieures; les autres font situées un peu plus bas, sur une ligne transverse & un peu arquée; souvent on n'en distingue bien que deux ou trois, celles des deux extrémités de la ligne étant très-petites.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Lang(dorff).

Je soupçonne qu'elle est la même que l'*H. Muretus* de Fabricius; mais la description qu'il en donne est si vague, que je n'ai point osé le citer dans la synonymie.

44. HESPÉRIE Ramufis.

HESPERIA Ramufis.

Hesperia alis brunneo-fuscis, maculis punctiformibus vitreis albis.

Papilio Ramufis. CRAM. *Pap.* 29. pl. 242. G.

Cette espèce, à la couleur du fond des ailes & des taches près, diffère peu de la précédente. Les taches du milieu des ailes supérieures sont plus grandes & plus rapprochées; celles des ailes inférieures sont toutes en forme de points, disposées sur deux lignes transverses, arquées, & presque toutes cercelées de noir.

Elle se trouve au Brésil.

Nota. Quelques espèces de Fabricius, telles que son *Phocas*, son *Nicias*, son *Rhetus*, le *P. Crinifus* de Cramer, &c., paroissent se lier avec les précédentes, & avoir aussi de l'affinité avec les hespéries *Gnetus*, *Salus*, & autres espèces analogues. La première, ou le *Phocas*, semble faire le passage de celles-ci aux précédentes. L'absence ou la présence des taches vitrées est un caractère très-artificiel, mais que nous sommes forcés d'employer pour arriver plus facilement à la détermination de certaines espèces.

φ φ. *Des taches transparentes sur les quatre ailes, sans cercle brun ou noirâtre autour; dessous des ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uniforme, soit avec un ou plusieurs points, soit avec de petites taches transparentes.*

Bbbbb

45. HESPÉRIE Chemnis.

HESPERIA Chemnis.

Hesperia corpore brunneo; alis fuscis, margine postico flavo; posticis utrinque concoloribus, maculis tribus quadratis hyalinis.

Hesperia U. Chemnis, *alis subcaudatis, fuscis, hyalino maculatis margineque postico flavo.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 351. n^o. 257.*

Papilio Chemnis. DOXOV. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. Ind. 6. pl. 3. fig. 1.*

Sa grandeur est un peu au-dessus de la moyenne. Le dessus du corps, le milieu des ailes supérieures & la base des inférieures sont d'un brun-rouillâtre; le bord postérieur des unes & des autres est jaune; toutes les autres parties du corps & des ailes sont brun-noirâtre, mais plus pâle sous les ailes inférieures. Les supérieures ont sept taches transparentes, jaunâtres: trois postérieures très-petites, en forme de points, disposées sur une ligne transverse & oblique, trois autres centrales, & la dernière ou septième entre celle-ci & les précédentes. On en voit trois ayant la même forme & une couleur fenestrale, mais un peu plus grandes, au milieu des inférieures & formant une ligne transverse.

Elle se trouve aux Indes.

46. HESPÉRIE Ethlius.

HESPERIA Ethlius.

Hesperia alis supra fuscis, infra, primorum disco excepto, flavidis; his maculis quatuor punctisque tribus ante apicem, fenestratis; alis posticis macularum quatuor flavidarum punctiformium serie transversâ.

Papilio Ethlius. CRAM. *Pap. 33. pl. 392. A. B.*

Cette espèce est si voisine de l'*H. Chemnis* de Fabricius, qu'elle n'est peut-être qu'une variété un peu plus grande, d'un brun plus sauve & commun aux deux surfaces des ailes. Le milieu du dessous des supérieures est noirâtre; celui des inférieures présente une série transverse de quatre petites taches, presque carrées, d'un jaunâtre-transparent; on pourroit n'en compter que trois, l'extérieure étant simplement divisée en deux ou double; celles des ailes supérieures ont la même disposition que dans l'*H. Chemnis*. Les quatre ailes sont finement bordées postérieurement de jaunâtre, ainsi que dans cette espèce, & les inférieures ont la même forme que les siennes. La base supérieure des unes & des autres, & le dessus du corps, sont un peu jaunâtres.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil.

47. HESPÉRIE Antonia.

HESPERIA Antoninus.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis; illarum costâ subius flavidâ; his punctis duobus flavidis, infra rubro-fuscis, basi flavo-griseâ.

Je suis redevable à l'amitié de M. Langdorff de plusieurs individus de cette espèce, qui, dans une méthode naturelle, se rapproche beaucoup de l'*H. Epitus*. Elle a encore plus de rapports avec l'*H. Ethlius*. L'angle anal des ailes inférieures est moins prolongé & leur dessous est autrement coloré. Sa taille varie; celle des plus grands individus est un peu au-dessus de la moyenne. La masse des antennes est jaunâtre & se termine brusquement en manière de crochet acéré. Le dessus du corps & des ailes est noirâtre. Les supérieures ont depuis leur milieu jusque près du sommet six à sept taches jaunâtres, transparentes, dont une près du milieu de la côte, deux ou trois autres en forme de petits points & alignées, près du sommet, & les autres inférieures & disposées en une ligne oblique; en dessous, le disque de ces ailes est plus foncé ou noirâtre, & la côte, depuis la base jusque près du milieu, est d'un gris-jaunâtre. Sur le milieu des ailes inférieures est une rangée transverse de deux petites taches, tantôt presque carrées, tantôt punctiformes, jaunâtres & vitrées. L'une d'elles, quelquefois même les deux, & quelques-unes des ailes supérieures s'oblitérent. Le dessous de ces ailes est d'un grisâtre ou jaunâtre, depuis la base jusque près du milieu; ensuite, d'un brun-rougeâtre, avec la portion du limbe contiguë à l'angle extérieur plus pâle ou cendrée. Cette espèce ressemble beaucoup, à cet égard, au *P. Phadon* de Cramer.

C'est près de l'*H. Antonia* ou de l'*H. Ethlius*, que paroît devoir se placer le *P. Salius* de cet auteur. (*Pap. 6. pl. 68. K.*) Il n'a représenté que sa face supérieure. Le dessous, selon lui, ne diffère du dessus qu'en ce que les ailes inférieures ont leur base d'un gris-cendré obscur.

J'ai reçu de M. Langdorff quelques individus d'une héspérie fort analogue. Le dessous de ces ailes offre tantôt deux petites taches, dont une transparente, tantôt de faibles vestiges d'une bande maculaire d'un jaunâtre-pâle. Le dessous est généralement d'un cendré un peu jaunâtre, avec deux bandes transverses, brunes, & une tache de cette couleur, en forme de point & située au-dessus d'elle, près du bord extérieur, à peu de distance de la base. Dans une variété, le dessous de ces ailes est d'un brun-ferrugineux, avec la base & une raie transverse jaunâtres. J'ai donné à cette espèce le nom de *Nyctelius*.

Toutes ces héspéries se trouvent au Brésil & à Surinam.

48. HESPÉRIE Dalman.

HESPERIA Dalman.

Hesperia alis supra fuscis; anticis maculâ apicali trigona, nigro-fuscâ, flavido marginatâ; posticis supra punctatorum quatuor flavescenscentium serie transversâ; infra fuscis, fuscâ flavidâ, fusco punctatâ maculâque atrâ subocellatâ.

Je donnerai à cette espèce le nom de l'un de nos plus célèbres entomologistes vivans, M. Dalman, directeur du cabinet d'histoire naturelle de Stockholm, regrettant seulement qu'il m'ait prévenu à l'égard de ces témoignages d'estime réciproque.

L'*H. Dalman* est très-voisine du *P. Arcalaus* de Cramer, *Pap.* 33. pl. 391. l. K. La grandeur, les couleurs du dessous du corps & des ailes, les taches supérieures, sont presque semblables. Les taches transparentes des ailes supérieures sont au nombre de sept, & ont la même forme & la même disposition que celles de l'espèce précédente, de l'*H. Ethlius* & de plusieurs autres. Le bord interne de ces ailes est garni en dessus, depuis la base jusqu'au milieu de la longueur, d'un duvet d'un jaunâtre-pâle ou grilâtre, & formant une raie longitudinale. Le milieu de la face supérieure des secondes ailes présente une rangée transversale de petites taches de cette couleur, & dont les deux du milieu transparentes. Le dessous des ailes antérieures est d'un brun-noirâtre-foncé, avec la portion supérieure de la côte & un espace près de l'angle du sommet, d'un jaunâtre-pâle; cet espace renferme une tache triangulaire, de la couleur du fond, dont la base est formée par le bord extérieur, & offre à son milieu une petite tache d'un jaunâtre-pâle; les petits points transparents & ordinaires bordent le côté interne de la tache. Le dessous des ailes inférieures est aussi d'un brun-noirâtre-foncé, avec la partie basilaire du bord extérieur, une bande transversale, située immédiatement au-dessus des taches du milieu, & l'extrémité du côté extérieur, d'un gris-jaunâtre; sur cette bande font intérieurement deux points noirs; au-dessous de celui qui est le plus interne, est une tache plus foncée, & à laquelle la petite tache jaune interne de la rangée du dessus de ces ailes forme une bordure en manière d'iris; le point transparent qui vient ensuite, ou l'interne des deux, est surmonté d'une petite tache d'un noirâtre-foncé & presque contiguë à la précédente; plus loin, en tirant vers le bord extérieur & au-dessus de la première tache de la série du milieu, est un point noirâtre; une partie du limbe postérieur est d'un brun plus clair, de manière que cette couleur se détache davantage au-dessous de la bande jaunâtre, & semble former elle-même une autre bande. La massue des antennes est noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous & terminée par un petit crochet. Le dessous

du corps, & particulièrement les palpes extérieurs, sont grilâtres.

Cette espèce fait partie de la collection du Muséum d'histoire naturelle du Jardin du Roi, & lui est venue du Brésil.

49. HESPÉRIE Bafoches.

HESPERIA Bafoches.

Hesperia alis supra fusco-nigris, infra, primorum disco excepto, cinereo-brunneis; unniunum disco maculis tribus albedo-hyalinis; primoribus supra maculâ apicali niveâ, subtus, ante apicem, nigro tripunctatis.

Parmi les savans qui m'honorent de leur amitié, & dont la correspondance m'a été des plus utile, je distinguerai spécialement M. de Bafoches, habitant de Falaïse, département du Calvados. La reconnaissance & l'amitié me font donc un devoir de lui consacrer cette espèce, qu'aucun naturaliste n'a fait connoître. Elle se rapproche beaucoup du *P. Phidon* de Cramer, dont nous avons parlé en décrivant l'*H. Antonin*. Mais elle en diffère néanmoins par plusieurs caractères exprimés dans notre phrase spécifique. Elle est de grandeur moyenne. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, mais dont un beaucoup plus étendu & en forme de bande, sur la massue, avant son crochet. Le corps est noirâtre. Les ailes sont presque noires en dessus, d'un brun-violet-pâle & un peu cendré en dessous, mais le disque des supérieures est noirâtre. Les inférieures offrent aussi un espace plus foncé, en forme de tache allongée ou de bande, allant obliquement du milieu de leur disque au bord extérieur. Sur le milieu de chaque aile font trois taches transparentes & blanchâtres; celles des supérieures sont plus grandes & disposées en triangle; celles des inférieures sont très-petites, contiguës, en manière de tache centrale & transversale; l'inférieure est en forme de petit point; l'entrelle & le bord interne est un point noirâtre; on en voit trois autres, formant un triangle, sur le dessous des supérieures, un peu avant le sommet; l'extérieur de ce sommet ou de l'angle apical est blanc en dessus.

M. Langsdorff m'a fait dou de cette espèce, qu'il a recueillie au Brésil.

50. HESPÉRIE Fischer.

HESPERIA Fischer.

Hesperia alis nigris; anticis maculis septem, posticis tribus, albo-hyalinis.

Je dédie cette espèce au savant auteur de l'*Entomographie de la Russie*, M. Fischer, vice-chancelier de l'Université de Moscou. Elle est de taille moyenne, noire, avec quelques points sur le dessus de la tête, les palpes extérieurs,

la poitrine & la majeure partie des pattes gris; le dessous des ailes inférieures & une grande partie de la portion extérieure de celui des supérieures ont une teinte d'un cendré-verdâtre & luisant. Le milieu de ces dernières ailes offre trois taches transparentes, dont la postérieure plus grande, presque carrée; les quatre autres sont situées entr'elle & l'angle apical; les deux les plus voisines de la côte sont très-petites, en forme de points & très-rapprochées; celle qui est la plus en arrière est aussi très-petite. Entre le milieu & le bord postérieur de chaque aile inférieure sont trois autres taches transparentes, presque cendrées, sur une rangée transverse, un peu arquée; les deux internes ne sont séparées l'une de l'autre que par une nervure. Les antennes sont entièrement noires.

Elle se trouve au Brésil, & je l'ai reçue de M. Langsdorff.

51. HESPÉRIE Lefueur.

HESPERIA Lefueur.

Hesperia alis nigro-fuscis, maculis punctifera albo-hyalinis; alis posticis puncto discoidaliterque quatuor inferis per seriem transversam dispositis.

Elle est un peu plus grande que l'*H. Ethlius*, d'un noirâtre plus foncé, avec les taches ordinaires des ailes supérieures & celles en forme de points des inférieures d'un blanc-transparent; celle des quatre taches antérieures des premières ailes, qui est la plus voisine de la côte, est échancrée à chaque bout; celles des ailes inférieures sont en forme de points, dont un isolé, presque central, & les quatre autres au-dessous, en une rangée transverse; l'avant-dernier est un peu plus grand; au-dessus de l'extrémité extérieure de cette série, est un cinquième point, très-petit & moins apparent. Les ailes sont finement bordées de blanc.

Cette espèce a été envoyée des États-Unis au Muséum d'histoire naturelle, par l'un de ses plus zélés correspondans, l'amî & le compagnon de feu Peron, M. Lefueur, & auquel j'ai consacré cette espèce.

52. HESPÉRIE Bonfils.

HESPERIA Bonfils.

Hesperia alis supra fuscis, infra fusco-ferrugineis, limbo postico diluitori; anticis fuscis, posticis punctis in seriem transversam medianque dispositis, albo-hyalinis; omnium sibiria posticâ albâ, nigro interfectâ.

M. Bonfils de Bordeaux cultive depuis longtemps l'étude des insectes, en possède une belle collection, & s'empresse de mettre à profit toutes les occasions qui lui permettent d'être utile à

tous les naturalistes. Ceux qui, comme moi & M. le général Dejean, ont éprouvé les témoignages de la bienveillance, partageront, j'espère, ce tribut de ma gratitude.

Cette hespérie est large (les ailes étendues) d'environ un pouce & demi. Le milieu des ailes supérieures est traversé obliquement par une bande d'un blanc-transparent, n'atteignant pas les deux bords, & formée de deux taches réunies; entr'elle & la base, près du bord interne, est un point de la même couleur; on en voit quatre autres, entre la bande & le bord postérieur, dont les trois supérieurs rapprochés en une ligne; le dessous de ces ailes est d'un fauve-obscure, avec le limbe postérieur d'un brun-clair; chaque extrémité de la bande est appuyée sur une tache griffâtre & marginale. Le disque des inférieures présente une série transverse de trois points transparents, dont l'antérieur, beaucoup plus grand, est formé de petites taches arrendies; en dessous, ces ailes sont d'un fauve-obscure au milieu, d'un brun-clair au côté interne & sur le limbe postérieur, mais pâle ici, & même griffâtre à l'angle extérieur; un peu au-dessus du centre est un point solitaire blanchâtre; au-dessous des points transparents est une bande d'un fauve-obscure, divisée en petites taches, presque en forme de points, & recourbée tout autour du disque; deux de ces points bordent extérieurement la tache transparente: le plus élevé est accolé intérieurement à une petite tache solitaire. L'angle anal est ainsi que dans beaucoup d'espèces voisines, comme tronqué obliquement & terminé par une dent.

Elle se trouve au Brésil & m'a été envoyée par M. Langsdorff.

☉ ☉ ☉. Des taches ou des points transparents aux ailes supérieures au plus.

53. HESPÉRIE Thrax.

HESPERIA Thrax.

Hesperia alis fuscis, infra dilutionibus; anticis maculis tribus flavido-hyalinis, in triangulum dispositis; anteriorum inferâ magnâ, elongato-quadratâ.

Hesperia P. U. Thrax, alis ecaudatis, fuscis; maculis aliquot fenestratis, antennis uncinatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 337. n. 282.

Papilio U. Thrax. Mant. Inf. tom. 2. p. 87. n. 795. — Spec. Inf. tom. 2. p. 134. n. 620. — Syst. Ent. p. 533. n. 338.

Papilio U. Thrax, alis ecaudatis, fuscis, maculis tribus fenestratis; antennis subuncinatis. Linn. Syst. Nat. edit. 12. tom. 2. p. 794. n. 260.

Papilio P. U. Thrax. DONOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 6. pl. 2. fig. 2.

Fabricius n'ayant point connu le *P. Thrax* de Linné, y rapporte, comme synonymes, plusieurs espèces essentiellement différentes. Peut-être cette confusion provient-elle de la citation qu'a faite celui-ci d'une figure de Clerck, qui ne s'accorde point avec la description de cet insecte. Il n'en est pas ainsi de celle qu'en a donnée M. Donovan; elle nous rappelle en tout point la description du naturaliste suédois. Nous sommes d'autant plus sûrs de l'identité, que M. Westermann nous a envoyé une héspérie de Java (patrie, selon Linné, du *P. Thrax*), parfaitement semblable à celle que le naturaliste anglais a représentée. Elle est assez grande, d'un brun-noirâtre, plus clair en dessous, ainsi qu'au bord extérieur des premières ailes. Celles-ci ont trois taches transparentes & jaunâtres, dont les deux antérieures plus grandes, l'inférieure surtout; la supérieure est échancrée postérieurement; en dessous, le disque de ces ailes est plus foncé; celui des inférieures présente l'apparence d'une ligne noireâtre en forme d'ovale. La massue des antennes est crochue, aiguë à son extrémité, noirâtre, avec un anneau blanc, près de son origine.

Dans la figure de Clerck (*Icon. Inf. tab. 42. fig. 2 & 3.*), les ailes supérieures y sont représentées avec des taches plus nombreuses & plus petites; les ailes inférieures ont sur leurs deux surfaces un point jaunâtre central; l'échancrure du bord postérieur voisine de l'angle anal y est peu sentie. D'après ces caractères & quelques autres, nous pensons que cette figure le rapporte plutôt à quelque variété de l'héspérie *Chennis* ou des papillons *Phidon*, *Ethlius* de Cramer.

Nous ne connaissons point l'*H. Flesus* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 338. n° 286.*) Cette espèce est, selon lui, voisine de l'*H. Thrax*. Ses antennes sont noires & crochues. Les ailes sont noirâtres; les antérieures ont des taches vitrées; le disque inférieur des secondes est blanc, avec des points noirs. Elle habite l'Afrique équinoxiale.

L'héspérie *Vespasien* du même (*Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 334. n° 269.*) doit être voisine de notre *H. Thrax*, ou de quelque autre espèce analogue. Le corps est grand, fauve. Les ailes sont d'un noirâtre-faive sur leurs deux surfaces; les supérieures ont, avant leur sommet, quelques taches vitrées. Les postérieures sont presque en queue & sans taches.

Elle habite les Indes.

Le *P. Ladon* de Cramer (*Pap. 24. pl. 284 G*) paraît encore se ranger près des espèces précédentes. Il habite la côte de Coromandel.

Je suis redevable à l'amitié de M. le baron Dejean d'une grande héspérie de Java, que je considère comme une variété de cette espèce. Ses ailes supérieures ont dans leur milieu trois taches blanches & transparentes, & près du sommet,

cinq à six autres de la même couleur, mais en forme de points & composant une ligne courbe.

Les ailes inférieures sont blanches, avec une large bordure noire au bord extérieur; en dessous, cette bordure est largement interrompue & elle ne se montre que sur une portion du côté extérieur & à l'angle anal.

54. HÉSPÉRIE ENNIUS.

HESPERIA ENNIUS.

Hesperia alis anticis fuscis, maculis flavo-hyalis; posticis supra flavis, fasciâ submarginali, atrâ, arcuatâ: subtis fuscis, disco albo.

Hesperia V. Ennius, alis fuscis; anticis hyalino maculatis; posticis supra atris, disco flavo: subtis fuscis, disco albo. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 337. n° 283.*

Papilio Ennius. JON. *Fig. pict. tab. 89. fig. 1.*

Papilio P. U. Ennius. DONOV. *of an Epit. of the Hist. of the Nat. Inf. of Ind. 11. pl. 3. fig. 1.*

Elle est grande & noirâtre. Les ailes supérieures, d'après la figure de Donovan, ont sept taches jaunâtres, dont une près du milieu de la côte, trois petites ou en forme de points & groupées près de son extrémité, & les trois autres situées en une ligne oblique, au-dessous de la première. Le dessus des ailes inférieures est jaune, avec une bande noire & arquée près des bords extérieurs; leur dessous, suivant Fabricius, est noirâtre, tacheté de noir, avec le disque blanc. L'abdomen, dans la figure de Donovan, est roussâtre.

Elle habite les Indes.

55. HÉSPÉRIE PHOCAS.

HESPERIA PHOCAS.

Hesperia fusco-flavida aut rufescens; alis anticis maculis flavido-hyalinis: tribus anticis majoribus, posticè emarginatis, quinque aut sex minutis, subapicalibus; alis posticis flavescens, fuscis; antennis abruptè uncinatis.

Hesperia U. Phocas, alis subcaudatis fuscis, fenestrato maculatis; posticis subtis puncto basales atro. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 334. n° 267.*

Papilio Phocas. CRAM. 14. pl. 162. F. — *Ejusd. P. Morpheus.* 33. pl. 392. G. II. Variété.

Son envergure est d'environ deux pouces. L'extrémité supérieure des antennes est brusquement courbée & se termine en une pointe aiguë. Le corps & les ailes font d'un noirâtre tirant sur le jaune, ou même fréquemment jaunâtres dans quelques individus; cette teinte do-

mine sur les inférieures, & elle est coupée transversalement par une ou deux raies obliques & noires, mais qui, dans quelques individus, s'effacent & le réduisent à une série de points; le bord postérieur est noirâtre. Le milieu des supérieures offre un groupe de quatre taches d'un jaunâtre-transparent, dont trois beaucoup plus grandes & échancrées à leur extrémité postérieure; près du sommet est un autre groupe de taches semblables pour la couleur & la transparence, au nombre de six, petites & presque en forme de points; une portion de la côte est séparée en dessous de la première nervure, par un filon étroit, profond & linéaire. Le fond de la couleur des ailes est quelquefois rouillâtre, & quelques-uns de ces individus ont même sur le dessous des inférieures de petites taches jaunâtres.

Je soupçonne que cette variété est l'*H. Nicias* de Fabricius (*Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 532. no. 262*), & qu'il dit être de Cayenne. Son corps, selon lui, est grand, fauve, avec les antennes noires & crochues. Les ailes antérieures ont la base fauve, marquée d'un point noir, & l'extrémité noirâtre, avec une grande tache finie, d'un jaune transparent. Les postérieures sont fauves, avec des points noirâtres; le dessous est de la couleur du dessus.

Cette espèce habite la Guyane & le Brésil.

56. HESPÉRIE AVITUS.

HESPERIA Avitus.

Hesperia fusco-flavescens; alis anticis maculis flavido-hyalinis; duabus anticis majoribus, subquadratibus; duabus tribusve punctiformibus, subapicalibus; alis posticis punctis fuscis, per series transversas dispositis; antennarum clavâ sensim arcuatâ.

Papilio Avitus. CRAM. *Pap. 30. pl. 554. D. E.*

Elle est presque de moitié plus petite que l'*H. Phocas*, & lui ressemble beaucoup. La massue des antennes est simplement arquée, noire, avec un anneau blanc. Les ailes sont d'un jaunâtre-obscure, ou mélangées de noirâtre & de jaunâtre. La côte des supérieures n'est point réléchie en dessous; leurs taches transparentes sont plus petites & moins nombreuses que dans l'espèce précédente; on n'en voit que deux ou trois près de leur extrémité, & les antérieures, ou celles du milieu, ne font qu'un nombre de trois, au lieu de quatre, inférieure de celles qui composent la rangée transversale manquant; ces taches, à l'exception de l'extérieure, ne font point échancrées postérieurement. Les ailes inférieures ont une rangée transversale de points noirâtres; on en voit aussi quelques-uns près de la base.

Cette espèce se trouve au Brésil & à Surinam. Je l'ai reçue de M. Laugsdorff.

57. HESPÉRIE RHÉTUS.

HESPERIA Rhetus.

Hesperia flavo-ferruginea; alis fusco undatis; anticarum margine externo valdè reflexo, posticarum caeruleo-atro.

Hesperia U. Rhetus, alis subcaudatis fulvis; posticis margine exteriori caeruleo-atro. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 534. no. 270.*

Papilio P. U. Rhetus. Mant. Inf. tom. 2. p. 86. no. 766. — Spec. Inf. tom. 2. p. 155. no. 612.

Papilio Mitas. CRAM. *Pap. 6. pl. 63. G.*

Le corps des plus grands individus a, les ailes étendues, un peu plus de deux pouces de largeur; il est, en majeure partie, couleur de fouci. Les antennes sont noires, avec le sommet courbé & très-pointu. Les ailes supérieures & le dessous des inférieures présentent dans les individus les plus colorés, deux raies onnées noirâtres transversales, dont la dernière terminale, & une tache de la même couleur, en forme de gros point, en avant de la première, près du milieu de la longueur; celle des supérieures est finie près de la côte; une portion de cette côte est fortement réléchie en dessous, ou forme une espèce de pli, contigu, dans sa plus grande largeur, à la première nervure; on observe le même caractère dans le *P. Salatis* de Cramer, & dans quelques autres espèces. Le bord extérieur des ailes inférieures est d'un noir-foncé, tirant sur le bleuâtre; sur le dessous est noirâtre, avec des bandes transversales rouillâtres, ou du moins mélangé de ces deux teintes.

Cette espèce se trouve à Surinam & au Brésil. C'est probablement auprès d'elle ou dans son voisinage, que se trouve l'*H. Silvius* de Fabricius. (*Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 542. no. 299.*) Elle est grande & du Cap de Bonne-Espérance. Le dessus de ses ailes est noirâtre, avec le disque jaunâtre & tacheté de noirâtre. Le dessous des postérieures est cendré, avec des raies noirâtres & onnées.

58. HESPÉRIE CRINIFUS.

HESPERIA Crinifus.

Hesperia alis fuscis, ad basin supra rufescentibus, infra griseo-flavidis; posticarum disco inféro rufescenti, fusco fasciato; anticis sæpius maculis hyalinis, minutis.

Papilio Crinifus. CRAM. *Pap. 25. pl. 300. G. H.*

Elle est de taille moyenne. La massue des antennes est graduellement arquée. Tout le corps est d'un gris-jaunâtre, plus pâle à la tête; les ailes sont noirâtres, avec la moitié antérieure de leur surface supérieure rouillâtre ou couleur de tabac

d'Espagne; l'autre moitié est saupoudrée de la même couleur, & offre ordinairement un assez grand nombre de petites taches transparentes, dont les antérieures & les dernières sont rapprochées trois par trois; l'espace intermédiaire en a trois autres. En dessus, l'origine des quatre ailes est de la couleur du corps. Le milieu des inférieures est rouffâtre, avec une bande transverse, noirâtre, paroissant un peu en dessus, divisant la teinte rouffâtre en deux parties inégales, & dont la postérieure forme une raie; l'angle anal est sensiblement prolongé en une dent assez pointue.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langdorff. Elle se trouve aussi à Surinam. Elle varie, à ce qu'il me paroît, par l'absence totale de taches transparentes, puisque les individus qui sont dans ce cas, ne diffèrent qu'en cela du précédent.

59. HESPÉRIE Lycidas.

HESPERIA Lycidas.

Hesperia alis anticis posticisque supra dilutofuscis; his maculis disci hyalino-flavescentibus; illis subtus ad basin fusco-nebulosis, ex tuis albidis; omnium simbria posticâ fusca alboque interfectâ.

Papilio U. Lycidus, alis subcaudis fuscis nigro dentatis; primoribus utrinque fasciâ flavâ; posticis subtus basi fusco-nebulosis, ex tuis albis. SMITH-ABBOT, *Lepid. Geogr. tom. 1. p. 39. pl. 20.*

Elle est de moyenne taille, d'un noirâtre-cendré & un peu jaunâtre en dessus, ainsi que sur le dessous des ailes supérieures. Les antennes sont crochues. Le disque des supérieures présente un groupe de taches d'un jaunâtre-pâle & transparent, formant une bande, & dont trois beaucoup plus grandes; entre cette bande & le bord postérieur, sont deux ou trois points de la même couleur. Le dessous des ailes inférieures est depuis la base jusqu'au milieu, noirâtre, avec quelques taches plus claires; l'autre portion de l'aile est blanchâtre, avec de petits traits & l'angle anal noirâtres. La frange postérieure, tant en dessus qu'en dessous, est entrecoupée de noirâtre & de blanc. Les ailes inférieures étant plus arrondies que dans les autres espèces de cette division, peut-être faudroit-il la placer près des *H. Cicéron*, *Nepos* & autres analogues.

La chenille est couleur de chair, avec une ligne noirâtre le long du milieu du dos, & deux taches sur le premier segment & les stigmates de cette couleur. La tête est pareillement noirâtre, mais avec l'extrémité antérieure plus claire. Elle vit sur l'*Hedysarum paniculatum* de Linné. Les individus qu'Abbot avoit élevés se transformèrent en chrysalides le 10 juillet, & parvinrent à leur dernier état le 25 du même mois.

Cette espèce continue de se reproduire.

GO. HESPÉRIE Lucas.

HESPERIA Lucas.

Hesperia alis fuscis; anticarum disco maculis 4-5 flavo hyalinis; posticis immaculatis.

Hesperia U. Lucas, alis ecaudatis, fuscis; anticis utrinque maculis flavo-hyalinis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 2. pars 1. p. 339. n. 290.*

J'ai vu dans la collection du Jardin du Roi, une hespérie très-voisine de l'*Ethlius*, mais plus petite, d'un brun-noirâtre, un peu luisant & un peu plus clair sur le dessous des ailes, ayant, comme dans cette hespérie, des taches jaunâtres & transparentes aux ailes supérieures, mais en moindre nombre & plus petites, & sur le dessous des inférieures seulement une rangée de quatre à cinq petits points jaunâtres. Ces points, d'après la comparaison de plusieurs individus de diverses espèces analogues, pouvant s'oblitérer & disparaître, il seroit possible que l'hespérie *Lucas* ne fût qu'une variété de la précédente. Selon Fabricius, elle est une fois plus petite que l'hespérie *Thrax*. Ses antennes sont noires & crochues. Ses autres caractères sont exposés dans sa phrase spécifique.

Elle se trouve aux Antilles.

61. HESPÉRIE Mathias.

HESPERIA Mathias.

Hesperia alis supra fuscis, infra flavido-fuscis; anticis utrinque punctisque albo-hyalinis; posticis utrinque aut infra punctorum alborum serie transversâ.

Hesperia U. Mathias, alis ecaudatis, fuscis; anticis utrinque hyalino maculatis, posticis subtus punctis albis. FAB. *Suppl. Ent. Syst. p. 455.*

Elle est de taille moyenne, d'un noirâtre-clair ou un peu cendré, mais qui sur le dessus des ailes de plusieurs individus tire un peu sur le jaunâtre. Les antennes sont noires, avec la massue crochue & rouffâtre en dessous. Les palpes extérieurs sont gris. Les ailes supérieures ont sur leurs deux surfaces de petites taches d'un blanc-transparent, au nombre de huit à neuf, dans les individus où il y en a le plus, disposées comme à l'ordinaire & dont les trois les plus voisines du sommet, en forme aussi de petits points: telle est aussi quelquefois la forme de toutes les taches. Sur le dessous des ailes inférieures, un peu au-dessus du milieu est une rangée, plus ou moins prononcée, de cinq points blanchâtres, dont les extérieurs plus rapprochés de la base; on en voit un sixième ou substituaire, un peu plus haut. Plusieurs de ces points sont quelquefois communs aux deux côtés de l'aile.

Elle habite le Bengale, d'où elle avoit été envoyée au Muséum d'histoire naturelle par feu Macé.

62. HESPERIE Gremius.

HESPERIA Gremius.

Hesperia alis fuscis, subtus fusco-cinereis; anticis maculis punctisque albo-hyalinis; posticis infra punctis quatuor aut quinque discoidalibus, atris, albo marginatis.

Hesperia U. Gremius, *alis ecaudatis, fuscis; anticis hyalino-maculatis maculâque flavâ; posticis subtus cinereis, atro-punctatis.* FAB. *Suppl. Ent. Syst. em. p. 453.*

Elle ne diffère de l'*H. Mathias* qu'en ce que le dessous des ailes est d'un noirâtre-cendré, & que celui des inférieures offre dans son milieu quatre à cinq points très-noirs, bordés de blanc, ou en forme de petits yeux, & disposés en arc, du côté du bord extérieur.

Elle habite les mêmes contrées.

J'ai reçu du Brésil une *hespérie (tripunctata)* ne différant de la précédente qu'en ce que les ailes supérieures sont presque sans taches, & que le dessous des inférieures n'offre que trois points noirs & rapprochés presque en manière de triangle.

63. HESPERIE NERO.

HESPERIA Nero.

Hesperia nigro-fusca, submicans; alis anticis utrinque, posticis subtus, punctorum alborum strigâ transversâ.

Hesperia U. Nero, *alis ecaudatis, fuscis; anticis hyalino maculatis; posticis subtus strigâ interruptâ albâ.* FAB. *Suppl. Ent. Syst. p. 443.*

Papilio P. U. Accius. SMITH-ABBOT, *Hist. nat. des Lépid. de la Géorg. tom. 1. p. 45. tab. 25?*

Elle est très-voisine de l'*H. Mathias*, mais, à ce qu'il m'a paru, d'un noirâtre plus foncé, du moins en dessus, & avec un reflet d'un vert-chatoyant. Le dessous est plus clair, quelquefois d'un brun-ferrugineux, plus pâle à l'extrémité postérieure des inférieures. Les taches transparentes des ailes supérieures sont moins nombreuses que dans l'*H. Mathias*, & ne forment qu'une série transverse & arquée. Leur nombre & leur grandeur varient; elles disparaissent même en tout ou en partie dans quelques individus; mais le plus ordinairement elles sont petites & en forme de points; souvent un ou deux de ces points forment une sorte de centre à l'arc composé par les autres.

Elle se trouve au Brésil & aux Antilles.

Le papillon *Accius* de Smith (*Hist. nat. des Lépid. de Géorgie*, publiée d'après les dessins & les notes d'Abbot) a de grands rapports avec cette espèce, s'il n'en est pas une variété. Sa chenille vit sur le blé indien, *zea mays*. Elle est blanchâtre, avec des raies verdâtres; la tête

a une ligne rouge dans son milieu & des espaces ou de petites raies noires sur les côtés. Sa chrysalide est remarquable par le prolongement de sa pointe antérieure. Elle est appliquée contre les tiges de cette plante & enveloppée dans les feuilles. Elle éclot vers le solstice d'été.

Il paroît que les points blancs des ailes supérieures sont plus nombreux & plus grands dans les femelles.

Le papillon *Adrastus* de Cramer, 27, pl. 519, F, G, est encore très-rapproché de cette espèce: car, dans quelques variétés de celle-ci, quelques-uns des points du dessous des ailes inférieures forment des taches. Il nous semble enfin que son *P. Elgius*, 50, pl. 554, H, vient auprès des précédentes. Ici, les ailes supérieures ont des taches blanches, disposées en une bande transverse, mais le fond des ailes inférieures est essentiellement le même. J'ai reçu de M. Langford d'une *hespérie* qui ne diffère de la précédente qu'en ce que les taches des ailes supérieures sont moins nombreuses & ne composent point de bande.

L'éducation des chenilles peut seule déterminer les limites de ces variations & nous fixer à l'égard des dimensions spécifiques. Il faudroit d'ailleurs voir beaucoup d'individus & bien conservés, ce qui nous manque souvent.

64. HESPERIE JACCHUS.

HESPERIA Jacchus.

Hesperia alis fuscis; anticis maculis flavofenestratis; posticis supra maculâ mediâ, flavâ, compositâ, subtus punctis sex niveis.

Hesperia U. Jacchus, *alis ecaudatis, flavo maculatis; posticis punctis sex niveis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 342. no. 301.*

Papilio P. U. Jacchus, *Mant. Inf. tom. 2. pag. 88. no. 832. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 155. no. 625. — Syst. Ent. pag. 553. no. 389.*

Papilio P. U. Jacchus. DONOV. *an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. New Holl. Lep. pl. 20. fig. 1.*

Cette *hespérie* est de moyenne grandeur. Les antennes sont crochues & annelées de blanc & de noir. Les ailes supérieures sont noirâtres, selon Fabricius, mais d'un brun-fauve dans les figures de Donovan, avec environ huit taches d'un jaune transparent, dont trois petites, situées près du sommet, trois autres disposées en une bande transverse, & les deux autres entre celles-ci & la côte. Les ailes inférieures sont de la couleur des supérieures (plus foncées en dessus dans les figures de Donovan), avec une grande tache jaune, formant une bande courte, transverse & divisée en trois; le dessous offre des points d'un blanc de neige, au nombre de six, suivant

Fabricius;

Fabricius; on en compte sept dans la figure de Donovan, dont trois supérieurs, plus petits, écartés, & quatre inférieurs, contigus, sur une ligne transverse; ils sont bordés de noir.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

65. HESPÉRIE Flaccus.

HESPERIA Flaccus.

Hesperia fusca; alis anticis hyalino-punctatis; posticis puncto fasciâque albis.

Hesperia U. Flaccus, *alis integerrimis, reversis, fuscis; anticis hyalino-punctatis; posticis puncto fasciâque albis.* FAB. *Suppl. Ent. Syst. pag. 454.*

Son corps est petit, noirâtre en dessus, blanc en dessous. Les ailes sont noirâtres, avec le dessous plus clair. Les premières ont quelques points transparents; les secondes ont un point & une bande blancs: cette bande occupe le milieu & n'atteint pas les deux bords.

Elle se trouve aux Indes orientales.

On peut placer près de cette espèce le *P. Hylaspes* de Cramer, *Pap. 51. pl. 365. I. K.* Ses ailes sont noires; les supérieures ont des taches blanches, dont les postérieures en forme de petits points alignés en manière de raies; en dessous cette raie est jaunâtre. Les inférieures ont une bande longitudinale & étroite de cette couleur, fort courte sur la face supérieure, de toute la longueur de l'aile, coupée & rouffâtre en haut, sur l'autre face. Sa patrie est inconnue.

66. HESPÉRIE Marc.

HESPERIA Marcus.

Hesperia alis supra nigris; anticis maculis albo-hyalinis; posticis supra fasciâ maculari, mediâ, transversâ, cœruleâcenti - albida; infra alba; o-fuscis, latere externo vittâque longitudinali internâ pallido-flavis.

Hesperia U. Marcus, *alis ecaudatis fuscis hyalino-maculatis; posticis subtis vittis duabus flaviscentibus, margine tenuiori fulvo.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 338. n. 285.*

Papilio Phyllus. GRAM. *Pap. 15. pl. 176. B. G.*

Elle est petite, noire en dessus, avec des points blancs sur la tête. Les antennes sont noires, arquées à leur extrémité, terminées en pointe, avec une portion intérieure de leur masse blancheâtre. Les ailes supérieures sont noires, avec six taches transparentes, d'un blanc un peu bleuâtre; une petite, au bord interne, peu éloignée de la base; trois au milieu, dont l'inférieure la plus grande de toutes; & les deux autres en forme de petits points & rapprochées près du sommet. En dessous les ailes sont d'un noir moins

Hist. Nat. Inf. Tome LX.

foncé, avec la côte jaunâtre & l'extrémité d'un brun-clair, lavé de jaunâtre. Le dessus des ailes inférieures est noir, avec une bande transverse au milieu, composée de quatre à cinq taches oblongues d'un blanc-bleuâtre, un peu transparentes; cette bande commence à quelque distance du bord extérieur; le dessous est d'un brun-clair, avec le côté extérieur, une bande longitudinale interne, commençant à la base & se terminant avant le bord postérieur, d'un jaune-pâle; une portion du bord interne & de ses côtés, près l'origine de l'aile, est rouffâtre. Les palpes extérieures & le dessous du corps sont blancs.

Elle m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff. Elle se trouve aussi dans la Guyane hollandaise. Le Papillon *Jolus* de Cramer, 33, pl. 592, I, K, qui vient de ce dernier pays, se rapproche de cette espèce & de son *P. Hylaspes*, dont nous avons parlé à la suite de la description de *H. Flaccus*, trois espèces que nous n'avons point vues en nature.

67. HESPÉRIE Lucrèce.

HESPERIA Lucretius.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis; his supra punctorum flaviscentium serie transversâ, infra griseis, fusco-nebulosis, maculâ trigonâ internâ punctoâque infuso maculâ albidâ trigonâque impoâto, atris.

Les ailes antérieures de cette petite espèce & le dessus des inférieures sont d'un noirâtre-luisant; vers le milieu des premières sont des deux côtés deux ou trois petites taches, presque en forme de points, d'un brun-jaunâtre & un peu transparent; en dessous, le limbe postérieur est plus clair, avec une tache grisâtre ou cendrée au sommet. Les ailes inférieures sont très-arquées extérieurement; le milieu de leur face supérieure offre quatre ou cinq petites taches ou points jaunâtres, disposés en une ligne transverse. En dessous ces ailes sont grisâtres, avec le bord interne, le disque & une portion du bord postérieur, noirâtres; entre le centre & le bord interne, est une tache triangulaire, d'un noir-foncé, bordée de bleuâtre intérieurement, & finée immédiatement au-dessus d'une autre tache blancheâtre, & formant, avec la précédente, un triangle isocèle; l'on voit près du milieu du bord interne de celle-ci un gros point d'un noir-foncé. Le dessous du corps est cendré.

Elle se trouve au Brésil.

68. HESPÉRIE Lafrenaye.

HESPERIA Lafrenaye.

Hesperia alis supra nigris, infra fusco-fermineis; anticis maculis albo-hyalinis; posticis unum disco supra fasciâ maculari transversâ,

Ccccc

*maculata inf. à magni, t. zoni, p. n. lo fer-
vagineo notatè, albis.*

M. le baron Dejean (*Catal. des Coléop.*) avoit déjà donné à une espèce de carabique le nom d'un ami commun & qui l'avoit découverte dans les Pyrénées, M. de Lafenaye. Je me plais à offrir l'hommage particulier de mon estime & de ma reconnaissance à ce naturaliste du département du Calvados, qui, formé à l'école de M. de Bafoches, son beau-père, cité bien souvent dans mes écrits, a recueilli plusieurs observations importantes sur divers insectes, & dont le zèle pour leur être en le citant au-dessus de nos éloges.

Cramer a représenté sous la dénomination de *Nitocis* (*Pap.* 55, pl. 795, F. C.) une hespérie très-voisine de celle-ci. Mais ici les ailes sont concolores, & le dessus des inférieures est sans taches. *L'H. Lafenaye* est petite. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs & un peu crochues à leur extrémité. Le corps est noir en dessus, avec l'abdomen annelé de blanc & garni à sa base d'un duvet d'un blanc-bleuâtre. Les palpes extérieurs, le duvet de la poitrine & des enilles sont blanchâtres. Le dessus des ailes est noir. Les antérieures ont environ six taches blanches & transparentes, dont trois contiguës & sur une ligne transverse au milieu, & les autres placées entre les précédentes & le sommet, & plus petites; le bord interne offre une ligne courbe d'un blanc-bleuâtre, formée par des poils; le dessus de chaque aile inférieure présente, près du même bord, deux lignes semblables, & dont la plus inférieure, beaucoup plus longue, s'étendant depuis la base jusqu'au-delà du milieu; on voit, sur le milieu, une bande courte, transverse, d'un blanc un peu transparent & composée de trois taches contiguës. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-fauve, mais plus foncé sur le disque des supérieures: le sommet de celles-ci est comme fupoudré, en manière de taches, de blanchâtre. Les deux taches discoïdales & blanches du dessous des inférieures, indiquées dans notre phrase descriptive, forment réunies un grand triangle presque isocèle, dont les côtés sont parfaitement rectilignes, & dont la base est ondulée & bordée inférieurement de gris; sur chaque tache est une petite ligne d'un brun-fauve, flexueuse, entrecoupée & terminée vers le bord interne par une petite tache arrondie, en forme de gros point & de la même couleur; les taches se prolongent un peu inférieurement, au bord interne; la tranche du bord postérieur est en partie blanche.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

69. HESPÉRIE Tibulle.

HESPERIA Tibullus.

Hesperia alis anticis nigris, flavo maculatis; posticis flavis, limbo nigro.

Hesperia U. Tibullus, *alis integerrimis: anticis nigris, flavo maculatis; posticis flavis, limbo nigro.* *Vat. Ent. Syst. em. tom. 5, pars 1, p. 356, n. 325.*

Papilio Tibullus. *Jon. Fig. picl. 6. tab. 76. fig. 1.*

Papilio Tibullus. *Doxov. of an Exil. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 4. fig. 3.*

Les ailes antérieures sont noires, avec une dizaine de petites taches jaunes, dont deux antérieures & opposées, & les autres dispersées en une rangée transverse & arquée; la côte est un peu rouillâtre en dessous. Les ailes postérieures sont jaunes & entièrement bordées de noir; cette couleur est interrompue au bord postérieur; le dessous de ces ailes est mélangé.

Elle se trouve aux Indes.

70. HESPÉRIE Abebalus.

HESPERIA Abebalus.

Hesperia alis anticis utraque posticisque supra fuscis; alis junctorum alborum sine transversa arcuata; his fava sicut flavescens, transversa, macula; saltus albis, renis frugoneis, maculis duabus medius alteraque anali serigneo-fuscis.

Papilio Abebalus. *Cram. Pap. 51. pl. 365. G. II. P. Pantalos. Ibid. 25. pl. 300. E. F.*

Si l'on compare les figures précitées de Cramer, l'on n'hésitera pas à les considérer comme essentiellement identiques. L'erreur vient probablement de ce qu'il a été trompé sur l'habitation de son papillon *Abebalus*. Il le dit du Cap de Bonne-Espérance & de Guinée, tandis que son *P. Pantalos* habite Surinam.

Le corps de cette petite espèce est noirâtre en dessus & blanchâtre en dessous. Les antennes sont noires & terminées par un petit crochet. Les ailes supérieures sont noirâtres, mais un peu plus claires ou d'un brun-foncé en dessous; elles ont six petites taches arrondies, blanches, dont les trois dernières ou les plus voisines du sommet, en forme de très-petits points, contiguës, & sur une ligne, forment un angle avec la ligne transverse & oblique, composée par les trois autres taches; en dessous, les trois points placés près du sommet, forment avec une tache d'un rouillâtre-pâle, une forte d'arc. Le dessous des ailes inférieures est noirâtre, avec une petite bande transverse, d'un jaunâtre pâle ou rouillâtre, formée de petites taches réunies, placée au milieu du disque, & ne gagnant pas les deux bords. Le dessous de ces ailes est blanc, avec des veines rouillâtres & trois taches de cette couleur, mais plus foncées ou même noirâtres, dont une supérieure, la se-

onde au-dessus du milieu, & se réunissant, en manière de bande arquée, avec la troisième, qui est fincée à l'angle anal : l'espace compris entre la supérieure & les deux autres présente ainsi l'apparence d'une bande transverse.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langsdorff.

71. HESPERIE Pertinax.

HESPERIA Pertinax.

Hesperia alis anticis utriusque, posticis supra nigro-fuscis; illis maculis quatuor parvis punctisque tribus hyalino-albis; his subtus albidis, posterius obscurioribus, venis punctatorumque serie transversâ, albidis.

Papilio Pertinax. CRAM. *Pap.* 50. *pl.* 334. F. G. — P. *Ancas.* 29. *pl.* 345. A. B. var.

Le dessus du corps & des ailes de cette petite espèce est d'un noirâtre-foncé. L'une des quatre taches blanches des ailes supérieures est placée près du milieu de la côte; les trois autres forment une ligne oblique; près du sommet sont trois petits points blancs, disposés en série; en dessous, le sommet des mêmes ailes est blanchâtre. Le milieu du dessus des inférieures présente quelquefois une série de taches blanches, en forme de bande renversée. Le dessous de ces ailes est blanchâtre, mais plus obscur ou d'un brun-clair, depuis le milieu jusqu'au bord postérieur; on y voit une série arquée de points blanchâtres; la couleur de l'extrémité postérieure des veines longitudinales semble même se dilater un peu au dessus de cette série de points, & former une seconde rangée, mais très-foible, de taches blanchâtres. Dans quelques individus, comme dans l'*Ancas* de Cramer, ces points blanchâtres manquent.

Cette espèce se trouve au Brésil & à Surinam.

72. HESPERIE Saturne.

HESPERIA Saturnus.

Hesperia alis fuscis: anticis albo-punctatis, posticis subtus albo striatis.

Hesperia U. Saturnus, alis divaricatis, fuscis, posticis subtus striatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag.* 528. n^o. 244.

D'après Fabricius, elle est plus petite que l'*H. Comma*; les deux surfaces de ses ailes antérieures & le dessus des deux autres sont noirâtres: celles-là ont quelques points blancs; celles-ci sont sans tache en dessus & leur dessous offre des lignes blanches, formées par les nervures. Elle se trouve à Cayenne. Nous en avons reçu du Brésil une variété où le limbe postérieur des ailes supérieures est de plus strié de blanc, & où les ailes inférieures ont, au milieu & des deux côtés, une rangée

transverse de petites taches blanchâtres. Les premières ailes ont quatre petites taches blanchâtres ou d'un blanc-jaunâtre, entre les trois premiers points de cette couleur, situés près du sommet, & que l'on retrouve dans plusieurs autres espèces. Celle-ci se rapproche évidemment de l'*H. Pertinax*.

73. HESPERIE Cæsar.

HESPERIA Cæsar.

Hesperia alis anticis fuscis, fenestrato maculatis; posticis supra atris, maculâ mediâ niveâ, subtus disco cinereo, nigro punctato.

Hesperia U. Cæsar, alis integerrimis; anticis fuscis, fenestrato maculatis; posticis atris, maculâ mediâ niveâ. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag.* 340. n^o. 294.

Papilio Cæsar. JON. *Fig. pict.* 6. *tab.* 79. *fig.* 4.

Elle est petite. Les ailes antérieures sont presque concolores, noirâtres, avec des taches vitrées. Le dessous des postérieures est d'un noir-foncé, avec une grande tache d'un blanc de neige & dentée au milieu; en dessous, leur disque est cendré, avec des points noirs.

Elle habite les Indes.

Près de cette espèce & de la précédente peuvent être rangées quelques hespéries de Surinam, figurées par Cramer, ayant toutes les ailes supérieures noires ou noirâtres, avec des taches blanches vitrées, & les ailes inférieures, en grande partie de cette couleur, tant en dessus qu'en dessous & bordées de noir, du moins au côté extérieur ou au bord postérieur. Tels sont, 1^o. le P. *Ebusus*, *Pap.* 25. *pl.* 500. C. D; 2^o. le P. *Pfecas*, *ibid.* 29. *pl.* 542. F. G. & le P. *Alemez*, *ibid.* 22. *pl.* 261. D. E., espèces très-rapprochées; & 3^o. le P. *Artemides*, *ibid.* 35. *pl.* 591. L. M., espèce très-voisine de l'*H. Virbius*.

74. HESPERIE Virbius.

HESPERIA Virbius.

Hesperia corpore alisque nigris; anticis maculis duabus minutis punctisque totidem albo-hyalinis; posticis apice niveis.

Hesperia U. Virbius, alis integerrimis nigris; anticis punctis tribus, posticis apice albis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p.* 333. n^o. 343.

Papilio P. U. Virbius. Mantiss. *Insect.* tom. 2. *pag.* 92. n^o. 829. — *Spec. Inf.* tom. 2. *pag.* 158. n^o. 641.

Papilio Virbius. CRAM. *Pap.* 12. *pl.* 145. F.

Le corps & les ailes de cette petite espèce sont noirs, mais un peu bruns sur le dessous de ces parties; l'extrémité postérieure de l'abdomen est en dessous deux petites taches blanches. Les antennes sont noires, brusquement crochues, avec

un anneau blanchâtre avant la massue. Les ailes supérieures ont quatre petites taches d'un blanc transparent, deux supérieures en forme de petits points & très-écartées, & deux inférieures un peu plus grandes & étroites. Les ailes inférieures sont terminées vers l'angle interne par une grande tache d'un beau blanc, en forme d'ovale transparente & rétrécie à l'angle anal.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langdorff.

75. HESPERIE Curtius.

HESPERIA Curtius.

Hesperia alis nigris; anticis punctis quatuor albis, posticis immaculatis.

Hesperia U. Curtius, alis integerrimis, concoloribus, nigris; anticis punctis quatuor albis, posticis immaculatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 554. n^o. 544.

Jon. Fig. pi^è. 6. tab. 70. fig. 1.

Elle ne diffère de l'*H. Viribus* que par ses ailes inférieures entièrement noires. Ce n'est peut-être qu'une variété.

76. HESPERIE Sénèque.

HESPERIA Seneca.

Hesperia alis supra fuscis, infra, anticarum disco excepto, cinereo-humidis, maculis fusco-ferrugineis; anticis fuscis transversis punctoque albo-hyalinis; posticis supra immaculatis.

Elle a le port des *H. Marcus*, *Lafrénaye*, *Viribus*, &c., mais elle est un peu plus grande. Toutes les parties supérieures du corps sont noires. Le dessous des antennes, ou du moins de leur massue, est rouillâtre. Le milieu des ailes supérieures est traversé obliquement par une bande blanche, transparente, composée de trois taches; entre la seconde & le bord postérieur est un petit trait ou point allongé de la même couleur. En dessous, le milieu de ces ailes est noirâtre, mais les autres espaces de cette surface, ainsi que la correspondante des antérieures, sont d'un brun-clair ou tirant sur le cendré, avec des taches d'un brun-fauve, savoir: une à la côte des ailes supérieures, en dehors de la bande blanche, & cinq sur chaque aile inférieure; les deux supérieures sont réunies extérieurement en manière de bande oblique, un peu arquée & séparées au côté opposé par une petite ligne oblique, grislâtre; les deux autres sont placées, l'une au-dessus de l'autre, vers le bord interne; la base de ces ailes est d'un brun plus clair.

Elle se trouve au Brésil.

77. HESPERIE Claudien.

HESPERIA Claudianus.

Hesperia alis atris; anticis fuscis duabus, macularibus, niveo-hyalinis; posticis supra maculâ orbiculatâ niveâ, infra diluto-fuscis, basi griseâ, fuscis transversis venisque atris.

Elle est de moyenne grandeur, noire, avec des points sur la tête, un anneau à la massue des antennes & le dessous du ventre, blancs; une ligne noire divise le blanc de cette dernière partie du corps en deux bandes longitudinales. L'antérieure des ailes supérieures & qui occupe leur milieu est composée de trois taches; il y en a cinq, & toutes contiguës, & transverses, à leur bande postérieure, ou celle qui précède le sommet; l'on voit un petit trait d'un blanc-transparent dans l'intervalle de ces bandes. La tache orbiculaire du dessus des ailes inférieures est grande & placée entre le centre & le bord postérieur; leur surface inférieure est d'un noirâtre-pâle, avec la base grislâtre & une bande transverse près du milieu, d'un noir-foncé; les nervures étant de cette dernière couleur paroissent y former des stries ou des veines longitudinales.

Elle habite le Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langdorff.

78. HESPERIE Minos.

HESPERIA Minos.

Hesperia alis atris; anticis maculis duabus medianis lineolarumque serie subapicali, niveis, hyalinis; posticarum disco fuscis transversis, niveâ, infra longiori, apicibus flavidis.

Son corps est de grandeur moyenne, noir, avec le dessous de l'abdomen rayé de blanc. Les ailes paroissent être proportionnellement plus allongées que dans les espèces voisines, & l'angle anal des inférieures forme une saillie arrondie; elles sont d'un noir-foncé, un peu chatoyant en dessous. Les antérieures ont des taches blanches & transparentes; une plus grande, centrale & divisée en deux portions inégales par une nervure; une seconde, petite, presque triangulaire, un peu en deçà de la précédente; & quatre autres en forme de petites lignes transverses, disposées en une série près de la côte, avant le sommet; l'extrémité postérieure de ces ailes est moins foncée en dessous, & offre quelques raies ou stries longitudinales blanchâtres. Le milieu du dessus des ailes inférieures est traversé par une bande blanche, n'atteignant point les deux bords; mais en dessous, elle est plus longue, l'une de ses extrémités étant prolongée jusqu'au bord interne; elle prend à chaque bout une teinte jaunâtre. La tranche du bord postérieur des quatre ailes est en partie blanche.

Elle se trouve au Brésil.

79. HESPERIE Hèmes.

HESPERIA Hemes.

Hesperia alis nigris; anticis maculis mediis punctisque plurimis, seriatim, ante apicem, posticis, limbo externo excepto, albis.

Hesperia U. Hemes, *alis rotundatis integerrimis atris: anticis maculâ, posticis fuscâ albâ.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 345. n.º. 312.*

Papilio Vemes. *Mant. Inf. tom. 2. p. 89. n.º. 810. — Spec. Inf. tom. 2. p. 136. n.º. 629.*

Hesperia P. U. Clito, *alis integris concoloribus, nigris: anticis punctis, posticis fuscâ albis.* EJS. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 353. n.º. 342.*

Papilio P. R. Neleus, *alis integerrimis concoloribus, nigris: primoribus punctis decem albis; posticis disco toto albis.* LINN. *Syst. Nat. 12. tom. 2. p. 792. n.º. 246? — Mus. Ludov. Ultr. p. 260. n.º. 79?*

CLERCK, *Icon. Inf. tab. 45. fig. 2. 4?*

Papilio Hemes. *CRAM. Pap. 9. pl. 105. fig. F. Mâle.*

Papilio Phoreus. *Ibid. 13. pl. 156. D. Fem. var.?*

Sa grandeur varie; mais, en général, les plus grands individus sont de taille moyenne. Les antennes font insensiblement arquées à leur extrémité. Le corps est noir en dessus & blanchâtre en dessous. Les ailes sont noires, avec une teinte d'un brun-luisant sur une partie de leur contour extérieur & de leurs surfaces inférieures; leur dessus offre même, dans quelques individus, une nuance de cette couleur, avec quelques taches plus foncées, mais peu distinctes, près du bord postérieur. Les antérieures ont une dizaine de taches ou de points blancs & un peu transparents; quatre de ces taches, & dont deux plus grandes, sont placées au milieu; les autres, toutes en forme de petits points, sont disposées en une ligne courbe & transverse, près du sommet. Les ailes inférieures sont blanches, avec une large bordure extérieure noire.

Les caractères que Fabricius assigne à son *H. Clito*, ne me paroissent pas la distinguer spécifiquement de son *H. Hemes*. Je soupçonne aussi que le *P. Neleus* de Linné n'est qu'une variété plus grande & fort analogue au *P. Phoreus* de Cramer. Elle habite le Brésil & la Guyane.

80. HESPERIE Duméril.

HESPERIA Dumeril.

Hesperia als *suprà nigris, infrâ, anticarum disco excepto, brunneo-flavidis; anticis maculis flavo-hyalinis; posticis ibidem fuscis duabus transversis, flavidis.*

Le nom du savant auquel je consacre cette espèce est trop connu, pour qu'il soit nécessaire de motiver cette dédicace. Mais elle est fondée sur d'autres sentimens que ceux d'une estime universelle, ceux de l'amitié.

Cette espèce est de la grandeur de l'*H. Talaus*. Les antennes sont noires, avec de petits anneaux blancs, & se terminent par une massue arquée, rouillée en dessous. La majeure partie du corps est garnie d'un duvet jaunâtre, formant des anneaux sur l'abdomen. Les ailes sont noires en dessus, & généralement d'un jaunâtre un peu brun, avec un rictel opalin, en dessous. Le dessus des antérieures offre, à partir de leur origine, deux ou trois lignes jaunâtres, longitudinales & courtes; ensuite cinq taches d'un jaunâtre-transparent, formant, la plus interne non comprise, un carré, & près du sommet deux ou trois points de la même couleur; le milieu du dessous de ces ailes est noirâtre. Le dessus des secondes présente deux bandes jaunâtres, partant du bord interne, transverses, & n'atteignant pas le bord extérieur; l'antérieure est plus large & interrompue à son extrémité extérieure; le bord interne est de cette couleur; ces deux bandes se voient aussi sur la face inférieure, mais l'antérieure s'y présente sous la forme d'une grande tache blanchâtre; l'angle anal est noirâtre; on remarque aussi une ou deux petites taches de cette couleur, au-dessus de la bande antérieure.

J'ignore quelle est la patrie de cette espèce. Elle fait partie de la belle collection du Jardin du Roi.

81. HESPERIE Talaus.

HESPERIA Talaus.

Hesperia alis *nigro-fuscis; anticis maculâ fasciâ sanguineâ, fuscâ maculari mediâ puncto-rumque serie subapicali, hyalino-ulbis; alis posticis disco albo.*

Hesperia U. Talaus, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis: anticis punctis albis basi que sanguineis, posticis disco albo.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 349. n.º. 328.*

Papilio P. U. Talaus. *Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n.º. 818.*

Papilio P. R. Talaus, *alis integerrimis, concoloribus, fuscis: primoribus punctis albis basi que sanguineis, posticis disco albo.* LINN. *Syst. Nat. 12. tom. 2. p. 792. n.º. 247. — Amœn. Acad. tom. 6. p. 407. n.º. 70.*

Papilio Talaus. *CRAM. Pap. 55. pl. 395. C.*

CLERCK, *Icon. Inf. tab. 45. fig. 1.*

SESA, *Mus. tom. 4. tab. 57. fig. 18.*

Elle est petite, d'un noirâtre-foncé, avec le dessous du corps gris. La massue des antennes est

arquée. Les ailes supérieures ont à leur base une tache médiane, alongée, d'un rouge de sang; elles présentent ensuite des taches d'un blanc-transparent, au nombre de onze, dont six en forme de points, composant une ligne transverse, près du sommet; trois disposées en une bande transverse, vers le milieu, & les deux autres isolées, l'une près du bord interne, en dedans de cette bande, & l'autre entre elle & la ligne de points. Le disque des inférieures a une grande tache d'un blanc un peu jaunâtre & un pen transparente, vue à la lumière.

Elle se trouve à la Guyane & au Brésil.

Nota. La variété B du *Papilio Phoreclus* de Linné, dont il fait mention dans son *Museum Ludovicæ Ultricæ*, p. 526, paroît appartenir à quelque hespérie voisine de la précédente & des suivantes.

82. HESPÉRIE Eumèle.

HESPERIA Eumelus.

Hesperia alis anticis atris, maculâ ad basin margineque interno, fulvis, fasciâ duabus macularibus punctoquo interjecto albis; alis posticis fulvis, venis margineque externo atris.

Hesperia U. Eumelus, *alis rotundatis, integerrimis atris: anticis albo maculatis, posticis fulvis, nigro venosis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 345. n.º 515.*

Papilio P. U. Eumelus. *Mant. Inf. tom. 2. p. 89. n.º 811. — Spec. Inf. tom. 2. p. 136. n.º 650.*

Papilio Eumelus. GRAM. *Pap. 15. pl. 156. E.*

Elle est très-voisine de l'*H. Talaus*; mais elle en est très-distincte par les couleurs des ailes inférieures. La patrie est la même.

83. HESPÉRIE Clonias.

HESPERIA Clonias.

Hesperia alis anticis ad apicem obtusis, fasciâ transversâ albo-hyalinâ; omnibus suprâ nigris, infrâ brunneo, griseo fuscoque variis.

Hesperia U. Clonias, *alis subcaudatis atris; anticis fasciâ niveâ, posticis subtus carulecentibus, ano sanguineo.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 524. n.º 271.*

Papilio P. U. Clonias. *Mant. Inf. tom. 2. p. 87. n.º 787. — Spec. Inf. tom. 2. p. 135. n.º 615.*

Papilio Clonias. GRAM. *Pap. 7. pl. 80. C. D.*

Cette petite espèce est remarquable par la forme de ses ailes supérieures, qui sont comme tronquées à leur sommet. Leur dessus, ainsi que celui des inférieures, est noir. Les premières offrent vers leur milieu une bande transverse, d'un blanc-transpa-

rent, & près de la côte, un pen avant l'angle du sommet, un trait formé de petits points très-rapprochés, de la même couleur & pareillement diaphanes. Le dessous des quatre ailes est d'un brun-grisâtre ou cendré; il est coupé sur les inférieures par diverses taches d'un brun-ferrugineux, bordées en partie de gris; le sommet des premières est aussi de cette couleur, du moins dans quelques individus. L'anus seul est rougeâtre.

Elle se trouve au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Lengsdorff.

84. HESPÉRIE Bufiris.

HESPERIA Bufiris.

Hesperia alis oblongis, atris: anticis maculis punctisque duobus flavis; posticis fulvis, atro marginatis.

Hesperia U. Bufiris, *alis oblongis, integerrimis, atris: anticis maculis punctisque duobus flavis, posticis fusco fulvo.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 345. n.º 410.*

Papilio Bufiris. JOX. *Fig. pict. 6. tab. 25. fig. 1.*

Papilio Bufiris. DONOV. *of an Epit. of the Nat. Insect. of Ind. 11. pl. 4. fig. 2.*

Son corps est noir, avec des points sur le thorax & des anneaux sur l'abdomen, blancs. Les ailes supérieures sont d'un noir-foncé, avec deux taches alongées & transverses, & deux points intermédiaires, jaunes; le sommet de ces ailes est cendré. Les postérieures sont fauves & bordées de noir-foncé postérieurement. Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus.

Cette jolie espèce a les ailes oblongues, ce qui lui donne le port d'un héliconien. Les hespéries *Gentius*, *Pelée*, *Brontès*, s'en rapprochent à cet égard, leurs ailes étant proportionnellement plus oblongues que dans les autres espèces de ce genre.

L'*H. Bufiris* se trouve aux Indes.

85. HESPÉRIE Pelée.

HESPERIA Pelous.

Hesperia alis atris; anticis fasciâ duabus, transversis, alterâ mediâ rubrâ, alterâ subapicali, flavidâ; maculâ flavido-hyalinâ, trigonâ, interjectâ.

Papilio P. R. Pelous, *alis integerrimis utrinque atris; primoribus fasciâ lineari rubrâ: exterius luteo maculatis.* LANN. *Syst. Nat. 12. tom. 2. p. 792. n.º 249. — Mus. Ludov. Ulr. p. 527.*

Papilio Pelous. GRAM. *Pap. 24. pl. 284. F.*

CLERCK, *Icon. Inf. tab. 45. fig. 5.*

Le corps, les antennes & les ailes sont noirs.

Les supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande d'un rouge-orangé, de la même largeur partout; près de l'extrémité est une tache allongée, en forme de bande oblique, rétrécie inférieurement, d'un jaunâtre, transparente & coupée par les nervures; entre ces deux bandes est une tache du même jaune, en forme de triangle, placée obliquement, s'avancant à l'angle interne, sur la bande rouge, & libre à l'angle opposé. La masse des antennes est simplement arquée.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

85. HESPÈRE Gentius.

HESPERIA Gentius.

Hesperia flavâ; alarum posticaram limbo anticis posterioribus nigris; ha un apice fasciâ duabus transversis maculâque interjectâ flavis.

Hesperia U. Gentius, alis integris, concoloribus, flavis: limbo atro, anticarum fasciâ flavis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 550. n. 550.

Papilio P. U. Gentius. Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n. 820. — Spec. Inf. tom. 2. p. 157. n. 657.

Papilio Gentius. CRAM. Pap. 15. pl. 179. C.

Nous n'avons presque rien à ajouter aux caractères spécifiques. Les ailes supérieures ont, de même que celles de l'*H. Pelée*, deux bandes transverses & une tache triangulaire, dans leur entreeux; mais la première de ces bandes est jaune, & la tache est plus petite & entièrement libre; elle manque quelquefois. Le corps est jaune, avec une ligne noire au milieu du dos de l'abdomen; quelquefois aussi le jaune offre une faible teinte fauve sur les ailes inférieures, la base des supérieures & sur une partie de leur bande antérieure.

Dans le *P. Procas* de Cramer, représenté sur la même planche, fig. D, le jaune domine davantage sur les ailes supérieures; leur extrémité n'offre qu'une bande, & le contour entier de ces ailes est noir.

Elle habite le Brésil & la Guyane.

87. HESPÈRE Celfus.

HESPERIA Celfus.

Hesperia alis suprà nigris, subtus brunneo-fuscis; anticis utrinquâ fasciâ transversâ rufo-flavâ; posticis suprà immaculatis; infrà cinereo-pulverulentis, margine externo strigâque transversâ brunneo-fuscis.

Hesperia U. Celfus, alis integerrimis, concoloribus, atris; anticis fasciâ flavâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 546. n. 516.

Papilio Celfus. JOS. Fig. piâ. 6. tab. 71. fig. 1.

Papilio Celfus. DE NOV. *et en Etyl. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* 1. C. pl. 4. fig. 5.

Papilio Hiarbas. CRAM. Pap. 11. pl. 18. F.

Elle est de moyenne grandeur, & a, au premier coup d'œil, une grande ressemblance avec le papillon *Ethereus* de Linné. Les antennes sont noires en dessus, presque entièrement grâsâtes en dessous, avec la masse entrecoupée de ces deux couleurs & crochue. Le corps est noir, avec les palpes extérieurs d'un cendré-bleu, & le milieu du dessous du ventre jaunâtre, du moins dans quelques individus. Les ailes sont noires en dessus, d'un noirâtre-brun-foncé en dessous, mais finement saupoudré de cendré, au limbe postérieur des supérieures & sur la majeure partie des inférieures. Les premières ont dans leur milieu & des deux côtés, une large bande transversée, couleur de sauci-pâle, un peu transparente, commençant au milieu de la côte & se terminant vers l'angle postérieur, mais sans gagner tout-à-fait le bord interne; sa largeur varie un peu; en dessous, la côte est libre, au point où elle commence, une tache jaunâtre. Les ailes inférieures, par la forme très-arruée de la portion antérieure de leur bord antérieur, doivent être convexes ou débordantes; en dessous, le limbe de ce bord, & la marge du bord postérieur n'étant pas saupoudrés de cendré, trauchent avec le fond de l'aile; un peu au-dessous du milieu, le fond est traversé par une raie noirâtre & formée de la même manière, on remarque sur la bordure latérale une tache arruée d'un brun plus clair. Quelquefois cependant le dessous de ces ailes est d'une teinte uniforme; quelquefois aussi leur bord extérieur est en partie un peu blanchâtre, & c'est ce que l'on voit dans la figure précitée de Cramer (1). Tantôt les bords de la bande des ailes supérieures sont entiers; tantôt ils offrent quelques échancrures, particulièrement au bord interne.

J'ai reçu du Brésil plusieurs individus de cette espèce, & envoyés par M. Langflorff. Dans aucun d'eux je n'ai vu à l'extrémité des ailes antérieures les trois petites pointes jaunes que Fabricius a observées dans l'*H. Thyris*, à laquelle il rapporte, mais avec doute, le *H. Hiarbas* de Cramer; d'ailleurs ces ailes ont la bande jaune de l'*H. Celfus*. Leur dessus, ainsi que celui des inférieures, est noirâtre; la surface inférieure des quatre est pourprée & parsemée d'une infinité de petits atomes jaunâtres. Cette espèce se trouve dans les îles de l'Amérique.

88. HESPÈRE Brontès.

HESPERIA Brontes.

Hesperia alis nigris; anticis fasciâ mediâ, pos-

(1) Voyez aussi l'*H. Brontes*.

ticis margine externo, modò albis, modò flavis.

Hesperia U. alis subcaudatis, concoloribus fuscis; anticis fuscâ, posticis margine nigris. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 535. n°. 235.

Elle est de la taille de l'*H. Celsus*, & lui ressemble au premier coup d'œil par les couleurs; mais elle en est bien distinguée par les ailes inférieures plus oblongues & presque ovales. Le corps & les antennes sont noirs; le dessous de leur massue est tantôt roullâtre, tantôt ambré de blanchâtre. Les pieds, dans quelques individus, sont roullâtres. Les ailes sont noires; mais le dessous des inférieures est quelquefois un peu plus clair, avec deux bandes transversales plus foncées & la base d'un cendré obscur; ces bandes sont çà & là un peu bordées de gris; l'antérieure est un peu entrecoupée: on voit aussi au-dessus d'elle, près du bord extérieur, un point plus foncé. Les ailes antérieures sont traversées de part & d'autre par une bande soit continue, soit formée de trois taches, blanche ou jaunâtre & transparente. Les ailes inférieures sont, à l'exception de leur partie supérieure, bordées extérieurement de l'une ou l'autre de ces couleurs. Le dessous du ventre de quelques individus est jaunâtre, avec une ligne noire & longitudinale au milieu.

M. Langsdorff m'a envoyé du Brésil plusieurs individus de cette espèce.

89. HESPÉRIE Justinien.

HESPERIA Justinianus.

Hesperia alis fuscis; anticis punctis albo-hyalinis; posticis supra immaculatis, infra d. fco rufescente, macularum cinerascensium subocellularum serie posterius marginato.

Les antennes de cette petite espèce sont noirâtres, avec un anneau blanc près de la massue. Les ailes supérieures ont cinq à six points blancs & transparents, dont trois, l'intermédiaire surtout, plus grands, disposés en une rangée oblique, & les deux ou trois autres près de la côte, avant l'angle du sommet. Dans quelques individus, le dessous de ces ailes présente cinq taches d'un cendré-bleuâtre à la place où ces derniers points sont situés, avec une rangée de points noirâtres entre les précédents & le bord postérieur. Le milieu du dessous des ailes inférieures est occupé par une tache ou bande, courbe, roullâtre, placée immédiatement au-dessus d'une rangée de taches ovales d'un gris-cendré plus ou moins vif, quelquefois opaque, bordées de noirâtre, & appuyées intérieurement sur une rangée de points de cette couleur; les extrémités antérieures de ces taches traversant le disque, font paroître le bord postérieur de la bande ondulé. Dans les individus dont les teintes sont les plus vives & les

plus variées, cette bande offre en devant un point noirâtre, & l'origine de l'aile, sur la même surface, est en grande partie cendrée.

Elle habite le Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff.

90. HESPÉRIE Remus.

Hesperia Remus.

Hesperia alis nigris; anticis immaculatis; posticis subtis fuscâ repandâ albâ, puncto fusco.

Hesperia U. Remus, alis intergerimis, subversis, nigris; posticis fuscâ repandâ albâ, puncto fusco. FAB. Suppl. Ent. Syst. p. 434.

Elle est petite, noire, & , à l'exception du dessous des ailes inférieures, où l'on voit une bande blanche, sinuose & marquée d'un point noirâtre, elle ne présente aucune tache; ses antennes sont crochues. Elle avoit été apportée de Cayenne par feu Richard, l'un de nos plus profonds botanistes.

91. HESPÉRIE Ménéstries.

HESPERIA Ménéstries.

Hesperia alis supra fuscis; posticis infra corulescentibus lineis duabus transversis fuscis, supra immaculatis.

Le nom de cette espèce rappelle celui d'un jeune naturaliste français qui seconde, avec beaucoup de zèle & d'instruction, M. Langsdorff dans les recherches sur l'histoire naturelle du Brésil, & qui m'a donné des preuves de son attachement par un envoi d'insectes de cette riche contrée. J'ajouterai aux caractères spécifiques, que cette hespérie est de petite taille, & que ses ailes supérieures, tantôt sans taches transparentes, tantôt en offrant trois, placées vers le milieu, ont en dessous, près du sommet, une teinte d'un bleuâtre-foncé & luisant. Cette couleur forme le fond de la surface inférieure des secondes ailes; elle est traversée dans son milieu par deux lignes noirâtres, droites, parallèles, partant du bord latéral, mais se terminant avant le bord interne.

Elle se trouve au Brésil.

92. HESPÉRIE Anaphus.

HESPERIA Anaphus.

Hesperia alis fuscis; posticarum apice abdominisque annulis flavis.

Hesperia U. Anaphus, alis integris, concoloribus, fuscis; posticis apice flavis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 545. n°. 504.

Papilio P. U. Anaphus. Mant. Inf. t. 2. p. 89. n°. 804. — Spec. Inf. tom. 2. p. 155. n°. 625.

Papilio

Papilio Anaphus. CRAM. *Pap.* 15. pl. 178. F.

Elle est assez grande, noirâtre, avec quelques bandes transverses, plus foncées sur les ailes; l'extrémité postérieure & interne des inférieures est jaune, & cette couleur y forme une grande tache arrondie en devant. Les bords des anneaux de l'abdomen sont encore jaunés. Les antennes sont noires & crochues.

Elle se trouve à Surinam.

93. HESPÉRIE *Cebrenus*.

HESPERIA Cebrenus.

Hesperia alis diluto-brunneis; anticis fuscis auro-albidis, femdiaphana.

Papilio Cebrenus. CRAM. *Pap.* 15. pl. 178. G.

Elle se rapproche de l'*H. Anaphus* par la taille & la forme. Les ailes sont d'un brun-clair, avec la base jaunâtre & le bord postérieur terminé par une ligne blanche. Dans l'individu figuré par Cramer, les antérieures sont traversées par une bande jaunâtre interrompue au milieu, & ont près du sommet trois petits points de cette couleur. Dans un individu de la collection du Jardin du Roi, les points manquent, & la bande est continue & plus large.

L'*H. Helinus* de Fabricius, *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 528. n. 243*, paroît avoir de grands rapports avec cette espèce. Selon cet auteur, les ailes font très-entières, divergentes ou en chevron, noirâtes, avec le bord noir; les antennes ont un point central jaune. Cramer l'a figurée, *Pap. exot. 5. pl. 60. D*.

Elle le trouve, ainsi que la précédente, à Surinam.

94. HESPÉRIE *Helius*.

HESPERIA Helius.

Hesperia alis fuscis; posticis latere externo fulvo.

Hesperia U. Helius, *alis subdivaricatis, fuscis: posticis margine interiori fulvis*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 529. n. 248*.

Papilio P. U. Helius. Mant. *Inf. tom. 2. p. 85. n. 771. — Spec. Inf. tom. 2. p. 132. n. 602.*

Papilio Helius. CRAM. *Pap.* 17. pl. 198. B.

Selon Fabricius, elle est de la grandeur de l'*H. Comma*. Ses ailes inférieures ont au bord interne (mais l'opposé, d'après la figure de Cramer), une grande tache ovale, fauve.

Elle se trouve à Surinam.

95. HESPÉRIE *Pisistratus*.

HESPERIA Pisistratus.

Hesperia alis fuscis; anticis flavo-nitentibus, *Syst. Nat. Inf. Tome 1. X.*

immaculatis; posticis supra disco flavo, subtus fuscis niveis, nigro punctatâ.

Hesperia U. *Pisistratus, alis integerrimis fuscis; posticis supra disco flavo, subtus fuscis niveis, nigro punctatâ*. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 545. n. 311.*

Papilio Pisistrates. JON. *Fig. pict. 6. tab. 26. fig. 1.*

Nous ne parlons de cette espèce que d'après Fabricius: elle a, selon lui, le port de l'*H. du Rocou (bixæ)*. Ses antennes sont noires & crochues; les ailes inférieures sont presque en queue; les autres caractères sont indiqués dans la phrase spécifique.

Elle habite l'Amérique.

Nota. On peut terminer cette subdivision par des espèces sans taches ni bandes vitrées, & dont les teintes font foncées, uniformes ou peu mélangées; comme, 1^o. le *P. Corbulo* de Cramer (30. pl. 354. A), dont tout le corps est d'un noirâtre-foncé, avec un anneau blanc aux antennes, & deux points de la même couleur, mais manquant quelquefois, près du sommet des ailes supérieures; 2^o. une nouvelle espèce, à laquelle nous donnerons le nom d'un naturaliste voyageur, trop tôt enlevé aux sciences, de *Lalande*. Tout son corps est d'un brun-ferrugineux-foncé, avec deux lignes transverses, plus obscures, & dont l'extérieure plus distincte est flexueuse; les ailes inférieures ont à l'angle anal une dent bien apparente. Sous ce rapport, cette espèce se rapprocheroit des premières de la division.

Nous possédons aussi quelques autres espèces inédites, qui viennent à la suite des précédentes, mais dont il seroit difficile de donner une connoissance exacte sans les secours de bonnes figures. Elles nous ont été envoyées du Brésil par M. Langsdorff.

b. *Ailes, ou du moins les supérieures, différenciant sensiblement par leurs couleurs ou leur disposition, dans les deux sexes; une ligne ou une tache noire ou noirâtre, en forme de cicatrice, oblique, coupant les nervures, au milieu de la face supérieure de ces ailes, dans la plupart des mâles. (Ailes inférieures, jamais dentées, & sans prolongement notable à l'angle anal; point ou rarement de taches vitrées; l'une des faces au moins, soit des quatre atlas, soit de deux d'entre elles, mais le plus souvent la supérieure des premières, très-variée de noirâtre & de fauve ou de jaunâtre.)*

* *Dessus des ailes supérieures ayant au milieu un trait ou une tache d'un noir plus ou moins foncé, oblique & coupant les nervures.*

† *Des taches constamment vitrées aux ailes supérieures.*

— *Musſue des antennes, terminée brufquement par un crochet.*

96. HÉSPÉRIE Phocion.

HESPERIA Phocion.

Hesperia alis ſuprà fuſcis; anticis maculis quatuor flavo-hyalinis, tribus poſticis tranſverſè ſeratis, alterâ coſtali, emarginatâ; alis poſticis ſuprà immaculatis, ſubtus cinereo-brunneis, lineis maculiſque brunneo-fuſcis.

Hesperia U. Phocion, alis ſubcaudatis fuſcis; anticis flavo maculatis, poſticis ſubtus fuſco glaucoque variis.

Papilio P. U. Coridon. Mant. Inf. tom. 2. p. 87. n.º 270. — Spec. Inf. tom. 2. p. 154. n.º 616. — Syſt. Ent. p. 553. n.º 385.

Elle eſt de moyenne grandeur, & aux caractères ſexuels près, qui diſtinguent cette diviſion, elle a, ainſi que les deux ſuivantes, de grands rapports avec les *H. Antonin, Ethlus, Thux*, &c. Les antennes ſont noirâtres, avec une portion de la maſſue rouſſâtre. Tout le deſſus du corps, ainſi que le deſſous des ailes ſupérieures, eſt noirâtre; mais le deſſous des inférieures eſt d'un brun-cendré tirant fur le gris-de-perle, avec des lignes & des taches d'un brun-foncé, & dont une beaucoup plus grande, de forme triangulaire, s'étend du milieu du diſque au bord intérieur; une partie du limbe poſtérieur eſt de cette couleur; ce bord, ainſi que celui des ailes ſupérieures, eſt entrecoupé, du moins dans quelques individus, de petites taches blanches: ces dernières ailes oſſient des deux côtés quatre taches jaunes & transparentes, dont les trois poſtérieures placées en diagonale, & dont la quatrième, ordinairement plus grande & compoſée, reſe, par l'une de ſes extrémités, fur le milieu de la côte. Ces quatre taches ſont rapprochées de manière que la plus reculée eſt encore aſſez éloignée du ſommet de l'aile; en deſſous, ce ſommet préſente quelques taches d'un brun-cendré. Les paſſes extérieures ſont grifâtres, & les pattes ſont en partie d'un brun-rougeâtre.

Elle fe trouve au Bréſil, à Cuba & à la Jamaïque, ſelon Fabricius. Cet auteur a donné le même nom de *Phocion* à trois eſpèces.

97. HÉSPÉRIE Sinon.

HESPERIA Sinon.

Hesperia alis ſuprà brunneo-fuſcis; anticis maculis quatuor flavo-hyalinis: duabus ſubcoſtalis, diſtitis, aliis approximatis; alis poſticis utrinque puncto diſcoïdali flavo.

Papilio Sergeſlus. CRAM. Pap. 7. pl. 74. C. Le mâle.

P. Sinon. Ibid. 29. pl. 342. D. E.

Cette eſpèce eſt de la taille de la précédente, & d'un noirâtre moins foncé; il tire davantage ſur le brun, particulièrement fur la tête, le deſſous du corps & à la côte des ailes ſupérieures; le limbe poſtérieur & le bord interne du deſſous de ces ailes, ainſi que celui des inférieures en entier, ſont d'un brun plus clair. Des quatre taches jaunes & transparentes des ailes ſupérieures, celle qui eſt la plus voiſine du ſommet eſt diviſée en trois par des nervures. Dans la figure du *P. Sinon* de Cramer, il y a une tache de plus, & qui eſt placée au bord interne; le deſſous des ailes inférieures préſente, un peu au-deſſous du centre, un point jaune, qui paroît auſſi de l'autre côté, mais plus foiblement: il y eſt placé ſur une tache ou ſur une bande d'un brun-rougeâtre; au-deſſous ſont quelques autres taches de la même couleur.

Elle m'a été envoyée du Bréſil par M. Langford.

98. HÉSPÉRIE Godart (1).

HESPERIA Godart.

Hesperia alis ſuprà brunneo-fuſcis; anticis maculis quinque flavo-hyalinis; poſticis ſuprà puncto flavo, infrâ ferrugineis, ſtrigis duabus parallelis, palido-aureis.

Par le deſſus des ailes, cette eſpèce eſt preſque ſemblable à l'*H. Sinon*; les ſupérieures ont

(1) Sans vouloir déprécier les travaux d'Illiger & d'Ochſenheimer, toujours, ſelon nous, eſt-il inconcevable qu'avant celui de M. Godart, la plupart des caractères ſpécifiques des lépidoptères diurnes étoient inſignifiants; que pluſieurs de leurs deſcriptions, celles ſurtout de ſeſpèces exotiques, étoient incomplètes & nullement comparatives; qu'on n'avoit point ou preſque pas donné d'attention aux différences ſexuelles, & que la ſynonymie de ces dernières eſpèces étoit ſingulièrement embrouillée.

M. Godart, en ſurmontant ces difficultés & en faiſant diſparaître autant que poſſible tous ces défauts, a donc rendu un ſervice éminent à la ſcience, & je ne puis m'empêcher d'admirer le zèle & la perſévérance avec laquelle il a rempli ſa tâche. Je n'ai d'autre part à ſon travail que celle de lui avoir fourni ſes moyens d'exécution & de l'avoir aidé de mes conſeils. Lortque je l'ai choiſi pour mon collaborateur, à l'égard de cette partie de l'*Encyclopédie*, j'avois déjà claſſé la collection publique des inſectes du Muſéum. Les lépidoptères y étoient diſtribués d'après ma méthode & tous nommés; la détermination de quelques eſpèces avoit cependant beſoin d'être revue, & ne pouvoit alors m'en occuper, M. Godart a bien voulu s'en charger. Il a encore eu le ſoin de nommer, en rédigeant cette partie de l'*Encyclopédie*, les lépidoptères diurnes de la collection particulière du même établiſſement. Un ſoit important pour moi & que l'on ignore, c'eſt que Fabricius avoit compoſé ſon *Syſtème des Gloſſes* d'après une revue générale des lépidoptères qui faiſoient alors partie des mêmes collections, & d'après la communication du catalogue que j'en avois fait; les eſpèces qu'il avoit, dans ſes premiers ouvrages, & éloignées de leur place naturelle, y étoient remiſes, & toutes les coupes principales étoient établies.

une tache de plus & placée sur le bord interne, comme dans l'individu femelle représenté par Cramer : la tache située au-dessus est la plus grande de toutes ; mais le dessous des ailes inférieures est très-différent, il est entièrement foncé, ou d'un rouge-brun, avec deux raies d'une couleur d'or pâle, luisantes, droites, parallèles, traversant obliquement toute la largeur de l'aile, du bord extérieur au bord interne. Je n'ai vu que le mâle.

Il m'a été envoyé du Brésil par M. Langsdorff.

99. HÉSPÉRIE Julien.

HESPERIA Julianus.

Hesperia (mas) *alis fuscis ; anticarum medio punctis plurimis albo-hyalinis : duobus anticis , approximatis , aliis transversis arcuato-feriatis ; alis posticis subtus punctorum alborum singula mediâ.*

Elle a environ quinze lignes de largeur, les ailes étendues ; leur couleur est d'un noirâtre-clair, un peu plus pâle ou un peu cendré en dessous. Les supérieures offrent au milieu sept à huit points blancs & transparents, deux plus rapprochés de la base, & les autres disposés en une ligne arquée, & dont les deux inférieurs oblongs. Le milieu du dessous des inférieures a quatre points blanchâtres, formant une ligne transverse comprise entre le centre & le côté extérieur. Les quatre ailes vues en dessus sont terminées postérieurement par une frange de cette couleur ; le dessous des supérieures présente une petite fente oblique, caractère distinctif du mâle, mais sans être environnée aussi sensiblement de noir que dans les mâles des espèces voisines. Les palpes extérieurs & le dessous de l'extrémité inférieure de la masse des antennes sont blanchâtres ; leur crochet terminal est proportionnellement plus court que dans les autres héspéries de cette division.

Elle se trouve à Java & paroit avoir des rapports avec l'*H. Nero* & quelques autres espèces analogues.

— — Antennes terminées en une masse régulièrement arquée dès son origine, & sans crochet brusque à son extrémité.

100. HÉSPÉRIE Péron.

HESPERIA Peron.

Hesperia (mas) *alis suprà fuscis , infrâ cinereo-fuscis ; anticis lineolâ , maculâ atrâ superpositâ punctisque quatuor , ante apicem , albo-vitæis ; posticis immaculatis.*

Je ne connois que le mâle de cette espèce, dont la taille égale presque celle de l'*H. Comma*. Ses antennes sont annelées de noirâtre & de blanc, avec la masse roussâtre ; les ailes sont noirâtres,

mais plus claires en dessous & tirant sur le cendré ; le trait noir du milieu des ailes supérieures caractérisant les individus de ce sexe, est enfoncé & forme une sorte de cicatrice ou d'impression : au-dessus est une petite ligne vitrée & oblongue ; près de l'extrémité postérieure de la ligne noire est un point blanc, transparent ; on en voit ensuite trois autres, mais plus petits, & rapprochés en une petite ligne près de la côte, avant l'angle du sommet. Les ailes inférieures sont sans taches.

Le nom du naturaliste auquel je la dédie est trop connu pour qu'il soit nécessaire de parler de lui ; il avoit recueilli cette espèce à la Nouvelle-Hollande.

†† Point de taches parfaitement & constamment vitrées aux ailes supérieures : quelques-unes au plus semi-diaphanes.

Nota. Masse des antennes généralement courte, presque ovoïde & à crochet terminal très-petit.

Toutes nos espèces d'Europe appartiennent à cette division & aux deux suivantes.

101. HÉSPÉRIE Nafon.

HESPERIA Nafon.

Hesperia *alis fuscis , serpius immaculatis : fimbriâ posticâ rufescente aut albidâ.*

Hesperia U. Nafon, *alis integerrimis , divaricatis , suprà fuscis , subtus brunneis : margine postico tenuissimè fulvo.* Fab. Suppl. Ent. p. 451.

Le Muséum d'histoire naturelle possède plusieurs individus de cette espèce, les uns recueillis au Bengale par feu Macé, les autres venant de l'Île-de-France ; leur taille égale presque celle de l'*H. Comma*. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & l'extrémité inférieure de la masse roussâtre. Le corps & les ailes sont noirâtres. Dans les individus du Bengale, le dessous des ailes, à l'exception du côté interne des supérieures, est d'un brun-jaunâtre-foncé ; une partie du duvet supérieur est de la même teinte. Le milieu des supérieures offre quelquefois deux points rapprochés, oblongs, blanchâtres & transparents ; la frange postérieure des uns & des autres est blanchâtre ou roussâtre. Dans les individus de l'Île-de-France, les yeux sont quelquefois rougeâtres ; les écailles des palpes extérieurs sont grisâtres, mais un peu roussâtres dans d'autres. Peut-être faudroit-il distinguer spécialement les derniers individus.

Seroit-ce une variété entièrement noirâtre, & venant du Bengale, que Fabricius auroit décrite sous le nom de *Pygmaeus* (*Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 354. n. 349*), ou quelque autre espèce analogue ? C'est sur quoi, vu la lacune de la description & l'indication trop vague du lieu d'habitation, il m'est impossible de prononcer.

D d d d d 2

102. HESPÉRIE Pélopidas.

HESPERIA Pelopidas.

Hesperia (mas) *alis cineris*, *anticis posticarumque punctis marginalibus obscurioribus.*

Hesperia U. Pelopidas, *alis integerrimis: anticis obscurè cineris, lineola mediâ fuscâ; posticis cineris.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 550. n^o. 531.*

Papilio Pelopidas. JON. *Fig. piâ. 6. tab. 27. fig. 2.*

La ligne noirâtre que, suivant Fabricius, l'on observe au milieu des ailes supérieures, paroît nous indiquer qu'il a décrit un individu mâle. Son corps est de grandeur moyenne; les antennes sont noires & crochues; les ailes sont entièrement cendrées; les supérieures, & des points marginaux aux inférieures sont plus foncés.

On la trouve aux Indes.

105. HESPÉRIE Silius.

HESPERIA Silius.

Hesperia (fœmina) *alis brunneo-fuscis; anticarum disco utrinquè fuscâ abbreviatâ, transversâ, rufâ.*

Je ne connois que la femelle de cette espèce, & ce n'est que par analogie que je la place dans cette division. Ses ailes étendues ont un peu plus d'un pouce d'envergure. Les antennes & le corps sont noirâtres, avec les pieds d'un roussâtre obscur. Les ailes sont d'un brun-noirâtre-foncé; le milieu des supérieures offre une bande courte, transversale, oblique, rétrécie en pointe au côté qui regarde le sommet, roussâtre, & divisée par les nervures; leur base, ou du moins la partie supérieure de leur côte, une partie du duvet qui revêt les inférieures & leur frange postérieure, ont une teinte semblable.

Elle m'a été envoyée du Brésil par M. Langford.

104. HESPÉRIE Cornélius.

HESPERIA Cornelius.

Hesperia (mas) *alis fuscis, nitidis; anticis fuscâ maculâ mediâ atrâ, ovatâ, punctifuge duobus albidis; omnibus infra punctorum alborum singâ.*

Cette espèce, dont l'envergure est d'environ quinze lignes, est presque entièrement d'un noirâtre-luisant. Les antennes sont noires, avec le dessous de la massue grisâtre. Les écailles des palpes extérieurs & les poils de la poitrine sont aussi de cette couleur. Sur la tache noire & médiane du dessus des supérieures est la cicatrice ou impression d'un noirâtre-mat, qui caractérise le mâle; elle est formée de deux taches réunies longitudi-

nalement; les écailles des bords extérieurs paroissent, vues à un certain jour, d'un cuivreux mêlé de vert & très-brillant. Près du sommet sont deux points blanchâtres, écartés & posés transversalement l'un sur l'autre: en dessous, on en voit deux autres, & situés dans l'espace intermédiaire, un peu en dehors, de manière que les quatre forment une ligne courbe. Le dessous de chaque aile inférieure en présente trois autres, disposés transversalement, un peu au-dessous du milieu.

Cette espèce vient de l'île de Cuba. J'ai en aussi de cette île, ainsi que du Brésil, une hespérie femelle, presque entièrement semblable, à l'absence près des points blancs, ou du moins de ceux des ailes inférieures, & de la tache noire des ailes supérieures. Il seroit possible que ces différences fussent purement sexuelles.

L'H. *Cassandre* de Fabricius paroît être très-voisine de cette espèce. Il l'a décrite dans la collection de Drury, qui a figuré une espèce pareillement très-analogue, mais qui nous semble devoir se rapporter à son H. *Phlémon*.

Nous avons cité, à l'occasion de l'H. *Néron* de cet auteur, le papillon *Accius*, figuré dans l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Georgie*. En examinant depuis, avec plus d'attention, un individu mâle, nous avons découvert aux ailes supérieures, la marque distinctive, formant le caractère de cette division, de sorte que cette espèce doit y être rangée. L'éditeur de cet ouvrage la signale ainsi: *alis ecaudatis, fuscis, primoribus punctis fenestratis, albis; subtus omnibus spice purpureo-pallescentibus*. On observe à l'origine de la massue des antennes une tache blanche. Les ailes supérieures ont trois petits points blancs, près de la côte, & un quatrième, isolé, en dessous. Les ailes inférieures nous ont paru avoir leur dessous quelques taches, situées près de la base, & une bande transversale, plus foncée.

Tout auprès doit encore venir le *P. Bethyllus* du même ouvrage (*tom. 1. p. 45. tab. 23.*). Voici les caractères spécifiques qui lui sont assignés: *alis ecaudatis, fuscis. primoribus maculis fenestratis, quadratis, albis; posticis subtus undato nebulosis*. Les points ou petites taches blancs & transparents des ailes supérieures sont nombreux & y forment presque deux lignes convergentes inférieurement. Le dessous des ailes inférieures offre deux bandes au moins de taches plus foncées. La chenille vit sur le *glycine reticulata* de Swartz. Elle est verdâtre, avec deux lignes jaunâtres & longitudinales de chaque côté; la tête est entièrement noire; le segment suivant est d'un beau rouge, avec une tache noire en devant. La transformation se fait au mois de juillet. Cette espèce se trouve aussi en Virginie. Elle nous semble se rapprocher beaucoup, du moins par le dessin, du *P. Duvanus* de Cramer, p. 15. pl. 126. F.

105. HESPERIE Pompée.

HESPERIA Pompeius.

Hesperia (mas) *alis anticis posticisque supra fuscis; anticarum medio supra maculâ atrâ punctisque duobus proximatis pallido-brunneis; posticis infra fusco-flavidis, fuscis fuscis.*

L'envergure de cette espèce est d'environ un pouce. Son corps est noir en dessus & d'un grisâtre-foncé en dessous. Les antennes sont noires, avec des anneaux & une partie du dessous de la tache discordale & noire du dessus des ailes supérieures, est un petit trait oblique, d'un brun-pâle ou rouillâtre, formé de deux ou trois points très-rapprochés; le dessous des ailes inférieures est d'un jaunâtre-obscur, avec la base, une bande transverse près du milieu, & une autre plus étroite & maculaire au-dessous, d'un brun-noirâtre. Une partie du côté interne & de l'extrémité postérieure de la surface inférieure des premières ailes, ainsi qu'une rangée transverse & oblique de cinq à six taches, située près du limbe postérieur, font de la même couleur que le fond du dessous des ailes inférieures.

Cette espèce m'a été envoyée du Brésil par M. Langlois. Feu Delalande fils avoit apporté de ce pays une hespérie femelle, dont les ailes inférieures sont des deux côtés d'un noirâtre uniforme, mais dont les supérieures ressemblent assez à celles de l'espèce précédente. Leur milieu offre trois petites taches blanchâtres, plus apparentes en dessous, & rapprochées en une ligne diagonale. Seroit-ce une variété de sa femelle ?

106. HESPERIE Mésogramme.

HESPERIA Mesogramma.

Hesperia alis fuscis; posticis puncto subcentrali fuscaque infra transversâ, supra rufescentibus, infra pallido-flavis albido-fove; alis anticis maris supra maculâ atrâ, ovata, fulva cinctâ.

Cette espèce ressemble beaucoup, d'une part, au papillon *Phineus* de Cramer, & dont elle n'est peut-être qu'une variété, & de l'autre à l'*H. Comma*. Mais elle diffère notamment de celle-ci par les ailes inférieures, & de l'autre, en ce que dans le mâle, le trait noir forme, avec l'espace adjacent, une grande tache ovale, sur un fond fauve, & non une bande oblique. Dans l'*H. Mésogramme*, celle du dessus des ailes inférieures est plus étroite, moins continue, tandis qu'en dessous elle est plus distincte, à raison de la teinte différente du fond. Les taches fauves des ailes supérieures qui, dans l'*H. Comma*, forment une raie transverse & arquée, sont souvent dans l'*H. Mésogramme*, en majeure partie diaphanes & blanchâtres; peut-être perdent-elles, avec l'âge, leurs écailles: car on trouve des individus, où elles

sont toutes rouillâtres; au-dessus de la seconde, en commençant au bord interne, est un point soit rouillâtre, soit hyalin. La bande transverse du milieu des inférieures est composée de taches contiguës, ou qui ne sont séparées que par des nervures; on n'observe au-dessus d'elle, près du centre, qu'une seule tache & en forme de petit point; elle est rouillâtre en dessus & blanchâtre en dessous. Dans une variété femelle du Brésil, elle est remplacée en dessous par un point noir, & les taches de la bande, vues du même côté, sont un peu bordées de noir aux deux extrémités; le fond de la couleur du dessous de ces ailes varie: il est tantôt noirâtre, tantôt d'un cendré-verdâtre; la frange du bord postérieur est jaunâtre & n'offre point cette suite de points noirs que l'on remarque dans l'*H. Comma*, ou du moins dans sa femelle. Si l'on en excepte la bande maculaire, le dessous des ailes supérieures des individus de ce sexe est presque entièrement noirâtre.

107. HESPERIE Phinée.

HESPERIA Phineus.

Hesperia alis supra fuscis, infra anticarum medio excepto, rufo-flavidis; his supra margine externo antico fuscaque maculari, posticis ibidem fuscâ continuâ extimoque margine postico flavo-rufis.

Hesperia U. Phineus, *alis subangulatis, airovicatis, fuscis; fuscâ flavâ anticarum interruptâ.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 529. n.º.*

Papilio P. U. Phineus. *Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n.º. 770. — Spec. Inf. tom. 2. p. 152. n.º. 601.*

Papilio Phineus. CRAM. *Pap. 15. pl. 176. E. Femelle.*

Nous n'avons vu que le mâle de cette espèce, & qui a été apporté du Brésil par M. de Saint-Hilaire. Elle a de grands rapports avec la précédente, mais elle s'en éloigne par plusieurs caractères. La couleur fauve, & tirant sur le fouci, domine moins sur le dessus des ailes supérieures; la côte, depuis la base jusqu'un peu au-delà du milieu, & la bande transverse & maculaire, sont seules de cette couleur: le mâle a en outre, près de l'extrémité postérieure du trait noirâtre qui distingue ce sexe, une tache de la même teinte; le trait noirâtre, ou la cicatricule, est divisé en deux ou trois taches. Les ailes inférieures n'offrent pas le point central que l'on observe dans l'*H. Mésogramme*. Le milieu du dessous des supérieures, en tirant vers le bord interne, est noirâtre, mais les autres parties de cette surface, ainsi que la correspondance des inférieures, sont d'un jaunâtre-rouillâtre; la bande fauve & transverse du dessous paraît cependant un peu. Dans la figure de Cramer, l'abdomen offre des anneaux jaunes;

L'individu qu'il a représenté avoit été trouvé à Surinam.

108. HESPERIE CORAS.

HESPERIA CORAS.

Hesperia alis fuscis, fuscis maculari, basia anticarum maculâ striatâ, posticarum basia infimæ maculis, rufo-flavidis.

Papilio CORAS. CRAM. *Pap.* 3. *pl.* 31. Femelle.

Papilio P. U. Otho, alis divaricatis, basi fulvis: disco utrinquè maculis subquadratis flavis. SMITH-ABBOT, *Hist. natur. des Lepid. de la Georg.* tom. 1. *p.* 31. *tab.* 16. *Var. ?*

Hesperia U. Esculapius, alis integerrimis, nigris, fulvo maculatis: margine flavo punctato. FAB. *Ent. Syst.* tom. 3. *pars* 1. *p.* 347. *n.º* 321. ?

Elle est petite, noirâtre, mais avec le corps & même l'origine des ailes couverts de poils jaunâtre. Les antennes sont rouffâtres en dessus, blanchâtres ou plus pâles en dessous, avec des anneaux noirs. Les ailes sont traversées entre leur milieu & le bord postérieur, & de part & d'autre, par une bande d'un jaune-rouffâtre, formée d'une suite des taches; les deux avant-dernières & intérieures de la bande des ailes inférieures s'allongent postérieurement; le dessus de ces ailes offre près du centre un point de cette couleur; leur dessous a une bande de plus, située près de la base, & composée aussi de taches, & disposée en arc. Dans le mâle, la base des ailes supérieures jusqu'à la ligne oblique & particulière propre aux individus de ce sexe, est d'un jaune-rouffâtre, couleur qui se divise en manière de liras en se terminant; la ligne noirâtre, & en forme de cicatrice, est bordée extérieurement par un trait d'un noir-foncé. Dans la femelle, cette partie des mêmes ailes est noirâtre, avec une tache d'un jaune-rouffâtre, en forme de coiu renversé & allongé, & coupée dans son milieu par une ligne noirâtre. Sur le dessous des quatre ailes, les taches sont plus pâles & tirent davantage sur le jaune. On aperçoit le long du bord postérieur une rangée de petites taches arrondies de cette couleur, mais peu prononcées.

Nous soupçonnons que le *P. Othon* de M. Smith, & l'*H. Esculape* de Fabricius, sont des variétés de cette espèce. Le premier de ces naturalistes cite, avec doute, l'*H. Thaumus* de celui-ci; mais dans cette espèce, les ailes inférieures n'ont point de taches, caractère qui exclut évidemment ce synonyme.

La chenille du *P. Othon* vit sur la bermudienne, mais plus communément sur le *panicum sanguinale*. Elle est d'un vert-pâle, avec des lignes longitudinales plus foncées, & des points noirs sur les stigmates; la tête est bruniâtre. Abbot

dit que le 19 août elle attacha, avec des fils de soie, plusieurs feuilles ensemble, & que l'insecte parfait parut le 30 du même mois.

M. Milbert, correspondant du Muséum d'histoire naturelle, a envoyé de Philadelphie plusieurs individus de cette espèce.

109. HESPERIE THAUMAS.

HESPERIA THAUMAS.

Hesperia alis fuscis; anticis modò (mas) supra à basi ad medium exterius fulvis, lineolâ atâ, puncto concolore internè terminatâ punctisque aliquot rufis ante apicem; modò (fœmina) punctorum alborum vitreorumque strigâ solummodò notatis.

Hesperia P. Thaumus (mas), alis divaricatis, fuscis; liturâ bascos fulvâ lineolâque mediâ atrâ. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. *pars* 1. *pag.* 327. *n.º* 258.

Hesperia Origenes, alis divaricatis, concoloribus, fuscis; strigâ punctorum alborum, anticis basi testaceis. Ibid. *p.* 328. *n.º* 245. *Fœmina ?*

Papilio Origenes. JON. *Fig. pict.* 6. *tab.* 74. *fig.* 2. *Fœmina ?*

Papilio Origenes. DONOV. *of an Epitom. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* cah. 5. *pl.* 4. *fig.* 2. ?

Dans un envoi d'histoire naturelle, adressé de Philadelphie au Muséum d'histoire naturelle, j'ai trouvé trois individus de cette espèce, dont un mâle me paroit offrir tous les caractères de l'*H. Thaumus* de Fabricius, & dont les deux autres appartenant à l'autre sexe. L'un de ceux-ci n'a de points blancs que sur les ailes supérieures; mais dans le second, outre que les points de ces ailes sont plus grands & plus nombreux, le dessus des inférieures offre, en outre, entre le milieu & le bord postérieur, une série transverse de petites taches blanchâtres: c'est peut-être une variété analogue que Fabricius a décrite sous le nom d'*Origenes*. Quoi qu'il en soit, son *H. Thaumus* est petite, d'un noirâtre-clair ou un peu brun. La moitié antérieure des ailes supérieures, à l'exception du côté interne, est fauve. La ligne noire du milieu, propre aux individus mâles, est surmontée, à son extrémité intérieure, d'un point de la même couleur, & comme distinguée brusquement à son bord postérieur de la portion adjacente de la surface, par l'apparence d'une fente ou d'une incision linéaire, suivie d'une dépression: entre cette dépression & la côte, & presque dans une même ligne transverse, sont quatre petits points fauves, dont l'inférieur un peu plus grand & isolé, & dont les autres rapprochés sur une petite ligne. Dans la femelle, on voit en cette place des points blancs & transparents; leur

nombre varie de six à huit, mais les trois supérieurs, & représentant ceux dont nous venons de parler, sont conlans. Dans la variété à ailes inférieures tachetées, les taches font au nombre de cinq, & paroissent aussi un peu en dessous, mais sous une teinte d'un brun-jaunâtre; la base du dessous des mêmes ailes offre aussi quelques espaces plus clairs. La frange postérieure des quatre ailes est blanche.

110. HESPERIE Drury.

HESPERIA Drury.

Hesperia alis anticis fuscis, costâ, apice excepto, sringâque maculari, transversâ, rufescentibus: disco maris puncto oblongo atro; posticis rufescenti-fuscis, subtis punctorâ pallidorâ sringâ transversâ mediâque obsoletâ.

Cette espèce est très-voisine de l'*H. Thaumax*, & habite les mêmes contrées. Les ailes antérieures sont noiresâtes, avec la côte jusque près du bout, souvent aussi une portion du bord interne, & une rangée transversée de petites taches, pour la plupart en forme de petits points, d'un fauve-rouillâtre ou couleur de tabac d'Espagne. Le mâle n'en offre que deux, & dont l'intérieure divisée en deux parties inégales; la ligne noire & distinctive du sexe ne forme qu'un point oblong; il est terminé postérieurement par la plus inférieure des taches précédentes. Immédiatement au-dessous l'on observe entre les nervures deux espaces dont les écailles sont relevées en forme de petites broches finement striées. Le fond des ailes inférieures est d'un brun-rouillâtre luisant; leur dessous est plus terne, traversé dans son milieu par une raie de petites taches d'un jaunâtre-pâle, mais qui s'effacent presque dans quelques individus.

Cette espèce se rapproche beaucoup de celle qui est figurée sous le nom de *Vitellius* dans l'*Histoire naturelle des lépidoptères de la Georgie*, tom. 1. tab. 17. Je soupçonne aussi qu'elle s'éloigne peu, si ce n'est pas la même, de l'*Hespérie Bion* de Fabricius. *Suppl. Ent. Syst. p. 452.*

Les caractères qu'il assigne à l'*H. Phocion* de ce supplément, pag. 451, la troisième espèce de ce nom, semblent convenir à une variété de la femelle de notre espèce, dont les ailes inférieures seroient plus foncées.

Une autre hespérie analogue aux précédentes, ainsi qu'à l'*H. Thaumax*, est celle qu'il nomme *Exclamationis*. (*Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 326. n. 252.*) Ses ailes, ainsi que le corps, sont noiresâtes; les supérieures ont une tache linéaire jaunâtre, avec un point de la même couleur au-dessous.

111. HESPERIE Augias.

HESPERIA Augias.

Hesperia alis anticis posticisque infisâ rufo-

flavis; his suprà nigris, puncto subcentrali fusciâque posticâ utrinque dentatâ rufo-flavis; anticis suprà lineâ obliquâ incurvâ limboque postico nigris.

Hesperia U. Augias, alis divaricatis, fulvis: fuscâ obliquâ margineque postico nigris. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 527. n. 259.*

Papilio P. U. Augias. Mant. Inf. tom. 2. p. 84. n. 765. — Spec. Inf. tom. 2. p. 151. n. 597. — Syst. Ent. p. 551. n. 575.

Papilio P. U. Augias, alis divaricatis, fulvis: fuscâ obliquâ margineque postico nigris. LINN. *Syst. Nat. 12. tom. 2. p. 794. n. 257. — Amœn. Acad. tom. 4. p. 410. n. 80.*

Papilio Augias. DOXON. of an Epitom. of the Natur. Hist. of the Inf. of Ind. 5. pl. 453. 1.

Elle est un peu plus petite que l'*H. Comma*. Son corps est noir, mais garni en majeure partie d'un duvet d'un jaune-fauve. Les ailes supérieures & le dessous des inférieures sont de cette dernière couleur: le dessus des premières offre au milieu une bande oblique & un peu courbe à son extrémité postérieure, noire & continue. Son milieu offre, dans le mâle, une ligne d'un cendré-obscur, composée de trois à quatre taches contiguës. Le limbe postérieur est noir en manière de bande terminale & obtusément dentée ou crénelée au bord interne; plusieurs nervures rapprochées forment près de la côte des stries fines & noires: au-dessous, la bande noire du milieu forme une tache noire & triangulaire; l'angle interne est aussi de cette couleur, & la bande terminale paroît un peu, mais sous une teinte plus pâle. Les traces du point subcentral & de la bande transversée du dessus des ailes inférieures se montrent aussi sur l'autre surface, mais plus faiblement, selon que cette surface est presque entièrement d'un jaune-fauve, ou que son contour est plus foncé & présente les vestiges de la bordure noire supérieure. J'ai vu une variété de la femelle dans laquelle la bande noire des ailes supérieures est plus grande & offre une tache d'un jaune-fauve.

Elle se trouve aux Indes orientales, dans l'île de Java, d'où elle a été envoyée au Muséum d'histoire naturelle par MM. Diard & de Vaucelle: telle est aussi la patrie que Linnæus donne à cette espèce.

112. HESPERIE Phylæus.

HESPERIA Phylæus.

Hesperia alis rufo-flavis; anticis suprà fuscâ obliquâ interruptâ (mas) maculâve arcuatâ (femina) limboque posticoque fuscis; posticis ibidem exâis, fusco marginatis.

Hesperia Colon (maris var.) alis divaricatis

Julsis, maculâ mediâ margineque striato fuscis.
FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 327. n^o. 241.

Papilio P. U. Colon. Mant. Inf. tom. 2. p. 84. n^o. 760. — Spec. Inf. tom. 2. p. 151. n^o. 538. — Syst. Ent. p. 551. n^o. 576.

Hesperia Vitellius (fœmina), alis divaricatis, fulvis; anticis maculâ mediâ margineque posticis limbo fuscis. EJT. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 327. n^o. 240.

Papilio Phylax. DRURY. Inf. tom. 1. pl. 15. fig. 4. 5. Mâle.

Etant certain que cette espèce est bien celle dont Drury a signifié le mâle, sous le nom de *Phylax*, j'ad'opteraï cette dénomination de préférence à celle de *Colon* ou de *Vitellius* de Fabricius, que je rapporte à cette héspérie, mais avec moins d'assurance; elle est voisine de l'*H. Agias*; mais outre qu'elle est propre à l'Amérique méridionale, elle s'en éloigne par plusieurs caractères. Sa couleur fauve, ou moins dans les mâles, est moins vive, & tire davantage sur le jaune. La bande noire & oblique du dessus des ailes supérieures de ces individus est presque toujours partagée en deux taches; la ligne cendrée, qui coupe longitudinalement le milieu de cette bande, ne paroît presque pas, ou n'y forme qu'un trait continu. Le limbe postérieur & supérieur des mêmes ailes, & quelquefois aussi des inférieures, offre une rangée de taches triangulaires; souvent elles sont communes à la surface inférieure, mais elles y sont beaucoup plus petites; bien souvent encore le dessous est ponctué çà & là de noirâtre. Les ailes inférieures sont bordées extérieurement & quelquefois entièrement de cette couleur; mais elle s'étend davantage à la base extérieure & y forme une grande tache oblongue & marginale. Les femelles, ou les individus plumés tels, ont, près de leur base, une tache noirâtre, plus prononcée en dessous; leur dessus, un peu au-delà du milieu, en présente une autre, de la même couleur, un peu arquée ou en forme de C; & elles se terminent par une bande continue. Le dessous des quatre ailes, si on en excepte la tache de la base des premières & quelquefois une seconde, placée à leur angle interne, est d'un fauve-jaunâtre uniforme. Le Muséum possède cependant une variété où les quatre ailes sont bordées de noirâtre sur les deux surfaces, où la couleur fauve est divisée sur le disque par des nervures noires, & où le dessous des inférieures est d'un fauve-obscur. Cette espèce se trouve aux Antilles & au Brésil.

115. HESPÉRIE Epicète.

HESPERIA Epicetus.

Hesperia alis supra nigris; anticis vittis duabus, alâ costali, alterâ internâ, obliquâ, longiore, posterius recurvâ, puncto interno, posticaramque disco, omnibus infra, nifo-flavis.

Hesperia U. Epicetus, alis integerrimis, nigris, disco flavo; anticis maculâ fuscâ, lunulâ flavâ; posticis subtus flavis, immaculatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 550. n^o. 252.

Papilio Epicetus. JOH. Fig. piç. 6. tab. 75. fig. 3.

Papilio Epicetus. DOXOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 5. pl. 4. fig. 4.

Ses ailes étendues n'ont guère plus de neuf à dix lignes de largeur. Leur dessus est d'un noirâtre-loncé & varié de jaune-fauve. Le dessous des supérieures offre deux bandes & un point de cette couleur; l'une occupe la côte depuis la base jusque près du milieu; l'autre s'étend obliquement depuis le bord interne, jusque près du sommet, où elle se recourbe en manière de crochet; quelquefois cette extrémité forme une tache isolée; le point est situé entre les deux bandes, un peu avant l'extrémité postérieure de la première; quelquefois il y en a un autre plus petit. Le disque supérieur des secondes ailes est d'un jaune-fauve; tantôt il n'y forme qu'une bande, tantôt il occupe presque toute la surface, à l'exception des bords. Le dessous des quatre ailes est un peu plus jaunâtre. La base des supérieures & leur angle interne ont quelquefois une tache noirâtre.

Cette espèce se trouve au Brésil, d'où elle m'a été envoyée par M. Langsdorff. N'ayant pu remarquer distinctement sur les ailes supérieures le caractère qui distingue les mâles de cette division, je ne la place ici, de même que la suivante, que provisoirement & par analogie.

114. HESPÉRIE Bandes-jaunes.

HESPERIA flavo-vittata.

Hesperia alis fuscis; anticis utrinquè maculis duabus marginalibus, alâ basilari, magnâ, triangonâ, alterâ subapicali, parvâ, fuscâ posticâ, transversâ, alisque posticis punctis duobus fuscâque transversâ flavis.

Hesperia U. Maro, alis integerrimis, divaricatis flavis, apice fuscis flavo maculatis; posticis subtus fusco-punctatis. FAB. Suppl. Ent. Syst. p. 452?

Cette espèce est de la taille de l'*H. Epicète* & s'en rapproche beaucoup. Les ailes sont noirâtes, mais d'une teinte un peu plus claire en dessous. Leur dessin est le même de part & d'autre. Aux caractères de la phrase spécifique, j'ajouterai les suivans: le bord interne des ailes supérieures est jaunâtre à sa base, & entre lui & la grande tache triangulaire de la côte, l'on voit encore une petite ligne de cette couleur; la tache située près de la côte, avant le sommet, est presque carrée ou arrondie, & se réunit quelquefois avec la bande qui traverse postérieurement ces ailes. L'un des deux points

points jaunes des ailes supérieures est placé au milieu, près de leur base, & l'autre au-dessus de l'extrémité extérieure de la bande transversale, & qui est située à peu de distance du bord postérieur. Les bandes jaunes ne forment quelquefois que des lignes, & celle de l'extrémité postérieure des premières ailes est partagée en deux.

Ces ailes ont leurs deux surfaces colorées de même, tandis que dans l'*H. Maron* de Fabricius, leur dessous est jaune, avec des points noirs. J'ai quelque doute sur l'identité spécifique. Mon ami M. Macleay, secrétaire de la Société linnéenne, m'a envoyé plusieurs individus de cette espèce, & qu'il avoit reçus de la Nouvelle-Hollande.

Selon Fabricius, l'*H. Maron* habite les Indes orientales.

115. HESPERIE Themistocle.

HESPERIA Themistocles.

Hesperia alis fuscis; anticis maculâ strigâque maculari fulvis; posticis immaculatis, subtus griseis.

Hesperia U. Phocion, *alis divaricatis, fuscis; anticis maculâ strigâque maculari fulvis; posticis immaculatis.* FAB. *Suppl. Ent.* p. 451.

Elle a entièrement le port de l'*H. Comma*. Les antennes sont noires, avec la massue obscure. Les ailes supérieures sont noirâtres, avec une tache oblongue, presque marginale, & une raie au-delà du milieu, fauve. Les inférieures sont sans taches & grises en dessous.

Elle habite l'Amérique méridionale. Ne l'ayant point vue, nous ne la plaçons ici qu'avec doute.

116. HESPERIE Comma.

HESPERIA Comma.

Hesp. alis obscure fulvis, supra flavescenti, subtus albo maculatis: posticis subtus maculis novem.

Papilio P. U. Comma, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, punctis albis lineolâque nigris.* LINN. *Syst. Nat.* 2. pag. 795. n°. 256. — *Faun. Suec. edit.* 2. p. 285. n°. 1080.

Papilio P. U. Comma, *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, lineolâ nigrâ: subtus punctis albis.* FAB. *Mant. Inf. tom.* 2. p. 84. n°. 761.

Hesperia U. Comma. FAB. *Entom. Syst. em. tom.* 5. pars 1. p. 525. n°. 255.

Papilio Comma. WIEN. *Verz.* p. 160. *fam.* A. n°. 4.

Papilio Comma. SCHÆFF. *Icon. tab.* 260. *fig.* 1. 2. (Mas.) — *tab.* 274. *fig.* 1. 2. (Fœm.)

NATURE. G. p. 8. n°. 52.

Hist. Nat. Inf. Tome I.X.

DE GEER, *Mem. Inf. tom.* 2. p. 152. *tab.* 1. *fig.* 4. 5.

Papilio Comma. HUENAG. *Tabell. im. Berl. Magazin.* tom. 2. p. 74. n°. 52.

Papilio Comma. MULLER, *Zool. Dan.* p. 115. n°. 1552.

Papilio Comma. MULLER, *Faun. Fridr.* p. 57. n°. 559.

Papilio Comma. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. p. 300. *tab.* 25. *fig.* 1. a. b.

Papilio Comma. LEWIN, *Inf. tab.* 45. *fig.* 1. 2.

Papilio Comma. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 179 & 284. n°. 1.

Papilio Comma. BORKH. *Rhin. Magazin.* tom. 1. p. 299. n°. 113.

Papilio Comma. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 272. n°. 170.

Papilio Comma. LANG. *Verz.* 2. pag. 59. n°. 499-502.

Papilio Comma. SCHWARZ, *Raupenkal.* p. 180.

Papilio Comma. FÜESSEL. *Suiff. Inf.* pag. 52. n°. 603.

ROSSI, *Faun. Etr. tom.* 2. pag. 158. n°. 1041.

ROSSI, *edit.* ILLIG. p. 251. n°. 1041.

Papilio Comma. PETAGNA, *Instit. Ent. tom.* 1. p. 492. n°. 159.

Papilio Comma. DEVILL. *Ent. Linn. tom.* 2. p. 79. n°. 160.

Papilio Comma. HUBN. *Pap. tab.* 95. *fig.* 479. (Mas.) 480. 481. (Fœm.)

HUBN. *Larv. lepid.* 1. *Pap.* 2. *Gens E.* *fig.* 3. a.

Erynnis Comma. SCHRANK, *Faun. Boic. tom.* 2. p. 159. n°. 1280.

Papilio Comma. OCHSEN. *Pap. Eur. tom.* 1.

Hesperie Comma. LATR. *nov. Diction. d'Hist. nat. cdt.* 2. tom. 14.

Hesperie Comma. GOD. *Hist. natur. des lépid. de France, tom.* 1. p. 257. *pl.* 12 *tert.* *fig.* 4.

Hesperie Comma. GOD. *Tab. méth. des lépid. de France, DIURNES,* p. 62. n°. 181.

Elle ressemble beaucoup en dessus à l'hesperie *Sylvain*; mais elle a le dessous d'un ton plus verdâtre & tacheté de blanc. Les taches du dessous de ses ailes inférieures sont au nombre de neuf, dont trois vers la base, les six autres formant une rangée incurvée derrière le milieu. La frange de toutes ses ailes est d'ailleurs blanche de part & d'autre, & mouchetée de noirâtre en dessous. Ses antennes offrent aussi une différence, laquelle con-

Ècècè

filée en ce que la masse est terminée en dessous par un gros point ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Europe, à la fin de juillet & dans le courant d'août.

La chenille, selon Hubner, est d'un vert-sale, mélangé de ferrugineux, avec la tête noire & trois rangées longitudinales de points de cette dernière couleur. Elle a un collier blanc, bordé de noirâtre. Les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères des environs de Vienne disent qu'elle vit principalement sur la *coronille bigarrée* (*coronilla varia*). La chrysalide n'est ni figurée, ni décrite, du moins à notre connaissance.

117. HESPÉRIE Sylvain.

HESPERIA Sylvanus.

Hesp. alis obscurè fulvis, utrinquè flavescenti maculatis : posticis subtus maculis quinque.

Papilio P. U. Sylvanus, alis divaricatis, fuscis, maculis quadratis supra flavis, subtus albis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 84. n. 765.*

Hesperia U. Sylvanus. FAB. *Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 526. n. 257.*

Papilio Sylvanus. ESP. *Pap. Eur. part. 1. p. 545. tab. 36. Suppl. 12. fig. 1. (Fæm.)*

Papilio Sylvanus. ILLIG. *Magaz. tom. 5. pag. 204.*

Papilio Sylvanus. LANG. *Verz. 2. pag. 59. n. 505-506.*

Papilio Sylvanus. LEWIN, *Inf. tab. 46. fig. 1-5.*

Papilio Sylvanus. SCHNEID. *Syst. Befchw. pag. 275. n. 171.*

ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 158. n. 1042.*

ROSSI, *Faun. Etr. edit. ILLIG. p. 251. n. 1042.*

Papilio Sylvanus. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 82. n. 164.*

Papilio Sylvanus. HUBN. *Pap. tab. 95. fig. 482. (Mas.) fig. 485. 484. (Fæm.)*

Papilio Sylvanus. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Papilio Sylvanus. BERGSTR. *Nomenkl. p. 57. tab. 89. fig. 4. 5.*

Papilio Melicerta. BERGSTR. *Nomenkl. p. 58. tab. 90. fig. 1-4.*

Papilio Sylvanus. BORKH. *Rhein. Mag. tom. 1. p. 500. n. 114.*

Papilio Sylvanus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 180 & 285. n. 2. — part. 2. p. 256.*

Papilio Melicerta. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 180 & 285. n. 5.*

La Bande-noire. EXENAN. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 192. pl. 45. fig. 95. a. b. c. d. g. l.*

Variété de la Bande-noire. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 67.*

Hespérie Sylvain. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 14.*

Hespérie Sylvain. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 255. pl. 12. secund. fig. 2, & pl. 12. tert. fig. 5.*

Hespérie Sylvain. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 61. n. 180.*

Elle a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec des taches jaunâtres, dont une située vers la base, les autres formant derrière le milieu une rangée transverse & flexueuse. Ces taches sont plus apparentes chez la femelle, parce qu'elle est d'un fauve plus obscur que le mâle : celui-ci a au milieu des ailes supérieures un trait noir, large & oblique.

Le dessous des deux sexes est d'un fauve-verdâtre, mais plus gai au milieu des ailes supérieures & à l'angle interne des inférieures, avec des taches jaunâtres, pâles, & répondant à celles du dessus. Les taches des secondes ailes ont un nombre de cinq. Le corps a le dessus à peu près du même ton que les ailes, & le dessous blanchâtre. Les antennes sont noirâtres, annelées de blanchâtre, avec la masse terminée par un crochet noir, & marquée en dessous d'un trait longitudinal ferrugineux.

Commune dans les clairières des bois de l'Europe, en mai & en juin.

118. HESPÉRIE Linéa.

HESPERIA Linea.

Hesp. alis fulvis, nitidis, supra margine fusco, subtus apice irrescunt-cinereo : omnibus lænius utriquè immaculatis.

Papilio Linea, alis divaricatis, fulvis, fæminæ immaculatis, maris lineolâ nigâ crassiore : posticis subtus græfels. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 228. n. 18.*

Papilio P. U. Linea, alis integerrimis, divaricatis, fulvis, margine nigro. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 84. n. 762.*

Hesperia U. Linea. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 526. n. 256.*

Papilio Linea. WIEN. *Verz. fam. A. n. 5.*

Papilio Linea. ILLIG. *N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 146. n. 5.*

Papilio Linea. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 197. — tom. 4. p. 25.*

Papilio Linea. SCHÆFF. *Icon. tab. 234. fig. 5. 6. (Fæm.)*

Papilio Linea. BERGST. *Nomenkl. tab.* 90. fig. 5-8.

Papilio Linea. HUBN. *Pap. tab.* 96. fig. 485-487.

HUBN. *Larv. lepid.* 1. *Pap.* 2. *Gens E.* fig. 2. a. b. c.

Papilio Linea. LANG. *Verz.* 2. p. 59. n^o. 507-510.

Papilio Linea. PETAG. *Inflit. Ent.* tom. 1. p. 492. n^o. 140.

Erynnis Linea. SCHRANK, *Faun. Boic.* tom. 2. p. 159. n^o. 1281.

Papilio Linea. BORKH. *Rhein. Magaz.* tom. 1. p. 300. n^o. 115.

Papilio Thaum. BORKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 181 & 285. n^o. 4. — *part.* 2. p. 236.

Papilio Thaum. *alis integerrimis, divaricatis, fulvis, immaculatis, lineâ tenuiori nigrâ alis superioribus, quâ fœmina caret.* *Esp. Pap. Eur. part.* 1. p. 344. tab. 36. *Suppl.* 12. fig. 2. 3. (mâle & fem.) — *tab.* 98. *cont.* 55. fig. 5-10. (chea. & chryf.)

NATURF. 6. p. 4. n^o. 10. — 20. p. 155. *tab.* 2. fig. A. B.

Papilio Thaum. HUFN. *Tab. im. Berl. Mag.* tom. 2. p. 62. n^o. 10.

Papilio Thaum. LEWIN, *Inf. tab.* 45. fig. 5-7.

Papilio Thaum. SCHNEID. *Syfl. Besch.* p. 275. n^o. 172.

Papilio Thaum. SCHWARZ. *Raupenkalend.* p. 195.

Papilio Thaum. DEVILL. *Ent. Linn.* p. 82. n^o. 165.

Papilio Flavus. MULLER, *Zool. Dan.* p. 115. n^o. 1535. (Fœm.)

La Bande-noire. GEOFF. *Hist. Inf. tom.* 2. p. 66. n^o. 37.

Variété de la Bande-noire. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 192. pl. 45. fig. 95. e. f.

Hespérie Bande-noire. LATR. *nouv. Diction. d'Hist. nat.* 2^e. *édit.* tom. 14.

Hespérie Bande-noire. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 253. pl. 12. fig. 5, & pl. 11 *tert.* fig. 2.

Hespérie Linéa. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 61. n^o. 178.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le dessus des deux sexes est d'un fauve-luisant, avec les bords & l'extrémité des nervures d'un brun-noirâtre. La femelle est sans taches, mais le mâle

a au milieu des premières ailes un trait noir, oblique & assez large.

Le dessous des ailes supérieures est du même fauve que le dessus, avec l'origine du bord interne noirâtre, & le sommet d'un cendré-verdâtre.

Le dessous des ailes inférieures est d'un cendré-verdâtre, avec la région de l'angle interne d'un fauve-gai. Le corps a le dessus d'un fauve-obscure, & le dessous d'un gri-jaunâtre. Les antéanes sont noires, avelécés de jaune-pâle, avec le dessous de la massue ferrugineux vers le haut.

Commune dans les bois & dans les jardins de l'Europe, vers la fin de juillet.

La chenille, selon Hubner, est d'un vert-foncé, avec une ligne dorsale obscure, & deux lignes latérales blanchâtres dont les bords sont noirs. Elle vit sur la canche de montagne (*airu montana*), & sur quelques autres graminées.

La chrysalide, d'après le même auteur, est jaunâtre, avec l'étui de la trompe brun, & une petite pointe près de la tête.

119. HESPÉRIE Linéola.

HESPERIA Linéola.

Hesp. alis integerrimis, divaricatis, fulvis, concoloribus, fœmine immaculatis, maris lineolâ nigrâ tenuiore. OSCHEN.

Papilio Lineola. OSCHEN. *Pap. Eur. tom.* 1. p. 250. n^o. 19. — *tom.* 4. p. 161. n^o. 20.

Papilio Virgula. HUBN. *Pap. tab.* 150. fig. 66c. 661. (Mas.) fig. 662. 663. (Fœm.)

Ce lépidoptère, dit M. Ochsenheimer, a peut-être été trop souvent confondu avec l'hespérie *Linéa*; aussi me suis-je décidé, d'après l'avis unanime des entomologistes que j'ai consultés à cet égard, à en faire une espèce séparée.

Il a le port & la taille du *P. Linéa*. Ses ailes supérieures sont cependant plus larges, plus obtuses, d'un fauve plus clair, & le trait noir qu'elles offrent chez le mâle est plus grêle & tout droit. La massue de ses venues est noire en dessous, tandis qu'elle est ferrugineuse dans le *Linéa*. Le dessous des ailes supérieures est d'un fauve uniforme. Le dessous des ailes inférieures est d'un jaune-blanchâtre, avec la région de l'angle interne d'un jaune-clair.

Il se trouve en même temps que le *P. Linéa* dans plusieurs contrées de l'Allemagne.

Nota. L'auteur que nous traduisons ici ajoute que le *P. Venula* de Hubner, *tab.* 151. fig. 666-669. ne diffère du *P. Linéa*, autant qu'il a pu en juger par des figures, qu'en ce que le mâle n'a pas de trait noir sur le milieu des ailes supérieures.

120. HESPERIE AÉLÉON.

HESPERIA AÉLÉON.

Hes. alis obscurè fulvis, suprâ margine fusco, subtis avicè vivescenti-cinereo: anticis utrinquè maculis flavescentsibus in arcum digestis.

Papilio Aéléon, alis integerrimis, divaricatis, fulvis: anticis lineolâ nigrâ maculisque luteis; posticis immaculatis. OCHSEN. *Pap. Eur. edit.* 2. tom. 1. p. 251. n^o. 20.

Papilio P. U. Aéléon, alis integerrimis, divaricatis, fulvis: superioribus suprâ maculâ in medio fuscâ, subtis pluribus pallidis. ESP. *Pap. Eur. part.* 1. p. 345. tab. 56. *Suppl.* 12. fig. 4.

NATURE. 6. p. 50. n^o. 18.

Papilio Aéléon. BOAKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 182 & 286. n^o. 5.

Papilio Aéléon. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 274. n^o. 175.

Papilio Aéléon. BERGST. *Nomenkl.* tab. 89. f. 6. 7.

Papilio Aéléon. LILLIG. *Magaz.* tom. 5. p. 183.

Papilio Aéléon. DEVILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 82. n^o. 166.

Papilio Aéléon. HUEN. *Pap. tab.* 96. fig. 488. 4^o. 9. (Mas.) fig. 490. (Fem.)

Hesperie Aéléon. GOD. *Hist. nat. des lépidop. de France, tom.* 2. p. 2 7. pl. A. a. XXVII. fig. 5. 4.

Hesperie Aéléon. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DURRES, p.* 61. n^o. 179.

Elle est un peu plus petite que l'hésperie *Linéa*. Le dessus de ses ailes est d'un fauve - obscur, bordé de brun-noirâtre, avec un double trait longitudinal & un arc transverse de petites taches d'un jaune-pâle vers la côte des supérieures chez les deux sexes. Dans le mâle, le dessus des ailes inférieures est sans taches, mais il offre dans la femelle un arc presque semblable à celui des ailes supérieures.

Le dessous des premières ailes est fauve dans les deux sexes, avec le sommet d'un gris-verdâtre, & précédé d'un arc de petites taches plus pâles qui ne font que la répétition de celles qu'on voit sur la face opposée.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris-verdâtre, avec l'angle interne largement fauve. Les anneaux sont noirâtres & annelés de jaune, avec le bout de la maille ferrugineux.

Le trait noir du dessus des ailes supérieures du mâle est oblique & assez large.

Elle habite l'Allemagne, le Portugal, la France, &c. M. Coity de Brécourt l'a prise, à la fin de juin & au commencement d'août, aux environs de

Nieppe & de la Roelle, dans des lieux en pente & exposés au midi.

* * Milieu du dessus des ailes supérieures des mâles sans ligne ou tache noire ou noirâtre, & oblique, caractérisant le sexe.

121. HESPERIE ORNÉE.

HESPERIA ornata.

Hesperia alis anticis fuscis, suprâ maculis tribus (mas) vel quinque (femina) flavescentsibus, subtis maculis apiceque albidis; posticis suprâ nigris, fasciâ transversâ crocèâ, margine postico albedo nigroque interfecto; subtis albidis, maculis nigris, transversè ordinatis.

Hesperia ornata. LÉACH, *the Zool. Miscell.* vol. 1. tab. 55. fig. 1. 2. 3.

Cette jolie espèce & propre à la Nouvelle-Hollande, a environ seize lignes de largeur, les ailes étendues. Le dessous du corps est en grande partie d'un blanc un peu jaunâtre; son dessus est noirâtre, mais avec des taches & des anneaux sur l'abdomen de la couleur précédente. Elle est aussi celle du dessous des ailes inférieures, des taches & du bord postérieur des supérieures, vues du même côté; le bord offre une rangée de points; la tache du sommet en a une de plus, outre deux autres points supérieurs, ou le commencement d'une autre série. Dans un individu que j'ai reçu de M. Macleay, les taches du dessus des ailes supérieures sont presque toutes blanchâtes.

La bande jaune-safran des ailes inférieures est large & sinuée, on un peu dentée sur les bords. Le dessous des inférieures offre un grand nombre de petites taches noires, dont une isolée à la base, & les autres formant trois lignes transverses; les deux internes de la première sont annulaires.

122. HESPERIE PEINTE.

HESPERIA picta.

Hesperia alis anticis suprâ fuscis, maculis flavidis punctonumque hyalinorum serie subapicali, posticis suprâ nigris, fasciâ transversâ punctonumque serie marginali, croceis; omnibus infra, anticarum disco excepto, brunneo-rufis; posticis nervis longitudinalibus, fasciâ, lineâque transversis, albidis.

Hesperia picta. LÉACH, *the Zool. Miscell.* vol. 1. tab. 55. fig. 4. 5.

Elle est très-voilée de l'H. *Ornée*, de la même taille & du même pays, mais elle en diffère par la couleur du dessous des ailes, & particulièrement sous le rapport du dessin des inférieures. Les supérieures ont quelques taches jaunâtres & trois

petits points transperans, rapprochés en une petite ligne, à la côte; & près du sommet, mais en dessous, l'on voit entr'eux & le bord inférieur une ligne blanchâtre; le milieu de ces ailes est noirâtre; le bord postérieur du dessous des quatre ailes offre une raie blanchâtre, plus large, terminale & entrecoupée de points noirs, formant une rangée, sur les inférieures.

125. HESPÉRIE Propertius.

HESPERIA Propertius.

Hesperia alis suprà nigris; anticis suprà lineis maculisque flavis; posticis ibidem fasciâ flavâ, subtus fasciâ rufis flavisque alternis.

Hesperia U. Propertius, alis divaricatis nigris, flavo maculatis; posticis subtus fasciâ rufis flavisque alternis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 325. n^o. 254.

Papilio Propertius. JOX. Fig. pict. 6. tab. 73. fig. 1.

Papilio Propertius DOXOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Ins. of Ind. cah. 4. pl. 4. fig. 2.

Elle est petite. Les ailes sont noires en dessus. Les antennes ont deux lignes marginales & situées à la base & des taches jaunes; leur dessous est mélangé de noir-foncé, de fauve & de jaune. Les postérieures ont en dessus une bande jaune; leur dessous est de cette couleur, mais coupé transversalement au milieu par une bande fauve, couleur qui borde presque entièrement son contour marginal.

Elle se trouve aux Indes.

124. HESPÉRIE Galenus.

HESPERIA Galenus.

Hesperia alis utrinque fuscis, punctis maculisque flavis; anticis fasciâ maculari, transversâ; posticis maculâ magnâ, elongato-quadratâ, à centro ad marginem posticum extensâ flavis.

Hesperia U. Galenus, alis integerrimis, concoloribus, fuscis, flavo maculatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 350. n^o. 552.

Papilio Galenus. DOXOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Ins. of Ind. cah. 3. pl. 1. fig. 3.

Nous avons suppléé, dans nos caractères spécifiques, ceux de Fabricius, au moyen de la figure de Donovan, car il se borne à ajouter que cette espèce a entièrement le port de l'*H. Mimas*, & que ses antennes sont crochues. Il répète sans détail que ses ailes sont noirâtres & tachetées de jaune.

Elle se trouve aux Indes.

125. HESPÉRIE Nostradamus.

HESPERIA Nostradamus.

Hesp. alis integris fuscis: anticis maris suprà disco nigro, keminâ utrinque strigâ maculari flavâ; posticis subtus cinereis.

Hesperia U. Nostradamus, alis divaricatis, fuscis: anticis suprà fasciâ maculari albâ; posticis subtus cinereis. FAB. Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 528. n^o. 246. (La femelle.)

Hesperia Nostradamus. COQUEBERT, Illust. Icon. Inf. Dec. 2. p. 70. tab. 17. fig. 2. (La femelle.)

Papilio Pumilio, alis integris, divaricatis, fuscis nigro nebulosis (keminâ leteu maculatis), concoloribus. OCHSEX. Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 216. n^o. 12.

Papilio Pumilio. HUBN. Pap. tab. 91. fig. 459. (Mas.) fig. 459. 460. (Fem.)

Papilio Pygmaeus. CYRILL. Ent. Neap. tab. 5. fig. 5.

Papilio Pygmaeus. ESP. Pap. Eur. part. 1. p. 54. tab. 99. cont. 54. fig. 5.

Papilio Pygmaeus. ILLIG. Magaz. tom. 3. pag. 202.

A en juger par les noms de Cyrille & de Habner, cette espèce devoit être un pygmée parmi les HESPÉRIES; cependant elle a, comme le dit Fabricius, la taille de l'*Hesp. Comma*. Les ailes supérieures sont d'un brun-foncé, avec le milieu noir en dessus dans le mâle, & traversé de part & d'autre dans la femelle par une ligne flexueuse de taches jaunes. Les ailes inférieures ont le dessus brun & sans taches, le dessous cendré. Les deux surfaces du corps sont de la même couleur que celles des secondes ailes, & les antennes ont la masse terminée de ferrugineuse.

Trouvée en Barbarie par M. Desfontaines, professeur de botanique au Jardin du Roi. Elle habite aussi la Calabre.

Nota. Dans l'individu femelle décrit par Fabricius & figuré par Coquebert, les taches des ailes supérieures avoient passé du jaune au blanc-sale.

126. HESPÉRIE Paniscus.

HESPERIA Paniscus.

Hesp. alis integris, fuscis, rubescenti nitidis, sulvo maculatis: posticis suprà maculis 10, subtus 13 pallidioribus.

Papilio P. U. Paniscus, alis integerrimis, divaricatis: posticis utrinque fuscis, sulvo maculatis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. n^o. 767.

Hesperia U. Paniscus. FAB. Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 528. n^o. 243.

Papilio Panificus, *alis integerrimis, divaricatis, fuscis, subvo maculatis: postlicis subtus flavis, maculis flavescensibus*. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 219. n. 14.*

Papilio Panificus. ESP. *Pap. Eur. part. 1. pag. 322. tab. 28. Suppl. 4. fig. 2. — tab. 113. cont. 50. fig. 5. (Var.)*

Papilio Panificus. SULZ. *Inf. tab. 19. fig. 8. 9.*

Papilio Panificus. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 91. fig. 7. 8.*

Papilio Panificus. NATORF. *12. tab. 2. fig. 11. 12.*

Papilio Panificus. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 185 & 286. n. 7. — part. 2. p. 256.*

Papilio Panificus. BORKH. *Rhein. Mag. tom. 1. p. 500. n. 116.*

Papilio Panificus. SCHNEID. *Syst. Befchr. pag. 280. n. 180.*

Papilio Panificus. ROSSI, *Faun. Etr. Mantis. tom. 2. p. 15. n. 557.*

Papilio Panificus. BRAHM. *Inf. Kalend. pag. 259. n. 155.*

Papilio Panificus. PETAG. *Instit. Ent. tom. 1. p. 493. n. 141.*

Papilio Panificus. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 82. n. 105. tab. 4. fig. 14.*

Papilio Brontes. WIEN. *Verz. p. 160. fam. A. n. 6.*

Papilio Brontes. ILLIG. *N. Aufg. Delf. tom. 2. p. 147. n. 6.*

Papilio Brontes. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 188. — tom. 4. p. 25.*

Papilio Brontes. LANG. *Verz. 2. p. 59. n. 511-514.*

Papilio Brontes. HUBN. *Pap. tab. 94. fig. 475. 476. (Mas.)*

HUBN. *Larv. lepid. 1. Pap. 2. Gens E. c. fig. 1. a.*

Papilio Palæmon. PALLAS, *Voy. tom. 1. App. n. 65.*

L'Échiquier. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pag. 194. pl. 45. fig. 96. a. b. — fig. 96. c. d. (Var.)*

Hespérie Échiquier. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. 2. état. tom. 14.*

Hespérie Échiquier. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 231. pl. 12. fig. 1. 2.*

Hespérie Panificus. GOD. *Tabl. method. des lépid. de France, DIURNES, p. 60. n. 176.*

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre à reflet violet, avec des taches fauves, dont les intérieures plus grandes & éparles, les postérieures formant une série parallèle au bord terminal. Les taches des secondes ailes sont au nombre de dix, & l'antérieure d'entre elles est baillaire & arrondie.

Le dessous des ailes supérieures est fauve, avec quelques taches, & l'extrémité des nervures, noires.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-jaunâtre, avec treize taches blanchâtres, inégales, bordées de noirâtre, & rangées transversement, à partir de la base, ainsi qu'il suit : 1, 2, 5, 7. Le corps est brun en dessus, avec des poils verdâtres sur le corselet ; il est d'un jaune-d'ocre pâle en dessous, avec quatre lignes longitudinales noires sur l'abdomen. Les antennes sont noires, annelées de jaune, avec la moitié antérieure de la massue orangée.

La femelle offre les mêmes caractères que le mâle, mais elle a les taches du dessus d'un fauve moins gai.

Cette espèce habite les avenues & les clairières des bois un peu humides, & paroît dans les commencemens de mai. Elle est assez commune aux environs de Paris.

127. HESPÉRIE SYLVIVS.

HESPERIA Sylvius.

Hesp. alis integris: anticis utrinque aureo-flavis, nitidis, nigro punctatis: postlicis fuscis, fuscis, maculis aureo-flavis, supra 11, subtus 12.

Papilio Sylvius, alis integerrimis, divaricatis: anticis flavis nigro maculatis, postlicis fuscis flavo maculatis. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. pag. 221. n. 4.*

Papilio P. U. Sylvius, alis divaricatis, fulvis: omnibus supra maculis parvis, fuscis: inferioribus subtus maculis pallidis oratis nigro inductis. ESP. *Pap. Eur. part. 1. pag. 140. tab. 80. cont. 50. fig. 5. 6.*

Papilio Sylvius. KNOCH, *Beytr. part. 1. tab. 5. fig. 1. 2.*

Papilio Sylvius. SCHNEID. *Syst. Befchr. p. 281. n. 181.*

Papilio Sylvius. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 85. n. 170.*

Papilio Sylvius. HUBN. *Pap. tab. 94. fig. 477. 478. (Mas.) — tab. 126. fig. 641. 642. (Mas.) 645. 644. (FEM.)*

Papilio Sylvius. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. p. 184 & 286. n. 8. — part. 2. p. 256.*

Papilio Sylvius. BORKH. *Rhein. Mag. tom. 1. p. 501. n. 117.*

Papilio P. U. Panificus. (Var.) FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 85. n^o. 767. f.

Hesperia U. Panificus. (Var.) FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 528. n^o. 242. f.

Papilio Palamon. (Var.) PALLAS, *Voy.* tom. 1. *App.* n^o. 65. f.

Papilio Panificus. (Var.) PETAG. *Instit. Ent.* tom. 1. p. 495. n^o. 142. f.

ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. pag. 285. pl. 74. *Suppl.* 20. fig. 90. e. f.

Hesperie Sylvius. *God. Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. pag. 214. pl. A. a. XXVII. fig. 1. 2.

Hesperie Sylvius. *God. Tab. method. des lépidop. de France*, DIURNES, p. 61. n^o. 177.

Elle se rapproche beaucoup de l'hésperie *Panificus* ; mais le dessus de ses premières ailes est toujours d'un jaune-doré-luisant ; les secondes ont une tache de plus sur la face supérieure, & , au contraire, une de moins sur la face inférieure. Ces taches sont d'ailleurs plus grandes en dessus & plus jaunes en dessous. Deux caractères qu'il est encore bon de remarquer, c'est que la massue de ses antennes est entièrement jaune, & que la tache basilaire du dessus de ses ailes inférieures est allongée & ovale.

La femelle est un peu moins gaie en dessus que le mâle, & elle a les points de l'extrémité des premières ailes moins détachés du bord.

Se trouve en mai, aux environs de Brunswick, & dans quelques cantons des bords du Rhin.

128. HESPERIE *Aracynthus.*

HESPERIA Aracynthus.

Hesp. alis integris, nigro-fuscis, nitidis : anticis utrinque apice flavo maculatis : posticis fatis lutescentibus, maculis 12 rotundatis albis nigro cinctis.

Papilio P. U. Aracynthus, alis rotundatis, integerrim fuscis : posticis fatis griseis, maculis ocellaribus salbis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 89. n^o. 809.

Hesperia U. Aracynthus. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 544. n^o. 509.

Papilio P. U. Aracynthus. PANZ. *Faun. Germ.* 9. 16.

Papilio P. U. Aracynthus. PETAG. *Instit. Ent.* tom. 1. p. 495. n^o. 142.

Papilio Steropes. WIEN. *Verz.* p. 160. *fam.* A. n^o. 7.

Papilio Steropes. ESP. *Pap. Eur. part.* 1.

p. 361. tab. 41. *Suppl.* 17. fig. 1. — tab. 80. cont. 50. fig. 4.

Papilio Steropes. ILLIG. *N. Aufg. Dess.* tom. 2. p. 148. n^o. 7.

Papilio Steropes. ILLIG. *Magaz.* tom. 5. p. 204.

Papilio Steropes. BERGSTR. *Nomenkl.* tab. 96. fig. 5. 4.

Papilio Steropes. OCHSENH. *Pap. Eur.* tom. 1. p. 215. n^o. 15.

Papilio Steropes. BOBKH. *Pap. Eur. part.* 1. p. 182 & 286. n^o. 6. — *part.* 2. p. 256.

Papilio Steropes. SCHNEID. *Syst. Besch.* p. 231. n^o. 182.

Papilio Steropes. LANG. *Verz.* 2. p. 60. n^o. 515-517.

Papilio Steropes. DEBILL. *Ent. Linn.* tom. 2. p. 82. n^o. 167.

Papilio Steropes. HUBN. *Pap. tab.* 94. fig. 475. 474. (Mas.)

Papilio U. Morpheus. PALLAS, *Voy.* tom. 1. p. 471. n^o. 64.

Erynnis Speculum. SCHRANK, *Faun. Boic.* tom. 2. p. 160. n^o. 1282.

Le Miroir. GROFF. *Hist. Inf.* tom. 2. p. 66. n^o. 56.

Le Miroir. ENGRAM. *Pap. d'Europe*, tom. 1. p. 191. pl. 64. fig. 94. a. b. — pl. 74. *Suppl.* 20. fig. 94. c. d.

Hésperie Miroir. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2^e. édit. tom. 14.

Hésperie Miroir. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 1. p. 229. pl. 12. *secund.* & pl. 12. *tert.* fig. 1.

Hésperie *Aracynthus.* GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France*, DIURNES, p. 60. n^o. 175.

Ge. Eroy a mis cette espèce parmi les *Argus* ou *Pantomatés*, & il lui a donné le nom de *Miroir*, parce qu'elle a le dessous des ailes inférieures chargé de taches blanches encadrées de brun.

Elle a de seize à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre-luisant, avec quelques taches jaunes vis-à-vis du sommet des supérieures.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus ; mais le bord terminal est longé en majeure partie par une ligne jaune crénelée intérieurement, & la frange est interrompue de blanc.

Le dessous des ailes inférieures est d'un jaune-rouillâtre, avec douze taches blanches, orbiculaires, bordées de noir, & rangées transverse-

ment, à partir de la base, ainsi qu'il suit : 2, 4, 6. Le corps à le dessus entièrement noirâtre ; il a le dessous blanchâtre, avec trois lignes noires longitudinales. Les antennes sont noires, annelées de blanchâtre, & elles ont la moitié supérieure de la masse d'un jaune-orangé.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a quatre taches jaunes, dont une discoidale, sur le dessus des ailes inférieures, & quelquefois une de plus sur le dessus des supérieures.

Elle habite les bois marécageux, & elle paroît à la Saint-Jean ou au solstice d'été. Il faut frapper les buissons pour en faire sortir les femelles. Les forêts de Bondy & de Senart sont, aux environs de Paris, des localités où l'on est presque toujours sûr de rencontrer cette espèce. M. Darville, lieutenant de la marine royale, a rapporté, des bords de la Mer-Noire, des individus parfaitement semblables à ceux qu'on trouve dans les districts contrées de l'Europe.

129. HESPERIE Metis.

HESPERIA Metis.

Hesperia alis anticis utrinquò posticisque supra nigro-fuscis; maculis fulvis, plurisque punctiformibus; alis posticis subtus brunneo-fuscis, immaculatis.

Hesperia U. Metis, *alis integerrimis, fuscis, maculis fulvis sparsis; posticis subtus immaculatis.* FAB. Ent. Syst. ent. tom. 5. pars 1. p. 329. n.º 249.

Papilio P. U. Metis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n.º 772. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 152. n.º 605.* — *Syst. Ent. p. 528. n.º 360.*

Papilio P. R. Metis, *alis integerrimis, ferrugineo-fuscis; maculis fulvis sparsis; posticis subtus immaculatis.* LINS. Syst. Nat. edit. 12. tom. 2. p. 792. n.º 245. — *Mus. Ludov. Ultr. pag. 325. n.º 145.*

DRURY, *Inf. tom. 2. pl. 16. fig. 3. 4.*

Papilio Metis. CRAM. Pap. 14. pl. 162. G.

Elle a environ un ponce d'envergure. Son corps est noirâtre, avec la majeure partie des antennes, les palpes extérieurs & les poils de l'anus, fauves. Les ailes supérieures en entier, & le dessus des inférieures sont presque noires avec des taches d'un fauve-orangé, & pour la plupart arrondies, ou en forme de points; ou en compte environ cinq sur les supérieures, dont deux près de la côte, & dont l'antérieure double, & les trois autres situées transversalement à l'extrémité postérieure; l'intermédiaire est encore double. Celles du dessus des ailes inférieures y sont disposées sur deux rangées transverses, trois & six; l'interne de la rangée intérieure, & les deux de chaque extrémité de l'inférieure sont très-petites, punctiformes. Le dessous

de ces ailes est d'un brun-noirâtre & sans taches. Cette description a été faite sur un individu mâle. D'autres individus présentent quelques différences dans le nombre des taches. Les taches supérieures des secondes ailes se montrent quelquefois en dessous; quelquefois il n'y a que la rangée antérieure, & le dessous présente une ou deux taches blanches.

Elle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

On peut placer près de cette espèce le papillon *Menès* de Cramer, 55. pl. 303. II. Z. Il est noirâtre, avec de petites lignes jaunes, en forme de stries, à l'extrémité des ailes supérieures, & une rangée de points de la même couleur, sous les inférieures, le long de leur bord postérieur. Cet auteur dit qu'elle se trouve à Surinam, au Coromandel & au Cap de Bonne-Espérance. Cela n'est point croyable, & il y a ici quelque confusion. Stoll a représenté, pl. 7, fig. 6, de son Supplément à l'ouvrage précédent, la chenille & la chrysalide de cette espèce. Le corps de la chenille est d'un vert-pâle, avec une raie brune sur le dos, les stigmates d'un rouge-brun, la tête noire & marquée de deux taches vertes. On la trouve, dit-il, dans l'herbe. La chrysalide est longue, mince, couleur de paille obscure, & ne demeure en cet état que cinq à six jours. Il a aussi figuré un individu femelle de l'infécule parfait.

130. HESPERIE Plutargue.

HESPERIA Plutargus.

Hesperia alis fuscis, auro irroratis; anticis supra maculâ apicis, subtus margine exteriori testaceis.

Hesperia U. Plutargus, *alis integerrimis, fuscis, auro irroratis; anticis supra maculâ apicis, subtus margine exteriori testaceis.* FAB. Ent. Syst. ent. tom. 5. pars 1. p. 329. n.º 251.

Papilio Plutargus. JON. Fig. pict. 6. tab. 75. fig. 1.

Papilio Plutargus. DONOV. of an Epitom. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah. 5. pl. 4. fig. 5.

Elle est de la taille de l'*H. Metis*. Tout le dessous est noirâtre, avec un grand nombre de petits points ou d'atomes dorés; les ailes supérieures ont une tache à leur sommet. Le dessous des quatre ailes est plus pâle: le bord extérieur des supérieures est d'un fauve-jaunâtre; les inférieures ont un point & une raie plus foncés.

Elle se trouve aux Indes orientales.

131. HESPERIE Numitor.

HESPERIA Numitor.

Hesperia alis anticis supra fuscis, fulvo nitentibus; posticis thidem rufis-flavis, limbo externo fusco, infra flavoscentibus.

Hesperia

Hesperia R. Numitor, alis integerrimis, fuscis; posticis suprâ disco flavo, subtus totis flavis, immaculatis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. n^o. 228.

Papilio Numitor. JOX. Fig. piçl. 6. tab. 40. 324. fig. 2.

Papilio Numitor. DOXOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Insect. of Ind. 10. pl. 2. fig. 3.

Cette espèce, l'une des plus petites du genre, & qui a le port de l'*H. Aracynthus* & de quelques autres analogues, m'a été envoyée de Philadelphie par mon ami M. Lefueur. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & elles se terminent en une pointe très-petite. Le corps est noir en dessus & blanc en dessous. Le dessus des ailes supérieures est noirâtre, mais glacé, en grande partie, d'un fauve-luisant; leur dessous est noirâtre, avec le bord extérieur & le sommet jaunâtres; telle est aussi la couleur de la surface inférieure des secondes ailes; leur dessous est fauve, avec le limbe extérieur noirâtre.

132. HESPÉRIE Catullus.

HESPERIA Catulus.

Hesperia alis atris, suprâ sæpius punctorum alborum strigâ posticâ.

Hesperia U. Catullus, alis rotundatis, integerrimis; atris: anticis albo punctatis, posticis strigâ punctorum alborum. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 348. n^o. 323.

Papilio Catullus. JOX. Fig. piçl. 6. tab. 80. fig. 2.

Papilio Catullus. DOXOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. cah. 5. pl. 1. fig. 4.

Papilio P. U. Catullus. SMITH-ABBOT, Hist. nat. des lépid. de la Georg. tom. 1. p. 47. tab. 24.

Elle est petite. Le corps est noir, avec la tête blanche. Les ailes sont d'un noir-foncé, avec une ligne transverse de points blancs sur leur surface supérieure, à peu de distance du bord postérieur: les premières ont, en outre, d'autres petits points de cette couleur; ils sont en moindre nombre sur leur dessous & celui des secondes. J'ai reçu de l'Amérique septentrionale une variété où ces ailes sont même sans taches en dessus, & où les postérieures n'ont qu'un seul point blanc en avant de la raie formée par les autres; cette raie est commune aux deux surfaces. Dans un autre individu, ces points manquent entièrement, ou l'on n'en voit que quelques-uns & près du sommet des supérieures.

La chenille vit sur le *monarda punctata*. Elle est d'un vert-obscur, avec deux taches noires sur le premier segment; la tête est noire, avec deux points oculaires blancs.

Hist. Nat. Inf. Tome LX.

133. HESPÉRIE Hottentote.

HESPERIA Hottentota.

Hesperia alis anticis cinereo-fuscis, illarum latero interno posticisq; pallido-flavidis.

Cette nouvelle espèce a été recueillie dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande, naturaliste du Gouvernement. Elle est de la taille de l'*H. Métis*. Son corps est noirâtre, avec les palpes extérieurs gris & le dessous de la masse des antennes rouffâtre. Les ailes supérieures sont d'un noirâtre-clair ou presque cendré, avec une grande tache occupant la majeure partie du côté interne d'un jaunâtre très-pâle; ce côté, en dessous, est presque blanchâtre. Les ailes inférieures sont presque entièrement d'un jaunâtre-pâle. Les couleurs de l'individu que j'ai décrit étoient un peu altérées.

134. HESPÉRIE Lepeletier.

HESPERIA Lepeletier.

Hesperia alis fuscis; posticis subtilis lineis duabus albis, longitudinalibus, rectis: internâ abbreviatâ.

M. Amédée Lepeletier de Saint-Fargeau, bien connu des savans par des Mémoires d'entomologie, & surtout par son intéressante Monographie des insectes de la famille des tenthréidines, & qui, secondé par son ami M. de Serville, a bien voulu se charger de terminer cette partie de l'Encyclopédie, ne doit pas être oublié dans cette liste de naturalistes auxquels j'ai donné ici des témoignages de mon estime particulière.

Cette espèce a environ un pouce de largeur, les ailes étendues. Son corps & ses ailes sont noirâtres; les antennes sont annelées de blanc. Les ailes supérieures & le dessous des inférieures sont sans taches; mais le dessous de celles-ci est remarquable par deux lignes d'un beau blanc, dont l'extérieure part de la base, se termine au bord postérieur, entre son milieu & l'angle externe, & dont l'interne commence vers le milieu de la longueur de l'aile, & finit anssi au bord postérieur; l'une & l'autre sont parfaitement droites, fines, & de la même largeur partout.

Elle a été apportée de la colonie du Cap de Bonne-Espérance par feu de Lalande, naturaliste-vooyeur du Gouvernement.

135. HESPÉRIE l'Herminier.

HESPERIA l'Herminier.

Hesperia alis immaculatis, suprâ fuscis, subtus cinereo-fuscis; antennis albo annulatis.

M. l'Herminier, correspondant du Muséum d'histoire naturelle, & qui, par ses intéressantes communications, ainsi que par divers envois, a beaucoup

F I I I I

contribué aux progrès de cette science, a envoyé cette espèce de la Caroline. Elle n'a guère plus de neuf lignes d'envergure. Ses antennes font noires, avec des anneaux & une partie du dessous de la massue blanchâtres; le crochet terminal est d'un brun clair. Les ailes font noirâtres, mais plus pâles en dessous, ou tirant sur le cendré, & sans aucune tache. Nous avons vu que la description de *H. Pygmeé* de Fabricius pouvoit convenir à une variété de son *H. Najo*; elle s'applique encore à celle-ci.

B. Ailes inférieures sans prolongement ni sinus à l'angle anal (généralement plus larges & plus arquées au bord postérieur que dans les divisions précédentes; le noir & le blanc plus ou moins mêlés, dominant dans la plupart).

Nota. On pourroit mettre en tête de cette subdivision des espèces ayant les quatre ailes ou les inférieures au moins *ritrées*; telles que l'*H. Atacus* de Fabricius & le *P. Julietus* de Stoll, pl. 9, fig. 1.

a. *Ailes dentées.*

* *Dentelures des ailes assez fortes ou très-fenêtrées.*

136. HESPÉRIE de la Lavatère.

HESPERIA Lavatæræ.

Hesp. alis anticis flavidis, fuscis duabus pallidioribus maculisque fenestratis; posticis supra olivaceo-fuscis, albido punctatis; subtus albidis, serè immaculatis.

Papilio P. U. Alceæ, alis divaricatis, fusco cinereoque variis: anticis punctis fenestratis; posticis subtus cinereis, immaculatis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n°. 822.

Hesperia U. Alceæ. FAB. Ent. Syst. ent. tom. 3. part. 1. p. 551. n°. 554.

Papilio Alceæ. ROEM. Gen. Inf. tab. 19. fig. 6. 7.

Papilio Alceæ. PETAG. Inslit. Ent. tom. 1. p. 494. n°. 144.

Papilio P. U. Lavatæræ, alis denticulatis, divaricatis, supra pallidis, maculis majoribus albis fuscisque; subtus albidis. ESP. Pap. Eur. part. 1. p. 143. tab. 82. cont. 32. fig. 4.

Papilio Lavatæræ. BORKH. Pap. Eur. part. 1. p. 189 & 288. n°. 15.

Papilio Lavatæræ. SCHNEID. Syst. Besch. p. 279. n°. 179.

Papilio Lavatæræ. ILLIG. Magaz. tom. 3. p. 197.

Papilio Lavatæræ. BRAHM. Inf. Kalend. pag. 490.

Papilio Lavatæræ. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 83. n°. 171.

Papilio Lavatæræ. HUBN. Pap. tab. 90. fig. 454. 455. (Fæm.)

Papilio Lavatæræ. OCHSEN. Pap. Eur. tom. 1. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 288. pl. 75. Suppl. 21. fig. 98. d. e.

Hespérie de la Lavatère. LATR. nouv. Diç. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 14.

Hespérie de la Lavatère. GOD. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 232. pl. B b. XXVIII. fig. 7. 8.

Hespérie de la Lavatère. GOD. Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 64. n°. 190.

Elle ressemble beaucoup à l'hespérie de la *Guimauve*; mais le dessus de ses ailes supérieures est toujours jaunâtre, avec les deux bandes plus pâles. Le dessous de ses ailes inférieures est d'un ton blanchâtre qui rend les taches presque nulles, surtout chez le mâle.

Se trouve en mai & en juillet, dans le midi de la France, en Suisse, en Syrie, dans le sud de la Russie, &c.

Nota. Fabricius y a rapporté à tort la figure 5 de la planche 51 d'Esper. Cette figure représente exactement notre hespérie de la *Mauve*.

137. HESPÉRIE de la Guimauve.

HESPERIA Althææ.

Hesp. alis supra olivaceo-fuscis: anticis fuscis duabus transversis cæruleo-centi-griseis maculisque fenestratis; posticis utrinquè albo punctatis, subtusque cinerascens.

Papilio Althææ. HUBN. Pap. tab. 90. fig. 452. 453. (Fæm.)

Hespérie de la Guimauve. GOD. Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 230. pl. B b. XXVIII. fig. 5. 6.

Hespérie de la Guimauve. GOD. Tab. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 64. n°. 189.

Illiger & Ochsenheimer ont pris cette espèce pour une variété de l'hespérie de la *Mauve*.

Elle a de seize à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-olivâtre, avec deux bandes transverses d'un gris-bleuâtre aux supérieures; avec une dizaine de points blancs, dont l'antérieur basilaire est isolé, aux inférieures. Les premières ailes ont sept taches transparentes, savoir: trois échancrées & une linéaire sur la bande postérieure qui est en même temps dis-

coïdale, & trois quadrangulaires alignées obliquement vis-à-vis du sommet. Il y a en outre un trait blanc à chaque échancre du bord postérieur de toutes les ailes, & les traits de la troisième & de la sixième échancre sont doubles & plus longs que tous les autres.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que le fond des ailes est d'un cendré-brunâtre, & parce qu'il y a deux points blancs au lieu d'un à la base des inférieures. Les deux surfaces du corps sont à peu près du même ton que celles des ailes. Les antennes ont le dessus noirâtre & légèrement annelé de gris; elles ont le dessous blanchâtre, avec la moitié antérieure de la massue très-noire & terminée de ferrugineux.

Les deux sexes sont semblables.

Elle se trouve en mai & en juillet. M. Cotty de Brécourt & M. le capitaine Devilliers l'ont prise abondamment dans les fossés de la Rochelle.

138. HESPÉRIE de la Mauve.

Hesperia Malvæ.

Hesp. alis supra olivaceo-fuscis, fuscis tribus transversis rubido-griseis: anticis maculis fenestratiss: posticis subtus fuscescentibus, albedo punctatis.

Papilio P. U. Malvæ, alis dentatis, divaricatis, fuscis, cinereo undatis: anticis punctis fenestratiss: posticis subtus punctis albis. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 90. n. 321.

Hesperia U. Malvæ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 350. n. 333.

Papilio Malvæ. WIEN. Verz. p. 159. fum. A. n. 1.

ROES. Inf. part. 1. class. 2. Pap. diur. tab. 10. fig. 1-6.

Papilio Malvæ. BORRH. Pap. Eur. part. 1. p. 185 & 287. n. 10.

Papilio Malvæ. BORRH. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 297. n. 108.

Papilio Malvæ. BERGST. Nomenkl. tab. 40. fig. 6. 7. — tab. 91. fig. 1. 2.

Papilio Malvæ. HUFNAG. Tabell. in. Berl. Magaz. tom. 2. p. 66. n. 20.

Papilio Malvæ. ILLIG. N. Aufg. Dess. tom. 2. p. 142. n. 1.

Papilio Malvæ. SCHWARZ, Raupenkal. p. 40 & 180.

Papilio Malvæ. FUESSL. Alt. Magaz. tom. 1. p. 262.

Papilio Malvæ. ROSSI, Faun. Etr. tom. 2. p. 185. n. 1045.

Papilio Malvæ. ROSSI, edit. ILLIG. p. 252.

Papilio Malvæ. HUBN. Pap. tab. 90. fig. 450. 451.

Erynnis Malvæ. SCRANK, Faun. Boic. tom. 2. p. 157. n. 1277.

Papilio Malvæ. OCHSEN. Pap. Eur. edit. 1. p. 448.

Papilio Malvarum. OCHSEN. Pap. Eur. edit. 2. p. 195. n. 1.

Papilio P. U. Alceæ, alis denticulatis, fuscis, nigro maculatis: superioribus maculis pellucidis in apice tribus, in disco quatuor sparsis. ESP. Pap. Eur. part. 1. p. 4. tab. 51. cont. 1. fig. 3.

Papilio Alceæ. SCHLEFF. Icon. tab. 162. fig. 7. 8.

Papilio Alceæ. DEVILL. Ent. Linn. tom. 2. p. 85. n. 168.

Papilio Alceæ. SCHNEID. Syst. Besch. p. 276. n. 175.

Papilio Alceæ. BRAHM. Inf. Kalend. p. 488. n. 350.

Le Papillon Grifette. ENGRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 198. pl. 46. fig. 98. a. b. c.

Hespérie de la Mauve. LATR. nouv. Diction. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 14.

Hespérie de la Mauve. GOD. Hist. natur. des lépid. de France, tom. 1. p. 245. pl. 12. secund. fig. 5.

Hespérie de la Mauve. GOD. Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 64. n. 188.

Elle a de quinze à seize lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-olivâtre, avec trois bandes transverses d'un gris-rougeâtre, & les échancreures du bord postérieur blanchâtres. Les premières ailes ont en outre six petites taches transparentes, savoir: trois, linéaires & dont une flexueuse, éparées sur le disque; trois, quadrangulaires & à peu près égales, alignées obliquement vis-à-vis du sommet.

Le dessous des quatre ailes est un peu plus pâle que le dessus, & celui des inférieures offre des points blancs, dont l'antérieur solitaire, les autres formant deux rangées courbes & transversales. Le corps est approchant du même ton que les ailes. Les antennes sont noirâtres en dessus, blanchâtres en dessous, avec l'extrémité de la massue ferrugineuse.

La chenille est pubescente, d'un gris-cendré, avec la tête noire, & quatre points jaunes sur le premier anneau. Elle vit sur la mauve sauvage, la passe-rose ou rose-trémière. (*alcea rosea*), &c. Lorsqu'elle n'a point subi la métamorphose avant l'hiver, elle s'enferme dans la tige de la bardane ou de quelques chardons, & elle y reste

engourdie jusqu'au printemps. Geoffroy l'a prise pour la chenille de l'héspérie *Plain-chant*.

La chrysalide est d'un cendré-bleuâtre.

En mai & en juillet, dans les bois, dans les jardins, &c. Elle se trouve aux environs de Paris & dans toute la France.

*** Dentelures des ailes foibles ou à peine sensibles.*

159. HESPÉRIE EUCRATE.

HESPERIA Eucrate.

Hesp. alis fuscescentibus, albo punctatis: posticis subtus luteis, albido maculatis. OCHSEN.

Papilio Eucrate. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1. p. 215. n°.* 10.

Papilio Eucrate. ESP. *Pap. part. 1. tab. 124. cont. 79. fig. 6.*

N'ayant point vu cette héspérie, nous ne pouvons en parler que d'après M. Ochsenheimer, qui la compare pour la taille aux plus petits exemplaires du *Polyserchon*. (Voyez *Polyommata Amyntas*, n°. 146.)

Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec la frange d'un gris-obscur & entrecoupée de brun. Les supérieures ont plusieurs points blancs épars, entre lesquels il y a une petite lunule également blanche: les inférieures sont faiblement dentées, & elles ont quatre ou cinq points blancs, dont un basilaire, les autres disposés en une ligne transverse au milieu de la surface. Il y a en outre une série de points moins distincts avant le bord postérieur de toutes les ailes.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-vertâtre, mais plus clair aux bords antérieur & postérieur, avec le même dessus qu'en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un jaune-brunâtre, avec des atomes plus foncés, quelques taches blanchâtres à la base, une bande irrégulière de cette couleur au milieu, & des points pareillement blanchâtres vers le bord postérieur.

Du Portugal.

Nota. M. Ochsenheimer ne fait pas assez sentir les différences qui séparent cette héspérie de ses analogues; il avoit cependant des termes de comparaison dans le *Sao*, & dans l'*Alveolus* ou héspérie du chardon.

140. HESPÉRIE PROTO.

HESPERIA Proto.

Hesp. alis fuscis, fuscis maculari punctisque flavescens: posticis subtus brunneis, albido subsufficiatis punctisque. OCHSEN.

Papilio Proto. OCHSEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 210. n°.* 8.

Papilio Proto. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 123. cont. 78. fig. 5.* (Mas.) *fig. 6.* (Fæm.)

Nous ne connoissons point cette héspérie; mais d'après la description de M. Ochsenheimer, elle est presque aussi grande que le *P. Testatum* (le *Plain-chant*), & elle en diffère principalement en ce que les taches du dessus de ses quatre ailes sont d'un jaune-pâle au lieu d'être blanches; en ce que le dessous de ses ailes inférieures est d'un brun-jaunâtre & non verdâtre, & qu'il a le bord interne d'un jaune-clair.

Le mâle a en outre le dessus des ailes saupoudré de jaunâtre.

Du Portugal.

b. *Ailes très-entières ou sans dentelures.*

141. HESPÉRIE TAGES.

HESPERIA Tages.

Hesp. alis fuscis, utrinque strigâ marginali & punctis minutis albis: anticis supra fuscis duabus transversis cinerascens.

Papilio P. U. Tages, alis denticulatis, divaricatis, fuscis, obsolete albido punctatis. LANN. *Sysl. Nat. 2. p. 795. n°.* 268. — *Faun. Succ. edit. 2. p. 286. n°.* 1082.

Papilio P. U. Tages. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 92. n°.* 831.

Hesperia U. Tages. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 554. n°.* 546.

Papilio Tages. WIEN. *Verz. p. 159. fam. A. n°.* 2.

Papilio Tages. ESP. *Pap. Eur. part. 1. p. 306. tab. 25. fig. 5.*

Papilio Tages. ILLIG. *N. Aug. Dess. tom. 2. p. 145. n°.* 2.

Papilio Tages. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 204.*

Papilio Tages. SCHÆFF. *Icon. tab. 162. fig. 3. 4.*

Papilio Tages. BERGSTR. *Nomenkl. tab. 91. fig. 5. 4.*

Papilio Tages. LEWIN, *Inf. tab. 45. fig. 3. 4.*

Papilio Tages. BORKE. *Pap. Eur. part. 1. p. 188. n°.* 14.

Papilio Tages. BORKE. *Rhein. Magaz. tom. 1. p. 299. n°.* 112.

Papilio Tages. SCHNEID. *Sysl. Besch. p. 278. n°.* 178.

Papilio Tages. LANG. *Verz. 2. p. 60. n°.* 525-526.

Papilio Tages. BRAHM. *Inf. Kalcnd. p. 360. n°.* 240.

Papilio Tuges. ROSSI, *Faun. Etr. tom. 2. p. 159. n.º. 1045.*

Papilio Tuges. ROSSI, *edit. ILLIG. p. 253. n.º. 1045.*

Papilio Tuges. FUESSL. *Suiff. Inf. p. 52. n.º. 610.*

Papilio Tuges. CYRILL. *Ent. Neap. tab. 12. fig. 5.*

Papilio Tuges. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 495. n.º. 148.*

Papilio Tuges. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 81. n.º. 162.*

Papilio Tuges. HUBN. *Pap. tab. 91. fig. 456. 457. (Mas.)*

HUBN. *Larv. lepid. 1. p. 2. Gens E. fig. 1. a. b.*

Papilio Tuges. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Erynnis Tuges. SCHRANK, *Faun. Boic. tom. 2. p. 158. n.º. 1279.*

Papilio Geryon. NATURF. 6. p. 51. n.º. 19.

Papilio Morio, var. 1. SCOP. *Ent. Carn. p. 181. n.º. 464. (Il fait une fautive citation de Roësel.)*

Le Papillon Grifette. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 68. n.º. 39.*

Le Point d'Hongrie. ENGRAM. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 286. pl. 75. Suppl. 21. fig. 97. a. b. bis.*

Hespérie Grifette. LATR. *nouv. Diç. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 14.*

Hespérie Grifette. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 1. p. 241. pl. 12. secund. fig. 4.*

Hespérie Tugès. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 63. n.º. 187.*

Elle a environ quatorze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une lorie courbe & marginale de points blancs très-petits. Entre ces points & le milieu de la surface, les ailes supérieures ont deux bandes transverses d'un cendré-pâle, & les inférieures une ligne flexueuse de points blanchâtres peu prononcés. L'extrémité de la frange est grisâtre, principalement aux secondes ailes.

Le dessous diffère du dessus en ce qu'il est plus clair, & en ce que les ailes inférieures n'ont pas de bandes cendrées, du moins apparentes. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes ont le dessus noir & annelé de blanc, le dessous entièrement blanchâtre, avec la fommité de la massue ferrugineuse de part & d'autre.

Elle se trouve communément dans toute l'Europe, en avril, en juillet & en août.

La chenille, d'après les auteurs du Catalogue systématique des lépidoptères de Vienne, vit sur

le chardon-rouland (*eryngium campestre*) & sur le lotier corniculé ou tréfle jaune (*lotus corniculatus*). Elle est d'un vert-tendre, avec la tête brune, & des lignes longitudinales jaunes, ponctuées de noir.

La chrysalide est rougeâtre, avec l'enveloppe des ailes d'un vert-obscur.

142. HESPÉRIE du Sida.

HESPERIA SIDA.

Hesp. alis fuscis : anticis strigâ flexuosa à maculis quadratis albis, alterâque ante marginem obfoletâ : posticis subtus albis, maculâ bascos fasciisque duabus transversis luteis.

Papilio P. U. SIDA, alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis : posticis subtus cinereis, fasciis duabus flavis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 91. n.º. 825.*

Hesperia U. SIDA. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 351. n.º. 335.*

Papilio P. U. SIDA, alis denticulatis, divaricatis, fusco-virescentibus, albo-maculatis : inferioribus subtus fasciâ transversâ fulvâ. ESF. *Pap. Eur. part. 1. pag. 178. tab. 90. cont. 40. fig. 3.*

Papilio SIDA. BORKH. *Pap. Eur. part. 1. pag. 189. n.º. 16. — part. 2. p. 257.*

Papilio SIDA. ILLIG. *Magaz. tom. 3. p. 204.*

Papilio SIDA. PETAGNA, *Instit. Ent. tom. 1. p. 494. n.º. 145.*

Papilio SIDA. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. pag. 83. n.º. 172.*

Papilio SIDA. HUBN. *Pap. tab. 95. fig. 468. (Mas.)*

Papilio SIDA. OCHSEN. *Pap. Eur. tom. 1.*

Le Chamarré. ENGRAM. *Pap. d'Eur. tom. 1. p. 330. pl. 7. Suppl. 3. fig. 97. a. b. quart.*

Hespérie du Sida. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 219. pl. A a. XXVII. fig. 5. 6.*

Hespérie du Sida. GOD. *Tabl. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 62. n.º. 182.*

Elle est à peu près de la taille de notre hespérie *Plain-chant*, & elle lui ressemble par le dessus des quatre ailes, ainsi que par le dessous des supérieures.

Le dessous de ses ailes inférieures est blanc, avec une tache basilaire, & deux bandes transverses, d'un jaune-fauve. Les bandes sont bordées de noir & divisées par des nervures brunes. Il y a en outre quelques mouchetures noirâtres avant le bord postérieur.

Quelquefois les taches blanches du dessus des ailes inférieures sont peu distinctes.

Elle se trouve aux environs de Toulon, en Italie, en Hongrie, dans les contrées les plus méridionales de la Russie, &c.

143. HESPÉRIE Orbifère.

HESPERIA Orbifera.

Hesp. alis supra violaceo-fuscis, nitidis: anticis strigis duabus flexuosis è maculis albis: posticis subtus corticinis, maculis plurimis albis, mediis orbicularibus: sinibræ alarum anticarum interstitio albo ab apice ultimo latiore.

M. Franck de Strasbourg nous a envoyé cette hespérie comme espèce nouvelle & comme n'étant pas encore figurée.

Elle ressemble beaucoup à l'hespérie *Sao*; mais elle a le dernier, & non le troisième, entre-coupé blanc de la frange des ailes supérieures plus large que tous les autres. Le dessous de ses ailes inférieures, au lieu d'être d'un rouge-brûlé, est d'un brun-tanné-clair, & il a les taches de la rangée du milieu orbiculaires, ce qui a probablement fait imposer à cette espèce le nom sous lequel nous la donnons ici. Indépendamment de cela, le collier & l'aube sont verdâtres, tandis qu'ils sont d'un rouge-brûlé chez l'hespérie *Sao*.

De la Hongrie.

144. HESPÉRIE *Sao*.

HESPERIA Sao.

Hesp. alis supra violaceo-fuscis, nitidis: anticis strigis duabus flexuosis è maculis albis: posticis subtus testaceis, maculis plurimis albis, mediis irregularibus: sinibræ alarum anticarum interstitio albo ab apice tertio latiore.

Papilio Sao. HUBN. *Pap. tab. 95. fig. 471. 472.* (Frem.)

Papilio Sertorius. HUBN. *Text. p. 71. n. 8.*

Papilio Sao. ILLIG. *Mag. tom. 5. p. 205.*

Papilio Sao. OCASEN. *Pap. Eur. edit. 1. p. 459.*

Papilio Sertorius, alis subdentatis, divaricatis, fuscis, lunula mediâ maculisque albis: posticis subtus testaceis, albo maculatis, fasciatisque. OCASEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 211. n. 9.*

Papilio Fritillum. SCHREFF. *Icon. Nomenkl. Planz. p. 149. tab. 162. fig. 1. 2.*

Le Tacheté. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 7. Suppl. 5. fig. 97. c. d. tert.*

Hespérie *Sao*. LATR. *nouv. Diçl. d'Hist. nat. citil. 2. tom. 14.*

Hespérie *Sao*. GOD. *Hist. nat. des lépidop. de*

France, tom. 2. pag. 227. pl. B. b. XXVIII. fig. 3. 4.

Hespérie *Sao*. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 63. n. 186.*

Elle a de dix à onze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-violet-luisant, avec deux séries transverses de taches blanches, & la frange entre-coupée de blanc & de brun. La série antérieure des premières ailes est flexueuse & précédée de trois taches blanches, dont deux lunulées & se regardant par leur concavité, sur le disque; la troisième, en forme de point, vers le milieu du bord interne. La série antérieure des secondes ailes ne se compose le plus souvent que d'une petite ligne transversale & d'un point placé au-dessous de cette ligne, ce qui représente en quelque sorte un ! ou un point d'exclamation.

Le dessous des ailes supérieures est noirâtre, avec la côte jaunâtre, & des taches blanches répondant à celles du dessus.

Le dessous des ailes inférieures est d'un rouge-brûlé, plus ou moins foncé, avec des taches blanches, dont deux plus grandes sur la moitié postérieure du bord d'en haut. Ces taches forment trois rangées, & celles de la rangée du milieu sont irrégulières. Le corps est brun, avec un collier & l'aube d'un rouge-brûlé. Les antennes ont le dessus noirâtre & annelé de gris; le dessous blanc, avec la massue toute noire.

Le principal caractère distinctif de cette hespérie, c'est d'avoir le troisième entre-coupé blanc de la frange des ailes supérieures plus large que tous les autres.

Elle se trouve au printemps & en été dans l'Autriche, la Suisse, le midi & le centre de la France, &c. Elle habite aussi les environs de Paris, mais elle y est rare.

145. HESPÉRIE Plain-chant.

HESPERIA Tesselum (1).

Hesp. alis fuscis: anticis strigâ flexuosâ è maculis quadratis albis alterâque ante marginem obsoletâ: posticis subtus virescenti-fuscis, fasciis macularibus albis; maculâ marginali ab apice secundâ longiore intusque acuto-bifidâ.

Papilio Tesselum. OCASEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 205. n. 4.*

Hesperia Tesselum, alis subdentatis, divaricatis, fuscis, maculis quadratis punctisque albis: posticis supra puncto basæ fasciisque duabus macularum albarum; subtus virescentibus, puncto

(1) Les noms de *Tesselum*, *Fritillum*, *Aveus* & *Alveolus*, imposés par les auteurs à des espèces de cette division, ne peuvent guère se rendre en français que par les mots *davier* & *échiquier*, mots déjà employés pour désigner d'autres diurnes; c'est pourquoi nous les avons rendus par des équivalens.

bafcos, fufciâ mediâ maculisque marginalibus alôidis. OCHSEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 4. pag. 157. n^o. 3.*

Papilio Teffelum. HUBN. *Pap. tab. 93. fig. 469. 470. (Mas.)*

Papilio Carthami. HUBN. *Pap. tab. 143. fig. 726-723.*

Papilio P. U. Fritillum. (Var. major.) FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 91. n^o. 824.*

Hesperia U. Fritillum. (Var. major.) FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 331. n^o. 336.*

Le Plain-chant. GEOFF. *Hist. Inf. tom. 2. p. 67. n^o. 38.*

Le Bigarré. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. p. 350. pl. 7. Suppl. 3. fig. 97. quint.*

Hespérie Plain-chant. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2 (par correction), pag. 221. pl. 12. fig. 4. 5. (Le mâle.)*

Hespérie Plain-chant. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 62. n^o. 183.*

Cette hespérie répond, suivant nous, au véritable *Plain-chant* de Geoffroy & au *Fritillum var. major* de Fabricius.

Elle a de quatorze à quinze lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec deux séries transverses de taches blanches. La série antérieure des premières ailes est flexueuse, plus apparente, composée de taches carrées, & précédée intérieurement de deux autres taches blanches, dont une en forme d'i sur le disque, une ronde & souvent moins apparente vers le milieu du bord interne. Outre cela, la frange de toutes les ailes est entrecoupée de blanc & de brun, & il y a sur la côte des supérieures quatre petits traits blancs consécutifs.

Le dessous des ailes supérieures est d'un gris-noirâtre, avec des taches blanches comme en dessus, mais plus rapprochées, notamment celles du bord.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun-vertâtre, avec trois bandes blanches, transverses & maculaires, dont l'intermédiaire très-inégale; la postérieure marginale, mouchetée de noirâtre, excepté sur la seconde tache à partir de l'angle externe: cette tache est plus longue que toutes celles de l'extrémité, & elle a le founet ou le bout intérieur aigu & bifide. Les antennes sont noires & annelées de blanc; leur massue a le dessous d'un ferrugineux-foncé, caractère qui sert encore à distinguer cette espèce de l'hespérie *Fritillaire*.

Dans les prés & dans les jardins, au printemps & en été. Elle est commune aux environs de Paris.

Nota. Quoique nous n'ayons point vu le *P. Carthami* de Hubner, nous l'avons rapporté ici, parce

que M. Ochsenbeimer assure que c'est le même que son *Teffelum*.

146. HESPÉRIE Fritillaire.

HESPERIA Fritillum.

Hesp. alis fuscis: anticis ocello centrali strigâque flexuosâ à maculis quadratis albis: posticis subtis viriscenti-fuscis, fuscis macularibus albis; maculâ marginali ab apice secunda breviori intusque obtusâ.

Papilio P. U. Malvæ, alis denticulatis, divaricatis, nigris, albo maculatis. LINN. *Syst. Nat. edit. 12. tom. 2. p. 795. n^o. 267.*

Papilio P. R. Malvæ, alis denticulatis, divaricatis, nigris, albo punctatis. LINN. *Faun. Suec. edit. 2. p. 285. n^o. 1081. — Faun. Suec. edit. 1. p. 241. n^o. 794.*

ROZS. *Inf. part. 1. class. 2. Pap. diurn. tab. 10. fig. 7.*

Papilio Malvæ. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 23. fig. 2. a.*

Papilio Malvæ. DEVILL. *Ent. Linn. tom. 2. p. 80. n^o. 161.*

Papilio P. U. Fritillum, alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 91. n^o. 824.*

Hesperia U. Fritillum. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 331. n^o. 336.*

Papilio Fritillum, alis integris, divaricatis, fuscis: anticis maculis quadratis; posticis supra albedo, subtis viriscenti alboque varis. OCHSEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 207. n^o. 6.*

Hesperia Fritillum, alis fuscis, punctis albis anticis, fuscâ sinuatâ à maculis quadratis albis: subtis griseo-olivaceis, albo variegatis, fuscâ mediâ irregulari alvâ distinctiori. (Major.) J. W. DALMAN, *Extr. des Mém. de l'Acad. de Stockholm (année 1816), n^o. 7 du genre HESPERIA.*

Papilio Alveus. HUBN. *Pap. tab. 92. fig. 461. (Mas.) fig. 462. 463. (Fæm.)*

Le Plain-chant. ENGRAM. *Pap. d'Europe. tom. 1. pl. 46. fig. 97. c. d.*

Hespérie Plain-chant. LATR. *nouv. Dict. d'Hist. nat. édit. 2. tom. 14.*

Hespérie Fritillaire. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 225. pl. B. b. XXVIII. fig. 1. 2.*

Hespérie Fritillaire. GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 62. n^o. 184.*

C'est à cette hespérie que se rapportent, selon nous, le *Papilio Malvæ* de Linnæus, & le *Fritillum* proprement dit de Fabricius.

Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une série transverse de taches blanches carrées aux supérieures, avec deux séries moins distinctes aux inférieures. La série des ailes supérieures est flexueuse, & précédée intérieurement de quatre taches blanches, dont trois formant une sorte d'œil sur le disque, la quatrième avoisinant le milieu du bord interne. Outre cela, la frange de toutes les ailes est entrecoupée de blanc & de brun, & il y a sur la côte des supérieures quatre petits traits blancs consécutifs.

Le dessous des ailes supérieures est d'un gris-noirâtre, avec une série de taches blanches & un petit œil comme en dessus.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun plus ou moins verdâtre, avec trois bandes blanches, maculaires & transverses, dont l'intermédiaire très-inégale; la postérieure marginale, mouchetée de noirâtre, excepté cependant sur la seconde tache à partir de l'angle externe. Cette tache est moins longue que celles avec lesquelles elle s'aligne, & elle a le sommet, on si l'on veut le bout intérieur, obtus. Les antennes sont noires & annelées de blanc en dessus; elles sont blanchâtres en dessous, avec la massue d'un ferrugineux-jaunâtre.

Se trouve en juin & en août dans les lieux secs & incultes. Elle habite presque toute l'Europe, & elle est commune aux environs de Paris.

147. HESPÉRIE du Chardon.

HESPERIA Cardui.

Hesp. alis supra nigro-fuscis : anticis strigis tribus flexuosis à maculis albis : posticis subtus olivaceo-fuscis, maculis plurimis albis, mediâ costali multò majore.

Papilio Alveolus, alis integris, divaricatis, nigris, albo maculatis punctatisque : posticis subtus rufescentibus, maculis punctatisque albis. OCHSEN. *Pap. Eur. edit. 2. tom. 1. p. 208. n. 7.*

Papilio Alveolus. HUBN. *Pap. tab. 92. fig. 466. 467.*

Papilio Fritillum. HUBN. *Pap. tab. 464. 465. (Var. fien.)*

Papilio Alveolus. HUBN. *Pap. tab. 116. fig. 597. (Var.)*

Papilio Alveolus. ILLIC. *Mag. tom. 5. p. 185.*

Papilio Malvæ minor. ESP. *Pap. Eur. part. 1. p. 545. tab. 56. Suppl. 12. fig. 5.*

Papilio Malvæ, var. ESP. *Pap. Eur. part. 1. tab. 51. fig. 2.*

Hesperia Malvæ, alis nigris, punctis maculifque quadratis albis, numerosis : posticis subtus griseo-nigris, albo punctatis maculatisque,

maculæ marginis anterioris majore. (Minor.) J. W. DALMAN, *Ertrait des Mém. de l'Acad. de Stockholm (année 1816), n. 6 du genre HESPERIA.*

Papilio Altheæ. BORRH. *Pap. Eur. (Var.)*

Papilio Turus. BERGSTR. *tab. 91. fig. 5.6. (Var.)*

Papilio P. U. Lavateræ, alis integris, fuscis : anticis albo maculatis, posticis punctatis : omnibus lunulâ mediâ niveâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 91. n. 825. (Var.)*

Hesperia U. Lavateræ. FAB. *Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 553. n. 359. (Var.)*

Papilio P. U. Lavateræ. PETAC. *Instit. Ent. tom. 1. p. 494. n. 147. (Var.)*

Le Tacheté. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 7. Suppl. 3. fig. 97. a. b. tert.*

Le Plain-chant, var. ENGRAM. *Pap. d'Europe, tom. 1. pl. 46. fig. 97. g. h. (Var.)*

Hespérie du Chardon. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2 (par correction), pag. 229. pl. 12. secund. fig. 4.*

GOD. *Hist. nat. des lépid. de France, tom. 2. p. 255. OBSERVATION. (Var.)*

Hespérie du Chardon (*Alveolus*). GOD. *Tabl. méthod. des lépid. de France, DIURNES, p. 65. n. 185.*

Ce lépidoptère est pour M. Dalman le véritable *Papilio Malvæ* de Linnæus, attendu, selon lui, qu'il n'y a en Suède aucune autre espèce voisine avec laquelle on puisse le confondre. Nous n'adoptons pas provisoirement l'opinion de M. Dalman, parce qu'il nous semble bien étonnant que l'hespérie *Fritillaire* ou *Fritillum*, à laquelle nous avons rapporté ce même papillon *Malvæ*, n'habite pas la Suède, tandis qu'elle se trouve dans le nord de l'Allemagne & en Laponie; parce que d'ailleurs Linnæus, en citant les figures de Roësel & de Schæffer, & en assignant à son papillon *Malvæ* la même taille qu'à l'*Argus* proprement dit, nous paroît avoir eu en vue une espèce plus grande que celle dont il est ici question.

L'hespérie du Chardon a de dix à onze lignes d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noir, avec trois séries transverses de taches blanches aux supérieures, avec deux, dont l'antérieure plus courte aux inférieures. Les deux séries antérieures des premières ailes sont flexueuses, plus distinctes, composées de taches quadrangulaires, & séparées l'une de l'autre par une lunule centrale blanche. Indépendamment de cela, la frange de toutes les ailes est entrecoupée de blanc & de brun.

Le dessous des ailes supérieures est d'un brun-noirâtre, avec des taches blanches répondant à celles du dessus, mais un peu plus grandes.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun plus ou moins olivâtre, avec des taches blanches formant trois rangées transversales. La tache qui occupe le milieu du bord d'en haut est irrégulière & beaucoup plus grande que les autres. Le corps est d'un brun-noirâtre. Les antennes sont noires & annelées de blanc en dessus; elles sont blanches en dessous, avec la massue ferrugineuse.

Quelquefois le dessous des secondes ailes offre moins de taches blanches à la rangée du milieu, comme dans la variété femelle que Hubner a figurée sous le nom de *Fritillum*.

On rencontre assez souvent une autre variété chez laquelle les taches du milieu des premières ailes sont réunies de manière à former une large bande blanche sur laquelle il y a un espace noir marqué d'un croissant blanc. Cette seconde variété est, sans contredit, le *papilio Lavateræ* de Fabricius. Elle répond : au *P. Mulvæ*, var. d'Esper, au *P. Altheæ* de Borkhausen, au *P. Turas* de Bergstræller, au *P. Alveolus* de Hubner, tab. 116, fig. 597, & au *Plain-chant*, var. d'Eugranelle, pl. 46. fig. 97. g. h.

Dans les bois & dans les lieux arides, au printemps & en été. On la trouve communément aux environs de Paris. Elle se repose de préférence sur le *chardon à bonnetier*.

148. HESPERIE Vindex.

HESPERIA Vindex.

Hesperia alis anticis utrinque posticisque supra nigris; his subtus fuscis fusco-lutescentibus albidisque alternis, supra fasciâ subcentrali albâ; illis maculis plurimis sparjis punctorumque serie posticâ albis.

Papilio Vindex. GRAM. Pap. 30. pl. 253. G. H.

Son envergure n'est guère que de dix lignes. Le dessus du corps est noir; son dessous & les antennes sont blanchâtres. Le dessus des ailes supérieures est noir, avec quelques petits traits à la côte, sept à huit petites taches éparées sur toute la surface, dont les unes oblongues & les autres arrondies & même punctiformes, & une rangée de points près du bord postérieur, blancs; le dessous offre le même dessin, mais la côte & le sommet sont d'un cendré-jaunâtre-pâle, & le noir du fond est moins foncé. Le dessus des ailes inférieures est noir, avec une petite bande oblique, maculaire ou divisée intérieurement, & la frange postérieure, blanches; entre elle & la bande, l'on voit aussi des taches de cette couleur, tantôt rares & peu apparentes, tantôt nombreuses & disposées en une série. Le dessous de ces ailes est blanchâtre & même tout-à-fait blanc au bord interne; mais cette couleur est divisée alternativement & traieusement, en manière de bandes, par une teinte d'un jaunâtre-obscur, formant trois bandes,

Hist. Nat. Inf. Tome IX.

& dont les deux de la base convergent & se réunissent intérieurement; le limbe postérieur, ou la dernière bande, est d'un gris-jaunâtre.

Elle se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

149. HESPERIE Galba.

HESPERIA Galba.

Hesperia alis fuscis, subtus dilutioribus; omnibus punctorum serie duplici posticâ, anticis maculis plurimis sparjis, posticis fuscis duabus, albis.

Hesperia U. Galba, alis integris, divaricatis, nigris, albo punctatis: posticis subtus griseis, fuscis duabus albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 352. n. 557.

C'est, de toutes les espèces que je connois, la plus petite de ce genre. Le corps est varié de noirâtre & de blanc. Les ailes sont noirâtres, luisantes, d'une teinte plus claire en dessous, particulièrement sous les inférieures & au bord extérieur des supérieures, & entièrement tachetées ou ponctuées de blanc, sur les deux surfaces; leur limbe postérieur offre deux séries transverses de points, dont la dernière entrecoupe la frange. Sur les ailes inférieures, les taches qui précèdent forment deux bandes transverses, dont la seconde, placée près du milieu, est plus grande & même continue en dessous. Parmi les taches des ailes supérieures, trois d'entre elles sont rangées, à partir de la base, en une série longitudinale; qu'avec d'autres très-petites & coniguës forment une petite ligne transverse, près de cette côte, à la suite des précédentes.

Cette espèce pourroit bien être le *P. Spio* de Linnæus. (Voyez les remarques sur des espèces douteuses ou inconnues, terminant ce genre.) On la trouve à Tranguébar & au Bengale.

150. HESPERIE Syrichtus.

HESPERIA Syrichtus.

Hesperia alis supra nigris, pube, maculis tessellatis dispositis strigose costalibus albis; anticis subtus serie concoloribus; posticis ibidem albis, strigis undatis nigris; omnium limbo postico utrinque albo punctato.

Hesperia U. Syrichtus, alis rotundatis, integris, nigro alboque varis; posticis subtus cinereis, strigis undatis nigris. FAB. Ent. Syst. tom. 3. pars 1. p. 549. n. 526.

Papilio P. U. Syrichtus. Mant. Inf. tom. 2. p. 92. n. 816. — *Spec. Inf. tom. 2. p. 157. n. 634.* — *Syst. Ent. p. 554. n. 593.*

Papilio Orcus. GRAM. Pap. 28. pl. 554. 1-5.

Linnæus, dans son *Système Naturel* (tom. 2. p. 795.) avoit décrit sous le nom spécifique d'*Orcus*

leus, une espèce de polyommate trouvée à Alger. Cramer l'a faullement citée pour l' synonyme de son papillon *Orcus*, & Fabricius, à partir de son *Mantissa*, a continué de reproduire cette erreur.

Cette hespérie a environ un pouce d'envergure. Les antennes sont noires, avec des anneaux blancs, & se terminent par une massue arquée & peu pointue. Le corps est varié de noir & de blanc. Le dessus des ailes est d'un noir plus ou moins foncé, mais tout coupé par une infinité de petites taches, formant pour la plupart, & notamment pour les inférieures, des séries transverses; le bord postérieur est noir, avec une ligne transversée de points blancs; la frange est entrecoupée alternativement de mêmes couleurs; les deux bords de la côte des ailes antérieures sont blancs & forment ainsi deux raies longitudinales; au bout sont aussi des lries de cette couleur, mais très-courtes & obliques. Le dessous de ces ailes diffère peu du dessus; mais celui des inférieures est en majeure partie blanc ou blanchâtre & coupé transversalement par des lignes noires, très-flexueuses, & qui généralement rapprochées deux par deux, y forment des bandes transverses. Leur bord postérieur, ainsi que celui des supérieures, vu du même côté, n'offre qu'une ligne noire, très-fine, au-dessus de laquelle est la rangée dont nous avons parlé.

Elle se trouve au Brésil, à Cayenne & à Surinam.

151. HESPÉRIE TRYXUS.

HESPERIA TRYXUS.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis, fuscis transversis à maculis variis, angulosis, compositis; posticis subtus alvidis, punctorum fuscorum serie terminali.

Papilio Tryxus. CRAM. *Pap.* 28. pl. 554. G. H.

Elle avoient évidemment les *H. Syrichtus*, *Arfalte*, & plus spécialement encore le *P. Afychis* de Cramer. Les ailes supérieures & le dessous des inférieures sont noirâtres; leur milieu offre une bande commune & transversée, d'un blanc-transparent, & formée de taches de grandeur & de forme diverses, & la plupart anguleuses: celles des ailes inférieures semblent y être divisées en deux séries; deux des supérieures, celle du milieu surtout, sont plus grandes. Les premières ailes ont de plus une ligne de points transparents, située, comme à l'ordinaire, près de la côte, avant le sommet; près de leur base est encore un autre point transparent, mais isolé; dans quelques individus, les ailes inférieures offrent son correspondant. En dessous, ces ailes sont blanchâtres, avec une rangée de petites taches noirâtres, triangulaires ou presque lunulées, près du bord postérieur. Celui des ailes supérieures pré-

sente aussi, sur la même surface, les vestiges de taches semblables & disposées de même; le côté interne est blanchâtre.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

152. HESPÉRIE ARFALTE.

HESPERIA ARFALTE.

Hesperia alis albis, margine postico nigro-fusca.

Hesperia U. Menalcas, *alis integerrimis concoloribus, albis: margine nigra.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 555. n. 340.*

Papilio P. U. Menalcas. *Mant. Inf. tom. 2. pag. 91. n. 826. — Spec. Inf. tom. 2. pag. 158. n. 659. — Syst. Ent. p. 555. n. 397.*

Papilio P. D. Arfalte, *alis integerrimis, rotundatis, albis: stris marginalibus nigris; anticis basi flavescensibus.* LINN. *System. Nat. ed. 12. tom. 2. p. 762. n. 91. — Mus. Lud. Ulr. p. 246. n. 265.*

Papilio Arfalte. CLERCK, *Icon. Inf. tab. 23.*

Papilio Niveus. CRAM. *Pap. 2. pl. 22. C.*

Je rends à cette espèce le nom que Linnæus lui avoit imposé, & que Cramer & Fabricius auroient aisément reconnue si, sans-avoir égard à la division où il l'avoit placée, ils avoient lu la description qu'il en donne, & consulté la figure de Clerck, à laquelle il renvoie.

L'envergure des ailes de cette espèce est de près d'un pouce & demi. Les antennes sont noires & terminées en une massue simplement arquée. Le corps est noir, mais couvert en majeure partie de poils ou d'écaillés blanches. Les ailes sont d'un blanc-chatoyant, avec une ligne fine le long du bord postérieur, & d'autres lignes qui la coupent presque perpendiculairement en manière de lries, & formées par les extrémités postérieures de nervures, noires ou noirâtres; cette couleur s'étend davantage au sommet des ailes supérieures, en sorte que cet espace, & même la portion avoisinant la côte, présente alternativement des raies noires & des raies blanches, & le plus souvent aussi une rangée de points blancs au-dessus de la ligne noire du bord postérieur. On voit encore quelquefois une rangée semblable de points près du bord postérieur des inférieures; sur le dessous de ces ailes, plusieurs des nervures longitudinales, particulièrement la plus extérieure, sont noires dans presque toute leur étendue. La côte des ailes supérieures est quelquefois noirâtre antérieurement; en dessous, elle est toujours rouillée à son origine.

Elle se trouve au Brésil & dans toute la Guyane. N. B. Fabricius rapporte avec doute à son *H. Maimon*, la figure précitée de Cramer; mais il est bien évident que ce sont deux espèces très-

diffinées. Celle de Fabricius se rapprocheroit davantage des papillons *Afychis* & *Trynus* de ce dernier, *Pap.* 23, pl. 554, E-II; mais il nous est impossible, dans ce moment, de prononcer à cet égard: il en sera de même de son *H. Menippus*. Ne pouvant, d'après les seules descriptions, faire ressortir, par opposition, les caractères de cette espèce, nous sommes forcés de les exclure du tableau.

153. HESPERIE Diofcoride.

HESPERIA Diofcorides.

Hesperia alis suprà fuscis, strigis duabus, macularibus, flavis; anticis infra fulvis, disco fusco flavo maculato; posticis subtus flavis, fusco undatis.

Hesperia U. Diofcorides, *alis integerrimis, flavo maculatis; posticis subtus flavis, fusco undatis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 329. n.º. 250.*

Elle est une fois plus petite que l'*H. Métis*. Son corps & le dessus des ailes sont noirâtres. Cette surface offre sur les unes & les autres deux raies jaunes; le milieu des supérieures, en outre, un point de cette couleur; leur dessous est fauve, avec le disque noirâtre, tacheté de jaune. Le dessous des inférieures est de cette couleur, avec plusieurs ondulations noirâtres.

Elle se trouve à Tranquebar.

Il nous paroît que cette espèce a de grands rapports avec le *P. Edipus* de Cramer, *Pap.* 31, pl. 166, E, F, & qu'il lui est du Cap de Bonne-Espérance.

154. HESPERIE Mævius.

HESPERIA Mævius.

Hesperia alis suprà nigris, lineis fasciâque maculari flavescens; subtus virescentibus, strigis maculisque albis.

Hesperia U. Mævius, *alis integris, suprà nigris, subtus virescentibus, utrinque lineis maculâque albidis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 352. n.º. 338.*

Suivant Fabricius, elle a le port & la grandeur de l'*H. Galba*. Ses antennes sont noires, avec des anneaux blancs. Le dessus des ailes est noir, & celui des supérieures offre à sa base deux ou trois lignes jaunâtres, & postérieurement une bande maculaire de cette couleur. Le dessus des inférieures ne diffère du précédent qu'en ce que sa base n'a qu'une seule ligne. Le dessous des quatre ailes est verdâtre, avec des stries & des taches blanches.

Elle habite les Indes orientales.

155. HESPERIE Cicéron.

HESPERIA Cicero.

Hesperia alis fuscis; anticis maculis, posticisque disco subhyalino-albis; harum maculâ discoidali dentatâ, subtus maculâ fuscâ notatâ.

Hesperia U. Cicero, *alis rotundatis, fuscis; anticis maculis, posticis disco albo-hyalinis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 356. n.º. 287.*

Papilio Fulus. CRAM. *Pap.* 7, pl. 74, F.?

Cette espèce, de grandeur moyenne, a le corps noirâtre en dessus & blanc en dessous. Les ailes sont noirâtres, un peu plus claires en dessous, & même un peu brunes, du moins dans quelques individus, au côté externe, & tachetées de blanc; ces taches sont demi-transparentes; il y en a cinq sur les supérieures, deux au milieu, & dont l'inférieure, plus grande & échancrée au côté interne, & les trois autres petites, disposées en triangle entre les précédentes & le sommet. La plus voisine de la côte est partagée en trois par des nervures. Les inférieures n'ont qu'une seule tache blanche, elle occupe tout le milieu de leur surface, & ses bords sont dentés; en dessous elle est plus anguleuse, semble se prolonger vers la base, & offre vers le côté interne une tache noirâtre, arrondie, ayant extérieurement un petit prolongement en manière de queue. Sur le limbe noirâtre, du côté extérieur, est un point blanc; le côté opposé est grisâtre, & cette couleur s'étend même au-dessous de la tache discoidale, & gagne l'autre bord. Le bord postérieur des quatre ailes est entrecoupé de petites taches blanches.

Elle se trouve à Java. Le *P. Fulus* de Cramer, vu en dessus, ressemble parfaitement à cette espèce; mais il le dit de Surinam.

156. HESPERIE Népos.

HESPERIA Nepos.

Hesperia alis anticis utrinque posticisque suprà fusco-nigris, maculis punctive atris; illis albo-hyalino punctatis; his, latere externo excepto, subtus albis, suprà ad angulum ani cinerascens, fimbriâ posticâ albâ.

Hesperia U. Nepos, *alis rotundatis nigris; anticis albo punctatis, posticis suprà angulo ani, subtus disco albis.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 340. n.º. 292.*

Papilio Nepos. JOX. *Fig. piñ. 6. tab. 79. fig. 2.*

Papilio Japetus. CRAM. *Pap.* 51, pl. 565, E. F. DAUB. *Inf. tom. 5. pl. 17. fig. 1. 2.*

Elle est de la taille de l'*H. Cicéron*. Le corps est noirâtre en dessus & blanc en dessous. Les antennes sont noires, avec la massue grêle, allongée, arquée & en partie brune. Les ailes supérieures & le dessus des inférieures sont d'un noirâtre-foncé, avec des taches & des points noirs, qui paroissent davantage sur celles-ci. Les supérieures

ont de petites taches, la plupart en forme de points blancs & transparents; il y en a trois au milieu, dont la supérieure, la plus grande de toutes, est échancrée de chaque côté; les autres, toutes punctiformes, sont au nombre de quatre, & forment une petite ligne transverse & arquée près de la côte, avant le sommet; l'espace situé au dessous de ces taches est un peu plus clair. En dessus, les ailes inférieures sont plus foncées ou noires au côté extérieur; leur disque offre trois petites taches arrondies, de cette couleur, & disposées transversalement en arc de cercle; le limbe postérieur, vers l'angle anal, est cendré; la frange postérieure est blanche; le dessous est de cette couleur, mais avec une teinte bleuâtre: le côté extérieur est noirâtre & plus foncé vers sa jonction avec le bord postérieur; près de ce bord est une ligne noirâtre interrompue, ou divisée en trois ou quatre points noirs; on voit aussi près du côté extérieur trois autres points de cette couleur, mais plus grands. L'intermédiaire surtout, plus ronds, & disposés en une série longitudinale.

Elle se trouve à Java, à l'île d'Amboine, &c., & n'a été envoyée par M. Roger, de Bordeaux, & par M. Wellermann, naturaliste anglais qui a enrichi ma collection d'un grand nombre d'espèces des Indes orientales.

157. HESPERIE Philéon.

HESPERIA Philemon.

Hesperia alis immaculatis, supra holosericeo-atris, nitidis, subtis brunneo-fuscis, anticarum margine interno dilutiore; antennis alboannulatis.

Hesperia U. Philemon, *alis rotundatis, integris, atris, immaculatis, antennis uncinat. s.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 546. n. 514.*

Papilio P. U. Philemon. *Mant. Inf. tom. 1. p. 89. n. 812. — Spec. Inf. tom. 2. p. 156. n. 651. — Syst. Ent. p. 534. n. 592.*

Papilio Flyas. CRAM. *Pap. 28. pl. 528. E.*

DRUR. *Inf. tom. 1. pl. 19. fig. 5. 6.*

Elle est de taille moyenne, entièrement noire, à l'exception de la surface inférieure des ailes qui est d'un noirâtre-brun & plus clair au côté interne des ailes supérieures. Les antennes sont finement annelées de blanc.

Elle se trouve au Brésil & aux Antilles.

Dans le *P. Corbulo* de Cramer, *Pap. 30. pl. 554. A.*, espèce très-voisine, le limbe postérieur & supérieur des ailes est plus clair & un peu bléâtre; le dessous des ailes inférieures est d'un brun-bleu.

Une autre espèce de Cramer, venant près de celles-ci, est son *P. Otreus*, *Pap. 28. pl. 528. F.* Ses ailes sont d'un brun-noirâtre, avec des bandes plus foncées, & ondulées.

L'île de Java fournit une autre espèce semblable (*nigrita*) à la précédente, mais d'une teinte entièrement uniforme.

158. HESPERIE Jovien.

HESPERIA Jovianus.

Hesperia alis anticis nigris, fasciâ maculari, albo-hyalinâ; posticis caruleis, fasciâ albâ, r. nis limboque externo nigris.

Hesperia U. Jovianus, *alis concoloribus, atris; posticis caruleo alboque radiatis.* FAB. *Entom. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 548. n. 524.*

Papilio Jovianus. JON. *Fig. pi. 6. tab. 93. fig. 2.*

Papilio Jovianus. DONOV. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 3. pl. 1. fig. 1.*

L'envergure de cette espèce est d'environ seize lignes. Son corps est varié de noir, de bleuâtre & de blanc. Dans les individus mâles, les palpes extérieures sont presque safranés, tandis que ceux des femelles ou du moins de quelques autres individus sont blancs. Les ailes supérieures présentent aussi des différences. Leur milieu offre constamment une bande courte, transverse, oblongue, blanche & transparente, composée de trois à quatre taches, dont une très-petite, occupant la bifurcation d'une nervure transverse, & située vers le milieu du bord postérieur de cette bande; mais quelques individus (les femelles, à ce qu'il me parait) ont, en outre, avant le sommet, une ligne transverse de quatre points blancs & transparents. Le limbe postérieur a sur les deux surfaces une rangée plus ou moins prononcée de taches linéaires ou de petites lignes parallèles, blanches; on en voit d'autres, en forme de rayons, à la base de ces ailes, dans les individus mâles, ou ceux où les points blancs du bout manquent. Le disque des ailes inférieures présente, entre leur base & le centre, une bande transverse de taches blanches, longues, étroites; dans les individus mâles, il n'y a qu'une seule tache blanche, & en forme de bande longitudinale, oblique & elliptique; elle est assez rapprochée du bord extérieur, part de la base & se termine au limbe postérieur.

Cette jolie espèce n'a été envoyée du Brésil par M. Langléboill.

159. HESPERIE Salvien.

HESPERIA Salvanus.

Hesperia alis supra fuscis, viridi maculatis; posticis subtis albis, punctorum fuscorum strigâ marginali.

Hesperia U. Salvanus, *alis integerrimis, fuscis, viridi maculatis; posticis subtis albis, strigâ marginali punctorum fuscorum.* FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 548. n. 525.*

Papilio Salvianus. Jox. Fig. piç. 6. tab. 94. fig. 4.

Papilio Salvianus. DONOV. *of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind.* 5. pl. 1. fig. 2.

Cette espèce est de moyenne grandeur & a le dessus du corps & des ailes noirâtre; près de leur bord postérieur est une rangée de points plus foncés. Le dessus des ailes inférieures présente deux bandes maculaires vertes, mais dont la postérieure plus étroite & en forme de raie; le milieu du dessus des supérieures est traversé d'une bande de la même couleur, & offre en outre, près de la base & du sommet, des taches pareillement vertes. Sur le dessous de ces ailes est une large bande blanche; celui des inférieures est de la même couleur, avec une rangée de points noirâtres.

On la trouve aux Indes.

160. HESPERIE JUVÉNAL.

HESPERIA JUVENALIS.

Hesperia alis diluto-fuscis: limbo postico punctorum albidorum fuscorumve subocellatorum strigis; alis anticis punctorum hyalinorum, fusco marginatorum serie transversa.

Hesperia U. Juvenalis, alis ecaudatis, fuscis: anticis atro maculatis alboque punctatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 555. n° 291.*

Papilio Juvenalis. Jox. Fig. piç. 6. tab. 78. fig. 1.

Papilio Juvenalis. SMITH-ANNOT. *Hist. Nat. des Lépid. de la Georg. tom. 1. p. 41. tab. 21.*

Elle a quelque analogie avec notre *H. Tages*, & plus encore avec le *P. Bromius* de Stoll, *Suppl. pl. 8. fig. 1.* Son envergure est d'environ un pouce & demi. Le fond de la couleur des ailes est d'un noirâtre-brun, tantôt plus clair, tantôt plus foncé; leur limbe postérieur offre deux ou trois lignes transverses de petites taches arrondies, blanchâtres, bordées de noirâtre; lorsque le fond est plus clair, plusieurs de ces taches, & particulièrement celles de la rangée antérieure des ailes inférieures, deviennent oculaires; cette rangée est courbe ou sinuée; elle est remplacée sur les ailes supérieures par des points transparens, au nombre de cinq à sept, variant en grandeur, & dont la série est interrompue au milieu; en avant & près du milieu de la côte est un autre point transparent. La masse des antennes est insensiblement arquée & rouflée.

La chenille est verdâtre, avec le dessus de la tête bise ou bicornue. Elle vit sur la *glycine elliptica* & quelques autres plantes. Cette hespérie paroît donner deux fois.

Elle se trouve en Georgie & dans d'autres contrées de l'Amérique septentrionale; elle vient

souvent près des maisons, & fréquente les lieux humides ou les bords des courans d'eau.

161. HESPERIE MIMAS.

HISPERIA MIMAS.

Hesperia alis fuscis, margine postico ferrugineo, subtus punctorum nigrorum, strigâ; anticis punctis tribus approximatis albis.

Hesperia U. Mimas, alis integerrimis, fuscis, margine ferrugineis, strigâ punctorum nigrorum. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 549. n° 529.*

Papilio P. U. Mimas. Mant. Inf. tom. 2. pag. 90. n° 619. — Spec. Inf. tom. 2. p. 157. n° 616.

Papilio Mimas. CRAM. *Pap. 5. pl. 52. E. F.*

Cette petite espèce est très-voisine du *P. Bromius* de Stoll, de l'*H. Juvénal*, &c. Les ailes sont noirâtres, avec des taches ou des lignes transverses plus foncées, & le bord postérieur d'un brun-fauve; en dessous, cette couleur s'étend davantage, & l'on y observe une raie traversée de points noirâtres. Les ailes supérieures ont près du sommet trois points blanchâtres rapprochés en triangle.

Elle se trouve à Surinam & au Brésil.

162. HESPERIE NERVA.

HESPERIA NERVA.

Hesperia alis anticis supra fuscis, maculis albis alisque marginalibus cinereis; posticis ibidem atris, immaculatis; omnibus subtus flavescenscentibus, maculis albis nigraeque.

Hesperia U. Nerva, alis integerrimis; anticis fuscis, albo maculatis, posticis supra nigris, immaculatis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 540. n° 295.*

Papilio Nerva. Jox. Fig. piç. 6. tab. 79. fig. 5.

Je n'ai point vu cette espèce. Selon Fabricius, son corps est petit & nonové. Notre phrase spécifique comprend les autres détails descriptifs. Elle ne paroît avoir beaucoup de rapports avec le *P. Paulinus* de Cramer, *Pap. 55. pl. 591. G. H.*

Elle se trouve aux Indes.

165. HESPERIE ORCUS.

HESPERIA ORCUS.

Hesperia alis anticis posticisque supra fuscis; illis punctis maculique lunata nitris; his fuscis superis infraque caeruleiscentibus.

Hesperia U. alis rotundatis fuscis: anticis flavo maculatis, posticis subis caeruleiscentibus. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 541. n° 296.*

Papilio Orcus. Jox. Fig. piç. 6. tab. 91. fig. 4.

Papilio Orcus. DONOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 11. pl. 4. fig. 1.

Papilio Cerialis. GRAM. Pap. 53. pl. 392. N. O.

STOLL, Suppl. aux Pap. de GRAM. pl. 10. fig. 1.

Le dessus du corps de cette hespérie est noir, avec des taches & des raies blanches; son dessous est blanchâtre. Les ailes supérieures sont d'un noirâtre-foncé, avec de petites taches & des points vitrés, entre le milieu & le sommet; la plus antérieure de ces taches est plus grande, presque en forme de fer-à-cheval, dont l'échancrure regardant le bord postérieur, & surmontée d'un point; on distingue près ce bord les traces d'une raie bleuâtre; en dessous la côte est aussi, à sa base, de cette couleur. Le dessus des ailes inférieures est noirâtre, avec trois bandes parallèlement bleuâtres, dont l'antérieure plus large, & offre souvent, dans son milieu, un point noirâtre; le dessous de ces ailes est d'un bleu plus vif, avec le limbe extérieur noirâtre, & traversé au bord postérieur par une ligne bleue.

Sa chenille, suivant Stoll, vit sur une espèce de poivrier. Elle est d'un vert-sale, avec la tête brune, une tache sur chaque côté de ses anneaux, & deux lignes le long du ventre blanches.

Elle ne reste qu'environ sept jours en chrysalide.

Près de cette espèce doivent être placés le *P. Jovienus* de Cramer, *ibid.* pl. 592 L. M., dont les ailes inférieures sont presque entièrement bleues des deux côtés, son *Herenius*, E. F. de la même planche, ainsi que le *P. Ophion* de Stoll, pl. 26, fig. 4. Nous pensons aussi que l'hespérie *Tentulin* de Fabricius (*Ent. Syst. tom. 3. pars 1. p. 541. n.º 295*) ne doit pas en être éloignée. Le dessus de ses ailes est d'un blanchâtre-foncé, avec des points plus obscurs; les supérieures ont quelques points transparents.

Ces espèces habitent l'Amérique méridionale.

164. HESPÉRIE Chlorocéphale.

HESPERIA Chlorocephala.

Hesperia alis nigro fuscis, fuscis macularibus atris; posticis infra intus cineriscentibus; palpis capitique vertice squamis viridibus, muticibus.

M. Laugsdorff, qui m'a envoyé cette espèce découverte par lui au Brésil & dans les environs de son habitation, avoit remarqué qu'elle diffère des autres par les écailles ou poils d'un vert doré & brillant de l'extrémité de ses palpes extérieurs & du sommet de la tête. Elle est petite. Ses ailes sont en dessus quelques zones cendrées, peu prononcées & formées de petits atomes. Leur dessous est un peu plus clair & celui des inférieures

est, vers le bord interne & jusqu'à l'angle anal, une teinte cendrée ou d'un brun-jaunâtre, avec des taches ou des points plus foncés.

Cette espèce est très-voisine du papillon *Herenius* de Cramer, 53, pl. 392, E, F, dont j'ai parlé à la suite de la description de l'espèce précédente.

2. *Ailes supérieures ayant soit la côte très-arrquée, soit l'angle du sommet avancé en manière de crochet ou de joule.*

Nota. Palpes extérieurs proportionnellement moins épais, plus cylindriques, plus avancés, avec le dernier article plus grand que dans les autres divisions, quelques espèces de la précédente cependant exceptées. Souvent les ailes inférieures paroissent comme tronquées, ou ayant le bord postérieur très-dilaté, présentent vers l'angle anal une concavité remarquable. Dans d'autres, leur côté extérieur est anguleux ou denté, & elles ressemblent alors à celles de quelques phalènes.

Ces espèces, toutes propres au Brésil & à la Guyane, représentent, dans cette tribu, les *Pyrales* ou les *Phalènes rouleuses* (*tortices*) de Linnæus.

A. *Bord postérieur des ailes supérieures presque droit ou sans courbure notable ni angle: le sommet point avancé brusquement en manière de dent ou de crochet.*

Nota. Les deux espèces qui composent cette division, faisant le passage de la précédente à la suivante, sont par-là même ambiguës. Dans la seconde espèce, la côte des ailes supérieures est peu arrquée; mais, par la forme des inférieures, elle se rapproche des dernières espèces.

a. *Côté extérieur des ailes inférieures sans dents.*

165. HESPÉRIE Melandre.

HESPERIA Melander.

Hesperia alis albidis, strigis, maculis nervisque plurimis fuscis, tubum posticum basinque sicipius obscurantibus; anticis punctis aliquot hyalinis.

Papilio Melander. GRAM. Pap. 25. pl. 270. H.

Cette espèce a beaucoup d'affinité, tant par la forme des antennes que par les couleurs, avec les *H. Syrictus*, *Asfule* & autres analogues, & paroît appartenir, à raison de la courbure de la côte des ailes antérieures, aux espèces de notre dernière division; leur sommet cependant ne se termine point en manière de crochet ou de dent, comme dans *H. Scaldus*, &c.

Les ailes sont d'un blanchâtre-luisant, particulièrement en dessous & au milieu de la surface

supérieure ; cette couleur est coupée transversalement par des lignes ondulées, des taches ou des points disposés en séries transverses, & par des nervures d'un noirâtre tirant sur le brun : cette couleur domine quelquefois sur les ailes supérieures. Près de leur sommet est une série transverse de quatre points transparens, mais qui, dans des individus plus clairs, sont moins tranchés ou peu apparens. Le limbe postérieur est tantôt d'un brun-noirâtre, avec des rangées de taches blanchâtres ou d'un brun-pâle, tantôt presque blanchâtres, avec des lignes de tac. es noirâtres.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

b. *Côté extérieur des ailes inférieures ayant une dent forte & aiguë.*

166. HESPÉRIE Néarque.

HESPERIA Nearchus.

Hesperia alis supra fuscis, subtus pullis, utrinque lineis saturationibus.

Hesperia Nearchus. LATR. *Rec. d'observat. de Zool. & d'Anat. comp. de MM. DE HUMBOLDT & BONPL.* part. 2. p. 135. pl. 45. fig. 3. 4.

Son envergure est d'environ deux pouces ; le crochet de leurs antennes est fortement replié en dehors. Le corps & le dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre très-foncé, avec des lignes noires, nombreuses & ondulées ; le dessous est d'un brun plus clair, & offre aussi des lignes & des traits traversés plus foncés que le fond. Le côté extérieur des ailes inférieures présente une faille en manière de dent forte & aiguë.

Cette espèce a été apportée de l'Amérique méridionale par MM. de Humboldt & Aimé Bonpland. Elle se trouve aussi au Brésil.

B. *Bord postérieur des ailes supérieures soit fortement arqué, soit anguleux ; le sommet avancé ou terminé brusquement en manière de crochet ou de juulx. (Ailes inférieures comme tronquées postérieurement, ou très-concaves à l'angle anal.)*

a. *Côté extérieur des ailes inférieures, denté ou anguleux.*

167. HESPÉRIE Westermann.

HESPERIA Westermann.

Hesperia alis supra cinereo-fuscis, vel fusco-brunneis, infra brunneis, utrinque lineis undulatis, transversis, obscurioribus, anticis punctis subcostalibus vitreis ; posticis processu externo bidentato.

J'ai déjà cité M. Westermann pour quelques

espèces qu'il a en l'amitié de me communiquer : je lui dédie maintenant celle-ci ; & avec d'autant plus de raison, qu'il vient de nous faire connoître plusieurs insectes curieux, soit des Indes orientales, soit du Cap de Bonne-Espérance.

La taille de cette espèce égale celle de l'*H. Mithridate*. La couleur du dessus des ailes varie un peu du noirâtre-cendré au brun-foncé ; & sous leur dessous est congloméré d'un brun plus clair, tirant même sur le maron. Les deux surfaces sont traversées de lignes ou de bandes très-ondulées, nombreuses & noirâtres ; le bord postérieur présente quelquefois une série de lunules de cette couleur. Les ailes supérieures ont près du sommet deux ou trois points transparens & très-rapprochés, mais qui sont quelquefois peu apparens ; dans d'autres individus, on en voit encore quelques autres vers le milieu de leur disque. Le bord latéral externe des ailes inférieures se prolonge à sa jonction avec le bord postérieur en une faille obtusément bidentée.

Elle se trouve au Brésil, & m'a été envoyée par M. Laplagdoff.

168. HESPÉRIE Sébaldus.

HESPERIA Sebaldus.

Hesperia alis fuscis, atro transversim undatis ; anticis apice uncinatis ; posticis subtus limbo postico flavido, fusco punctato.

Hesperia U. Sebaldus, alis ecaudatis fusco-atroque variis ; posticis subtus angulo uni flavo. FAB. *Ent. Syst. em. toni. 3. pars 1. pag. 345. n^o. 305.*

Papilio P. U. Sebaldus. Mant. *Inf. tom. 2. p. 89. n^o. 80.*

Papilio Bufinus. CRAM. *Pap. 22. pl. 261. A. B. C.*

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. La massue des antennes est longue, grêle & arquée. Le corps & les ailes sont d'un noirâtre plus ou moins foncé, & quelquefois presque noirs ; ces ailes sont traversées par diverses taches ou bandes plus foncées ou noires. Les ailes inférieures ont extérieurement un angle avancé ou une forte dent ; en dessous, leur limbe postérieur est jaunâtre, avec une ou deux rangées de points noirâtres : la couleur jaoee y forme une large bande. Vers l'angle interne, ces ailes sont fortement concaves, & celui du sommet des ailes supérieures a la forme d'une dent brusque ou d'un petit crochet.

Elle se trouve au Brésil & à Surinam.

J'ai reçu du Brésil une hespérie très-analogue à la précédente par la forme générale & la couleur des ailes ; mais les inférieures n'ont point de dent au bord extérieur, & ses palpes labiaux sont

plus longs & plus avancés que dans ses congénères. Je la nommerai *H. Palpalis*.

b. Côté extérieur des ailes inférieures sans angles ni dents.

169. HESPÉRIE Thrafsybulé.

HESPERIA Thrafsybulus.

Hesperia alis supra nigris, cæruleo undulatis; posticis subtilis angulo ani cinereo, fusco punctato.

Hesperia U. Thrafsybulus, alis integerrimis, atris, lunulis cæruleis; posticis subtilis angulo ani cinereo, fusco punctato. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 546. n^o. 515.

Papilio Thrafsybulus. JON. Fig. pi^a. 6. tab. 28. fig. 1.

Papilio Thrafsybulus. DONOV. of an Epit. of the Nat. Hist. of the Inf. of Ind. 6. pl. 3. fig. 4.

Elle a de grands rapports avec la précédente, mais elle est beaucoup plus petite. Les ailes inférieures n'ont point de dents au côté extérieur, & le sommet des supérieures ne forme pas un angle aussi brusque. Le dessus des quatre est noir ou noirâtre, avec des lignes ondulées d'un bleu très-foncé; leur dessous est plus clair, tirant sur le brun, & même un peu jaunâtre ou cendré sur l'extrémité postérieure & interne des inférieures, avec des taches & des points plus foncés.

Elle se trouve au Brésil.

170. HESPÉRIE Mithridate.

HESPERIA Mithridates.

Hesperia alis atris, maculâ fuscâque posticâ purpureis, lunulis pallidioribus.

Hesperia P. U. Mithridates, alis rotundatis atris: maculâ fuscâque posticâ purpureis; lunulis pallidioribus. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 536. n^o. 277.

Papilio Mithridates. DONOV. of an Epit. Nat. Hist. Inf. 6. pl. 3. fig. 5.

Papilio Mithridates. JON. Fig. pi^a. 5. tab. 25. fig. 1.

Elle est grande, d'un noir-foncé, avec des taches d'un rouge-pourpre sur le corps & les ailes. Le dessus de ces ailes a postérieurement une bande de cette couleur, avec des lunules plus pâles. Leur dessous est noir, avec deux bandes pareillement purpurines & formées par des taches.

Selon Fabricius, elle se trouve aux Indes; mais d'après l'analogie, elle doit être propre à l'Amérique méridionale. J'ai reçu du Brésil une hespérie ne différant de la précédente qu'en ce que les

taches & la bande postérieures des ailes sont d'un brun-cendré au lieu d'être rouges.

171. HESPÉRIE Brébisson.

HESPERIA Brébisson.

Hesperia alis anticis utrinque posticisque supra dilatâ fuscis; his nigro punctatis, ibidem posterioribus infraque, margine externo excepto, cæruleo-lescentibus; anticarum margine postico angulato.

M. de Brébisson, de Falaife, a fait de nombreuses recherches sur les insectes des environs de cette ville, & particulièrement sur divers héméoptères négligés ou peu observés jusqu'à ce jour, à raison de leur extrême petitesse.

L'espèce à laquelle je donne son nom est une des plus remarquables de ce genre. Le milieu du bord postérieur de ses premières ailes forme un angle: elles sont, ainsi que la surface supérieure des secondes, d'un noirâtre-clair; en dessus, leur milieu présente une grande tache noire, sur laquelle on remarque quelques points vitrés, jaunâtres, luisans, & dont un, beaucoup plus grand, a une teinte dorée; l'angle interne a une tache noire, triangulaire, entourée de bleu-cendré; en dessous, la base de ces ailes & une portion du bord interne font de cette couleur. Telle est aussi la teinte du limbe postérieur & supérieur des ailes inférieures & de leur dessous; à l'exception du bord extérieur, qui est noirâtre. Ces ailes paroissent comme fortement tronquées; leur angle extérieur est noir en dessus & bordé de bleuâtre intérieurement; leur dessous est tacheté & ponctué de noir.

Elle se trouve au Brésil.

N. B. Quelques hespéries *Urbicoles* de Fabricius, telles que l'*Alphæus*, le *Pretus*, le *Silenus*, le *Polyctetus*, doivent être placées avec nos polyommates.

Il en est d'autres que, faute de données suffisantes, nous avons été forcés d'omettre. En voici l'énumération:

1^o. *H. Atticus*, n^o. 288. Elle rentreroit dans la division des *H.* à ailes inférieures arrondies & entièrement vitrées. Stoll, dans son Supplément aux papillons de Cramer, a représenté une espèce analogue, *P. Julietus*, pl. 9, fig. 1.

2^o. *H. Clericus*, n^o. 289. Elle paroît se rapprocher du *P. Bromius* de Stoll, ou de quelque autre espèce de sa division, l'avant-dernière de notre méthode.

3^o. *H. Næthus*. Les ailes, à l'exception du dessous des inférieures, sont noirâtres; les supérieures ont de petites taches vitrées; le dessous des inférieures est blanc, avec trois points argentés tirant sur le bleu, entourés d'un anneau noirâtre, & six autres semblables sur le bord postérieur:

rieur : ce bord est noirâtre ; le dessous du corps est blanc. Cette espèce est d'Amérique.

Le *P. Ophion* de Stoll, *Suppl. aux Pap. exot.* de Cramer, pl. 26, fig. 4, s'en rapproche un peu. Il le dit de Sierra-Leone en Afrique, ce qui me paroit douteux.

4°. Les *H. Niso*, n°. 547, & *Spio*, 548. Fabricius dit que la première se trouve à Cayenne ; mais Linnæus, qui la compare, ainsi que la seconde, à son *P. Tages*, leur donne le Cap de Bonne-Espérance pour patrie. M. Donovan a figuré dans le cinquième fascicule de son Epitome de l'histoire naturelle des insectes de l'Inde, une hespérie sous le nom de *Spio*, mais simplement en dessus. A en juger d'après son dessin, cette espèce se rapprocheroit beaucoup de l'*H. Galba* de Fabricius. Dans celle-ci, le dessous des ailes est presque semblable au dessus ; la couleur du fond est seulement plus claire ; or, c'est ce que dit formellement Linnæus à l'égard du *P. Spio*, & ce qui ne convient nullement à l'*H. Vindex*. Quant à son *P. Niso*, n'ayant point vu un assez grand nombre d'hespéries du Cap de Bonne-Espérance, il nous est impossible de nous former sur ce sujet une opinion.

5°. L'hespérie *Phocion* de Fabricius, n°. 545, & qu'il ne faut pas confondre avec celle du n°. 274, que nous avons décrite, paroîtroit se rap-

procher de l'*H. Aracanthus*, en ce que deux de ses ailes seroient jaunes en dessous, avec des taches blanches en forme d'yeux ; mais comme les caractères spécifiques qu'il donne au *Phocion* du n°. 545 ne s'accordent pas avec sa description, & qu'il doit y avoir quelque erreur, nous n'avons pas cru devoir mentionner autrement cette espèce.

6°. Le *Papilio P. U. Protumnus* de Linnæus nous est encore inconnu ; nous présumons qu'il se rapproche de l'*H. Mævius* de Fabricius, ou de quelque autre espèce de son voisinage. Si nous eussions eu à notre disposition un plus grand nombre de matériaux & si nous n'euissions pas été pressés par le temps, notre travail eût été moins imparfait : nous espérons néanmoins qu'il offrira quelque intérêt, surtout à ceux qui, ayant des collections considérables de lépidoptères exotiques, compareront l'état où Fabricius a laissé cette partie de la science, avec ce que nous avons fait pour elle, soit en éclaircissant la synonymie, soit en caractérisant les espèces & en les rapprochant par petits groupes naturels.

Nous aurions pu, en en décrivant plusieurs autres, donner plus d'étendue à cet article ; mais comme la plupart de ces espèces inédites ont généralement des teintes sombres, & qu'il est bien difficile de les reconnoître sans le secours de bonnes figures, nous avons cru devoir les omettre.



FAMILLE SECONDE.

CRÉPUSCULAIRES. *Crepuscularia*.

Les quatre ailes horizontales, ou en toit, dans le repos. Un criu à l'origine du bord antérieur des inférieures pour retenir les supérieures.

TRIBU PREMIÈRE.

HESPÉRIES-SPHINX. *Hesperio-Sphinges*.GENRE CASTNIE. *Castnia*. FAB.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

PALPES distinctement triarticulés, non contigus, et brièvement garnis d'écaillés.

OBSERVATION. Depuis l'impression de la première partie de ce volume, l'examen d'objets nouveaux nous a déterminés à former une tribu particulière, tenant le milieu entre les HESPÉRIDES et les SPHINGIDES, & à laquelle pour cette raison nous avons donné le nom de tribu des HESPÉRIES-SPHINX. Elle a pour caractères : *antennes toujours sans dents, en masse fusiforme, crochue et sans houppes d'écaillés à son extrémité*, et elle se compose des genres *Castnie* et *Agariste*, genres chez lesquels la cellule discoidale des secondes ailes est ouverte. Quelques Castnies avoient été mises par Fabricius dans le genre *Papillon*, tel que Linné l'a formé.

ESPÈCES.

Nota. Les Castnies ont les écaillés plus grandes que la plupart des autres lépidoptères connus.

1. CASTNIE Cyparissias.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant, avec deux bandes blanches de part et d'autre : bandes es supérieures sinuées, bandes des inférieures maculaires.

2. CASTNIE Pylade.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes sinuées, d'un blanc-sale en dessus, rousâtres en dessous ; inférieures ayant de part et d'autre une bande marginale fauve, tachetée de noir.

3. CASTNIE Licas.

Ailes entières, ayant le dessus d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes blanches, dont une plus courte ; inférieures avec une rangée marginale de taches rouges : dessous des inférieures centré.

4. CASTNIE Évalthé.

Ailes entières, d'un noir chatoyant : supérieures avec deux bandes jaunes de part et d'autre, inférieures avec une seule : dessus des inférieures avec une série de taches marginales, leur dessous avec toute la surface, rouges.

CASTNIE. (Insecte.)

5. CASTNIE ICARE.

Ailes entières, presque semblables de part et d'autre : supérieures d'un brun-noirâtre chatoyant, avec trois bandes blanches ; inférieures rouges, avec deux lignes ondulées transversales, et le limbe, noirs.

6. CASTNIE AMYCUS.

Ailes entières, d'un noir chatoyant : supérieures ayant de part et d'autre une bande et un point blancs ; dessous des inférieures avec deux bandes, leur dessous avec toute la surface, rouges.

7. CASTNIE BRÉCOURT.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec une bande difforme blanchâtre ; inférieures avec deux bandes transverses blanches et une bande intermédiaire d'un rouge-minium.

8. CASTNIE COCHIRUS.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, d'un noir-brun chatoyant, avec une bande blanche courte sur le milieu des quatre : anneaux postérieurs de l'abdomen rouges et bordés de blanc.

9. CASTNIE LATREILLE.

Ailes entières, d'un noir-brun chatoyant : supérieures avec une bande blanchâtre, oblique et bifide ; inférieures avec une bandelette longitudinale, et un arc maculaire, d'un bleu-tendre.

10. CASTNIE SAUTOIR.

Ailes entières, d'un vert-brun chatoyant : supérieures avec deux bandes blanches, en sautoir ; inférieures avec une seule, maculaire.

11. CASTNIE PHALARIS.

Ailes entières, d'un gris-brun chatoyant, avec deux bandes blanchâtres : bandes des supérieures peu prononcées en dessus, bifides en dessous ; bandes des inférieures maculaires de part et d'autre.

12. CASTNIE PALATINUS.

Ailes entières : supérieures d'un ferrugineux-chatoyant, avec un point oculaire noir ; inférieures noires, avec une bande médiane, et une ligne postérieure maculaire, d'un jaune-blanchâtre.

13. CASTNIE FONSCOLOMBE.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un ferrugineux-chatoyant, avec cinq points d'un jaune-transparent sur le milieu ; dessus des inférieures d'un rouge-brûlé, avec une série postérieure de taches noires.

14. CASTNIE THALAÏRE.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un vert-brun chatoyant, avec la base et deux bandes d'un gris-incarnat ; inférieures rouges de part et d'autre, avec deux bandes et le bord noirs.

15. CASTNIE FABRICIUS.

Ailes entières : dessus des supérieures d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux lignes transverses, et une tache intermédiaire, ferrugineuses ; inférieures d'un rouge-brûlé, avec deux bandes maculaires, et une bordure crénelée, noires.

16. CASTNIE MARCEL-SERRES.

Ailes entières, d'un brun-chatoyant en dessus, avec des bandes peu prononcées d'un gris-incarnat : bandes des supérieures continues et au nombre de trois, bandes des inférieures maculaires et au nombre de deux.

CASTNIE. (Insecte.)

17. CASTNIE Cronis.

Ailes entières, semblables de part et d'autre : supérieures noires, avec le disque et des taches marginales d'un beau blanc; inférieures d'un jaune-pâle, avec une bordure noire, crénelée.

18. CASTNIE Pélagus.

Ailes très-entières, semblables de part et d'autre : supérieures verdâtres, avec une bande fauve; inférieures noires, et sans taches. FAB.



1. CASTNIE *Cypariffias*.*CASTNIA Cypariffias*.

Cast. alis integris, atris, nitidis: utrinquè fuscis duabus albis, anticarum repandis, posticarum macularibus.

Papilio D. F. Cypariffias, alis integerrimis, nigris, fuscis duabus albis: anticarum obliquis, posticarum punctatis. FAB. *Spec. Inf.* tom. 2. p. 52. n^o. 226. — *Mant. Inf.* tom. 2. pag. 25. n^o. 259. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 59. n^o. 415.*

Papilio Cypariffias. HERBST, *Pap. tab.* 118. fig. 1. 2.

Papilio Dedalus. GRAM. *pl.* 1. fig. A. B.

Elle a de sept pouces à sept pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec deux bandes blanches. Les bandes des premières ailes sont obliques, continues, sinuées, inégales, & suivies d'une rangée transversale de quatre à sept taches blanches. Les bandes des secondes ailes sont maculaires, un peu courbes & disposées transversalement entre le milieu & le bord postérieur.

Le dessous ressemble au dessus, mais l'extrémité des premières ailes & toute la surface des secondes sont d'un brun beaucoup plus pâle que du côté opposé.

Se trouve à Surinam, dans les bois.

2. CASTNIE *Pylade*.*CASTNIA Pylades*.

Cast. alis integris, atris, nitidis: anticis fuscis duabus repandis, supra albidis, subtus rufescentibus; posticis fuscis marginali utrinquè subvâ nigroque maculata.

Papilio Pylades. GRAM. *pl.* 587. fig. A. B.

Papilio Pylades. HERBST, *Pap. tab.* 135. fig. 1. 2.

Elle a environ cinq pouces & demi d'envergure, & elle est d'un brun-noir, chatoyant en vert ou en violet, selon les aspects. Ses premières ailes ont derrière le milieu deux bandes transverses & sinuées, qui sont d'un blanc-sale en dessus, rouffâtes en dessous. Ses secondes ailes offrent parallèlement au bord postérieur une bande sauve, divisée dans le sens de la longueur par une série de taches noires orbiculaires.

Des Indes occidentales.

3. CASTNIE *Licas*.*CASTNIA Licas*.

Cast. alis integris, supra atris, nitidis: anticis

sej; uifuscis à albâ, posticis serie marginali è maculis rubris: posticarum paginâ inferiori cinerâ.

Papilio D. F. Licas, alis integerrimis, fuscis: anticis fuscis duabus, posticis univâ albis maculisque rubris: subtus cineris, albo fuscis utis. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. p. 26. n^o. 273. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 45. n^o. 157.*

Papilio Licas. GRAM. *pl.* 223. fig. A. B.

Papilio Lycus. HERBST, *Pap. tab.* 134. fig. 3. 4.

Papilio Licas. DRURY, *Inf.* 1. *pl.* 16. fig. 1. 2.

MERIAN, *Surin. Inf. tab.* 56.

SEBA, *Mus. 4. tab.* 19. fig. 11. 12. — *tab.* 21. fig. 10.

JON. *Fig. pict.* 3. *tab.* 73. fig. 2.

Papilio D. F. Syphax, alis integerrimis, atris: anticis fuscis à albâ, posticis rubris marginali. FAB. *Mant. Inf.* tom. 2. pag. 26. n^o. 271. — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 45. n^o. 155.*

Papilio Syphax. HERBST, *Pap. tab.* 134. fig. 1. 2.

Papilio Harmodius. GRAM. *pl.* 225. fig. C. D.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, jetant un reflet vert ou violet selon les aspects, avec deux bandes blanches aux supérieures, & une seule aux inférieures. La bande antérieure des premières ailes est continue, & elle descend du milieu de la côte à l'angle interne. Leur bande postérieure est plus courte, maculaire, flexueuse & située vis-à-vis du sommet. La bande des secondes ailes est oblique, médiane, & suivie d'une rangée marginale de taches orbiculaires rouges.

Le dessous diffère du dessus, en ce que les premières ailes ont des taches blanches ou rougeâtres sur le milieu du bord postérieur, en ce que les secondes ailes sont cendrées & qu'elles ont les taches rouges de l'extrémité ordinairement peu prononcées.

La bande blanche des ailes inférieures est quelquefois oblitérée. Il arrive même qu'elle manque totalement, comme dans la variété que les auteurs ont donnée sous le nom de *Syphax*. On voit aussi des mâles chez lesquels la bande postérieure du dessus des premières ailes est à peine sensible.

4. CASTNIE *Evalthé*.*CASTNIA Evalthe*.

Cast. alis integris, nigris, nitidis: utrinquè anticis fuscis duabus, posticis univâ flavis: posticis supra serie è maculis marginalibus, subtus paginâ omni rubris.

Papilio D. F. Evalthe, alis integerrimis, ni-

gris : anticis fasciis duabus , posticis unicâ flavis maculifque rubris , subtis rubris fasciâ maculari flavâ. FAB. *Syfl. Ent. p.* 480. n^o. 166. — *Spec. Inf. tom. 2. p.* 33. n^o. 255. — *Mant. Inf. tom. 2. p.* 26. n^o. 272. — *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p.* 45. n^o. 156.

Papilio Evalthus. HERBST, *Pap. tab.* 157. fig. 1. 2.

Papilio Dardanus. GRAM. *pl.* 17. fig. E. F.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, & chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec trois bandes jaunes, dont deux obliques & continues aux supérieures, & une maculaire aux inférieures. Ces dernières ailes offrent parallèlement à leur bord terminal une rangée de taches rouges, arrondies.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que la côte & le sommet sont lavés de rougeâtre. Le dessous des secondes ailes est tout rouge, avec une bande maculaire jaune, répondant à celle de la surface opposée.

Dans quelques individus, les taches rouges du dessus des secondes ailes s'étendent jusqu'à la bande jaune; dans d'autres, cette bande est remplacée par une grande tache semi-lunaire de fa couleur.

De Surinam & du Brésil, dans les bois.

5. CASTNIE Icare.

CASTNIA Icarus.

Cast. alis integris , subconcoloribus : anticis fasciis , nitidis , fasciis tribus albis ; posticis rubris , strigis duabus undulatis limboque nigris.

Papilio Icarus. GRAM. *pl.* 18. fig. A. B.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un brun-noirâtre, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec trois bandes blanches continues, dont les deux antérieures obliques & parallèles, la postérieure transversale, plus courte & faisant face au sommet.

Le dessous des secondes ailes est rouge, avec deux lignes postérieures ondulées, & le limbe terminal, noirs. Avant les lignes, il y a deux ou trois points blanchâtres, surmontés d'une lunule centrale noire.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que la base des ailes supérieures est rouge, & parce que les points blancs des inférieures sont accompagnés d'une double tache également blanche. Le corps est grisâtre, avec les côtés de l'abdomen & l'anus orangés. Les antennes sont noires & terminées de blanchâtre.

De Surinam.

6. CASTNIE Amycus.

CASTNIA Amycus.

Cast. alis integris , nigris , nitidis : anticis utrinquè fasciâ punctoque albis ; posticis suprâ fasciis duabus , subtis paginâ omni rubris.

Papilio Amycus. GRAM. *pl.* 227. fig. D. E.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-chatoyant, avec deux petites taches & une bande blanche aux supérieures; avec deux bandes rouges, dont la postérieure maculaire, aux inférieures. La bande des premières ailes est placée entre les deux taches, & elle descend de la côte à l'angle interne.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que la base est rouge, & en ce que la tache blanche antérieure manque.

Le dessous des secondes ailes est rouge, avec une série transversale de points blancs cerclés de noir.

De Surinam.

7. CASTNIE Brécourt.

CASTNIA Brécourt.

Cast. alis integris , atris , nitidis : anticis fasciâ deformi albidâ , posticis duabus transversis albis intermediâque miniacèâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-brun, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec une bande très-difforme d'un blanc-sale aux supérieures; avec deux bandes transversales blanches & une bande intermédiaire d'un rouge-minium aux inférieures. La bande antérieure des secondes ailes est discoïdale, large, continue, tandis que la postérieure est très-étroite & maculaire.

Le dessous diffère du dessus en ce que les premières ailes ont l'origine de la côte rouge, & le bord postérieur chargé d'une série transversale de taches blanches. Le corps est d'un noir-brun, avec les genoux & l'anus d'un rouge-minium. Les antennes sont noires.

Dédiée à M. Cotty de Brécourt, entomologiste-observateur, & décrite d'après un individu de la collection de M. Latreille.

Du Brésil.

8. CASTNIE Cochrus.

CASTNIA Cochrus.

Cast. alis integris , concoloribus , atris , nitidis , omnium disco fasciâ abbreviatâ albâ : abdomine posticè cingulis sanguineis albo marginatis.

Papilio D. F. Cochrus , alis integerrimis , concoloribus , atris , fasciâ maculari albâ : abdomine sanguineo cingulis atris. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p.* 25. n^o. 265. — *Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p.* 42. n^o. 125

Elle a près de quatre pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-brun, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec une bande blanche, discordante, oblique, courte & divisée par les nervures. La bande des secondes ailes est plus courte & plus large, & ces mêmes ailes ont vers le sommet deux à trois points blancs. Le corps est noir, avec les quatre anneaux postérieurs de l'abdomen rouges & bordés de blanc. Le devant du corselet, la poitrine, la base du ventre sont tachetés de rouge, & les genoux sont de cette couleur. Les antennes sont entièrement noires.

Quelquefois la bande des ailes supérieures est moins blanche en dessus qu'en dessous.

Du Brésil.

9. CASTNIE Latreille.

CASTNIA Latreille.

Cast. alis integris, atris, nitidis : anticis fasciis albidis, obliqua, bifida ; posticis vittâ longitudinali arcuque maculari caesiis.

J'éprouve un véritable plaisir à dédier cette nouvelle espèce à mon maître, savant académicien que les naturalistes de l'Europe ont, d'une voix unanime, proclamé le prince des entomologistes de notre siècle.

Elle a près de cinq pouces d'envergure. Les premières ailes sont d'un brun-ensumé & très-chatoyant, avec le milieu coupé obliquement par une bande bifide, qui est d'un blanc-obscur en dessus, d'un blanc-violet en dessous.

Le dessus des secondes ailes est noir, avec une bandelette lilas, partant du disque où elle se dilate en manière de lachette, & allant aboutir à un arc marginal de trois taches également lilas. Le dessous est moins foncé que le dessus, & il offre vers l'extrémité une ligne courbe & transverse de points bleuâtres. Le corps est entièrement d'un brun-noirâtre, & les antennes font ferrugineuses.

Du Brésil; collection de M. Latreille.

10. CASTNIE Sautoir.

CASTNIA Decussata.

Cast. alis integris, fusco-viridibus, nitidis : anticis fasciis duabus albis decussatis, posticis univâ maculari.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-brun, chatoyant, avec deux bandes blanches, dont deux en sautoir aux inférieures, & une maculaire aux inférieures. La bande antérieure des premières ailes jette en outre un rameau qui se rabat sur l'origine du bord de l'aile.

Le dessous diffère du dessus en ce que le rameau de la bande antérieure des premières ailes manque, & en ce que le fond des secondes est d'un brun-jaunâtre-pâle.

Décrite d'après un individu unique.
Du Brésil.

11. CASTNIE Phalaris.

CASTNIA Phalaris.

Cast. alis integris, fusco-griseis, nitidis, fasciis duabus albidis : anticarum supra obsoletis, subtis bifidis, posticarum utrinque macularibus.

Papilio F. Phalaris, alis integerrimis, fuscis : posticis strigis duabus macularibus albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 45. n. 138.

Papilio Phalaris. Jox. Fig. pict. 5. tab. 75. fig. 2.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un gris-obscur, chatoyant en vert ou en violet suivant les aspects, avec deux bandes blanchâtres. Les bandes des premières ailes sont obliques, peu prononcées, & bifides à leur extrémité supérieure. Les bandes des secondes ailes sont maculaires, transversales & placées derrière le milieu sur un fond noirâtre.

Le dessous ne diffère du dessus que parce que les bandes des premières ailes sont beaucoup plus distinctes & qu'elles ont une tache blanche dans la fissure. Le corps est entièrement de la couleur des ailes.

Du Brésil.

12. CASTNIE Palatinus.

CASTNIA Palatinus.

Cast. alis integris : anticis ferrugineis, nitidis, puncto ocellari nigro ; posticis nigris, fasciâ mediâ strigatâ apicis maculari albidoflavescens.

Papilio Palatinus. GRAM. pl. 159. fig. B. C.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un ferrugineux-chatoyant, avec un petit œil noir à prunelle blanche vis-à-vis du sommet.

Le dessus des secondes ailes est noir, avec une large bande d'un jaune-blanchâtre sur le milieu, & une série de taches du même jaune sur le bord postérieur. La bande prend une teinte rousse vers la côte.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus en ce qu'il est généralement plus pâle, & en ce que le milieu des supérieures offre quatre taches noires dont une annulaire.

De Surinam.

13. CASTNIE Foulcolombe.

CASTNIA Foulcolombe.

Cast. alis integris : anticis supra ferruginis, nitidis, disco punctis quinque hyalino-flave-

centibus; posticis tesuceis, serie postica à maculis nigris.

Elle a plus de quatre pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un ferrugineux-chatoyant, avec cinq points jaunes, dont l'antérieur plus gros & presque discoidal, les autres un peu diaphanes & alignés transversalement sur une bande plus intense que le fond de l'aile. Le dessous des secondes ailes est d'un rouge-brûlé, avec la base obscure, & l'extrémité chargée d'une série courbe de taches noires orbiculaires.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, quant au dessin, mais il est d'un rouge-brûlé au lieu d'être ferrugineux. Le dessous des secondes ailes est d'un jaune-d'ocre, avec trois lignes transverses, dont les deux antérieures rougeâtres & ondulées, la postérieure noirâtre & maculaire. Le corps a le dessus ferrugineux, avec la moitié postérieure de l'abdomen d'un jaune-rougeâtre. Les antennes sont de la couleur du corselet.

Dédiée à M. Boyer de Fonscolombe, savant naturaliste de la ville d'Aix en Provence.

Du Brésil; collection de M. Latreille.

14. CASTNIE Thalaïre.

CASTNIA Thalaïra.

Cast. alis integris: anticis suprà fusco-viridibus, nitidis, basi fuscis; duabus carneo-griseis; posticis utraque rubris, fuscis duabus marginique nigris.

Papilio Thais. DRURY, *Inf. tom. 3. pl. 16. fig. 4.*

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un vert-brun, chatoyant, avec la base & deux bandes obliques d'un gris-incarnat. La bande intérieure est plus longue & plus large que l'extérieure.

Le dessus des secondes ailes est rouge, avec deux bandes postérieures, & le bord terminal, noirs.

Le dessous des premières ailes est noir, avec la base rouge, & trois bandes orangées, dont deux répondant aux bandes incarnates du dessus, la troisième maculaire & longeant le bord postérieur.

Le dessous des secondes ailes ressemble au dessus, mais il est généralement plus pâle, & il offre trois ou quatre petites taches blanches sur la bande qui avoisine le disque.

Quelquefois le rouge de l'extrémité des secondes ailes est remplacé par du jaune-orangé, comme dans l'individu figuré par Drury.

Cette Castnie a le bord postérieur des premières ailes beaucoup plus arqué en dehors que l'*Iceare*.

Du Brésil.

15. CASTNIE Fabricius.

CASTNIA Fabricii.

Cast. alis integris: anticis suprà carneo-griseiscentibus, nitidis, strigis duabus maculæque intermedii ferrugineis; posticis tesuceis, fuscis duabus macularibus marginique crenato nigris.

Castnia Fabricii. SWAINSON, *Zoological illust. or origin. fig. an. descript. &c. tab. 30. pl. 149.*

Ce lépidoptère parait être l'un des sexes de celui que M. Swainson a figuré sous le nom de *castnia Fabricii*.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux lignes transverses, & une tache intermédiaire, ferrugineuses. Le bord postérieur est en outre ferrugineux, principalement vers le sommet. Le dessous des secondes ailes est d'un rouge-brûlé, avec deux bandes maculaires, & une bordure crénelée, noires. Les deux bandes sont courbes & placées transversalement entre le milieu & l'extrémité de la surface.

Le dessous des quatre ailes est d'un rouge-brûlé-pâle, avec des lignes noirâtres qui ne font que la répétition des caractères du dessus, & sur le milieu de l'antérieure desquelles on voit aux secondes ailes un double point blanc ocellé.

Du Brésil; collection de M. Latreille.

16. CASTNIE Marcel-Serres.

CASTNIA Marcel-Serres.

Cast. alis integris, suprà fuscis, nitidis, fuscis obsoletis carneo-griseiscentibus: anticam tribus continuis, posticarum duabus macularibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-ensumé, chatoyant en vert ou en violet selon les aspects, avec des bandes transverses & peu prononcées d'un gris-incarnat. Les bandes des premières ailes sont au nombre de trois, dont l'intermédiaire finie, la postérieure terminale, mais ne couvrant pas le sommet. Les bandes des secondes ailes sont au nombre de deux, & formées l'une par des taches presque quadrangulaires, l'autre par des lunules renversées. La frange de ces dernières ailes est en outre blanchâtre.

Le dessous des premières ailes est d'un gris-chatoyant, avec l'extrémité traversée par une bande bilobée de taches blanchâtres. Le dessous des secondes ailes est d'un gris-rougeâtre, avec trois lignes brunâtres, transverses & ondulées, dont l'antérieure discoidale & marquée d'un double point blanc. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

Dédiée à M. Marcel de Serres, connu par plusieurs écrits, professeur de géologie & de minéralogie à la Faculté des Sciences de Montpellier, &c.

Du Brésil; collection de M. Latreille.

17. CASTNIE

17. *CASTNIE Cronis.**CASTNIA Cronis.*

Cast. alis integris, concoloribus : anticis nigris, disco maculisque marginalibus niveis ; posticis flavescensibus, margine crenato nigro.

Papilio Cronis, fem. CRAM. pl. 178. fig. A.

L'individu que Cramer a pris pour la femelle de son papillon *Cronis* nous paroît être une castnie, tant par la forme des antennes, que par celle de la cellule discoidale des secondes ailes.

Il a près de trois pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est noir, avec une vingtaine de taches blanches, savoir : une très-grande sur le disque, une médiocrement grande sur le milieu de la côte, les autres en forme de points ovales & disposées sur deux rangs le long du bord postérieur.

Le dessus des secondes ailes est d'un jaune-d'ocre pâle, avec une bordure noire, étroite & ayant le côté interne crénelé.

Le dessous des quatre ailes diffère très-peu du dessus. Le corselet est noir, avec deux points rouges. L'abdomen est du même ton que les secondes ailes, & les antennes sont noires.

De Surinam.

18. *CASTNIE Pélafgus.**CASTNIA Pélafgus.*

Cast. alis integerrimis, concoloribus : anticis virescentibus, fasciâ fulvâ ; posticis nigris, immaculatis. FAB.

Papilio D. F. Pélafgus. FAB. Mant. Inf. tom. 2. p. 26. n°. 274. — Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. p. 46. n°. 159.

Papilio Pélafgus. CRAM. pl. 202. fig. D.

Papilio Pélafgus. HERBST, Pap. tab. 156. fig. 6.

Nous ne connoissons cette espèce que par la figure de Cramer.

Elle a à peu près deux pouces & demi d'envergure. Les premières ailes sont d'un vert-brun & chatoyant de part & d'autre, avec une bande fauve, transverse, médiaire, courbe, atteignant à peine les deux bords.

Les secondes ailes ont le dessus ainsi que le dessous d'un noir-chatoyant, & sans aucune tache.

De Surinam.



GENRE AGARISTE. *Agarista*. Leach.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

PALPES inférieurs longs, ayant le deuxième article comprimé et barbu, le troisième subcylindrique et nu. (Voyez l'Observation ci-dessus, page 794.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes ayant le milieu prolongé en une queue obtuse.

1. AGARISTE Leach.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un brun-chatoyant : supérieures avec une bande transverse, inférieures avec le bord du sommet, blancs.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi et entier.

2. AGARISTE Peinte.

Ailes presque semblables de part et

d'autre, noires : supérieures tachetées de jaune-pâle, de jaune-orangé et de bleu-tendre; inférieures avec deux bandes transverses, dont l'antérieure d'un bleu-pâle, la postérieure écarlate.

3. AGARISTE Huit-taches.

Ailes entières, semblables de part et d'autre, noires, avec deux taches arrondies sur le disque de chacune : taches des supérieures d'un jaune-soufre pâle, taches des inférieures d'un blanc de neige.



A. Bord postérieur des premières ailes entier. Bord analogue des secondes ayant le milieu prolongé en une queue obtuse.

1. AGARISTE Leach.

AGARISTA Leach.

Agar. alis concoloribus, fuscis, nitidis: anticis fasciâ transversâ, posticis margine apicali, albis.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure. Ses ailes sont de part & d'autre d'un brun-noirâtre chatoyant, avec une bande transverse aux supérieures, & le bord du sommet aux inférieures, blancs. La bande des ailes supérieures est courbe, ultra-médiaire, & moins blanche en dessus qu'en dessous. Le corps & les antennes sont approchant du même ton que les ailes.

Dédiée à M. William Elford Leach, très-favant naturaliste anglais, & décrite d'après un seul individu, envoyé du Brésil à M. Latreille par M. de Langsdorff.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi & entier.

2. AGARISTE Peinte.

AGARISTA Piçta.

Agar. alis subconcoloribus, nigris: anticis flavescente, aurantio castroque maculatis; posticis fuscis duabus transversis, alterâ castâ, alterâ coccineâ.

Agarista Piçta, atra, ano, fulvo: alis anticis strigâ bascos flavâ maculisque fulvis; posticis fuscis duabus transversis, posticâ coccineâ. LEACH, the Zoological miscellany, vol. 1. tab. 15.

Papilio Agricola, alis nigris: anticis flavo aurantioque maculatis; posticis cyaneo sanguineoque fasciatis. Donovan. Gen. Illustr. of Ent. part. 1. an Epit. of the Ins. of Asia, pl. fig.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces

d'envergure. Ses ailes sont noires. Les supérieures ont à la base une bande longitudinale d'un jaune-verdâtre; sur le milieu deux bandes obliques de taches orangées; & vis-à-vis du sommet deux lignes maculaires, également obliques, dont l'antérieure bleuâtre, la postérieure à peu près du même jaune que la bande de la base. Il y a en outre sur le bord interne deux lignes blanches, puis une tache jaunâtre. Les secondes ailes ont deux bandes transverses, dont l'antérieure d'un bleu-tendre, la postérieure écarlate & plus large. La frange de ces dernières ailes est entièrement blanche, tandis que celle des ailes de devant ne l'est qu'au sommet & à l'angle inférieur. Le corps est noir, avec le corselet d'un jaune-pâle, la poitrine écarlate, l'anus garni d'un bouquet de poils orangés. Les antennes sont noires.

Le mâle se distingue de la femelle en ce qu'il a la bande basilaire du dessus des premières ailes plus étroite, & le dessous des secondes tacheté de jaune-bleuâtre à son origine.

De la Nouvelle-Hollande.

3. AGARISTE Huit-taches.

AGARISTA octomaculata.

Agar. alis integris, concoloribus, nigris, disco singularum maculis duabus rotundatis: anticarum pallidâ sulphureis, posticarum niveis.

Sesia 8maculata, alis atris: maculis duabus anticarum flavis, posticarum albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 381. n. 8.

Elle a environ quinze lignes d'envergure. Ses ailes sont noires en dessus & en dessous, avec deux taches orbiculaires sur le milieu de chacune. Les taches des ailes supérieures sont d'un jaune-soufre pâle, les taches des inférieures d'un blanc de neige. Le corps est noir, avec les épaulettes, un point frontal, le premier article des palpes & la base du troisième, d'un jaune-soufre. Les deux jambes antérieures sont garnies de poils orangés, & les antennes sont toutes noires.

Recueillie dans l'Amérique septentrionale par M. Milbert, voyageur du Gouvernement.



SUPPLÉMENT.

Avis. Sous le titre de RECTIFICATIONS, nous signalons : 1^o. les espèces à supprimer comme ne formant qu'un seul sexe ; 2^o. celles dont nous avons reconnu postérieurement la synonymie ou le véritable *habitat* ; 3^o. les fautes typographiques qui nous avoient d'abord échappé.

RECTIFICATIONS.

GENRE PAPILLON.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

- Page 25. n^o. 2. Pap. PANTHOÛS. — Femelle du PRIAM, page *ibidem*, n^o. 1.
Page 58. n^o. 59. Pap. TÉRÉAS. — Piéride. *
Page 59. p. Pap. *Lycidas*. Cram. — Femelle du BÉLUS, pag. 58. n^o. 42.
Page 41. n^o. 49. Pap. ANDROGÉE. — Femelle du POLYCAGN, page *ibidem*, n^o. 48.
Page 42. n^o. 51. Pap. EPHESTION. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. URSULE, page 580. n^o. 101.)
Page 51. n^o. 75. Pap. NIAMUS. — Pap. *Nomius*. Esp. Pap. exot. tab. 52. fig. 5.
Page 62. n^o. 101. Pap. PANDROSUS. — Pap. *Torquatinus*. Esp. Pap. exot. tab. 51. fig. 2.
Page 63. n^o. 104. Pap. TÊMÈNE. — Pap. *Aristodemus*. Esp. Pap. exot. tab. 59. fig. 2.
Page 63. n^o. 105. Pap. LYCORÆUS. — Pap. *Machaonides*. Esp. Pap. exot. tab. 45. fig. 2.
Page 67. n^o. 114. Pap. PHORCAS. — Pap. *N. Doreus*. Fab. Ent. Syst. tom. 3. pars 1. pag. 68. n^o. 212.
Page 75. n^o. 156. Pap. LYSITHOÛS. — Pap. *Heclorides*. Esp. Pap. exot. tab. 40. C. fig. 1.

GENRE PARNASSIEN.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

GENRE THAÏS.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement. (Chrysalide attachée par les deux bouts, et terminée antérieurement par deux petites pointes garnies de crochets.)

GENRE COLIADE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

- Page 89. col. 1. lig. 25, ont le bord interne anguleux ; *lisez*, ont le bord postérieur anguleux.
Page 91. n^o. 6. Coliade CIPRIS. — La femelle est plus pâle, & le dessus de ses ailes supérieures offre souvent un gros point noir vers le milieu de la surface.
Page 91. n^o. 7. Col. LEACH. — Fond des ailes d'un jaune-verdâtre chez le mâle, d'un blanc-verdâtre chez la femelle. Antennes rosées & non noires.
Page 92. n^o. 12. — Col. EURULE. — Femelle de la MARCELLINA, page *ibidem*, n^o. 9.
Page 95. n^o. 14. Col. CNIDIA. — Femelle de l'ARGANTE, page 92. n^o. 11.

Page 94. $\left. \begin{array}{l} \text{n}^{\circ} 15. \text{ Col. LOLLIA.} \\ \text{n}^{\circ} 16. \text{ Col. ARICIE.} \\ \text{n}^{\circ} 17. \text{ Col. LARRA.} \end{array} \right\}$ — Femelles & variétés femelles de la PHILÉA, page 91.

Page 95. n^o. 20. Col. CATILLA. — Femelle de l'HILARIA, page 97. n^o. 25. Points discoïdaux du dessous des ailes inférieures, bien argentés & entourés de deux cercles, dont l'extérieur non fermé. Antennes d'un rose-grisâtre, avec le bout de la massue ferrugineux.

Page 96. n^o. 21. Col. JUGURTHINA. (*Jugurtha & Crocale*. Cram.) — Femelle de notre ALCEMONÉ, page 97. n^o. 27. Dessous du mâle d'un jaune-soufre & sans taches. Dessous de la femelle d'un jaune-d'ocre, ordinairement très-pâle, avec un point blanc bordé d'un simple cercle rougeâtre aux ailes supérieures, & deux points semblables aux inférieures. Ces points manquent quelquefois. Dernier article des palpes très-court; antennes d'un brun-grisâtre, avec le bout de la massue ferrugineux.

Page 96. n^o. 21. Col. JUGURTHINA. (*Statira*. Cramer.) — Femelle de notre TITANIA, page 97. n^o. 26. Habite le Brésil, & non le Coromandel, comme nous l'avions cru d'après Cramer. Dessous de ses ailes d'un gris-jaunâtre luisant, avec des points discoïdaux d'un blanc-rosé, non bordés, ou seulement bordés en arrière par des atomes noirâtres. Dernier article des palpes allongé; antennes d'un brun-rougeâtre & ayant le tiers antérieur de la massue jaunâtre. Le *Papilio* D. C. *Titania* de Falcius paroit plutôt répondre à l'HILARIA qu'à notre TITANIA.

Page 98. n^o. 28. Col. EVADNÉ (*Alceone*. Cram.) paroit être une variété mâle, & sans taches en dessous, de notre TITANIA.

GENRE PIÉRIDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 119. n^o. 3. Piér. CALLIRHOË. — Variété femelle de la Piér. GLAUCIPPE, page *ibidem*, n^o. 2.

Page 122. n^o. 12. Piér. OMPHALÉ. — Femelle de l'ÉVIPPE, page *ibidem*, n^o. 10.

Page 122. n^o. 13. Piér. ACHINÉ. — Variété femelle de l'ÉVIPPE, page *ibidem*, n^o. 10.

Page 125. n^o. 14. Piér. AMYTIS. (*Arthusa*. Cram.) — Variété femelle de l'ÉVIPPE, sans taches fauve au sommet des ailes supérieures en dessus.

Page 151. n^o. 39. Piér. AMATE. — Coliade.

Page 154. n^o. 50. Piér. CANDIDE. — Coliade.

Page 154. n^o. 51. Piér. HÉCABÉ. — Coliade.

Page 155. n^o. 52. Piér. AGAVÉ. — Coliade.

Page 155. n^o. 53. Piér. BRIGITTE. — Coliade.

Page 155. n^o. 54. Piér. NÉDA. — Coliade. Répond au P. D. *Libythea*. Fab. *Suppl. pag. 437.* n^o. 598—9.

Page 156. n^o. 56. Piér. SMILAX. — Coliade.

Page 156. n^o. 58. Piér. ELATHÉE. — Coliade.

Page 157. n^o. 59. Piér. DAIRA. — Coliade, variété de l'ELATHÉE, n^o. 58.

Page 157. n^o. 61. Piér. PHIALÉ. — Coliade.

Page 158. n^o. 66. Piér. SINOÉ. — Coliade.

Page 142. n^o. 83. Piér. CAENIS. — Nymphale. (*Voy. Nymph. Amphicéda*, page 384. n^o. 113.)

Page 145. n^o. 96. Piér. HIRLANDA. — Chez le mâle, la bordure noire est moins large que chez la femelle que nous avons décrite.

Page 147. n^o. 101. Piér. THYRIA. — Pap. N. *Nero*. Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 153.* n^o. 471. — *Donov. of an Epit. Inf. of India, cat. 9. pl. 3. fig. 1.*

Page 147. n^o. 102. Piér. PANDA. — Coliade.

Page 150. n^o. 113. Piér. PHYLÈRE. — Pap. D. *Cacneus*. Linn. *Syst. Nat. 2. p. 766. n^o. 111.* — *Muf. Lud. Ulr. 271.*

Page 155. n^o. 128. Piér. PYRRHA. — Nous avons vu, en double exemplaire, une variété mâle, dont le dessous des ailes est jaune au lieu d'être blanc.

Page 156. n^o. 130. Piér. PANÉLA. — Femelle de la Piér. PYRRHA, page 155. n^o. 128.

Page 157. n^o. 153. Piér. DÉMOPHILE. — Femelle de l'AMATHONTE, page *ibidem*, n^o. 152.

Page 163. n^o. 146. Piér. de la BRYONE. — Nous avons actuellement la certitude que ce n'est qu'une variété femelle, & propre aux montagnes alpines, de la Piér. du NAVET, page 161. n^o. 145.

Page 165. n^o. 155. Piér. MÉLITE. — La femelle est d'un jaune beaucoup plus pâle & tirant sur le verdâtre. La base de ses ailes inférieures est marquée en dessous de deux points d'un jaune-orangé. Chez les deux sexes, le dessus des ailes supérieures offre le plus souvent au sommet une ligne oblique de trois points du même jaune que le fond.

Page 168. n^o. 165. Piér. GENUA. — Libythée.

GENRE LIBYTHÉE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

GENRE DANAÏDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 175. n^o. 32 du tableau. Dan. CLÉOBULE ; *lisez* CLÉOPHILE.

Page 188. n^o. 40. Dan. MISIFFE. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. MISIFFE, page 394. n^o. 153.)

GENRE IDÉA.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

GENRE HÉLICONIE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 209. n^o. 18. Hél. LANSDORF ; *lisez* LANGSDORFF.

Page 211. n^o. 23. Hél. THALLO. — Nocturne, que Linné a pris pour un diurne.

GENRE ACRÉE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 231. n^o. 5. Acr. ENTORIA. — *Pap. P. Andromacha*. Fab. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 182. n^o. 564.*

Page 234. n^o. 13. Acr. CYNTHIA. — *Lisez* CYNTHOΔ, & de même à la page 228. n^o. 13 du tableau.

Page 236. n^o. 20. Acr. OMBRE. — Paroit être une nymphale, du moins par la cellule discoïdale des secondes ailes.

GENRE CÉTHOSIE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 245. n^o. 6. Céth. VIBILIE. — Acrée.

Page 246. n^o. 7. Céth. ALIPHÉRA. — Acrée.

GENRE ARGYNNE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 262. n^o. 18. Arg. TEPHNE. — Mâle de l'argynne NIPRÉ, page 261. n^o. 17.

Page 268. n^o. 27. Arg. MYRINA. — *Lisez* MYRISSA, & de même à la page 255. n^o. 27 du tableau ; placez-la entre l'EUPHROSINE & la SÉLÉNÉ.

Page 278. col. 2. lig. 35, de l'Allemagne & de la Russie; *lisez*, de l'Allemagne, de la Russie & de la France.

GENRE VANESSE.

Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 299 n^o. 8. Van. AGLATONICE. — *Pap. D. Anacardii*. Linn. *Syfl. Nat.* 2. p. 758. n^o. 74. — *Muf. Lud. Ul.* 256.

Pap. Anacardii. Clerck, *Icon. tab.* 28. *fig.* 1.

Pap. P. Anacardii. Fab. *Mant. Inf. tom.* 2. *pag.* 17. n^o. 177. — *Ent. Syfl. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 183. n^o. 507.

Pap. Parthajus. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 4. *fig.* 1. 2.

Pap. Æthiopa. Paliffo-B Beauvoir, *Inf. liv.* 1. *pl.* 3. *fig.* 1. 2. a. b.

Pap. Opale. Paliffo-B Beauvoir (*texte*), *pag.* 22. *liv.* *ibidem*.

Sans la figure de Clerck, on ne le douteroit jamais que ce lépidoptère fût le même que celui auquel Linnæus donne le nom d'*Anacardii*. Il se trouve sur la côte occidentale d'Afrique, & principalement vers le golfe de Guinée. Linnæus & Fabricius l'ont probablement confondu avec un fatyre d'Amérique, voisin du phitodète, page 680.

Page 300. n^o. 11. Van. CORINNE. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. CORINNE, page 360. n^o. 35.)

Page 300. n^o. 12. Van. DIONÉ. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. DIONÉ, page 360. n^o. 34.)

Page 301. n^o. 14. Van. DEMONICA. — *Pap. N. Eurocia*. Fab. *Ent. Syfl. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 79. n^o. 247.

Pap. Delius. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 14. *fig.* 5. 6.

Elle se trouve à Sierra-Léone en Afrique, selon Drury.

Page 302. n^o. 16. Van. F-Blanche. — N est qu'une variété du C-BLANC, page *ibidem*, n^o. 17.

Page 315. n^o. 43. Van. EMMÀ. — *Pap. N. Zingha*. Fab. *Ent. Syfl. em. tom.* 3. *pars* 1. *p.* 117. n^o. 358.

Pap. Amebis. Drury, *Inf. tom.* 3. *pl.* 20. *fig.* 3.

Elle se trouve à Sierra-Léone en Afrique.

Page 315. n^o. 44. Van. MICALIA. — Nymphale. (*Voyez* Nymph. MICALIA, pag. 415. n^o. 205.)

Page 317. n^o. 48. Van. ORITHYÈ. — *Voyez* le Supplément ci-après, n^o. 48 *duplicata*.

Page 317. n^o. 49. Van. CALYBÉ. — *Pap. N. Velleda*. Fab. *Entom. Syfl. em. tom.* 3. *pars* 1. *pag.* 91. n^o. 285.

Pap. Velleda. Donov.

Page 319. n^o. 54. Van. ATALANTE. — Se trouve aussi dans l'Amérique septentrionale, comme le dit Fabricius.

Page 324. n^o. 64. Van. CALLITHÉA. — Argynne.

GENRE BIBLIS.

Nervure supérieure ou sous-costale des premières ailes très-renflée à son origine; cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 326. col. 1. lig. 26, au bord d'en haut; *lisez*, ou bord d'en haut.

Page 327. n^o. 7. Bib. ILLITHYÈ. — Vanesse.

GENRE MORPHO.

La deuxième division de ce genre forme actuellement le genre PAVONIE, *Pavonia*, lequel se distingue des morphos proprement dites en ce qu'il a les palpes moins barbues, la nervure inférieure

du dessus des premières ailes courbée en S à son origine, & la cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement. (Les mâles de quelques espèces de ce nouveau genre ont, à la région du bord interne des ailes inférieures, une fente longitudinale couverte de poils.)

GENRE SATYRE.

Page 491. n^o. 46. Sat. ΠΑΤΥΡΙΣ. — *Satyrus argenteus*. Swainson, *Zoological illustrations, or original figures and descriptions, &c., cah. 1. pl. 5.*

Page 520. colon. 2. lig. 27, celui des inférieures; *lisez*, celui des supérieures.

Page 528. colon. 2. lig. 38, pag. 22. n^o. 701; *lisez*, pag. 224. n^o. 701.

Page 547. colon. 1. lig. 4, sans taches aux supérieures; *lisez*, sans taches aux inférieures.

GENRE ÉRYCINE.

Page 587. n^o. 111. Eryc. Αἰδων. (P. R. *Ægon*. Fab.) — Répond à notre argynne ΡΥΓΜΑ, page 290. n^o. 63. C'est une véritable argynne.

GENRE HESPÉRIE.

Page 714. n^o. 10 du tableau. Hesp. POLYBE; — *lisez* POLYBE.

Page 727. n^o. 162 du tableau. Hesp. NÉRON; — *lisez* Hesp. NERVA.

Nota. Le défaut de conservation, ou le manque d'objets, ne nous a pas permis de pousser plus loin nos rectifications.

ESPÈCES ADDITIONNELLES.

GENRE PAPILLON.

Nota. Pour indiquer la place que chaque espèce supplémentaire doit occuper dans le genre dont elle fait partie, nous employons, suivant l'usage, deux chiffres séparés par un trait : ainsi, par exemple, le signe 10—11, qui précède le papillon *Floridor*, signifie que ce lépidoptère doit être mis entre le n°. 10 & le n°. 11 du genre PAPILLON.

10—11. PAPILLON Floridor.

PAPILIO Floridor.

Pap. alis dentatis, nigris : anticis utrinque albedo radiatis : posticis subtus maculis basæ annulifque marginalibus sanguineis.

Il a de cinq à six pouces d'envergure. Le mâle est noir, avec des raies blanchâtres à l'extrémité des ailes supérieures de part & d'autre, & seulement à l'extrémité des inférieures en dessous. Les ailes inférieures ont à l'angle de l'anus un cercle rouge surmonté d'un groupe d'atomes bleus. Leur dessous offre à la base cinq taches triangulaires, & le long du bord terminal six anneaux d'un rouge-vermillon. Il y a encore deux anneaux semblables, mais dont l'un plus allongé, sur le bord interne de ces mêmes ailes. Les trois anneaux extérieurs du bord terminal sont ouverts, tandis que les trois autres, & au moins l'un des deux du bord interne, sont fermés. Le dessous des ailes supérieures est marqué à la base d'une tache longitudinale rouge.

La femelle se distingue du mâle, en ce que la tache rouge de la base de ses premières ailes se reproduit en dessous ; en ce que ses secondes ailes n'ont pas de raies blanchâtres, & que leur milieu est blanc sur chaque face. Deux autres caractères qu'il est bon de ne pas omettre, c'est que ces dernières ailes ont en dessous deux taches rouges, indépendamment du cercle anal, & que les anneaux de leur dessous sont tous ouverts, à l'exception cependant de celui qui occupe le haut du bord interne.

Des Philippines.

12—13. PAPILLON Mémercus.

PAPILIO Memercus.

Pap. alis subdentatis, concoloribus, fusconigris : anticis apice griseiscenti radiatis, posticis immaculatis. (Mas.)

Papilio Nox? SWAINSON, *Zoological Illustrations, or original figures and descriptions, &c. cah. 21. pl. 102.*

Il est large d'environ quatre pouces, & d'un noir-brun de part & d'autre. Ses ailes supérieures

sont entières, & elles ont l'extrémité rayée longitudinalement de griffâtre. Ses ailes inférieures sont faiblement dentées & sans aucune tache. Le corps est de la couleur des ailes, avec les côtés de la poitrine, le dessous des palpes & le bout de l'anus d'un rouge-cramoisi. Les antennes sont entièrement noires.

Décrit d'après un individu mâle de la collection de M. Marchand, amateur à Chartres.

Il le trouve dans l'île de Java.

Nota. Le papillon *Nox* de M. Swainson paroît n'en différer que par l'absence des raies griffâtres du bout des ailes supérieures.

46—47. PAPILLON Serville.

PAPILIO Serville.

Pap. alis caudatis, dimidiatim flavescens nigrisque : anticis supra apice fasciis diabus abbreviatis albidis ; posticis lunula anali sanguinea punctifque marginalibus nigris.

Il est un peu plus grand que le *Doliceon*, auquel il ressemble beaucoup. Le dessus de ses ailes est d'un jaune-d'ocre pâle depuis la base, jusque vers le milieu, ensuite noir jufqu'au bout. Sur la partie noire, les ailes de devant ont deux bandes blanchâtres, transverses & triangulaires, dont l'inférieure interrompue par une nervure bifurquée, l'extérieure plus courte & plus étroite. Les secondes ailes, qui ont trois den s'inégales, avec une queue noire, linéaire, très-longue & terminée par du jaune-fauve ; les secondes ailes, dis-je, offrent parallèlement au bord postérieur une série de points blancs, & leur échancrure anale est jaune & accompagnée d'une lunule écailleuse.

Le dessous des quatre ailes diffère du dessus, en ce qu'il a un léger reflet violet ; en ce que la bande extérieure du bout des premières ailes est remplacée par une bande blafée à son origine & descendant jusqu'à l'angle interne, où elle finit en pointe ; en ce que les points blancs marginaux des secondes ailes sont surmontés d'un rang de taches jaunâtres, luisantes, grandes & presque en forme de coin ; enfin, en ce que la lunule rouge de l'angle de l'anus s'appuie sur deux arcs d'ato-

K l k k k

mes blancs. Le corps & les antennes sont comme chez le *Dolicoon*.

Décrit d'après un individu unique appartenant à M. de Serville, l'un des auteurs de la *Faune française*, & possesseur d'une des plus riches collections entomologiques de la capitale.

Il habite l'Amérique méridionale.

47—48. PAPILLON Devilliers.

PAPILIO Devilliers.

Pap. alis caudatis, atro-viridibus, nitidis, supra lunularum caeruleoventium serie postica: inferioribus subtus maculis argenteis, interpositis lunulis sanguineis.

Papillon Devilliers. GODART, *Mém. de la Société Linnéenne de Paris, tom. 2. pl. 1 des lépid. fig. 3. 4.*

Nous ne connaissons ce lépidoptère que par un individu mâle & unique, recueilli dans l'île de Cuba.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes ont le dessus d'un vert-bronzé-luisant, & liseré de blanc aux échancrures, avec une rangée postérieure de lunules bleuâtres, beaucoup plus grandes aux inférieures qu'aux supérieures.

Le dessous des premières ailes retombe au dessus, mais la couleur du fond varie selon les incidences de lumière; les lunules & le liseré des échancrures sont plus larges, & il y a un arc de points blancs à l'extrémité de la cellule discoidale.

Le dessous des secondes ailes est vert, avec l'origine de la côte & tout le bord postérieur d'un blanc-mat, le milieu d'un brun-pourpre & chargé de huit à neuf taches argentées, dont trois plus grandes & enveloppées extérieurement par les autres. Sur le blanc du bord postérieur règne un cordon de taches argentées, bordées chacune en dehors par un chevron noir, & en dedans par une lunule d'un rouge-ferrugineux. On voit en outre une tache rouge au-dessus de l'angle de l'aune. La queue de ces ailes est médiocrement longue & un peu en spatule. Le corps est vert en dessus, avec des points blanchâtres sur la tête; il est noir en dessous, avec une rangée de taches jaunâtres sur chaque côté de l'abdomen. Les antennes sont noires.

Dédié à M. le capitaine Devilliers, chevalier de St.-Ferdinand d'Espagne, amateur non moins recommandable par ses connaissances & par son zèle, que par son extrême obligeance à communiquer les espèces inédites de son intéressante collection.

61—62. PAPILLON Jafon.

PAPILIO Jafon.

Pap. alis subcaudatis, supra fuscis, fasciâ posticâque maculis sex viridibus. LIEB.

Papilio E. A. Jafon. LIEB. *Syfl. Nat. 3. p. 752. n. 58. — Hist. Lud. Ulr. p. 210.*

Papilio Jafon? ESP. *Pap. exot. tab. 56. fig. 5.*

D'après la figure susmentionnée ci-dessus, ce papillon parait bien être le même que *Eucrypile* (pag. 45. n. 61); mais, d'après Linnaeus, il en diffère par l'absence des taches & d'une ligne rouge de dessous des ailes inférieures. Ces caractères manquent-ils constamment, ou étroit-ils effacés dans l'individu décrit par Linnaeus? C'est ce qu'il nous est impossible de décider pour le moment; notre but est seulement d'appeler l'attention du lecteur sur ce point.

Des Indes orientales.

68—69. PAPILLON Empedocle.

PAPILIO Empedocles.

Pap. alis caudatis, fuscis: anticis utrinque fasciâ maculari viridi, transversâ, mediâ: posticis subtus ad angulum ani lunulis duabus nigris.

Papilio N. Empedocles, alis caudatis, fuscis: anticis fasciâ abbreviatâ, maculari, viridi: posticis subtus maculis duabus anguli ani. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n. 94. — Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 1. p. 70. n. 217.*

Papilio Empedocles. DONOV. *of an Epitom. of the Nat. Hist. Inf. of Ind. cah. 14. pl. 2. fig. 1*

Fabricius met à tort ce lépidoptère parmi les *Nymphales*.

Il est grand. Ses ailes supérieures sont finées, d'un brun-obscur de part & d'autre, avec une bande verte, transverse, médiane, & formée de cinq à six taches, dont les antérieures plus petites. Les ailes inférieures ont le dessus d'un brun-obscur, avec la base plus pâle. La queue qui les termine est large, médiocrement longue, arrondie & blanchâtre à son extrémité.

Le dessous de ces dernières ailes est à peu près de la couleur du dessus, avec deux lunules anales noires, surmontées chacune d'un croissant roux, & des atomes blanchâtres avant le bord postérieur. Le corps est brun, avec des poils blancs sur l'abdomen. Les antennes sont noires.

Des Indes orientales.

73—74. PAPILLON Coréfilaus.

PAPILIO Corefilaus.

Pap. alis caudatis, subhyalino flavescens, utrinque fasciis tribus nigris: posticarum fasciâ mediâ subtus lineâ sanguineâ longitudinaliter divisâ.

Il se distingue du *Protéfilaus* par les caractères ci-après: 1°. ses ailes ne sont pas blanches, mais d'un jaune-pâle, & sans teinte verdâtre à la base; 2°. les premières n'ont que trois bandes noires,

dont l'antérieure discoïdale, & ne descendant pas au-delà du milieu de la surface; la suivante fourchue ou en Y, & se réunissant près de l'angle interne à la postérieure qui est tout-à-fait marginale. 3°. Les trois bandes des secondes ailes sont visibles de part & d'autre, & l'intermédiaire d'entre elles est entièrement divisée en dessous par une ligne rouge, au lieu d'y être bordée par une ligne de cette couleur. 4°. Les lunules jaunâtres de l'extrémité des mêmes ailes ne forment qu'une seule rangée, & les croissans bleuâtres qui les accompagnent sont au nombre de cinq au lieu d'être au nombre de trois.

Le mâle ressemble à la femelle.

Recueilli au Brésil par M. le chevalier de Langford.

105—106. PAPILLON Homère.

PAPILIO Homerus.

Pap. alis caudatis, atris: anticis fasciâ mediâ maculisque flavis; posticis flavescensibus, serie marginali e maculis septem nigris extus lunulâ ferrugineâ marginatis.

Papilio E. A. Homerus, *alis caudatis, nigris, fasciâ flavâ: posticis subtilis flavescensibus, maculis ocellaribus septem.* F&B. *Ent. Syst. em. tom. 5. pars 1. pag. 29. n.º. 85.*

Papilio Homerus. Jon. *Fig. pict. 1. tab. 8.*

Papilio homerus. Esp. *Pap. exot. tab. 46. fig. 1.*

Il est grand. Son port est le même que celui du *Lyconeus*; & il à-dire qu'il a aussi une queue assez longue en spatule, plus une dent anale prolongée & aiguë. Le dessus de les ailes est d'un noir-brun; celui des supérieures a deux bandes jaunes, transverses, dont l'extérieure formée de six taches; l'intérieure continue, un peu courbe en arrière, précédée en avant d'une tache oblique également jaune & voisine de la côte. Les ailes inférieures ont le milieu traversé d'un bord à l'autre par une bande jaune, large, dentée en dehors. Leur queue est toute noire & surmontée de deux lunules rouges, convexes en dehors.

Le dessous des premières ailes ne diffère du dessus que parce que la bande du bout se réduit à quatre taches, dont l'antérieure seule bien prononcée.

Le dessous des secondes ailes est jaunâtre, avec une bande blanchâtre, discoïdale, transversale, & une rangée postérieure de sept taches noires, orbiculaires, séparées de la bande du milieu par des groupes d'atomes bleuâtres, & bordées chacune extérieurement par une lunule ferrugineuse ou d'un rouge-fauve. Le corps est noir en dessus, jaunâtre en dessous.

De l'Amérique.

121—122. PAPILLON De Lalande.

PAPILIO De Lalande.

Pap. alis caudatis, concoloribus, nigris, fasciâ mediâ transversâ ochraceâ: fasciâ anticarum bifidâ, posticarum extus dentatâ.

Papillon De Lalande. GODART, *Mém. de la Société Linnéenne de Paris, tom. 2. pl. 1. des lépid. fig. 1. 2.*

Il a près de quatre pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande transversale & médiane d'un jaune-d'ocre pâle. La bande des ailes supérieures forme à son origine deux branches, dont l'antérieure plus large & d'un gris-verdâtre. La bande des ailes inférieures offre à son côté externe six dents très-aiguës, & elle aboutit à l'angle anal, angle au-dessus duquel on voit une petite tache rouillée que surmonte un arc d'atomes blancs. Outre cela, le bord postérieur des premières ailes est précédé dans toute sa longueur d'une série de neuf points jaunes, & il y a sur chaque échancrure, ainsi qu'au bout de la queue, une lunule également jaune. La queue est assez longue & en spatule.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais il est plus pâle, excepté sur le côté externe de la bande & le long du bord postérieur. Le corps est noir en dessus; il est brun en dessous, avec la poitrine & les palpes jaunes. Les antennes sont entièrement noires.

Recueilli en Castrée, sur les bords de *Groot-Fisch Rivier*, par leu De Lalande, chevalier de la légion d'honneur & aide-naturaliste au Jardin du Roi.

129—130. PAPILLON Polygius.

PAPILIO Polygius.

Pap. alis caudatis, nigris, virescenti-nitidis: anticis utrinquâ ad apicem griseiscenti radiatis: posticis subtilis maculis novem chermesinis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses ailes sont d'un noir-loué, élargies au verdâtre. Les premières ont de part & d'autre, vers l'extrémité, des raies longitudinales griffées. Le dessous des secondes ailes offre à l'angle de l'anus une tache rouge, plus ou moins obscure, & accompagnée parfois d'une autre plus petite.

Le dessous de ces dernières ailes a neuf lunules d'un rouge-carmin tendre; savoir: six alignées le long du bord postérieur, les trois autres groupées entre le milieu du bord interne & la cellule discoïdale. Le corps est noir, avec les palpes, les côtés de la poitrine, les anneaux du ventre & l'anus d'un rouge-écarlate. Les antennes, la trompe & les braves sont noires.

La femelle ressemble au mâle, mais les raies

grifes de ses premières ailes font moins apparentes.

Des Philippines.

155—154. PAPILLON ? Palamède.

PAPILIO Palamedes.

Pap. alis caudatis, nigris, lunulis marginalibus flavis : anticis fasciâ flavâ, posticis maculâ nigrâ. FAB.

Papilio N. Palamedes. FAB. *Syst. Ent. p. 454. n.º. 45. — Spec. Inf. tom. 2. p. 18. n.º. 75. — Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n.º. 84. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 68. n.º. 215.*

Queique nous n'ayons point vu ce lépidoptère, nous soupçonnons qu'il appartient plutôt au genre *Papillon* qu'aux *Nymphales* parmi lesquelles *Fabricius* l'a placé.

Le corps est grand, noir en dessus, jaune en dessous, avec quatre points blancs sur la tête. Les antennes font renflées en dehors. Les ailes supérieures sont courbées, noires, avec une bande arquée & des taches marginales jaunes vers la base. Les ailes inférieures ont une bande de lunules rouffes, puis une bande de lunules bleues peu prononcées, & ensuite une série terminale de lunules jaunes. Leur angle anal offre une lunule rouffe, & leur queue est obtuse & tout-à-fait noire.

Le dessous ressemble au dessus, mais les lunules rouffes & les lunules bleues des ailes inférieures font plus distinctes.

De l'Amérique.

(Traduction de *Fabricius*.)

157—158. PAPILLON Afcalus.

PAPILIO Afcalus.

Pap. alis caudatis, concoloribus, virescenti-nigris, stigâ communi mediâ albâ : posticis maculis marginalibus chermesinis, geminatis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-verdâtre, avec une bandelette ou raie blanche, commençant en point vers le bout de la côte des supérieures, & finissant presque carrément vers le milieu du bord interne des inférieures. Ces dernières ailes sont dentées, liserées de blanc à chaque échancrure, & terminées par une queue de moyenne longueur, un peu en spatule. Sur leur bord postérieur est une suite de taches très-noires, grandes, longitudinales, cunéiformes, chargées chacune de deux taches d'un rouge-carmin, lesquelles font triangulaires & untes par un de leurs angles.

Le dessous des quatre ailes ressemble au dessus, mais le fond est un peu plus pâle, & les taches rouges des inférieures font plus claires, du moins dans l'individu que nous décrivons. Le corps est

noir, avec des points d'un rouge-carmin sur la poitrine & sur les côtés du ventre.

Du Brésil.

158—159. PAPILLON Harris.

PAPILIO Harrisianus.

Pap. alis caudatis, nigris, fasciâ communi mediâ albâ : anticis suprà maculâ basæ sanguineâ ; posticis utrinquè maculis marginalibus chermesinis, emarginatis.

Papilio Harrisianus. SWAINSON, *Zoological Illustrations, or original figures and descriptions, &c. cah. 22. pl. 109.*

Ce papillon a été dédié par M. Swainson à M. Moses Harris, artiste anglais très-distingué.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande blanche, commune, médiane, s'atteignant ni la côte des supérieures, ni le bord interne des inférieures. Les ailes supérieures ont à la base une tache d'un rouge-vermillon. Les inférieures font dentées, & terminées par une queue assez longue, un peu en spatule. Leur extrémité offre une série de sept taches échancrées d'un rouge-carmin.

Le dessous diffère du dessus en ce que la base des quatre ailes a plusieurs taches vermillon, & en ce que les inférieures font marquées au bord interne d'une veine très-rouge qui aboutit aux taches basillaires, mais ne touche pas la tache anale. Le corps est noir & sans taches.

Il est des individus chez lesquels la bande des premières ailes monte à peine jusqu'au disque ; il en est d'autres qui font sans bande aux ailes inférieures, & qui n'ont qu'une tache blanche transversale au bord interne des inférieures. Le dessus de ces dernières ailes n'offre parfois que quatre taches rouges à son extrémité ; celles qui avoient le fond manquent.

Du Brésil.

GENRE THAÏS.

1—2. THAÏS Cérify.

THAÏS Cerify.

Th. alis subcaudatis, flavescens : anticis utrinquè fuscis septem transversis nigris ; posticis stigâ posticâ à lunulis sex coccineis.

Thaïs Cerify. GODART, *Mém. de la Société Linn. de Paris, tom. 2. pl. 2 des lépid.*

Nous ne connoissons cette nouvelle *Thaïs* que d'après un seul individu, qui nous a été généreusement offert par M. Lefebure de Cérify, ingénieur de la marine à Toulon.

Elle a approchant deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un jaune très-pâle, avec la base noire & garnie de poils blan-

châtes. Les ailes supérieures offrent sept bandes noires transversales, dont les trois antérieures courtes & appuyées obliquement par la côte, les trois suivantes maculaires & plus longues, la septième terminale & crénelée. Les ailes inférieures ont six taches écarlates, dont la supérieure isolée vers le milieu du bord d'en haut, les cinq autres alignées parallèlement au bord d'en bas. Ses taches font suivies d'autant de lunules noires fur lesquelles il y a une poussière bleuâtre, & le bord postérieur est longé par une ligne noire anguleuse & interrompue. On remarque en outre quatre à cinq points noirs derrière la cellule discoidale.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, mais il est luisant, & les deux bandes noires de son extrémité font moins apparentes.

Le dessous des secondes ailes présente des différences qui consistent : 1°. en ce que le bord antérieur, le milieu de la surface & celui de chaque échancrure font lavés de blanc-argenté; 2°. en ce que la cellule du disque renferme trois taches longitudinales d'atomes noirâtres. Le corps est velu, jaunâtre, avec le dos noir, & sept lignes transversales orangées sur chaque côté de l'abdomen. Les antennes, la trompe & les pattes font noires.

Prise au mois de février, sur les montagnes élevées & arides d'Ourlac (archipel de la Méditerranée).

Nota. Cette espèce se distingue de ses congénères en ce qu'elle a la deuxième dent après l'angle de l'anus prolongée en manière de queue.

GENRE LIBYTHÉE.

2. LIBYTHÉE Téréna. (*Duplicata*.)

LIBYTHEA Tereña.

Libyt. alis angulato-dentatis : anticis utrinque maculis quatuor albis; posticis supra disco albedo seu rufescente.

La description que nous avons donnée de cette espèce (*pag.* 170), ayant été faite sur un individu mâle, n'est point exacte; c'est pourquoi nous en donnons ici une nouvelle d'après plusieurs exemplaires des deux sexes.

Son envergure est d'environ deux pouces. Ses ailes supérieures font d'un brun-noirâtre de part & d'autre, avec quatre taches blanches, dont une en forme de point vis-à-vis du sommet, les deux suivantes disposées en une bande oblique; la quatrième longitudinale, très-grande, & prenant une teinte fauve près de l'origine de l'aile.

Le dessous des ailes inférieures est rouffâtre dans le mâle, blanchâtre dans la femelle, avec tout le pourtour extérieur d'un brun-noirâtre & finé à son côté interne. Le dessous est d'un gris-rosé, piqué de noirâtre, avec deux taches près du mi-

lieu du bord d'en haut, & le bord postérieur moins fon angle externe, d'un brun-obscure. Le corps est brun en dessus, gris en dessous. Les antennes font noirâtres & finement annelées de blanc.

Dans la variété mâle dont nous avons parlé à la page 170, la tache longitudinale de la base des premières ailes est tout-à-fait fauve.

Des Antilles, & principalement de l'île de Cuba.

5—6. LIBYTHÉE Geoffroy.

LIBYTHEA Geoffroy.

Libyt. alis angulato-dentatis, supra fuscis, violaceo nitidis; anticis apice punctis tribus albidis, posticis disco maculâ rufescente.

Libythée Geoffroy. *God. Mém. de la Société Linn. de Paris, tom. 2. pl. 2 des lépid.*

Nous n'avons vu que le mâle de cette libythée.

Il a un peu plus de deux pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec presque toute la surface des supérieures, & la base des inférieures, glacées de violet-argenté. Les ailes supérieures ont vis-à-vis du sommet trois points blanchâtres, plus ou moins distincts & formant un arc oblique. Les ailes inférieures offrent vers leur milieu une tache rouffâtre qui est coupée par une nervure.

Le dessous des premières ailes est d'un brun-clair, avec une tache longitudinale fauve à la base, plusieurs points blancs groupés deux à deux sur le milieu, & des atomes d'un gris-violet au sommet.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun piqué de violâtre, avec trois bandes blanchâtres, transverses, dont les deux postérieures se réunissant à l'angle externe de l'aile. Le corps a le dessus brun, le dessous gris. Les antennes font noirâtres, avec la base annelée de blanc en dessous, la massue grêle & terminée de fauve.

Dédiée à M. le chevalier Geoffroy-Saint-Hilaire, membre de l'Académie des Sciences, professeur au Muséum d'histoire naturelle, à la Faculté des Sciences de Paris, &c. &c.

De l'île de Java.

GENRE COLIADE.

1—2. COLIADE Clorinde.

COLIAS Clorinde.

Col. alis angulatis, rufescenti-albidis (Maris pallidioribus), disco jugularum puncto ocellari aurantio; anticis supra medium costæ versus maculâ citrinâ.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces d'envergure. Le dessus de toutes les ailes est d'un blanc-verdâtre, avec un point central orangé à

prunelle noire. Les ailes supérieures offrent en outre vers le milieu de la côte une grande tache d'un jaune-citron.

Le dessous est verdâtre & légèrement réticulé, avec un point central incarnat répondant au point oculaire de la surface opposée. Le corps est de la couleur des ailes, & les antennes font d'un gris-rosé qui s'étend sur la tête.

Les femelles, ou du moins les deux que nous avons vues, font un peu plus verdâtres que les mâles; mais elles ont la tache jaune du dessus des ailes supérieures moins prononcée.

Du Brésil.

GENRE PIÉRIDE.

56—57. PIÉRIDE *Thymétus*.

PIERIS Thymetus.

Pier. alis integerrimis, flavis, limbo communi fusco. FAB.

Papilio F. Thymetus. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 30. n. 320. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 56. n. 173.*

Ce lépidoptère paroît avoir tant de rapport avec la piéride (*par correction* la coliaide) *sinuata* que nous le plaçons immédiatement après elle.

Fabricius le décrit ainsi: il est petit. Les antennes font noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue fauve. Le corps est jaunâtre, avec le corselet noirâtre. Le dessus des ailes est jaune, avec tout le limbe postérieur noir. Leur dessous est d'un jaune-pâle, avec des ondes fauves. Il habite.....

87—88. PIÉRIDE *Cronissa*.

PIERIS Cronissa.

Pier. alis integris, concoloribus: anticis nigris, disco maculisque marginalibus albis; posticis albis immaculatis.

Papilio Cronis. (Mas.) CRAM. *pl. 60. fig. C.*

Cramer a pris cette piéride pour le mâle de la castine *Cronis*. (*Voyez ci-dessus* genre *CASTINE*, page 801, n. 17.)

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Ses premières ailes font noires de part & d'autre, avec des taches blanches, dont une très-grande occupant le disque & se terminant en pointe à la base de l'aile, quatre ou cinq linéaires & longitudinales sur la côte, les autres en forme de points & alignés le long du bord postérieur. Les secondes ailes font blanches, & sans taches en dessus comme en dessous. Le corselet est noir, avec une tache rouge à l'origine de chaque épauvette.

Des Indes occidentales.

102—103. PIÉRIDE *Placidia*.

PIERIS Placidia.

Pier. alis suboblongis, integerrimis, immaculatis, supra nigro-fuscis, subtus glaucis.

Papilio Placidia. STOLL, *Pap. Suppl. à CRAM. pl. 28. fig. 4 & C.*

Elle a approchant trois pouces d'envergure. Ses quatre ailes font d'un brun-noirâtre en dessus, d'un vert-blanchâtre en dessous, & sans taches de part & d'autre.

Décrite d'après un individu sans corps. De l'île d'Amboine.

103—104. PIÉRIDE *Libérius*.

PIERIS Libérius.

Pier. alis suboblongis, integerrimis, immaculatis, supra plumbeis: subtus anticis virescentibus, posticis lutescentibus.

Papilio F. Libérius, alis integerrimis, plumbeis: subtus anticis viridibus, posticis fulvis. FAB. *Spec. Inf. tom. 2. p. 52. n. 229. — Mant. Inf. tom. 2. p. 25. n. 264. — Entom. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 42. n. 126.*

Papilio Liberia. CRAM. *pl. 210. fig. G. H.*

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses quatre ailes est couleur de mine de plomb. Le dessous des supérieures est verdâtre, le dessous des inférieures d'un jaune-fauve. Les unes & les autres font sans taches de part & d'autre, seulement leur bord terminal est légèrement noir.

De l'île d'Amboine.

155—156. PIÉRIDE *Melia*.

PIERIS Melia.

Pier. alis oblongis, integerrimis: anticis nigris, lineâ longitudinali maculisque duabus transversis flavis: posticis supra flavis, lura limboque nigris; subtus puncto basæo coccineo.

Elle a le port & la taille de la piéride *Mélite* (*pag. 165*). Le dessus des premières ailes est noir, avec une raie longitudinale à la base, puis deux taches tranversales, jaunes. La tache antérieure est large, tandis que la postérieure est petite & trifide.

Le dessous des secondes ailes est jaune, avec le limbe postérieur, l'extrémité des nervures, & une liture arquée vers le bord interne, noirs.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, excepté qu'il est plus pâle & que la tache jaune de l'extrémité est plus grande.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-noirâtre-pâle, avec des taches jaunes tout le long des bords & sur le disque. Il oïtre en outre à la

basse un gros point d'un rouge-écarlate. Le corps est noir en dessus, jaune en dessous. Les antennes sont noires.

Décrite d'après un individu mâle, appartenant à M. Florent Prévost.

Du Brésil.

GENRE DANAÏDE.

Observ. Les Danaïdes forment trois divisions distinctes; savoir :

1°. Mâles ayant le bord interne des premières ailes fortement arqué.

2°. Mâles ayant vers le milieu du bord interne des premières ailes une petite bande ou raie longitudinale, formée par des écailles plus claires & disposées autrement que sur le reste de la surface.

3°. Mâles ayant une petite poche au-dessous de la cellule discoidale des secondes ailes.

Nous avons déjà signalé la première & la troisième divisions dans la note des pages 177 & 184 de ce volume.

2. DANAÏDE EUNICE.

DANAIS Eunice. (Voyez page 177.)

Danaïde Eunice. *Voy. du cap. DE FREYCINET, pl. 85. fig. 1.*

Les individus recueillis dans l'île Guam (une des Mariannes), par MM. les docteurs Quoy & Gaimard, ont constamment la tache du milieu des ailes supérieures plus grande que ceux qui se trouvent à Java.

12-13. DANAÏDE DUFRESNE.

DANAIS Dufresne.

Dan. alis integris, supra nigris, violaceo mutabilî nitidissimis; anticis utrinquè fasciâ apicis abbreviatâ albâ.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est noir, avec un rellet d'un bleu-violet très-vif & changeant de place selon les aspects. Les premières ont vis-à-vis du sommet une bande blanche, oblique, courte, maculaire, & le long du bord postérieur une série de points d'un blanc-bleuâtre. Les secondes ailes sont fans taches dans le mâle, mais elles ont chez la femelle une rangée marginale de petits points blanchâtres, plus trois taches blanches orbiculaires alignées transversalement en face du sommet.

Le dessous diffère du dessus, en ce que le fond est brun; en ce qu'il y a des points bleuâtres sur le milieu des ailes supérieures des deux sexes, & à l'extrémité des ailes inférieures du mâle. Un caractère qu'il est encore bon d'indiquer, c'est que chaque aile a un petit liféré blanc interrompu.

Le corps est noir, avec des points blancs sur la poitrine ainsi que sur le corselet, & une série de taches d'un gris-bleuâtre le long du ventre. Les antennes sont noires.

Dédiée à M. Dufresne, chef des travaux zoologiques au Jardin du Roi.

Des Philippines; collection de M. Cotty de Brécourt.

16-17. DANAÏDE SWAINSON.

DANAIS Swainson.

Dan. alis integris, fuscis: anticis utrinquè fasciâ apicis abbreviatâ, posticis punctis marginalibus in serie duplici, albis.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus des quatre ailes est d'un brun-noirâtre, avec une double série de points blancs le long du bord postérieur. Il y a en outre, vis-à-vis du sommet des premières ailes, une bande blanche, oblique, courte & maculaire.

Le dessous ressemble au dessus, mais le fond est un peu plus clair; le disque des ailes supérieures offre trois ou quatre taches blanches inégales, & le disque des inférieures deux ou trois points blanchâtres. Le corps est brun, avec des points blancs sur la poitrine ainsi que sur le corselet, & un rang de taches grises le long du ventre. Les antennes sont noires.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle a le bord interne des premières ailes un peu concave, & sans raie longitudinale luisante.

Dédiée à M. William Swainson, qui publie en ce moment, avec figures, un très-bel ouvrage anglais sur la zoologie.

Des Indes orientales; collection de M. Cotty de Brécourt.

17-18. DANAÏDE ELEUTHO.

DANAIS Eleutho.

Dan. alis repandis, fuscis, fusciâ maculari punctisque marginalibus albis.

Danaïde Eleutho. *Voy. du cap. DE FREYCINET, pl. 83. fig. 2.*

Cette danaïde se distingue de celles de sa division par la concavité du bord postérieur des premières ailes & par les sinus du bord analogue des secondes.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande maculaire postérieure, & des points marginaux, blancs. La bande des premières ailes n'atteint pas la côte. La bande des secondes est échancrée sur les côtés dans son milieu.

Le dessous ressemble au dessus; mais le fond est plus pâle, la bande des ailes supérieures est plus longue, & le disque des inférieures offre quatre

à cinq petits points violâtres. Le corps est brun , avec des points blancs sur la poitrine.

Nous n'avons vu que des mâles. Ils ont aux ailes supérieures une raie longitudinale plus claire que le fond.

De Guam , îles Mariannes.

GENRE HÉLICONIE.

22—25. HÉLICONIE Affrica.

HELICONIA Affrica.

Hel. alis oblongis, integerrimis, nigris : anticiis supra maculis duabus, posticis fasciâ dentatâ disci, albis.

Papilio Affrica. CRAM. *pl.* 565. *fig.* A. B.

Papilio Affrica. HERBST, *Pap.* tab. 79. *fig.* 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes sont noires, avec deux taches blanches irrégulières vers le milieu des supérieures, & une large bande dentée, également blanche, sur le milieu des inférieures.

Le dessous diffère du dessus en ce que la côte & le bord postérieur des quatre ailes sont chargés d'une série de points blancs.

Cramer la dit de l'île d'Amboine; mais ne seroit-elle pas plutôt du nouveau continent?

GENRE CÉTHOSIE.

9—10. CÉTHOSIE Lefchenault.

CETHOSIA Lefchenault.

Ceth. alis dentatis, supra violaceo-nigris, holosericeis; subtus ferrugineis, nigro viviscentique variegatis: omnibus utrinque fasciâ terminali ochraceâ.

Par le dessus des ailes, cette espèce a quelques rapports avec le *Morio* ou vanelle *Antope*. (*Voyez* page 508. n°. 28.)

Son envergure est de trois pouces & demi. Ses ailes sont à peu près rondes, & dentées. Leur dessus est d'un noir-velouté à reflet violâtre, avec une bande d'un jaune-d'ocre, terminale, large, se répétant en dessous, & formée par des taches très-voisines, qui sont en forme de coin. En avant de cette bande, & non loin de la côte, le dessus des premières ailes offre deux taches du même jaune.

Le dessous de chaque aile est ferrugineux, & dessiné ainsi qu'il suit: entre la base & le milieu sont trois bandes transverses d'un vert-grisâtre, coupées dans le sens de leur longueur par des lignes noires; vient ensuite, parallèlement à la bande terminale, une série de petites taches plus ou moins noires, réuniformes, entourées de jau-

nâtre aux ailes de devant, de cendré à celles de derrière.

Recueillie dans l'île de Java par M. le chevalier Lefchenault, voyageur du Gouvernement.

GENRE ARGYNNE.

14—15. ARGYNNE Clagia.

ARGYNNIS Clagia.

Arg. alis subdentatis, fulvis, supra limbo postico aut strigis tribus undulatis nigris: subtus margaritaceo nitidis, striga ocellorum.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus du mâle est d'un fauve-jaune, avec une large bande terminale d'un noir-violet, & bordée à son côté interne par des points très-noirs. Il y a en outre aux secondes ailes une ligne noire qui se dirige obliquement du disque à l'angle de l'aune. Le dessous a la moitié antérieure fauve & glacée de gris de perle; la moitié postérieure ferrugineuse, avec trois lignes nacrées, transverses & flexueuses, dont les deux antérieures séparées par une lérie d'yeux roux à prunelle noire. Le corps est verdâtre en dessus, grisâtre en dessous.

La femelle a le dessus d'un fauve-obscur, avec trois lignes ondulées transversales, & un cordon de points, noirs; sans compter une tache nacrée occupant le milieu de la côte. Son dessous ressemble à celui du mâle, mais il est généralement plus terne.

De l'île de Java; collection de MM. Marchand & Devilliers aîné.

15—16. ARGYNNE Egestine.

ARGYNNIS Egestina.

Arg. alis subcaudatis, basi supra fulvis, apice nigris: posticis subtus nitide glaucis, strigâ ocellorum.

Argynne Egestine. Voyage du capitaine DE FREYCINET, pl. 83. *fig.* 4.

Elle a le port & à peu près la taille de l'*Egesta*. Le dessus des quatre ailes est fauve depuis la base jusqu'au milieu, ensuite noir jusqu'au bout.

Le dessous des ailes supérieures est jaunâtre & sans taches vers le bord interne; il est brun vers la côte, avec la base verdâtre & coupée transversalement par quatre lignes noires, le milieu marqué d'une bande blanche luisante, derrière laquelle il y a une bande verdâtre peu prononcée.

Le dessous des ailes inférieures est d'un vert-blanchâtre-luisant, avec une rangée transversale de cinq yeux noirs à iris roux sur le milieu, & un double cordon de lunules nacrées le long du bord postérieur. Le corps est noirâtre en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont ferrugineuses.

Recueillie à l'île de Guam (une des Mariannes) par

par MM. Quoy & Gaimard, médecins de l'expédition de M. le capitaine de Freycinet.

24—25. ARGYNNE Elisa.

ARGYNNIS Elisa.

Arg. alis subdentatis, fulvis, nigro maculatis: posticis subtus latè ochraceis, costâ bascos, maculis parvis numerosissimis pupillâque ocellorum aliquid fuscescentium argenteis.

Argyne Elisa. God. Tab. méth. des lépid. de France, DIURNES, p. 64. n^o. 86. 87.

Chez les argynnes *Aglabé*, *Adippé*, *Niobé* (pag. 264, 265, 266), les taches noires du milieu des ailes forment une ligne transverse en zig-zag, & les chevrons qui précèdent le bord postérieur se touchent. Dans l'argyne *Elisa*, au contraire, toutes les taches noires sont isolées & moins grandes. Le dessous des secondes ailes diffère d'ailleurs en ce qu'il est d'un jaune plus gai, qu'il a les taches nacrées plus petites, plus nombreuses, environnées de brunâtre, & en ce que celles de l'extrémité sont presque réniformes, au lieu d'être triangulaires comme dans l'*Adippé* & la *Niobé*. Indépendamment de cela, les nervures du dessus des ailes supérieures du mâle ne sont point dilatées dans leur milieu.

Communiquée par M. Lefebure de Cérify.

Elle habite la Corse & la Sardaigne.

58—59. ARGYNNE Aceste.

ARGYNNIS Aceste.

Arg. alis subintegris, luteis, anticarum dimidio apicali nigro supra fasciâ flavâ: subtus omnibus fusco fasciatis.

Papilio N. Aceste, *alis subdentatis: primoribus nigris, basi fasciâque flavis; posticis flavis, subtus fasciis.* LAMM. *Syfl. Nat.* 2. p. 762. n^o. 191. — *Mus. Lud. Utr.* p. 298.

Papilio N. Aceste. *FAB. Syfl. Ent. pag.* 511. n^o. 287. — *Spec. Inf. tom.* 2. p. 100. n^o. 442. — *Mant. Inf. tom.* 2. p. 54. n^o. 557.

Papilio S. Aceste. *FAB. Ent. Syfl. em. tom.* 3. pars 1. p. 245. n^o. 764.

Papilio Acesta. CLERCK, *Icon. tab.* 43. fig. 5. 6.

Papilio Aceste. HERBST, *Pap. tab.* 145. fig. 3. 4.

Papilio Aceste. CRAM. *pl.* 121. fig. E. F.

STOLL, *Suppl.* à CRAM. *pl.* 6. fig. 6. (la chenille.) fig. 6. E. (la chrysalide.)

Fabricius a placé cette espèce parmi les *Nymphales*, puis parmi les *Satyres*; mais par sa chenille, elle nous paroit appartenir aux *Argynnes*.

Son envergure est d'environ deux pouces. Les premières ailes ont la moitié antérieure d'un jaune-

Hist. Nat. Inf. Tome LX.

fauve; l'autre moitié noire, avec une bande oblique, jaune ou blanchâtre, puis un arc transversal de trois points blancs. Le dessus des secondes ailes est d'un jaune-fauve, avec une double rangée marginale de taches noires, dont les intérieures lunulées. Le dessous des premières ailes diffère du dessus, en ce qu'il y a à la base quelques lignes noires transverses, & au sommet quatre raies blanchâtres, également transverses. Le dessous des secondes ailes est d'un gris-violâtre, rayé transversalement de brun, & marqué avant le bord postérieur d'une suite de lunules bleues. L'empreinte des lignes brunes des quatre ailes se fait sentir en dessus.

La chenille vit sur le *cacaoyer*. Stoll la représente d'un vert-fauve, avec une ligne jaunâtre le long de chaque côté, des épines noires & légèrement branchues sur le dos. La tête, qui est pareillement noire, offre deux épines semblables, mais un peu plus longues.

La chrysalide est brune, rayée de jaune & parsemée de points argentés. Elle a sur le dos quatre points noirs, & la partie antérieure est profondément bilobée.

De Surinam.

64. ARGYNNE Téléstus.

ARGYNNIS Teletusa.

Arg. alis oblongis, denticulatis, supra nigro-fuscis, anticarum maculis, posticarum fasciâ, fulvis: subtus anticis ocello unico, posticis quinque, cæcis.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Ses quatre ailes sont faiblement dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec quatre taches incogales sur les supérieures, une bande, puis une ligne ondulée sur les inférieures, fauves. Les échancrures du bord terminal font en outre ciliées de blanchâtre ou de jaune-fauve.

Le dessous des premières ailes est fauve vers la base, avec un point plus pâle, noirâtre au milieu, avec deux taches d'un jaune-d'ocre; brunâtre à l'extrémité, avec un œil & une ligne flexueuse obscurs, plus une liture blanche devant le sommet.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun plus ou moins jaunâtre, avec des taches à la base, une bande peu prononcée au milieu, une rangée de lunules avant le bord postérieur, d'un blanc-violâtre-luisant. Entre la bande & les lunules sont cinq taches noirâtres, un tant soit peu cercelées de jaunâtre. Le corps & les antennes sont comme dans le *Janthé*.

Quelquefois la bande du dessus des secondes ailes & les trois taches antérieures du dessus des premières sont d'un jaune-d'ocre; il n'y a de fauve que la tache postérieure des ailes de devant.

Du Brésil.

65. ARGYNNE Janthé.

ARGYNNIS Janthé.

Arg. alis oblongis, dentatis, suprâ nigro-fuscis; anticarum maculis, posticarum fuscis; albis: subtus anticis ocellis duobus pupillatis, posticis sex cæcis.

Papilio N. Janthé, alis dentatis, suprâ fuscis, albe fuscifasciatis: posticis subtus ocellis quinque cæcis. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 102. n^o. 315.*

Papilio Hera. CRAM. *pl. 255. fig. F. G.*

Papilio Hera. HERBST, *Pap. tab. 259. fig. 1. 2.*

Par sa forme, cette espèce sembleroit appartenir à la division des *Nymphales* à ailes oblongues; mais il suffit de voir les palpes & ses antennes pour être convaincu que c'est une *argynne*.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces d'envergure. Les quatre ailes sont dentées, d'un brun-noirâtre en dessus, avec plusieurs taches éparées sur le milieu des supérieures, & une bande transverse & étroite sur le milieu des inférieures, blanches. Les échancrures du bord terminal sont en outre garnies de cils blancs.

Le dessous des premières ailes est d'un jaunefauve depuis la base jusqu'au milieu, avec deux points blancs cercelés de noir; brun du milieu à l'extrémité, avec des taches & une ligne ondulée blanches, plus deux yeux à prunelle & à iris de cette couleur.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-jaunâtre-pâle, avec des taches à la base, une bande transverse sur le milieu, une série de lunules avant le bord postérieur, blanches. Entre ces lunules & la bande il y a une rangée transverse de six gros points noirs bordés de blanc. Le corps est noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous. Les antennes sont brunes, annelées de blanc, avec la sommité de la massue fauve.

La femelle se distingue du mâle en ce que les lunules de l'extrémité de ses ailes inférieures se répètent en dessus, du moins dans les individus que nous avons vus.

De la Guyane & du Brésil, & non de la Guinée comme le dit Cramer.

66. ARGYNNE Flavia.

ARGYNNIS Flavia.

Arg. alis oblongis, integris, dilutè fulvis, suprâ omnium limbo postico anticarumque litorâ obliquâ nigris: posticis subtus undis ferrugineis longique punctorum fuscorum.

Elle a de quinze à dix-sept lignes d'envergure. Le dessus de ses quatre ailes est blond ou d'un fauve-clair, avec une bordure terminale noire. La bordure des secondes ailes est surmontée d'une

ligne en fesson de sa couleur. Les premières ailes ont à la base quelques *figmas* noirâtres, & derrière le milieu une liture noire, oblique, souvent interrompue.

Le dessous des ailes supérieures ressemble au dessus, mais il est plus pâle, tant sous le rapport du fond que sous celui du dessin. Le dessous des secondes ailes est légèrement oûdé de ferrugineux, & il offre avant les deux lignes de l'extrémité une rangée transverse de points noirâtres. Ces points se répètent quelquefois en dessous, principalement chez la femelle.

Du Brésil.

GENRE VANESSE.

5 (*duplicata*). VANESSE Hypocla.*VANESSA Hypocla.*

Van. alis subcaudatis, suprâ nigris, fasciis communibus fulvis aut albis: subtus lutescentibus, brunneo reticulatis; posticis strigâ à maculis margantæticis.

Nous n'avons décrit dans le temps que le mâle de cette espèce (voy. page 298). La femelle en diffère en ce que les bandes du dessus de ses ailes sont blanches au lieu d'être fauves; en ce qu'elle a le dessous plus pâle, l'abdomen blanchâtre & annelé de brun.

De Java, d'Amboine & de la Chine.

5-6. VANESSE Hypselis.

VANESSA Hypselis.

Van. alis subcaudatis, suprâ nigris, fasciis communibus fulvis: subtus albis, nigro multumaculatis; posticis strigâ ex ocellis viridimontanis. (Mas.)

Nous avons pris d'abord ce lépidoptère pour une variété de l'*Hypocla*; mais il forme une espèce distincte, dont la femelle nous est encore inconnue.

Il ressemble en dessus à l'*Hypocla* (page 268). En dessous, il est blanc vers la base, d'un jaune-orangé pâle à l'extrémité, avec une multitude de taches noires, parmi lesquelles les premières ailes offrent une tache ferrugineuse, réniforme & longitudinale. Les secondes ailes ont, avant le bord postérieur, une rangée transverse de cinq taches d'un vert de montagne, placées sur un fond noir & encadrées de jaune. La troisième & la quatrième, à compter du sommet, sont cunéiformes, tandis que les autres sont lunulées & plus petites.

De Java.

13-14. VANESSE Léthé.

VANESSA Lethé.

Van. alis subcaudatis, suprâ fulvis: anticis apice latè nigro fasciâ maculâque fulvis; posticis

eis lineis marginalibus nigris, anteriore abbreviatâ dilatâtiue.

Papilio N. Lethæ, alis dentato-caudatis, fulvis: anticis apice nigris, fasciâ maculâque flavis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 80. n^o. 250.

Papilio Lethæ. JON. Fig. piçâ. 5. tab. 18. fig. 2.

Papilio Lethæ. DOSOV. of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of India, cah. 3. pl. 2. fig. 1.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un fauve-foncé à la base; ensuite noir jusqu'au bout, avec une bande oblique sur le milieu, & cinq taches vis-à-vis du sommet, fauves ou jaunes. Les taches forment deux lignes, dont l'antérieure oblique & surmontant un point blanc, la postérieure transverse & courbée en arrière.

Le dessus des secondes ailes est d'un fauve-foncé, avec trois lignes marginales, dont l'antérieure très-dilatée vers la côte & ne descendant pas au-delà du niveau du disque. Il y a en outre, entre le bord interne & l'origine de la petite queue, une suite de trois croissans plus ou moins blanchâtres.

Le dessous des premières ailes est d'un jaunepâle, réticulé de ferrugineux, avec deux ou trois points, puis une double liture, d'un blanc-violâtre vers l'extrémité.

Le dessous des secondes ailes ressemble au dessous des premières, près du bord d'en haut; mais il est ensuite d'une couleur feuille-morte plus ou moins obscure, avec une rangée de trois plus deux points oculaires à prunelle violâtre, & une série marginale de lunules lilas-clair. Les trois lunules placées entre le bord interne & la petite queue sont surmontées d'atomes verdâtres, & il y a entre la base & le disque trois à quatre *figmas* bleuâtres, consécutifs.

Du Brésil.

14—15. VANESSE Paullus.

VANESSA Paullus.

Van. alis bicaudatis, supra fulvis: anticis apice nigro maculis fulvis; posticis angulo anteriori cærulescente.

Papilio N. Paullus, alis dentato-bicaudatis, fulvis apice nigris: posticis subtus variegatis, maculâ basæ albâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 65. n^o. 199.

Papilio Paullus. JON. Fig. piçâ. tab. 78. fig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est fauve. Les premières ont au sommet un large espace noir, avec trois taches fauves, inégales, & un seul point blanc. Il y a en outre sur leur milieu une ligne noire,

transversale & presqu'en S. Les secondes ailes offrent avant le bord postérieur trois lignes noires, tortueuses, indépendamment desquelles on voit à l'angle de l'anus une tache noire saupoudrée de bleu.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre, avec deux lignes ferrugineuses, transverses, bordées de bleuâtre sur un de leurs côtés, & séparées de la base par quelques taches blanches. Vis-à-vis du sommet des premières ailes, est une ligne arquée de quatre points dont les deux antérieurs & le postérieur ocellés, l'autre plus gros & tout blanc. Le bord terminal des secondes ailes est longé par un cordon de lunules violâtres.

Chez la femelle, le dessus des premières ailes est moins noir au sommet que chez le mâle.

Des Antilles.

15 (*duplicata*). VANESSE Point d'interrogation.

VANESSA P. interrogationis.

Van. alis angulatis, supra fulvis nigro maculatis, margine postico cæcis: posticis subtus argenteo notatis.

Ainsi que nous l'avons dit à la page 502, Fabricius a confondu le *C. Aureum* de Linnæus avec cette espèce américaine.

Elle a deux pouces à deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est fauve, avec huit ou neuf taches noires inégales aux supérieures, & trois aux inférieures. Son extrémité qui est d'un ferrugineux plus ou moins intense, avec une série transverse de taches jaunâtres, est bordée extérieurement de bleu-cendré.

Le dessous est d'un brun-noirâtre ou feuille-morte, plus ou moins nuancé de gris-violet, avec une tache argentée en forme de point d'interrogation ou de C interrompu sur le disque des ailes inférieures. On remarque en outre vers le bout des quatre ailes une rangée transversale de points noirs, en partie faibles de bleuâtre.

La femelle, ordinairement plus grande que le mâle, a l'origine de la côte jaune & réticulée de ferrugineux en dessous. Le prolongement de ses secondes ailes est en outre plus prononcé, & le dessus de ses premières ailes offre neuf taches noires.

Voyez pour la synonymie & pour la description de la chenille, les pages 301 & 302 de ce volume.

De l'Amérique septentrionale.

19 (*duplicata*). VANESSE Progné.

VANESSA Prognæ.

Van. alis angulatis, supra fulvis, maculis anticarum octo posticarumque apice lato nigris: posticis subtus angulo albo notatis.

Elle ressemble beaucoup à *L-Blanche* (p. 305); mais, outre qu'elle est d'un fauve plus foncé en dessus, elle a le limbe terminal des premières ailes, & presque la moitié postérieure des secondes, noirs. Les ondes grises du dessous de ses ailes occupent d'ailleurs plus d'espace.

Nous avons vu d'abord, comme Cramer & Fabricius, un individu chez lequel l'angle blanc du dessous des ailes inférieures étoit effacé, c'est ce qui nous a fait dire que cette espèce n'avoit pas de tache sur le disque; mais nous sommes actuellement convaincus du contraire. D'après cela, il faut regarder comme non-venu le dernier alinéa du n^o. 18, page 304, puisque le lépidoptère que nous y signalons est le même que la *Progné*.

De l'Amérique septentrionale & de la Jamaïque.

24 (*duplicata*). VANESSE Xanthomelas.

VANESSA Xanthomelas.

Van. alis supra fulvis, limbo latè nigro lunulis violaceo-ceruleis: anticis maculis quatuor disci nigris lunulæque apicis albæ: posticis subtus strigâ mediâ nigricante, antrosum biangulata.

Vanessa Xanthomelas. GOD. Tab. méth. des lépid. de France, DUBRUIS, page 41. n^o. 113.

Comme nous n'avons donné cette vanesse que d'après les auteurs, il est nécessaire que nous en parlions actuellement *ex vivo*.

Elle se distingue de la *Polychlore* (page 504) par les caractères que voici : 1^o. les deux taches supérieures du disque de ses premières ailes sont oblongues & lunulées, & celle de l'angle de l'anus est ronde, tandis que le contraire a lieu chez la *Polychlore*; 2^o. la lunule du sommet des mêmes ailes est toujours blanche, & le jaune est à peine sensible entre les taches noires de leur bord antérieur; 3^o. la bordure terminale des quatre ailes est plus large, & celle des ailes inférieures n'est ni dentée, ni liserée de jaunâtre à son côté interne; 4^o. la ligne noirâtre qui traverse en dessous le milieu de ces dernières ailes forme deux angles, au lieu d'un, à sa partie antérieure. On pourroit encore ajouter que les lunules marginales bleues du dessus tirent davantage sur le violet.

On la trouve en Allemagne & en Alsace, sur la rive du Rhin.

58—59. VANESSE Pélasgis.

VANESSA Pelasgis.

Van. alis dentatis: anticis falcatis, posticis intus subcaudatis: omnibus fuscis, fasciâ supra rufescente, subtus albâ; anticarum bifidâ.

Nous ne connoissons cette espèce que par un individu unique, pris au pays des Hottentots par feu M. De Lalande.

Il a environ deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, & entièrement traversé au milieu par une bande rouffâtre, sur laquelle sont alignés des points noirs à prunelle bleuâtre. Les premières ailes ont à la base deux raies fauves, courtes, transversales, & leur bande offre près de la côte une siffure profonde qui renferme deux points blancs.

Le dessous ressemble au dessus, mais la bande est blanche, au lieu d'être rouffâtre, & il n'y a pas de raies fauves près de l'origine des ailes supérieures. Ainsi, ce lépidoptère ne peut être confondu avec le *Laodorus*, puisqu'il n'a aucune tache sur le bord postérieur des ailes, & que les points de la bande sont ocellés de part & d'autre.

59—40. VANESSE? Profopé.

VANESSA? Profopé.

Van. alis dentatis, fuscis, fasciâ communi fulvâ: anticarum punctis duobus nigris. FAB.

Papilio N. Profopé. FAB. *Syst. Ent.* p. 504. n^o. 260. — *Spec. Inf.* tom. 2. p. 91. n^o. 400. — *Mant. Inf.* tom. 2. p. 49. n^o. 483. — *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 120. n^o. 367.

Papilio Profopé. DONOV. *Gen. Illustr. of Ent. part. 1. an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of New Holl. pl.* 27. fig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, particulièrement à l'extrémité, avec une bande fauve, commune, large, discoidale. Cette bande est sans taches aux secondes ailes; mais elle offre deux points aux premières, lesquelles ont en outre au sommet deux taches fauves.

Le dessous de toutes les ailes est plus pâle que le dessus, avec une rangée postérieure de points noirs. Les points des ailes de devant sont simples. Ceux des ailes de derrière ont un iris ferrugineux peu distinct, & ils sont précédés d'une ligne blanche & ondulée.

Décrite d'après Fabricius & Donovan.

De la Nouvelle-Hollande.

42—43. VANESSE? Pythia.

VANESSA? Pythia.

Van. alis angulato-dentatis, fuscis: anticis maculâ albidâ: subtus griseis, posticis strigâ punctorum nigrorum. FAB.

Papilio N. Pythia. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 3. pars 1. p. 116. n^o. 357.

Comme Fabricius place ce lépidoptère immédiatement à côté de son *Zingha* (notre Emma), il est très-probable que c'est une vauessé.

Il est de moyenne taille, & il a les ailes très-anguleuses. Leur dessus est d'un brun-obscur, avec

une grande tache blanchâtre vis-à-vis du femur des supérieures. Le dessous des quatre ailes est gris, avec une rangée transversale de six points blancs, appuyés chacun sur un point noir.

De la Guinée.

(Traduction de Fabricius.)

48 (*duplicata*). VANESSE Orithye.

VANESSA Orithya.

Van. alis denticulatis, suprâ nigris, singularem ocellis duobus unipupillatis: anticis subfulcatis, costâ basæos albâ; posticis rotundatis, fasciâ cyaneâ.

Papilio N. Orithya, *alis dentatis, fuscis: omnibus suprâ ocellis duobus, anticis subinis unico.* LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 770. n^o. 157. — *Mus. Lud. Ulr.* p. 278.

Papilio N. Orithya. *FAB. Syst. Ent. pag. 490. n^o. 208. — Spec. Inf. tom. 2. p. 70. n^o. 315. — Mant. Inf. tom. 2. p. 35. n^o. 367. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 91. n^o. 246.*

SULZ. *Inf. tab. 17. fig. 1. 2.*

ROES. *Inf. 4. tab. 6. fig. 2.*

Papilio Orithya. *CRAM. pl. 19. fig. C. D.* (La femelle.)

Papilio Orithya. *CRAM. pl. 52. fig. E. F.* (Le mâle.)

Papilio Orithya. *CRAM. pl. 290. fig. A. B.* (Le mâle.) *fig. C. D.* (La femelle.)

Nous avons donné pour la femelle de l'Orithye un lépidoptère qui en est très-voisin, mais qui forme une espèce distincte. Il devient donc nécessaire que nous décrivions de nouveau cette vanesse, afin qu'on ne la confonde pas avec celle qui y avoit été réunie.

L'Orithye a le plus ordinairement deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus de chaque aile est d'un noir-foncé & velouté dans le mâle, d'un noir-brun dans la femelle, avec deux yeux noirs à prunelle d'un bleu-violet & à iris d'un fauve-rougeâtre. Les premières ailes, dont la côte est blanchâtre depuis sa naissance jusqu'au milieu, ont vers la base quatre petites lignes obliques, alternativement fauves & bleuâtres; & vers le bout trois raies blanches, dont l'intérieure plus large, plus courte & comprimée au côté interne, l'intermédiaire interrompue par l'œil supérieur & descendant jusqu'à l'œil inférieur; la troisième maculaire & longeant tout le bord terminal, bord dont les échancrures sont blanches. Les secondes ailes ont le long du même bord une double ligne blanche sinuée, & surmontée d'une bande bleue, qui, dans le mâle, se replie vers la côte pour gagner la base, tandis que dans la femelle, au contraire, elle couvre l'angle interne des ailes

supérieures. Le dessous de ces dernières ailes est fauve depuis son origine jusqu'au milieu, avec trois bandes blanchâtres, transverses, sinuées, bordées de noir; ensuite grisâtre jusqu'à l'extrémité, avec un ou deux yeux allez semblables à ceux de la surface opposée. Le dessous des ailes inférieures est tantôt blanchâtre, tantôt d'un gris-brun, avec des lignes rouillâtres, flexueuses & transverses vers la base; quatre yeux, dont les deux intermédiaires beaucoup plus petits vers l'extrémité. Ces yeux sont remplacés quelquefois par des points à peine distincts, notamment dans les femelles. Le corps est noir en dessus, grisâtre en dessous. Les antennes sont blanchâtres, avec la massue noire.

Bengale, Chine, Java.

48—49. VANESSE Orthofie.

VANESSA Orthofia.

Van. alis denticulatis, suprâ nigricantibus: anticis subfulcatis, costâ basæos fuscâ; posticis rotundatis, ocellis sesquitertis, anteriori tripupillato.

Papilio Orithya. *CRAM. pl. 281. fig. E. F.*

Nous l'avions prise pour la femelle de l'Orithye; mais elle en diffère en ce que l'origine de la côte des premières ailes est brune au lieu d'être blanchâtre; en ce que l'œil de leur angle interne est beaucoup plus grand, moins rond, & accompagné de part & d'autre de deux points noirs renfermés dans le même iris que lui; en ce que le dessous des secondes ailes est sans bande bleue, & qu'il a trois yeux lilas, dont l'antérieur plus grand & pourvu de trois prunelles blanches, l'intermédiaire très-petit & adhérent au postérieur; enfin, en ce que le dessous de ces dernières ailes a cinq taches oculaires, dont la seconde & la cinquième plus grosses.

De l'île d'Amboine.

Nota. On voit par la synonymie que Cramer la rapporte à l'Orithye.

55—56. VANESSE Dejean.

VANESSA Dejeanii.

Van. alis subdentatis, suprâ fuscis: anticis dimidiâ apicali nigro fasciâ flavescente mediâ repandâ; posticis ocellis quatuor marginalibus rufis.

Elle est à peu près de la taille de l'*Atalante*, à laquelle elle ressemble beaucoup en dessous.

Le dessous des ailes supérieures est brun à la base & tout le long du bord interne, ensuite très-noir jusqu'au bout, avec une bande d'un jaune-faive, transversale, centrale, courbe, sinuée, & suivie de cinq taches blanches inégales, dont l'intérieure appuyée obliquement sur la côte, les quatre au-

tres en forme de points & disposées en arc vis-à-vis du sommet. Le dessus des secondes ailes est brun, avec une rangée terminale de quatre yeux rous à prunelle noire, & surmontés chacun d'un point immédiat de cette couleur: outre cela, il y a à l'angle de l'anus deux petits groupes d'atomes violâtres.

Le dessous des premières ailes offre les mêmes caractères que le dessus; mais l'origine du bord antérieur est entre coupée de jaunâtre, la bande adhère par son côté interne à un V ferrugineux; il y a entr'elle & la tache blanche intérieure un anneau bleu, & le sommet est brun, avec une ligne violâtre transversale.

Le dessous des secondes ailes est brun, avec la base finement réticulée de blanc, le milieu de la côte marqué d'une tache d'un gris-lilas, & le bord postérieur longé par une ligne bleue, ligne avant laquelle il y a une série de cinq yeux presque allacés. Ce bord est, ainsi que celui des premières ailes, liseré de blanc aux échancrures. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous. Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec la sommité de la massue rousse.

Les deux sexes sont semblables.

Dédiée à M. le baron Dejean, savant entomologiste, à qui nous en devons la connoissance.

Elle habite l'île de Java.

56—57. VANESSE Chrysités.

VANESSA Chrysites.

Van. alis denticulatis: anticis subtruncatis utrinque violaceo-nigris, fuscis calthaceis: posticis rotundatis, subtis maculâ costali stramineâ, emarginato-trigonâ.

Nymphalis Chrysites. Recueil d'observations de zool. & d'nat. comp., par Alex. de Humboldt & A. Bonpland, vol. 1. p. 245. fig. 1. 2. (La femelle.)

Puisque le renflement brusque de la massue des antennes est le caractère qui distingue principalement les VANESSES des NYMPHALES, l'espèce dont il s'agit ici doit appartenir au premier de ces deux genres.

Elle a de deux pouces & un quart à deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des premières ailes est d'un noir à reflet violet dans les deux sexes, avec trois bandes transverses d'un jaune-fouci chatoyant, & dont la postérieure maculaire plus courte, marquée d'un point blanc ou blanchâtre. Le mâle a le dessus des secondes ailes d'un noir-brun, avec un espace discoïdal d'un bleu-violet-luisant, grand & arrondi en dehors. La femelle a le dessus des mêmes ailes d'un brun-noirâtre, & entièrement traversé dans son milieu par une bande-fouci un peu glacée de violet, large, coupée parallèlement au bord postérieur par une ligne noirâtre en feston, & que surmonte près de l'angle

anal un point également noirâtre. Le dessous des ailes de devant, dans le mâle comme dans la femelle, diffère du dessus en ce que l'espace qui sépare les deux bandes antérieures offre un gros point bleu; en ce que le sommet est bai-brun, avec une rangée courbe & transversée de quatre yeux, dont les deux antérieurs très-petits, noirâtres, à prunelle & à iris violâtres; le troisième plus grand, blanchâtre, entouré de deux cercles dont l'intérieur rousâtre, l'externe jaunâtre; le quatrième de la grosseur du précédent, noir, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaunâtre. Ces yeux sont suivis d'un cordon transversal de lunules violâtres. Le dessous des ailes de derrière est bai-brun, teinté de bleuâtre vers la base, marqué au milieu de la côte d'une tache triangulaire & échancrée d'un jaune-paille-luisant, traversé au-delà du milieu par une rangée de quatre yeux entourés d'un cercle jaunâtre, & ayant, à l'exception de l'avant-dernier, une prunelle noire faiblée de bleuâtre. Le corps est à peu près du même ton que le fond des ailes. Les antennes sont brunes, annelées & terminées de blanchâtre.

Du Pérou & du Brésil.

57—58. VANESSE? Drufius.

VANESSA? Drufius.

Van. alis integerrimis, fulvis, apice nigris: posticis subtis punctis albis ocellisque duabus.
FAB.

Papilio N. Drufius. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 56. n°. 172.

Papilio Drufius. DONOV. Gen. Illustr. of Ent. part. 1. an Epit. of the Nat. Hist. Inj. of Asia, pl. 26. fig. 2.

Elle a le port & la taille de la vanesse du *Charadon* (la belle-dame). Ses antennes sont en massue. Les premières ailes sont fauves, avec l'extrémité noire & chargée d'une bande & d'un point fauve. Les secondes ailes sont fauves, avec le bord terminal noir & précédé de deux points oculaires de sa couleur. Le dessous des quatre ailes est nuancé de ferrugineux: celui des supérieurs offre au milieu une tache blanche flexueuse & une raie noire transversale, à l'extrémité des points blancs & deux yeux à prunelle noire & blanche, sans compter deux autres yeux peu distincts & disposés sur la même ligne. Le dessous des secondes ailes a des points blancs & deux yeux.

De l'île de Rotterdam.

(Décrite d'après Fabricius.)

58—59. VANESSE Cœlina.

VANESSA Cœlina.

Van. alis dentatis, fusco-nigris: anticis subtruncatis, disco supra nitidè cæruleo: posticis rotundatis, subtis marmoratis, ocellis octo obsoletis.

Nous n'avons vu que des mâles de ce lépidoptère. Ils ont environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes supérieures est d'un bleu-violet-luisant, avec l'extrémité d'un noir-brun & coupée par une ligne oblique de trois points blancs. Le dessus des secondes ailes est d'un noir-brun, sans aucune tache. Le dessous des ailes supérieures est noirâtre, avec une bande blanchâtre, oblique, peu prononcée; puis trois points blancs correspondant à ceux du dessus: derrière ces points, sont trois petites taches verdâtres, rangées obliquement sur un fond gris qui s'étend jusqu'au bord du sommet. Le dessous des ailes inférieures est marbré de brun, de noirâtre & de blanchâtre, & présente au-delà du milieu une rangée transversale de huit yeux peu prononcés, à prunelle verdâtre & à iris brun. Les échancrures des quatre ailes sont blanches. Le corps est de la couleur des ailes. Les antennes sont brunes, avec le dessous de la massue jaunâtre.

Du Brésil.

58—59 a. VANESSE Sophronie.

VANESSA Sophronia.

Van. alis dentatis, supra cyaneo-virescentibus: anticis subtruncatis, utrinque fascia punctisque albis: posticis rotundatis, subtus marmoratis, ocellis quinque obsoletis.

Nous n'avons vu que des femelles de cette espèce. Elles ont près de deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un vert-bleuâtre un peu luisant, avec le sommet des supérieures & le pourtour des inférieures noirs. Les supérieures ont, au-delà du milieu, une bande blanche, oblique, sinuée, presque maculaire, & suivie d'une rangée oblique de trois points blancs, dont l'inférieure moins distinct. Les secondes ailes sont sans taches. Le dessous des ailes de devant est noirâtre, avec la base & le sommet grisâtres: on y voit, outre la bande & les points de la surface opposée, un trait d'un blanc-bleuâtre, peu éloigné de la base & appuyé obliquement sous la côte. Le dessus des ailes de derrière est marbré de blanc, de gris-cendré & de violâtre, avec une ligne d'un brun-foncé, transversale & flexueuse, sur le milieu; puis une rangée également transversale de cinq yeux noirâtres, ayant la prunelle bleuâtre, l'iris plus ou moins blanchâtre & peu prononcé. Les échancrures du bord postérieur sont blanches. Le corps est bleuâtre en dessus, gris en dessous. Les antennes sont ferrugineuses, avec la massue noirâtre.

Du Brésil.

59—60. VANESSE Amycla.

VANESSA Amycla.

Van. alis denticulatis, fuscis: anticis sub-

truncatis, apice cærulescenti-nigro alboque maculato: posticis rotundatis, subtus ocellis quinque obsoletis.

Nous ne connaissons cette espèce que par des individus femelles. Leur envergure est de près de deux pouces. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec le sommet des supérieures d'un noir-bleuâtre & marqué de quatre taches blanches, le bord terminal des inférieures longé par une ligne noirâtre en sillon. Le dessous des ailes de devant est gris à la base, avec du rouffâtre; noirâtre au-delà du milieu, avec des taches blanches comme dessus, mais séparées par des points bleuâtres; gris au sommet, avec une ligne violâtre en forme de 5. Le dessous des ailes de derrière a environ la moitié antérieure violâtre & bordée par une ligne ferrugineuse très-fine; l'autre moitié d'un brun-rouffâtre, avec cinq yeux peu prononcés, ferrugineux, à prunelle & à iris d'un gris-violâtre, & entourés de violet-obscur. Le bord postérieur des quatre ailes est ferrugineux & irrégulièrement entrecoupé de blanc. Le corps est à peu près du même ton que les ailes. Les antennes sont brunes en dessus, ferrugineuses en dessous.

Du Brésil.

60—61. VANESSE Sophie.

VANESSA Sophia.

Van. alis denticulatis, anticis subsulcatis, posticis rotundatis: omnibus supra rufa, nigro flavidoque variis, limbo fusco, nigro punctato.

Papilio S. Sophia, alis dentatis, flavo-fusco nigroque variis, margine fusco, nigro punctato lunulique posticavum albis. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 248. n.º 771.

Papilio Sophia. JON. Fig. pict. 4. tab. 91. fig. 2.

Papilio Sophia. DONOV. of an Epitom. of the Nat. Hist. Ins. of Ind. cah. 2. pl. 2. fig. 5.

Fabricius place cette espèce dans son magasin des *Satyres*.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure. Le dessus des premières ailes est roux à la base, avec quatre lignes noires, courtes & transversales; jaunâtre au milieu, avec les nervures noirâtres; obscur à l'extrémité, avec une petite bande jaunâtre, courbe, transversale, & séparée de l'angle interne par une suite de quelques points noirs. Le dessous des secondes ailes est obscur, avec deux petites taches rousses à la base, une bande jaunâtre sur le milieu, deux rangs de points noirs & une double ligne blanchâtre sur le limbe postérieur. Le dessous des quatre ailes ne diffère du dessus que parce que tout le jaunâtre est remplacé par du blanc-luisant, & le brun-obscur par du jaune-pâle.

De la côte occidentale d'Afrique. Fabricius dit qu'elle se trouve dans les Indes.

63—64. VANESSE? Sophonisbe.

VANESSA? Sophonisba.

Van. alis rotundatis, subintegris, utrinque eyaneo-virescentibus, nigro maculatis: anticis fuscis albâ.

Papilio Sophonisba. CRAM. pl. 295. fig. A. B.

Si la figure de Cramer est exacte, ce lépidoptère a bien du rapport avec la vanesse *Sophonie*; mais les ailes supérieures sont arrondies, & non tronquées; la bande blanche de leur dessus n'est ni sinuée ni suivie de points blancs; le dessous de ces mêmes ailes est verdâtre à la base, ainsi qu'à l'extrémité, avec des taches noires; les deux qu'on appelle des secondes ailes sont d'un vert-bleuâtre, avec des taches noires, dont cinq ocellées, & formant une rangée transverse au-delà du milieu.

De Surinam.

GENRE BIBLIS.

5—6. BIBLIS Antholia.

BIBLIS Antholia.

Bib. alis dentatis, suprâ nigris, violaceo maculatis: anticis truncatis, utrinque albo maculatis: posticis rotundatis, subtus strigâ mediâ puncturâ fuscâ.

Nous n'avons vu de cette espèce que deux individus, & ils étoient sans abdomen; leur envergure est d'environ trois pouces. Le dessus des ailes est noir, avec un rellet violet assez vif. Les supérieures, dont le sommet est prolongé & largement tronqué, ont vers le bout une bande blanche, transverse, interrompue sans son milieu, & précédée en dehors de deux gros points de sa couleur. Les ailes inférieures sont arrondies, dentées & sans taches en dessus. Le dessous des premières ailes est d'un brun-noirâtre, avec tout l'angle externe, & une bande correspondante à celle du dessus, d'un blanc-violet. Le dessous des ailes de derrière est d'un brun-grisâtre, teint de violet, avec deux raies ou bandes plus claires, discoïdales, transverses & sinuées, dont la postérieure offrant par son côté interne une série de cinq à six points noirâtres.

Des Antilles, & particulièrement de la Martinique.

5—6 a. BIBLIS Hiarba.

BIBLIS Hiarba.

Bib. alis dentatis, fuscis, fuscâ utrinque communi albâ: posticâ latiore, bipunctatâ.

Papilio N. Hiarba, alis dentatis, nigris, fuscâ communi albâ: anticarum abbreviatâ. FAB. Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 123. n°. 591.

Papilio Hiarba. JON. Fig. pict. 5. tab. 79. fig. 2.

Papilio Hiarba. DOXON. of an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of Ind. cah. 9. pl. 3. fig. 3.

Papilio Hiarba. DRYER, Inf. tom. 3. pl. 14. fig. 1. 2.

Elle est de la taille de la précédente. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande blanche commune, plus étroite & sans taches aux supérieures, marquée aux inférieures de deux petits points obscurs: il y a en outre le long du bord terminal des unes & des autres, une ligne flexueuse d'un gris-cendré. Le dessous diffère du dessus en ce que le fond est plus pâle; en ce que la base des quatre ailes est finement ondée de blanc, & leur milieu traversé avant la bande par une raie ferrugineuse, sinuée & peu distincte. Le corps & les antennes sont de la couleur des ailes.

Prise dans les grands bois au pays des Hottentots, par M. De Lalande. On la trouve aussi à Sierra-Léone, mais non dans les Indes comme le dit Fabricius.

5—6 b. BIBLIS Dryope.

BIBLIS Dryope.

Bib. alis dentatis, fuscis, fuscâ communi, suprâ fulvâ & immaculatâ, subtus albidâ: posticarum latiore subtusque septem punctatâ.

Papilio S. Driope, alis dentatis, fuscis, rufis maculatis, apice fulvis: subtus maculis rufis albo cinclis. FAB. Spec. Inf. tom. 2. pag. 107. n°. 469. — Mant. Inf. tom. 2. p. 61. n°. 582. — Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. pag. 156. n°. 793.

Papilio Driope. CRAM. pl. 78. fig. E. F.

Papilio Dryope. HERBST, tab. 168. fig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, faiblement tacheté de roux près de la base, & traversé vers l'extrémité par une bande fauve, commune & sans taches. La bande des premières ailes n'atteint pas la côte, du moins ordinairement; celle des secondes ailes est plus large & précédée en dehors d'une ligne flexueuse de sa couleur. Le dessous de toutes les ailes a environ la moitié antérieure d'une teinte verdâtre, avec des taches ferrugineuses encadrées de blanc, & le bord postérieur d'un brun-pâle, avec une ligne blanche en fesson: à la bande du dessus correspond une bande blanche, sur laquelle les secondes ailes ont une rangée courbe de sept points obscurs.

De la côte de Guinée.

GENRE

GENRE NYMPHALE.

11—12. NYMPHALE Schreiber.

NYMPHALIS Schreiber.

Nym. alis bicaudatis, supra nigris : subtus margaritaceo olivaceoque variis, fasciâ mediâ hyalino-albâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-verdâtre à la base, d'un noir-violet à l'extrémité, avec une bande blanche, commune, oblique, discoïdale, un peu transparente, terminée en pointe à chaque bout & presque entièrement bordée de bleu-pâle à son côté externe. Entre cette bande & le sommet, les premières ailes ont deux points blancs, disposés longitudinalement. Les secondes ailes ont avant le bord postérieur une rangée de sept lunules blanches, & sur ce bord même une rangée de sept lunules fauves, mais dont l'anale moins foncée. Leurs deux queues sont extérieures, linéaires, blanches de part & d'autre, avec les bords noirs.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris de perle à la base & vers l'extrémité, d'un vert-olive pâle avant le milieu & le long du bord postérieur. A la bande blanche du dessus correspond ici une bande semblable, mais bordée intérieurement par une ligne noire, & extérieurement par une série de petits croissants blanchâtres, lesquels s'appuient aux secondes ailes sur un cordon de lunules ferrugineuses. Ces dernières ailes sont en outre terminées par sept lunules jaunâtres. Les ailes supérieures ont près de l'origine de la côte deux petits points, & près de l'angle interne une grande tache, noirs. Le corps est verdâtre en dessus, grisâtre en dessous, avec quatre points blancs sur la tête. Les antennes sont noires, avec la sommité ferrugineuse.

Décrite d'après un individu unique appartenant à M. Marchand de Chartres, & dédié au savant M. Schreiber, directeur du cabinet impérial de Vienne.

De l'île de Java.

43—46. NYMPHALE Franck.

NYMPHALIS Franck.

Nym. alis subcaudatis, supra nigris : anticis fasciâ obliquâ albâ azureo marginatâ : posticis subtus basi fusco inscriptis, apice viriscenti pulverulentis.

Nymphale Franck. *Mém. de la Soc. Linn. de Paris, tom. 2. pl.*

Nous ne connoissons ce beau lépidoptère que par un individu mâle & unique, recueilli dans l'île de Java.

Hist. Nat. Inf. Tome LX.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure. Le dessus des ailes est d'un noir-violet, avec la base verdâtre. Les ailes supérieures ont une bande blanche, anguleuse, largement bordée de bleu d'azur, descendant obliquement du milieu de la côte à l'angle postérieur, & offrant vers l'origine de son côté interne un *stigma* transversal d'un noir-foncé. Il y a en outre près du sommet trois gros points blancs, rangés en arc. Le sommet des ailes inférieures est chargé de deux points semblables, mais bordés de violâtre intérieurement.

Le dessous des premières ailes est d'un nankin, avec une multitude d'hieroglyphes d'un noir-brun, & parmi lesquels se répètent la bande ainsi que les trois points blancs de la surface opposée.

Le dessous des secondes ailes est nankin vers la base, avec des hieroglyphes du même noir que ceux des ailes de devant; puis d'un brun-noir jusqu'au bout, avec des lignes nankin, transversales, flexueuses, séparées l'une de l'autre par un large semis d'un vert-grisâtre luisant, semis qui remonte jusqu'au milieu du bord abdominal. A l'angle de l'anus est une lunule ferrugineuse, derrière laquelle sont placées successivement deux taches d'un vert-jaune. Le corps est brun, avec le dessus de l'abdomen jaunâtre. Les antennes sont ferrugineuses.

Dédié à M. Franck de Strasbourg, amateur très-instruit & possédant en lépidoptères d'Europe la collection la plus complète que l'on ait formée jusqu'ici.

222—225. NYMPHALE Livius.

NYMPHALIS Livius.

Nym. alis integerrimis, atris, maculâ disci coraleâ : posticis subtus cinereis, fasciis raris argenteo marginatis. FAB.

Hesperia R. Livius. FAB. *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 315. n. 194.*

Papilio Livius. JON. *Fig. pict. 6. tab. 58. fig. 1.*

Elle est de moyenne taille. Toutes ses ailes sont noires en dessus, avec une grande tache bleue sur le disque.

Le dessous des premières ailes est cendré vers la base, avec une grande tache jaune, oblongue & bordée d'argent; il est jaunâtre vers l'extrémité, avec une bande brune, large, & pareillement bordée d'argent.

Le dessous des secondes ailes est cendré, avec trois bandes rouffes bordées d'argent, & dont la troisième interrompue: il a en outre le bord postérieur jaune, avec une bande argentée.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

M m m m m

234—235. NYMPHALE Héraclite.

NYMPHALIS *Heracitus*.

Nym. alis dentatis, atris : anticis maculâ fulvâ, posticis cœruleâ : subtus posticis strigis flavis punctisque cœruleis. FAB.

Hesperia R. *Heracitus*. FAB. *Ent. Syst. ent.* tom. 3. pars 1. p. 291. n^o. 112.

Papilio Heracitus. JON. *Fig. piçt.* 6. tab. 37. fig. 2.

Ses ailes sont très-noires. Les supérieures ont en dessus une grande tache fauve, transversale. Leur dessous offre un point & une tache fauves, plus deux lignes jaunes, dont une à la base, l'autre à l'extrémité. Le dessous des ailes inférieures a une grande tache bleue sur le disque. Le dessous a cinq lignes noires, transversales, dont l'antérieure commune aux ailes de devant, la seconde & la troisième se réunissant en arrière, la quatrième courte, la cinquième arquée : entre la troisième & la quatrième il y a quatre points bleus, sans compter trois points semblables placés vers l'angle de l'anus.

De l'Amérique méridionale.

(Traduction de Fabricius.)

235—236. NYMPHALE Ischaris.

NYMPHALIS *Ischaris*.

Nym. alis integris, suprà fusco-nigris : anticis maculâ disci niveâ apiceque chermesino : omnibus subtus chermesinis, maculis argenteo-cœruleis nigriſque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure. Le dessus de ses ailes est d'un noir-brun chatoyant, avec toute l'extrémité des supérieures, & une liture marginale au sommet des inférieures, d'un rouge-carmain.

Le dessous est d'un rouge-carmain, avec une multitude de taches d'un bleu-argenté, entremêlées de taches noires, & éparſes depuis la base jusqu'au-delà du disque. Les ailes supérieures offrent en face du sommet un grand espace fauve, absolument nu. Les inférieures ont l'extrémité noire, avec trois lignes arquées, dont l'antérieure d'un bleu-argenté, l'intermédiaire d'un jaune-d'ocre, la postérieure rouge vers l'angle externe, & jaune vers l'angle interne : outre cela, les taches qui précèdent la ligne antérieure sont bordées en arrière de jaune-orangé. Le corps est brun en dessus, jaunâtre en dessous.

Décrite d'après un individu recueilli dans les Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel, voyageurs du Gouvernement.

GENRE EUMÉNIE. *Eumenia*.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs allongés, simplement garnis d'écaïlles, ayant le premier et le troisième articles, mais surtout le premier, sensiblement plus courts que le deuxième. Cellule discoidale des secondes ailes fermée en arrière comme dans le genre EURYMIE.

Nota. Ce nouveau genre doit être placé entre les pages 459 & 460 de ce volume.

1. EUMÉNIE Toxéa.

EUMENIA *Toxæa*.

Eum. alis rotundatis, integris, suprà ardoſiaceis, limbo nigro : subtus fuscis ; anticis immaculatis, posticis apice strigis tribus è punctis inaurato-viridibus maculâque marginis interni aurantiâ.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart d'envergure. Le dessus des ailes est d'un bleu-ardoilé-chatoyant, avec le limbe postérieur noir, & chargé aux inférieures d'une série de points d'un vert-doré. La frange est en outre totalement blanche.

Le dessous est d'un brun-noirâtre, sans aucune tache aux ailes supérieures, avec trois rangées transversales de points d'un vert-doré à l'extrémité des inférieures. Ces points sont placés sur un fond plus intense que tout le reste de la surface, & il y a vers le milieu du bord interne une tache orangée. Le corps est ardoilé en dessus ; d'un brun-noirâtre en dessous, avec les trois quarts postérieurs du ventre orangés. Les antennes manquent aux trois individus d'après lesquels nous faisons la présente description.

Chez la femelle, le bleu du dessus des ailes a moins d'étendue, principalement aux inférieures.

De l'intérieur de l'Amérique méridionale.

GENRE SATYRE.

109—110. SATYRE Anthé.

SATYRUS *Anthe*.

Sat. alis dentatis, suprà fuscis, nitidis, fuscis albâ : anticarum maculari ocellis duobus haut pupillatis ; posticis ocello utrinquè cæco.

Hipparchia *Anthe*, *alis dentatis, fuscis, fuscis albâ, anticarum interruptâ ocellis duobus cæcis : posticis subtus cinereo fuscoque mammoratis, ocello utrinquè unico.* OCHSEN. *Pap. Eur. edit.* 2. tom. 4. p. 131. n^o. 4.

Papilio Persephone. HUBN. *Pap. tab.* 140. fig. 710. 711. (Mas.) — *tab.* 115. fig. 589. 590. (Fem.)

Ainsi que nous l'avons dit à la page 515, ce fatyre se rapproche extrêmement de la femelle du *Briffis*; mais les yeux de ses ailes supérieures sont toujours sans prunelle, & ses ailes inférieures ont de part & d'autre un œil également dépourvu de prunelle: outre cela, il offre en dessous des différences qui consistent en ce que le double ligne noir du milieu de la côte des premières ailes & les trois bandes blanchâtres des secondes ailes font beaucoup plus étroits. La femelle ne diffère d'ailleurs essentiellement du mâle que par la grandeur.

Il habite la Russie orientale.

111—112. SATYRE Néomiris.

SATYRUS Neomiris.

Sat. alis subdentatis, suprâ fuscis, fuscâ fulvâ: anticarum maculari oculo unico seu duobus: posticis subtus fusco cinereoque marmoratis, fuscâ albâ intus emarginatâ. (Mas.)

Satyre Néomiris. GOD. *Hist. nat. des lépid. de France*, tom. 2. p. 88. pl. XI. fig. 1. 2.

Satyre Néomiris. GOD. *Tub. méthod. des lépid. de France*, DIURNES, p. 19. n^o. 52.

Nous n'avons vu que le mâle de ce fatyre. Il a de vingt à vingt-deux lignes d'envergure. Le dessus des ailes est d'un brun-noirâtre, avec une bande fauve, parallèle au bord postérieur. La bande des premières ailes est maculaire, oblitérée antérieurement, & marquée vis-à-vis du sommet d'un petit œil noir à prunelle blanche. La bande des secondes ailes est courbe, large, & elle a le côté interne carrément échancré dans son milieu.

Le dessous des premières ailes diffère du dessus en ce que la bande fauve est continue & tiquetée de blanc à son extrémité supérieure.

Le dessous des secondes ailes est marbré de brun & de cendré, & traversé dans son milieu par une bande blanche, ayant le côté interne échancré, le côté externe suivi d'une rangée de points blanchâtres, derrière laquelle il y a une ligne noire anguleuse. Les antennes sont brunes en dessus, pâles en dessous, & terminées par une massue en cuilleron.

Quelquefois la bande du dessus des ailes supérieures offre un second œil, & l'on en voit aussi un près de l'angle anal des inférieures.

De la Corse; communiqué par M. Lefebure de Cérisy.

GENRE ÉRYCINE.

5 (*duplicata*). ÉRYCINE Curius.

ERYCINA Curius.

Eryc. alis subconcoloribus, nigris, fuscâ communi glaucâ: anticis antè apicem hyalinis.

Papilio E. A. Curius, alis caudatis, concoloribus, atris: anticis fuscâs duabus hyalinis, posticis unicâ albâ. FAB. *Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n^o. 71.* — *Ent. Syst. em. tom. 3. pars 1. p. 28. n^o. 81.*

Papilio Curius. DONOV. *Gen. Illust. of Entom. an Epit. of the Nat. Hist. Inf. of Ind. cah. 4. pl. 4. fig. 4.*

Par la forme de la tête, cette espèce sembleroit appartenir au genre PAPILLON (*Equites*, Linn.); mais, d'après la structure de la cellule discontinue de ses ailes inférieures, elle doit être mise dans la division des *Chenilles cloportes*, où elle constituera probablement un genre, lorsqu'on aura acquis des notions sur ses deux premiers états. En attendant, nous la laissons parmi les *Erycines*; mais nous la décrivons de nouveau ici, attendu que nous ne l'avions fait connoître que par la traduction du texte de Fabricius.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure. Le dessus des ailes est noir, avec une bande d'un vert-blanchâtre, descendant de la côte des supérieures au disque des inférieures, où elle se termine en pointe. Les premières ailes ont entre le milieu & le bord terminal un espace diaphane, grand, en forme de triangle curviligne & coupé par des nervures noires. Les secondes ailes sont brièvement dentées, liserées de blanc à leur bord postérieur ainsi qu'au côté interne de la queue, laquelle est entièrement saupoudrée de gris.

Le dessous ressemble au dessus, excepté que les ailes inférieures ont vers le bas du bord abdominal trois chevrons blanchâtres, transverses & lucifères. — Le corps est noir en dessus, blanchâtre en dessous, avec une double rangée latérale de points noirâtres. Les antennes sont noires, avec le dessous de la massue roussâtre.

Nous n'avons vu que des individus femelles.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

10—11. ÉRYCINE? Amyntor.

ERYCINA? Amyntor.

Eryc. alis dentato-caudatis, atris, basi maculâ fulvâ, apice fuscâ flavâ. FAB.

Papilio Cecilia. CRAM. pl. 159. fig. D. E.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure. Les quatre ailes sont d'un noir-foncé, avec une grande tache fauve à la base, & une bande jaune transverse à l'extrémité. La bande des premières ailes est plus large que celle des secondes.

Le dessous ressemble au dessus, mais le bord postérieur des secondes ailes offre derrière la bande jaune une série de petites taches blanches, lunulées.

- De l'Inde, selon Fabricius; du Bengale, selon Cramer.

Nota. Le papillon *Dorinne*, pl. 576, fig. G, H, de Cramer, n'en seroit-il pas la femelle ou une variété? Il n'en diffère en dessus que par l'absence de la bande jaune des ailes inférieures. On le trouve à Surinam.

11—12. ERYCINE? Coriolan.

ERYCINA? *Coriolanus*.

Eryc. alis dentatis, caudatis, obscurè cinereis, strigâ communi ferrugineâ. FAB.

Hesperia R. *Coriolanus*. FAB. *Ent. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 284. n°. 91.

Papilio Coriolanus. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 48. fig. 1.

Elle est grande. Les ailes sont grises, avec une ligne commune sur le milieu des quatre, & une tige à l'extrémité des inférieures, ferrugineuses. Le dessous ressemble au dessus, mais les ailes inférieures ont quatre points noirs, marqués de blanc.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

13—14. ERYCINE? Plante.

ERYCINA? *Plautus*.

Eryc. alis dentatis, fuscis, suprâ immaculatis: subtus lineolis atris albifque. FAB.

Hesperia R. *Plautus*. FAB. *Entom. Syst. em.* tom. 5. pars 1. pag. 291. n°. 115.

Hesperia Plautus. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 44. fig. 1.

Elle est de moyenne taille. Le dessus de ses ailes est d'un brun-noirâtre, sans taches. Leur dessous est obscur: celui des supérieures offre à la base deux traits noirs, sur le milieu & vers l'extrémité une ligne maculaire noire & blanche, & à l'extrémité même des lignes blanches. Le dessous des secondes ailes a six lignes noires, tranverses & interrompues, dont la seconde & la quatrième bordées de blanc sur un de leurs côtés. Ces dernières ailes ont des dents aiguës.

Des Indes.

(Traduction de Fabricius.)

GENRE MYRINE.

6. MYRINE? Phocides.

MYRINA? *Phocides*.

Myr. alis caudatis, suprâ fuscis: posticis albis, punctis duobus nigris. FAB.

Hesperia R. *Phocides*. FAB. *Entom. Syst. em.* tom. 5. pars 1. p. 282. n°. 85.

Papilio Phocides. JON. *Fig. pict.* 6. tab. 12. fig. 2.

Elle est de la taille de l'*Atymmus*. Le dessus des ailes est d'un brun-obscur, avec l'extrémité des inférieures blanche & marquée de deux points noirs opposés. La queue de ces dernières ailes est longue, ciliée, blanche.

Le dessous des ailes supérieures est alternativement fauve de blanc & de rouge-brique. Le dessous des ailes inférieures est blanc, avec des points & des lignes d'un brun-obscur, & deux taches anales noires.

De Sicra-Léone en Afrique.

(Traduction de Fabricius.)



